


UNIVERSITY OF
OTTAWA
LIBRARY



E 41-16s. Set
2 vols.

2v

CD|-|

~~CD~~

37 plates

~~CD~~
2

ARITHMETICA
UNIVERSITATIS



ARITHMETICA

UNIVERSALIS.

ARITHMETICA

UNIVERSALIS



MO-C9

ARITHMETICA
 UNIVERSALIS;
 SIVE DE
COMPOSITIONE
 ET
 RESOLUTIONE
ARITHMETICA.

Auctore IS. NEWTON, Eq. Aur.
 Cum Commentario

JOHANNIS CASTILLIONEI,
*in almo Lyceo Trajectino Philosophiæ, Matheseos
 & Astronomiæ Professoris Ordinarii &c.*
TOMUS PRIMUS.



AMSTELODAMI,
 Apud **MARCUM MICHAELEM REY.**
 MDCCLXI.



ARITHMETICA

UNIVERSALIS

SIVE DE

COMPOSITIONE

ET

RESOLUTIONE

ARITHMETICAE

AUCTORE IS. NEWTON, Ed. Am.

Cum Commentariis

JOHANNIS CASTILLONII

et aliorum Sacerdotum, Philosophorum, Mathematicorum

et aliorum Sacerdotum, Philosophorum, Mathematicorum

TOMUS PRIMUS



CSB

QA

154

149

1761

n. 1

AMSTERODAMI

Apud MARCUM MICHAELM REY

MDCCLXI

ILLUSTRIBUS AC PRÆPOTENTIBUS
POPULI TRAJECTINI ORDINIBUS
ELECTIS
EQUITIBUS
MAGISTRATIBUS
PATRIÆ PATRIBUS
ATQUE AMPLISSIMIS
CONSULIBUS
ET
SENATORIBUS
ACADEMIÆ
CURATORIBUS

QUOD BONIS LITTERIS ENIXE FAVEANT

ET PRÆSERTIM

QUOD MATHEMATICAS DISCIPLINAS COLENDI

OTIUM SIBI FECERINT

ET PUBLICE DOCENDI CURAM DEMANDAVERINT

D. D. D.

JO. CASTILLIONEUS.

ILLUSTRIBUS AC PRAEPOSENTIBUS
POPULI TRAJECTINI ORDINIBUS
ELECTIS
EQUITIBUS
MAGISTRATIBUS
PATRIAE PATRIBUS
ATQUE AMPLISSIMIS
CONSUETUDINIBUS
ET
SENATORIBUS
ACADEMIAE
CURATORIBUS

QUOD ROSAE LITTERAE LIXIT
ET PRAESENTI
QUOD MATHEMATICARUM DISCIPLINAM COLLENDI
OTIUM SEI PERCIPIT
ET PURICE DOCEBENDI CURAM PERMANENTINTE

M. D. C. C. C. C.
JO. CASTELLIONUS

MONITUM

PRIMÆ EDITIONI PRÆMISSUM.

AD

LECTOREM.

CUM, post haud paucos doctorum Virorum in Arte analytica tradenda labores, liber aliquis, materia plenus, mole parvus, in regulis necessariis brevis, in exemplis certo consilio electis longus, & primis tyronum conatibus accommodatus, etiamnum desiderari videretur; interque *κειμήλια* nostra academica hujusmodi tractatus M. S. publicas Professoris mathematici tunc temporis celeberrimi prælectiones, triginta fere abhinc annis in scholis habitas, continens, mihi statim occurreret; dedi operam ut libellus iste, imperfectus licet, & currente calamo pro officii urgentis ratione compositus, nec prælo ullatenus destinatus, tamen in usum studiosæ juventutis nunc in publicum prodiret. In quo quidem quæstiones haud paucæ e variis Scientiis adductæ multiplicem Arithmeticæ usum satis ostendunt. Animadvertendum tamen, constru-

*

ctio-

AD LECTOREM.

ctiones illas (sive geometricas, sive mechanicas, prope finem adpositas,) inveniendis solum duabus tribusve radicum figuris prioribus, uti suo loco dicitur, inservire: opus enim Cl. Autor ad umbilicum nunquam perduxit; cubicarum *Æquationum* constructionem hic loci tradidisse contentus; dum interea in animo habuerit biquadraticarum aliarumque superiorum potestatum constructionem methodo generali exponendam adjicere, & qua ratione reliquæ radicum figuræ essent extrahendæ sigillatim docere. Cum autem summo Viro hisce minutis postmodo vacare minime placuerit, defectum hunc aliunde supplere volui; atque eum in finem generalem planeque egregiam Cl. Halleii *æquationum* radices extrahendi methodum ex Actis nostris Philosophicis, exorata prius utrobique venia, huc transferendam judicavi. Vale Lector, & conatibus nostris fave.

G. W.

Dabam Cantabrigiæ III. Kal. Mai
An. D. MDCCVII.

PREFA-

PRÆFATIO

A

G. J. S'GRAVESANDE

Præmissa editioni quæ Lugduni Batavorum
prodiit Anno 1732.

Liber hicce prima vice, inscio Auctore, &
ipso hoc ægre ferente, editus fuit Canta-
brigie anno 1707.

Secunda vice in lucem prodiit Londini 1722.;
sed in statu perfectiore, ut quis facile percipiat,
non omnino fœtum abdicasse virum celeberrimum;
ordo propositionum non tantum mutatus est, sed
in ipsis solutionibus & demonstrationibus corre-
ctiones multæ reperiuntur, non nisi ipsi Auctori
tribuende.

Secundam hanc editionem secuti fuimus, adje-
cto tamen monito primæ editioni præposito, & in
secunda suppresso. Singulasque scedas totius
operis, ab alio jam correctas, ipsi, antequam
prælo subjicerentur, examinavimus & legimus.

Nihil in laudem operis dicam, nomen Aucto-
ris in titulo legitur, & hoc quidem satis est. Non
ego editionem dirigere suscepissem, nisi librum
* 2 magni

magni facerem. Jam etiam quid de ipso sentiam explicari satis in præfatione ad specimen commentarii in hunc ipsum; quod specimen habetur ad calcem libelli nostri, cui titulus *Matheseos Universalis Elementa*.

Cum Newtoni *Arithmetica* primum in lucem prodiret, adjecerat Editor, propter convenientiam materiæ, Halleii methodum extrahendi radices æquationum, desumptam ex *Transactionibus Philosophicis Societatis Regiæ Londinensis*; Nos hoc exemplum secuti, non tantum hocce Halleii scriptum, sed omnia adjecimus, quæ in dictis *Transactionibus* reperiuntur, & quæ nobis ad Newtoni librum illustrandum utilia visa sunt. Quæ anglico sermone conscripta erant, latine reddidit vir Rev. Joh. Petr. BERNARD, viri Celeberrimi Jacobi BERNARD, in hac nostra *Academia Batava Professoris Philosophiæ & Mathes. dignissimi & Collegæ nostri dum viveret, conjunctissimi, filius.*

JOH. CASTILLIONEUS

LECTORI, S.



SAACI NEWTONI, summi viri, *ARITHMETICAM UNIVERSALEM* explicandam suscepisse me, novum in Mathematicorum Republica hominem, certe miraberis. Quis es tu, jure quidem dices, qui provinciam illam ultro tibi sumas, quam doctissimus s' GRAVESANDE ad primi ordinis Mathematicos, hoc seculo vigentes, amandavit? Tunc librum illum totum explicabis, cujus duo tantum loca vir ingeniosissimus exposuit & quæ non esse *inter difficillima* modeste professus est?

Vera profecto sunt ista: &, ideo quia vera sunt, scias oportet, quomodo mihi opus hoc exciderit. Non enim consilio mihi onus, quod humeri ferre recusabant, imposui, sed illud, fato quoddam in me conjectum, quousque potui, portavi. Viginti anni jam sunt elapsi, ex quo eximius & optimæ spei Adolescens, (cujus immaturum in teritum adhuc lugeo) *Stephanus SEIGNORETTUS Anglus* rogavit ut ei *Arithmeticam universalem* NEWTONI prælegerem, voluitque ut non ea dumtaxat afferrem, quæ ad Auctoris mentem assequendam erant necessaria, sed quæcunque ad plenioram scientiam facerent, & ea præsertim, quibus vis ingenii (quo multum sane pollebat) crescere posset. Quamobrem ego librum hunc summa cum animi contentione legere; quæ pro tenuitate mea poteram, adnotare; atque, ut curtam suppellestem augerem, optimum quemque hujus argumenti scriptorem diligenter pervolvere; & quæ ad rem facere videbantur, undique corradere. Celerrimo gradu me sequebatur præstantissimus Discipulus, seu potius studiorum comes; quin & multa ipse commentabatur, & mihi plura, quæ sine eo non animadvertissem, commentandi præbebat occasionem. Sic paulisper, me imprudente, crevit *Commentarius hic*; quem, cum perspicerem in justii voluminis formam excrevisse, &, cum nonnulli, qui illum legerant, a me poscerent ut eum publi-

ci juris facerem, ad immortalis memoriæ virum G. s' GRAVESANDE, operis *Newtoniani* fautorem, scripsi quid præstare conatus fuisssem, quibus auxiliis usus, ea demum quæ quid facere instituissem plane quidem, quomodo autem id perfecissem quoad licuit, docere possent (*). Meis litteris humanissime, ut solebat, ille respondit, quid in melius mutandum esset indicavit, & sua cura Typographum libro meo paratum esse significavit. Majores animos hinc ego collegi, atque opus totum revolvere, emendare, augere alacriter cœpi. Interea vita functus est egregius ille vir, cui ego, ac totus litteratus Orbis lacrymis parentavimus. Tunc ego commentarios hos ad perpetuas tenebras damnatos existimans, manum ab eis removi, & operam meam ad *Newtoniana Opuscula*, suadente Marco Michaele BOUSQUET, Bibliopola notissimo, colligenda, vertenda, edenda transtuli.

Tandem post multos casus, quos narrare longum & supervacaneum esset; M. M. REY, diligens Bibliola, & amicus conjunctissimus, hæc qualiacunque fuerint, edere voluit.

En quo pacto librum hunc, id non cogitans, inchoaverim, atque aliorum potius auctoritate quam voluntate mea ductus, perfecerim, atque ediderim. Pauca nunc de ipsa NEWTONI *Arithmetica Universalis* & de consilio meo dicenda supersunt.

Si *ex locis omnibus, in quibus honesti natura & vis continetur, primus* (ut ait CICERO (a) *ille est, qui in veri cognitione consistit, & maxime attingit naturam humanam*, quanti facienda est ars veritatem investigandi? Quam a quo potius ediscamus quam a NEWTONO, summo inventore, non video, nisi quis forte poeticen a CHERILO vel BAVIO quam a VIRGILIO aut HORATIO, militaremque scientiam ab ipso HORATIO qui

..... *celerem fugam*
Sensit *relicta non bene parmula* (b)

quam ab ALEXANDRO aut CÆSARE discere malit. Neque se minor est NEWTONUS in *Arithmetica universalis*, quamquam eam imperfectam reliquerit. Nam, Dii Boni! quæ præceptorum vis, quæ con-

(*) Harum epistolarum una edita nunc est in 2^o. tomo Dictionari scripti gallice a Prospe-ro Marchand, articulo s' *Gravesande*.

(a) De Off. l. i. 6.

(b) Hec. Od. l. II. 7.

concinnitas ordinis, quæ exemplorum copia! Quam hæc omnia sunt apte selecta!

Ordinis autem & præceptorum utilitatem, si olim laudassem, certe risu exceptus illud vulgatum audivissem, *quis vituperat?* Nunc autem horum necessitatem propugnare cogor, postquam viri, (quod magis doleas, alioquin docti & acuti,) seculi levitati adfrentantes, præcepta & ordinem, tamquam perfidos duces in devia trahentes, traducere sunt ausi, & ideo tempus, quod in pulcherrimis & novis excogitandis recte poterant inumere, in iis, quæ veteres recte tradiderant, corrumpendis perdendum censuerunt. Apage, inquit, has definitionum, postulatorum, atque axiomatum insulfas congeries; apage hæc abstracta Theoremata. Quis enim hæc leget? Melius veritatem, nullo ordine, sed ut necessitas postulabit, requirens, sectaberis illorum vestigia, qui prima scientiarum fundamenta posuerunt. Sic illos confirmabis, quos horrida, qua vulgo Mathesin deformant, persona deterret. Quia & hinc fiet ut adolescentium animi ad veritatem e DEMOCRITI pu-
teo hauriendam aptiores evadant.

At ego putabam utilissimam quidem esse Mathesin in hoc tamen maxime utilitatem ejus elucere, quod mentis facultates exornando, acuendo, augendo, nos a brutorum natura remotiores, divinæ propiores efficiat; quo nomine Disciplinæ hujus studium cunctis esse commendandum fatentur omnes. Mens vero (quod ad veri cognitionem attinet) aut prius ignota percipit, aut jam nota reminiscitur; quorum neutrum fieri potest sine contentione quadam, quam attentionem nuncupamus. Intelligere vero est non opinari, non dubiis & incertis se permittere, sed certis & indubiis adhærere, qualia Mathesis præcipue complectitur. Unde fiat oportet, ut qui huic Disciplinæ sedulam navant operam, ita cum evidentia & certa cognitione consuescant, ut primo intuitu vera statim a falsis discernant atque distinguant. In quo maxime intellectus perfectio versatur, quæ Mathesi debetur. Neque minus hæc scientia ad memoriam atque attentionem conducit; quandoquidem de propositionis alicujus veritate certus esse non potest qui totam demonstrationem, uno conspectu non cernit, (quod qui facere satagit, mire attentionem auget,) & qui præterea non habet ad manum principia necessaria, aut illa firmissima esse non sentit; quod qui diligenter curat maxime memoriam exercet. Quæ omnia commoda tollit istorum facilitas, & eo rem adducit ut ne-
que

que nova discere, neque quæ jam didicimus, recollere nisi fortuito possimus. Etenim aliquid, (sive proprio ingenio, sive alio præeunte,) discere, si quid aliud est quam notiones, quas habemus, aut evolvere & penitus dignoscere, aut inter se comparare, isti doceant. Si autem res ita se habet, ut reor; quomodo, obsecro, notiones, quas nec ipsi bene novimus, comparabimus? Quomodo in quibus conveniant, in quibus differant, dispiciemus? Igitur *in omnibus, quæ ratione docentur & via, primum constituendum est quid quidque sit, . . . atque involutæ rei notitia definiendo aperienda* (a). Siquidem definitio est prima & simplicissima notionis evolutio. Nunc, si quid ex ipsa definitione discimus, illud negligemus, an considerabimus? Certe considerabimus, quandoquidem rem non evoluit ille, qui non dispicit diligenter omnia, quæ res complectitur, & stultum esset ea negligere, quæ sponte se obviam faciunt, deinde requirenda: neque a montis radice ad verticem uno impetu possumus advolare. Igitur nova discere nequit, qui a *definitionibus* non incipit, illisque subjicit *axiomata & postulata*, veritates nempe, seu ad aliquid cognoscendum, seu ad faciendum pertinentes & a definitionibus sponte fluentes. Utrum autem quæ sic discimus, ut isti volunt, recollere possimus, infra dispiciemus. Nunc videamus quæ sunt illa abstracta Theoremata, quibus fatigati Tirones Mathesin, tanquam nimis aridam, fastidiunt atque refugiant. Ea sunt (ipsis fatentibus) generales quædam propositiones, quibus notiones a sensibus alienæ continentur, & quarum connexio cum praxi difficile perspicitur. Num autem ita molesta sunt hæc Theoremata, quia generalia sunt? At, cui gratius esset peculiare propositiones addiscere, quæ sæpe levi, aut nulla mutatione, forent repetendæ? In ipso ortu scientiarum peculiare veritates sectandæ fuerunt, tum quia generales invenire difficillimum erat, tum quia recta methodus ignorabatur. Tunc decebat, necessitate magistra, nunc has nunc illas propositiones indagare. At nunc, *quæ est hominum tanta perversitas, ut inventis frugibus, glande vescamur* (b)?

Quis non intelligit eo magis scientias perfici, quo magis universalia Theoremata reperiuntur? Præsertim, cum tanta jam sit methodorum & propositionum copia, quæ tamen quotidie augetur, ut nemo omnia discere & retinere queat, nisi in pauca genera-

nera-

(a) Cic. Orator. 33.

(b) Cic. Orator. 9.

neralia Theoremata coarctentur. Verumtamen fortasse creant hanc molestiam notiones quas considerant Geometræ, ideo quia sunt a sensibus alienæ. Qui sic sentit, a mente excolenda prorsus absteineat, necesse est; mentis enim regnum est a corpore omnino separatum. Neque melius sentiunt cum dicunt, difficili cum praxi connexionem fastidium creari. Prius enim instrumenta quæ sint, est intelligendum, quam modum iis utendi doceamur. Ex me tu quaris quo valeant, qualem præbeant usum tot de triangulis, de parallelis, de circulis propositiones? Quid responderes puerulo quærenti quo valeant elementa prima? Nonne patet melius illum figuras adhibiturum, qui melius quæ sint cognoverit? Testis sit NEWTONUS, qui ut sectiones conicas Astronomiæ aptaret, novas earum proprietates detegere, id est earum naturam penitus introspicere, debuit. Testis HUGENIUS, qui horologia perficere non potuit, nisi cycloidis natura diligentius investigata. Testis BERNOULLIUS, testis LEIBNITIUS, quorum alter plenissime, alter minus perfecte curvam celerrimi descensus determinavit, quia ille ipsam cycloidem accuratissime cognoverat, quam hic negligenter consideraverat. Testes denique omnes recentiorum libri, referti inventis simplicibus, elegantibus, utilibus, ubi Auctores rerum, quas tractabant, naturam optime intelligebant, ubi fecus, perplexis, inelegantibus, atque ideo inutilibus.

Prætereo, quod non ut artificia perficiantur, sed ut

*Concretam tollat labem, purumque relinquat
Æthereum sensum atque auræ simplicis ignem (a)*

nata est Mathesis; quod ita pro certo habebant veteres illi (velis nolis) præceptores nostri, ut quidquid a manibus penderet, hac scientia judicarent indignum. Errabant illi quidem, sed magis errat, qui sublimem hanc disciplinam, quæ sola valet mirabilia DEI opera quadantenus explicare atque hominis naturam exornare, putat placere non posse, nisi fabrilibus artibus inquinetur.

Quod vero dicunt, hac incondita Mathesin tradendi via fieri ad veritatem detegendam aptiores Adolescentes, profecto jocantur. Sic discunt quod nemo nescit, scilicet quod ubi propositione aliqua opus habes, illa tibi est investiganda. Sed quomodo illud

(a) Virg. Æn. I. VI. v. 716.

illud Theorema tibi necessarium recte quæres? Quomodo quæstiones enodabis? Nisi fortasse putas, cum neque schyphus neque scamnum sine præceptis efformari possit, gravissimam atque difficillimam inveniendi artem præceptis non egere. Sed esto; impetu quodam ingenii unum aut alterum, vel etiam singula problemata solves. At; *rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere (a), quomodo disces?*

Tamen, ajunt, supervacaneum est accurate demonstrare illa, quorum veritatem quivis levi animi contentione potest dispicere. Experientia docet eos, qui ad Mathesin addiscendam apti nati sunt, ingenium suum libenter exercere, & demonstrationibus quasi inutilibus fatigari. Demonstrat EUCLIDES duos circulos se mutuo secantes idem centrum non habere; nemo mirabitur. Illi res erat cum Sophistis pertinacibus, qui laudi apponebant propositiones vel evidentissimas rejicere; quapropter Mathesis, ut Logica, instructa esse debebat Syllogismis, quibus cavillantium os posset occludere. Nunc autem superflua sunt ratiocinia, quibus confirmare conamur id quod bona mens ostendit; *perspicuitas enim, (ut ait CICERO) (b) argumentatione elevatur.*

Utinam Philosophi, Medici, Jurisconsulti, Theologi, in supervacaneis istis demonstrationibus, tempus, ut dicitur, trivissent! Quot & quantis quæstionibus circa verba, aut circa res quæ intelligi nequeunt, versantibus, quibus tandiu detinemur, quot falsis, aut saltem incertis opinionibus, quibus obruimur, caruissimus? An putas, si parcius huic sensus communis imagini se credidissent, si accuratius prima principia probassent civilis & pontificii juris Scriptores, Philosophi, Theologi, non vulgares tantum sed & GROTIUS, HOBBIUS, PUFENDORFIUS, DEMOCRITUS, ARISTOTELES, PLATO, CARTESIUS, ATHANASIUS, HIERONYMUS, AUGUSTINUS, LUTHERUS, CALVINUS, tot scripti fuissent de jure libri, ut vel ad titulos legendos, vel ad errores, quibus scatent, non dicam refellendos sed detegendos, vix humana vita, quantumvis longa, sufficiat; tot & tantis disputationibus de rerum principiis, de mundi systemate, de finibus boni & mali, de Trinitate, de gratia, de commercio animæ & corporis, scholæ strepuissent & adhuc streperent sine ullo scientiarum incremento; in-

(a) Cic. Orator. 41.

(b) De nat. Deor. l. III. 4.

quisitionem sensisset GALILÆUS, per totam vitam timuisset CARTESIUS; tot & tam cruentis persequutionibus inquinata fuisset sanctissima CHRISTI Religio, summa pacis conciliatrix? Sed, ut ad rem propius accedam, quis ignorat ii, qui Mathematici vocantur, quanta in obscuritate rerum, & quam recondita in arte & multiplici subtilique versentur. Quo tamen in genere ita multi perfecti homines extiterunt, ut nemo fere studuisse ei scientiæ vehementius videatur, quin, quod voluerit, consequutus sit (a). Quare? nisi quia claras & distinctas notiones quisque, dummodo non omnino plumbeus sit, percipit; quæ hinc sponte perficiuntur, intelligit; quæque ex his definitionibus & axiomatis pedetentim deducuntur, sectatur & assequitur, quod vix facere possunt acutiores, ubi non gradatim proceditur, sed per saltus, ut in aliis fere scientiis, discucitur. Fieri autem nequit ut claras & distinctas habeat notiones, & ut gradatim procedat ille qui non singula certissimis demonstrationibus confirmat, sed levi quodam iudicio nixus evidentia pronuntiat, cum ratio clamet VERULAMII verbis; (b) ut prima quæque, quæ se offerunt animo eique arrident, pro suspectis habeantur. Omnium enim, quæ per se patere existimantur, notiones confusæ sint, necesse est, quæ quam sæpe fallant omnes norunt, & quam sæpe logomachiis viam aperiunt, disputationes nuper in Mathesim invecitæ testantur; ut præteream periculosum esse notionibus his confusis assuescere. Ideo WOLFIIUM (c) audiat, non istos, qui intellectus perficiendi gratia Mathesi operam navat, monentem quod is a rigore demonstrandi ne latum quidem unguem recedere tenetur, ne methodi confuse notiones & de eadem concepta præiudicia noceant extra Mathesim.

Præterea, si quis in scientiis profectus sibi proponit non poenitendos, is ita debet prima principia tenere, ut illa sponte menti sese offerant, quod numquam obtinebit, nisi qui ea sæpius & attente consideraverit; cui rei quantum demonstratio, quin & plures diversæ demonstrationes conducant, cuius iudicandum relinquo. Præcipue qui nova detegere cogitant, male prima principia negligunt. Respice per quam longum & sinuosum iter plerumque maximi Mathematici ad veritatem perveniant, ad quam facile pervenire poterant, si prima principia recte perpendissent. Audi

NEW-

(a) Cic. de Orat. l. 1. 3.

(b) Bac. de augm. Scient. l. 1,

(c) Elem. Math. Tom. V. Cap. IV. 178. in fine.

NEWTONUM, qui jam grandævus & summum scientiæ apicem adeptus dolebat, quod non EUCLIDIS elementa, qua decebat diligentia, juvenis perlegisset. Ille certe, quamvis Mathesi aptissimus, tunc has demonstrationes molestas & graves non arbitratur, neque supervacanea & solum contra sophistas utilia censebat ratiocinia, quibus bonæ mentis judicia confirmare veteres conati sunt. Ceterum, non defunt alia, quibus Tironum ipsorum ingenia bene possint exerceri, & plurimum in scientiis valet vulgatum illud *festina lente*.

Huc accedit, quod si in ipsis principiis docemur negligentiam atque oscitantiam, quando attentio & diligentia disci possit, non video. Num in sublimioribus scientiæ partibus? Sed tunc recurret illud axioma, naturæ humanæ laborem averfanti commodissimum, *frustra quis demonstrat quæ bona mens ostendit*; argumenta probabilia se se pro certis demonstrationibus obtrudent, & obrepent paralogismi, a quibus immunes sunt veteres omnes, qui artem severam amabant, & a quibus vix recentiorum unus & alter (qui quidem veterum fuerunt imitatores) potuit abstinere.

Denique frustra homines discere, quæ statim obliviscantur, nemo negabit. Certum autem est nos vix rerum meminisse, quas nullus ordo revocat ad mentem; hinc fit ut facilius, quam soluta oratio, carmina retineantur. Id senserunt gentes omnes, vel barbaræ, quæ carminibus historiam & Philosophiam descripserunt, antequam litterarum usus invaluit.

..... *Tantum series juncturaque pollet (a)*

Hæc de ordine, nunc de præceptis, quæ si mentem aliquantisper tardam redderent, ut nonnulli putant, nihil tamen progressibus obessent, quandoquidem testudo in via citius ad metam pergit quam Achilles extra viam. Sed ne regulæ & præcepta mentem opprimant & tarditatem inducant, verendum non est. Nam ingenium totum (quantum est) circa duo versatur, ut scilicet conceptionem aut repugnantiam notionum deprehendat, quam præcepta nullo modo, sed quomodo ad propositam metam brevissima via pervenias, ostendunt. Et revera, quis unquam Theorematis demonstrationem aut problematis solutionem quæsit, qui notio-
num

(a) HOR. AR. POET. v. 242.

num mediarum defectu aut copia non laboravit. Si desunt, unde & quomodo extundendæ? Si redundant, quæ feligendæ? Ubi frustra quæro principia, quæ me deficiunt, experior quod nec *manus nuda nec intellectus sibi permissus multum valet. Instrumentis & auxiliis res perficitur, quibus opus est non minus ad intellectum quam ad manum (a).* Ubi vero me nimia copia reddit inopem,

quo me cunque rapit tempestas, deferor hospes (b)

& sentio, quod *hominum intellectui non plumæ addendæ, sed plumbum potius & pondera, ut cobibeant omnem saltum atque volatum (c)* unde patet unicam omnino restare salutem *ut mens ab ipso principio nullo modo sibi permittatur, sed perpetuo regatur, & res, veluti per machinas, conficiatur (d).* Cum præceptis ita consuecant, qui *spiritus proprios, ut sibi oracula exhibeant, (e)* solent invocare, ut vel inviti ab iis regantur, & tunc videbunt quanti sint æstimanda: quod si facere respuunt, quæ ignorant saltem non vituperent, neque vocibus suis alios a recta via deterreant; & dum scribunt, caveant ne populo, cui scribere sunt censendi, faciant injuriam, populum illum quasi levem artisque severæ impatientem traducentes: *omnes enim qui probari volunt, voluntatem eorum qui audiunt, intuentur (f).* Et nemo ideo scribit ut improbetur. Et isti delicatuli Discipuli, siquid sapiant, VARRONEM audiant. Hæc ait ille (g) *aut omnino non discimus, aut prius desessimus quam intelligamus cur discenda sint. Voluptas autem vel utilitas talium disciplinarum in post-principiis existit, cum perfectæ absolutæque sunt: in principiis vero ipsis, ineptæ & insuaves videntur.* Cui sententiæ si non adfuerint, relinquunt, suadeo, graves has disciplinas, quibus nati non sunt.

Sed fortassè minus lucidus aut concinnus est ordo a NEWTONO servatus, aut recto talo non stant ejus præcepta. Meliora igitur profer; & optime mereberis de prudentioribus, qui omnes adhuc imperfectam esse artem inveniendi fatentur. Ordinem vero *Newtonianum* breviter exponam, verbum nec amplius addam; verendum

(a) Bac. Nov. Org. Scient. Aph. II.

(b) Hor. Ep. l. i. Ep. i. v. 15.

(c) Bac. Nov. Org. Scient. Aph. CIV.

(d) Bac. Nov. Org. Scient. Præf.

(e) Bac. ibidem.

(f) Cic. Orator. 8.

(g) Apud Aul. Gcl. l. XVI. Cap. 18.

dum enim est ne peculiare quoddam studium, quo semper in hunc summum virum latus sum, me fallat.

Sibi proposuerat NEWTONUS scribere *de compositione & resolutione arithmetica*. Quapropter statim tradit quomodo rationes subducendæ sint per numeros & per symbolos. Cum autem hæ regulæ futuræ nullius usus fuissent, nisi ad quæstiones enodandas infervirent, primo docet, quo pacto æquatio reddatur simplicior, & incognita exterminetur; deinde qua via problemata ad æquationem deducenda sint; quod haud raro facere non potest, qui incognitarum eliminationem ignorat. Præterea, hanc problematum ad æquationem deductionem, utpote difficultate & utilitate insignem, pluribus exemplis illustrat. Superest ut æquationum radices invenire discat qui cetera callet; cui rei viam aperiturus Auctor noster, plura notanda profert de æquationum natura, radicibus, & transformatione, & libro colophonem imponit appendice de æquationum constructione lineari. Quæ omnia multis & selectis exemplis cumulavit, quibus præcepta explanantur, & sæpius ad lectorum mentem revocantur. Nec alioquin inutilia sunt hæc exempla, sed utilium scientiarum fontes plerunque aperiant.

Nunc pauca de consilio meo sunt dicenda. Quid dixerit s'GRAVESANDE de hoc libro explicando non repetam. Sed III. WOLFFII verba referam, quia meum propositum fere complectuntur. *Utilem* (ait ille de Arithmetica universali NEWTONI, (a) *tironibus operam sumeret qui eandem commentario illustraret. Multa enim occurrunt difficilia, quorum rationes non facile assequi licet, etiam exercitatoribus. Desunt etiam constructiones geometricæ problematum, quorum tantummodo dantur solutiones per calculum.* Quare

Primo, cum *Arithmetica universalis* ab Auctore perfecta non fuerit, arbitratus sum mihi onus incumbere, illam pro viribus talem reddendi, qualem scriptorem ipsum redditurum putabam, si ultimam manum imposuisset. Idcirco, titulum ab NEWTONO adscriptum considerans, judicavi eum sibi proposuisse omnia tradere quæ ad æquationes ex problematum legibus deducendas, & earum radices, sive numeris sive lineis exhibendas, pertinerent. Hinc factum est, ut *Newtonianum* de Polynomio ad potestatem quamlibet evehendo Theorema fusius tradiderim & demonstraverim; nonnulla de problematum & æquationum natura sim com-

men-

(a) Elem. Math. univ. Tom. V. Cap. IV. 12. de scriptis Anal.

mentatus; generales pro constructionibus problematum canones docuerim, & alia hujus generis. Fateor nonnulla esse fortasse in alium locum rejicienda, utpote paullo difficiliora, aut non statim usu ventura; quæ tamen ideo collegi, quia quæ ad idem argumentum pertinent melius collecta, quam sparsa, discuntur atque retinentur. Præsertim cum Auctor meus, omnia, quibus opus se habiturum videt, ordine locare soleat, necessitatem, quæ ad illa afferenda cogat, non expectans.

Præterea, memor NEWTONUM sibi persuasum habuisse analyticis solutionibus syntheticas demonstrationes esse substituendas, ut, *omisso, quatenus fieri potest, calculo algebraico, Theorema fiat concinnum & elegans ac publicum lumen sustinere valeat, (a)* atque sapius doluisse, quod geometrica algebraicis rationibus tractasset, geometricas demonstrationes & analyses addidi, quando ab algebraicis diversas invenire potui. Et sane, ubi detegenda sunt ignota, subsidium Algebra præbere fatendum est; & ad hoc est excogitata, ut paucis principiis multa possint *(b)* inveniri. Sed meminert tyrones eam nihil esse quam supplementum, quo adjutatur imbecillitas humani intellectus, ut de *seriebus* ait FONTENELLIUS *(c)*. Ideo, quo magis quisque pollet ingenio, eo minus his auxiliis uti debet, ita ut, qui semper rationes subducunt, se parvi ingenii damnent, nisi forte nova & difficilia detegant. His enim summæ gratiæ sunt habendæ, quod humanarum scientiarum pomœria proferant; & rogandi sunt ut, quomodo solent, nova & bona dent, quamcunque tandem methodum adhibeant. Ceteri vero firmiter veterum analysi adhæreant, eam enim talem *non esse, qua, algebra inventa, carere possimus, haud difficulter ostenditur. Etenim, antequam problemata geometrica vel alia in Mathesi mista ad Geometriam puram reducta, per algebraem solvantur, reducenda sunt ad æquationes. Hæc vero reductio non modo supponit præparationem, methodo veterum inveniendam, verum etiam ipsamet per eandem methodum est eruenda. Accedit subinde, occurrere problemata etiam in altioribus, quæ methodo veterum multo brevius & elegantius solvantur, quam per calculum algebraicum, qui haud raro admodum perplexus & nimis longus est. Accedit, quod, absque omni theoria, calculo algebraico minime sit locus. Hinc, qui proble-*

(a) Newt. Opuf. T. I. pag. 170.

(b) Vide Wolf. Elem. Math. Un. T. V. Cap. IV. 143. de medio Algebrae.

(c) Act. Scient. Paris. An. 1727. Elog. Newt.

blemata physico-mathematica, vel etiam mechanico-physica solvunt; quædam, tamquam cognita, sumere tenentur. Contingit autem haud raro, ut sumant nondum satis explorata, vel, si ea demonstrare voluerint, quæ certa sunt, & methodo veterum rigide demonstrari poterant, in dubitationem adducant, ut adeo, quæ per calculum ex assumptis eruuntur, vel incertitudini obnoxia fiant, vel suspecta reddantur acutioribus rigori veterum assuetis. Imo, nullum est dubium, quin plura irrepperint a veritate aliena, ita ut inventa recentiorum Mathematicorum revisione quadam indigerent, & haud pauca firmiori fundamento superstrui mererentur. Nec alia ratio est cur inter recentiores Mathematicos agitentur controversiæ, quales veteribus erant ignotæ. Optime igitur sibi consulunt, qui methodum veterum cum algebraica recentiorum conjungunt. Et merito dolemus cum NEWTONO quod, illa neglecta, cito nimis pede ad hanc properent, qui inter Mathematicos eminere volunt. (a) Si vero existimaveris demonstrationes syntheticas dari posse si, vestigiis calculi insistentes, verbis enuncies quæ per eum patent, & in reddendis rationibus ad leges calculi confugas, totus falleris (b). Si autem studium Matheseos intellectum perficere debet, necesse est ut in demonstrando sis assiduus. Intelliguntur vero hic demonstrationes syntheticæ, quales sunt EUCLIDIS & Geometrarum veterum (c). Quæ clarissimi WOLFFII verbis exponere & auctoritate confirmare volui, nequis me pravo quodam studio a communi sententia dissentire putaret.

Denique geometricas effectiones addidi, principio quidem omnes; deinde, cum arbitratus sum generales constructionum canones satis esse notos, illas quæ aliquid habere visæ sunt observatione dignum & a canonibus alienum. Nam plerumque canones effectionem præbent minus elegantem; elegantiorum autem judico quæ simplicior & factu facilior est.

Ceterum, in his omnibus ad EUCLIDIS *Elementa* sæpius appellavi, ut ea tiro cogatur accurate repetere, nec sero dolere possit se negligenter ea pervolvisse; atque ne laudanda veterum diligentia prorsus obsolescat, in determinationibus, quam potui, maximam curam adhibui.

Et hæc putavi facturum fuisse NEWTONUM, si librum suum perficere voluisset. Sed illum præterea mihi ad Tironum captum acco-

(a) Wolff Elem. Math. un. T. V. C. IV. 146. de studio Alg.

(b) Wolff. Elem. Math. un. T. V. C. IV. 178. de studio Alg.

(c) Ibid. 99. & 100.

comodandum esse sum arbitratus. Quapropter, omnia, pro viribus diligenter & simpliciter demonstravi; rationes ab Auctore omiffas subduxi, principio quidem omnes, deinde gradatim difficiliores; problemata nonnulla pluribus modis solvi; principia, sine quibus solutiones nullo pacto poterant intelligi, breviter explanavi; & corollaria, siqua præclara se obtulerunt, sum persecutus.

Nunc grates mihi sunt agendæ celeberrimi viris *Nicolao & Danieli BERNOULLII*, quorum alter demonstrationem regulæ de inveniendis Divisoribus furdis, adhuc ineditam atque huic operi inferendam humanissime communicavit; *Daniel* vero me regula de inveniendis divisionibus rationalibus a se demonstrata cumulavit, & prudentissimis monitis jovit: quo nomine multum etiam me debere fateor *Joh. Ludovico CALANDRINO & Gabrieli CRAMERO*, quibus merito se jactat *Geneva*; Quos omnes & alios, qui mihi opem ferre dignati sunt, obsecro atque obtestor ut æqui bonique ducant hoc tene grati animi testimonium. Illi qui non laudati sua inventa in hac opella legent, ne plagii crimine me accusent, precor. Quisque sibi vindicet, quod sibi debitum putat. Etsi multa ipse excogitavi, tamen nihil, præter eligendi difficultatem, transcribendi laborem, & voluntatem faciendi rem tironibus utilem, mihi tribuo.

Ceterum statueram antiquam notationem a *NEWTONO* usurpata, ubique servare. Sed confestim victus Typothetarum conviciis de ejus difficultate querentium, notationem pro multiplicatione & potestatibus a *LEIBNITIO* repertam adhibere coactus fui.

Fateor, quæ *NEWTONUS* facere potuisset, tentare temerarium esse, perficere difficillimum, & Tironibus scribere fortasse difficilium. Nam primo omnia perspicue quidem & enucleate tractanda sunt, ita tamen ut fatietatem non pariant; deinde *diligentissime hoc est eis, qui instituunt aliquos atque erudiunt, videndum quo sua quemque natura maxime ferre videatur (a)*. Quod vix facere potest ille, qui Discipulos audientes & interrogantes docet; quomodo autem facere queat ille, qui literis aliquid mandat, non video. Quapropter uni aut alteri satisfaciens, vereor ne pluribus displiceam, & inveniar scripsisse quæ nec indocti intelligerent nec docti legere curarent. Siquid igitur peccatum est, ignoscas, ob-

(a) Cic. de Off. 1. III. 9.

obsecro, benigne Lector; Quinimo *Horatianum* *QUINTILIUM* imiteris, qui

..... *Corrige, fodes,*
Hoc, aiebat, & hoc (b)

Et me non eum invenies

qui defendere delictum, quam vertere, malit. (c)

(b) Hor. Art. Poet. v. 438. 439.

(c) Ibid. v. 442.

ARITHMETICA

UNIVERSALIS;

SIVE

DE COMPOSITIONE ET RESOLUTIONE

ARITHMETICA

LIBER.

SECTIO I.

CAPUT PRIMUM.

I. **C**OMPUTATIO vel fit per *Numeros*, ut in vulgari Arithmetica, vel per *Species*, ut Analyſtis mos eſt. Utraque iisdem innititur fundamentis, & ad eandem metam collimat: *Arithmetica* quidem definite & particulariter, *Algebraica* autem indefinite & univerſaliter; ita ut enuntiata fere omnia, quæ in hac computatione habentur, & præſertim concluſiones, *Theoremata* dici poſſint. Verum Algebra maxime præcellit, quod cum in Arithmetica quæſtiones tantum reſolvantur progrediendo a datis ad quæſitas quantitates, hæc a quæſitis tanquam datis ad datas tanquam quæſitas quantitates plerumque regreditur, ut ad concluſionem aliquam, ſeu *Æquationem*, quocumque demum modo perveniatur, ex qua quantitatem quæſitam elicere liceat. Eoque pacto conficiuntur difficillima *Problemata*, quorum reſolutiones ex Arithmetica ſola fruſtra peterentur. Arithmetica tamen Algebrae in omnibus ejus operationibus ita ſubſervit, ut non niſi unicam perfectam *computandi Scientiam* conſtituere videantur; & utramque propterea conjunctim explicabo.

II. Quisquis hanc Scientiam aggreditur, inprimis vocum & notarum ſignifica-

Tom. I.

A

fica-

ficationes intelligat, & fundamentales addiscat operationes, *Additionem* nempe, *Subductionem*, *Multiplicationem*, *Divisionem*, *Extractionem* radicalem, *Reductiones* fractionum & radicalium quantitatum, & modos ordinandi terminos *Æquationum*, ac incognitas quantitates (ubi plures sunt) exterminandi. Deinde has operationes, reducendo problemata ad æquationes, exerceat; & ultimo naturam & resolutionem æquationum contempletur.

CAPUT II.

De vocum quarundam & notarum significatione.

III. **P**ER numerum non tam multitudinem unitatum, quam abstractam quantitatis cujuscvis ad aliam ejusdem generis quantitatem, quæ pro unitate (a) habetur, rationem intelligimus (b). Estque triplex; integer, fractus & surdus: *Integer*, quem unitas metitur: *Fractus*, quem unitatis pars submultiplex metitur: & *Surdus*, cui unitas est incommensurabilis (d).

IV. *Integratorum* numerorum notas (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,) & notarum, ubi plures inter se necantur, valores nemo non intelligit (e). Quemadmodum vero numeri in primo loco ante unitatem, sive ad sinistram, scripti denotant denas unitates, in secundo centenas, in tertio millenas, &c. sic numeri in primo loco post unitatem scripti denotant decimas partes unitatis, in secundo centesimas, in tertio millesimas, &c. Hos autem dicimus *Fractos Decimales*, quod in ratione decimali perpetuo decrescant (f). Et ad distin-

(a) 1. Unitas hæc est *respectiva*, cum enim partes habeat, licet eam considerare ut aggregatum ex suis partibus, & quamlibet ejus partem pro unitate sumere.

Quæ sit unitas ABSOLUTA, & an dotur in rerum natura, disputandum non censuo. Semper enim agemus de respectiva.

(b) 2. Sic, si in tempore hora sumatur pro unitate, ratio, quæ est inter horam, & horæ minutum, aut diem, aut mensem &c., dicitur *numerus*. In Lineis, si AC sit unitas linearis, ratio, quæ est inter AC, & CB, aut AB, est numerus &c.

(d) 3. Numerus integer est eadem quantitas, quam *Eucl.* def. 2. V. & def. 5. VII. vocat *multiplicem*, ubi quantitas minor, cujus

major multiplex est, sumitur pro unitate. Fractus autem, dicitur ab *Eucl.* def. 1. V. & def. 3. VII. pars. aut def. 4. VII. partes, si modo major numerus, quem minor metitur, pro unitate capiatur, *Surdus* vero ab eodem, def. 2. X. *incommensurabilis* appellatur; surus tantum pro unitate magnitudinem, cuius alia est incommensurabilis.

(e) 4. Numeri primi a dextra unitates expriment; secundi *decades*; tertii *centena*, id est, decadem decades, vel decies decem unitates; quarti *millia*, vel decies centum, vel decies decies decem unitates &c: ita ut in unitatuna Serie *IIIIII* &c. hi numeri sint *decinceps* proportionales [*Eucl.* def. 20. VII.] vel efficiant *progressionem geometricam*, quia scilicet prima unitas a dextris decies continetur in secunda, secunda decies in tertia, sic *decinceps*.

(f) 5. Cum nec arabes, nec alie qua-

distinguendum integros a decimalibus interjici solet comma, vel punctum, vel etiam lineola. Sic numerus 732' 569, denotat septingentas triginta duas unitates, una cum quinque decimis, sex centesimis, & novem millesimis partibus unitatis. Qui & sic 732, 569, vel etiam sic 732 | 569, nonnunquam scribitur. Atque ita numerus 57104, 2083, denotat quinquaginta septem mille, centum & quatuor unitates, una cum duabus decimis, octo millesimis, & tribus decimis millesimis partibus unitatis. Et numerus 0'064 denotat sex centesimas & quatuor millesimas partes. Surdorum & aliorum fractorum notæ in sequentibus habentur.

V. Cum rei alicujus quantitas ignota est, vel indeterminate spectatur, ita ut per numeros non liceat exprimere, solemus per Speciem aliquam seu litteram designare.

Et, si quando cognitæ quantitates tanquam indeterminatas spectemus, discriminis causa designamus initialibus Alphabeti literis *a, b, c, d,* & incognitas finalibus *z, y, x,* &c. Aliqui pro cognitæ substituant consonantes vel majusculas literas, & vocales vel minusculas pro incognitis (*g*).

VI. Quantitates vel Affirmativæ sunt seu majores nihilo, vel Negativæ seu nihilo minores.

Sic

quævis numerorum notæ sua natura, & necessario numeros exprimant, sed negotium hoc ab hominum institutione & arbitrio prorsus pendet; liquet quod notæ unitatem, aut unitatum collectionem infra decem exponentes, possint ad libitum collocari, vel in dextra, vel in sinistra ordinis parte, vel in aliqua ex mediis.

6. Si unitates ponuntur in ultima sede versus scribentis, aut legentis dextram, habent valorem explicatum N^o. 4. Hoc accidit in vulgari Arithmetica.

7. Si unitates ponuntur in lineæ aut ordinis principio, id est ad scribentis sinistram, numeri eas immediate ad dextram sequentes, denotant decimas unitatis partes, aut si mavis, unitates a primis diversas, & quarum decem primam unitatem constituunt. Hæc computandi ratio dicitur Arithmetica decimalis.

8. Quod si unitates in medio ponuntur, numeri ab unitate versus sinistram erunt ex Arithmetica vulgari, ab eadem versus dextram ex

decimali. Hæc appellari potest mista

9. Arithmetica decimalis, & mista facile ad vulgarem revocantur sumendo pro unitate, quæ numeros omnes conficit, unitatem, quæ ad dextram locatur. Sic 732, 569, qui numerus est ex Arithmetica mista & significat septingentas triginta duas unitates, quinque decimas unitatis partes, & sex centesimas cum novem millesimis, si unitas, ad quam omnia referuntur, in medio locetur; si vero posita concipiatur in lineæ finem ad dextram, est ex Arithmetica vulgari, & significat septingenta triginta duo millia unitatum cum quingentis sexaginta novem ex iisdem unitatibus. Hoc pacto aliquas difficultates, quibus Arithmetica decimalis est obnoxia, effugies; memento tamen has unitates non esse easdem, ac illas, quas haberes, si numerum eundem juxta mistæ Arithmeticæ regulas explicares.

(g) 10. Hoc omnino obsolevit: apud omnes recentiores primæ Alphabeti literæ cognitæ, ultimæ incognitæ designant. Animadvertete autem, quod æquales quantitates per eandem Speciem, inæquales vero per diversas exponuntur; siqua notanda præterea sunt, ea suis locis invenies.

A 2

(b) 15.

Sic in rebus humanis possessiones dici possunt bona affirmativa, debita vero bona negativa. Inque motu locali progressus dici potest motus affirmativus, & regressus motus negativus, quia prior auget & posterior diminuit iter confectum. Et ad eundem modum in Geometria, si linea versus plagam quamvis ducta pro affirmativa habeatur, negativa erit quæ versus plagam oppositam ducitur. Veluti si AB dextrorsum ducatur, & BC sinistrorsum, ac AB statuatur affirmativa; tunc BC pro negativa habebitur, eo quod interducendum diminuit AB, redigitque vel ad breviorum AC, vel ad nullam, si forte C incidit in ipsum A, vel ad minorem nulla, si BC longior fuerit quam AB, de qua auferitur.

TAB. I.
Fig. I.

Negative quantitati designandæ signum $-$, Affirmative signum $+$ præfigi solet. Signum \mp incertum est, & signum \pm etiam incertum sed priori contrarium.

VII. In aggregato quantitatum nota $+$ significat quantitatem suffixam esse ceteris addendam & nota $-$ esse subducendam.

Et has notas vocabulis plus & minus exprimere solemus (*b*). Sic $2+3$, sive 2 plus 3, valet summam numerorum 2 & 3, hoc est 5. Et $5-3$, sive 5 minus 3, valet differentiam quæ oritur subducendo 3 a 5, hoc est 2. Et $-5+3$ valet differentiam quæ oritur subducendo 5 a 3, hoc est -2 : Et $6-1+3$ valet 8. Item $a+b$ valet summam quantitatum *a* & *b*: Et $a-b$ valet differentiam, quæ oritur subducendo *b* ab *a*. Et $a-b+c$ valet summam istius differentię & quantitatis *c*. Puta si *a* sit 5, *b* 2, & *c* 8; tum $a+b$ valebit 7; & $a-b$ 3; & $a-b+c$ 11. Item $2a+3a$ valet 5*a*. Et $3b-2a-b+3a$ valet $2b+a$; nam $3b-b$ valet $2b$ & $-2a+3a$ valet *a*, quorum aggregatum est $2b+a$. Et sic in aliis.

Hæ autem notæ $+$ & $-$ dicuntur *Signa*. Et ubi neutrum initiali quantitati præfigitur, signum $+$ subintelligi debet. VIII

(*b*) II. Hinc explicari potest quod assertum est Art. VI. de contrariis plagis, ad quas in Geometria tendunt lineæ positivæ, & affirmativæ. Signum $+$ additionem, signum $-$ subtractionem significat; sed, ut lineæ CE ad punctum E addatur recta EB, describendus est radio EB centro E arcus versus B, & recta CE ad peripheriam producenda, ut patet: ut autem ex C E ad punctum E subducatur EA, arcus centro E radio EA versus A describendus est; ergo lineæ additæ & subductæ, sive positivæ ac negativæ, tendunt ad partes contrarias.

12. Aggregatum, aut differentia ex pluribus quantitativis [ut $a+b-e$ &c.] dicitur quantitas *composita*, vel *complexa*.

1°. Additio *solum*, & subtractio, sive *singulæ*, sive *ambæ simul* (ut in $a+b+c$, ubi *solum* est additio, aut $-a-b-c$, ubi *sola* subductio, aut denique $a+b-3c-4f-5e$ &c, ubi *subductio*, & additio simul habentur) efficiunt *quantitates complexas*. Ceteræ operationes (quæcunque demum ea sint) *quantitates relinquunt simplices aut incomplexas*.

2°. *Quantitates simplices vocantur etiam TERMINI.*

(1) De-

TAB. A.
Fig. I.

VIII. MULTIPLICATIO proprie dicitur quæ fit per numeros integros, utpote quærendo novam quantitatem toties *majorem* quantitate multiplicanda quoties numerus multiplicans fit *major* unitate (i). Sed aptioris vocabuli defectu multiplicatio etiam dici solet quæ fit per fractos aut surdos numeros, quærendo novam quantitatem in *quacunq[ue] ratione* ad quantitatem multiplicandam quam habet multiplicator ad unitatem (k). Neque tantum fit per abstractos numeros, sed etiam per concretas quantitates, ut per lineas, superficies, motum localem, pondera &c., quatenus hæ ad aliquam sui generis notam quantitatem tanquam unitatem relatæ, rationes numerorum exprimere possunt & vices supplere. Quemadmodum si quantitas A multiplicanda fit per lineam duodecim pedum, posito quod linea bipedalis sit unitas, produceretur per istam multiplicationem 6 A, sive sexies A, perinde ac si A multiplicaretur per abstractum numerum 6, siquidem 6 A fit in ea ratione ad A quam habet T. A. N. I. linea duodecim pedum ad unitatem bipedalem (l). Atque ita si duas quasvis Fig. 3. lineas AC & AD per se multiplicare oportet, capiatur AB unitas, & agatur BC eique parallela DE, & AE productum erit hujus multiplicationis, eo quod fit ad AD ut AC ad unitatem AB (m). Quin etiam mos obtinuit ut

(i) *Definitio NEWTONI in hanc recidit.*

13. Quantitatem aliquam sibi met aliquoties addere, dicitur eam *multiplicare*, & hæc repetita additio vocatur *multiplicatio*.

Sic 4. sibi met ipsi ter addere dicitur multiplicare numerum 4 per 3.

14. Ut multiplicatio fiat duo requiruntur; *quantitas* sibi met addenda, & *numerus* exprimens quoties *quantitas* sibi addi debet. Facta autem multiplicatione obtinetur altera *quantitas*, quæ repentina additione conficitur.

15. *Quantitas* sibi met aliquoties addenda dicitur *multiplicandum*.

16. Numerus indicans *quoties* *quantitas* sibi debet addi, *multiplicator*.

17. *Productum* vero *quantitas* multiplicatione genita.

18. *Multiplicandum* potest esse *quantitas* quævis.

19. *Multiplicator* semper esse debet *numerus*.

20. *Productum* toties *multiplicandum* continet, quoties *multiplicator* continet unitatem, aut hæc quantitates sunt proportionales.

21. Quævis quantitas potest concipi tanquam productum ex se ipsa in unitatem.

(k) 22. *Definitio Auctoris & nostra explicatio* dant productum *multiplex multiplicandi*; aut fracti non unitatem, sed unitatis partes continent; unitas vero surdis est incommensurabilis (*supra* No. 3.); quare in neutris inveniri potest nova quantitas multiplex multiplicandi, seu toties *major* quantitate multiplicanda, quoties numerus multiplicans est *major* unitate. Tunc igitur nulla fit multiplicatio proprie dicta.

(l) 23. Faber murarius *ex gr.* pro duobus muri pedibus tulit tres sestertios, quæritur quot sestertii huic debeantur pro duodecim pedibus. Hic tres sestertii locum tenent quantitatis A, & ad invenendum quod petitur, non tres sestertii multiplicandi sunt per sex pedes, quod esset absurdum; sed quærenda est sestertiorum quantitas toties ternario sestertiorum numero major, quoties abstractus *duodenarius* numerus abstracto *binario* major est, id est ternarii sextuplex: ubi quantitates concretæ, duo, & duodecim pedes non considerantur, sed numeri 2; 6; earum rationem exprimentes abstracte sumuntur.

(m) 24. Hoc semper intelligendum in hypothesi notæ cujusdam lineæ, quæ pro unitate sumitur. Quod si nulla detur unitas, ad arbitrium ea sumi potest: tunc autem productum inve-

ut generis seu descriptio superficiei per lineam super alia linea ad rectos angulos moventem dicatur multiplicatio unitatum linearum. Nam quamvis linea utcumque multiplicata non possit evadere superficies (*n*), adeoque hæc superficiei e lineis generatio longe alia sit a multiplicatione; in hoc tamen conveniunt quod numerus unitatum in alterutra linea multiplicatus per numerum unitatum in altera, producat abstractum numerum unitatum in superficie lineis istis comprehensa, si modo unitas superficialis definiatur, ut solet, Quadratum cujus latera sunt unitates lineares. Quemadmodum si recta AB constet quatuor unitatibus & AC tribus, tum rectangulum AD constabit quater tribus seu duodecim unitatibus quadratis, ut inspicienti Schema patebit (*o*). Estque similis analogia solidi & ejus quod continua trium quantitatum multiplicatione producitur. Et hinc vicissim evenit quod vocabula *ducere*, *contentum*, *rectangulum*, *quadratum*, *cubeus*, *dimensio*, *latus*, & similia, quæ ad Geometriam spectant, arithmeticis tribuantur operationibus. Nam per *quadratum*, vel *rectangulum*, vel *quantitatem duarum dimensionum* non semper intelligimus superficiem, sed ut plurimum quantitatem alterius cujuscumque generis quæ multiplicatione aliarum duarum quantitatum producitur, & sæpissime lineam quæ producitur multiplicatione aliarum duarum linearum. Atque ita dicimus *cubeum* vel *parallelepipedum*, vel *quantitatem trium dimensionum* pro eo quod binis multiplicationibus producitur (*p*), *latus* pro radice, *ducere* pro multiplicare, & sic in aliis.

TAB. I.
Fig. 1.

IX. Numerus speciei alicui immediate præfixus denotat speciem illam toties sumendam esse (*q*).

Sic $2a$ denotat duo a , $3b$ tria b , $15x$ quindecim x .

X. *Dux*

invenitur *hypothesis*, id est posito quod unitas sit illa ipsa linea, quæ pro unitate sumitur, nam unitate mutata, mutatur & productum, ut liquet. Sæpe sæpius autem unitas ex problematis solvendi legibus innotescit.

(*n*) 25. Siquidem productum ex linea in lineam est linea.

(*o*) 26. Negotium faceffere tironibus posset, quod hic unitas superficialis per analogiam comparata videtur cum linea, contra EUCL. def. 3. V. Sed *dux* faciendæ sunt analogiæ; id est, ut unitas linearis ad lineam tripedalem, sic quadrupedalis ad duodecim pedum lineam, & ut unitas linearis ad lineam duodecim pedum, sic unitas superficialis, ad superficiem continentem duodecim unitates superficiales.

TAB. A.
Fig. 2.

(*p*) 27. Si recta AE, quam supra invenimus, diceretur quantitas *duarum dimensionum*, (est enim productum ex rectis AC, AD) &

rursus quæretur quarta AF post AB (unitatem), quamvis rectam AG, & AE; hæc quarta AF diceretur quantitas trium dimensionum, cum sit productum ex quantitate duarum dimensionum in lineam. Hoc probe notandum, ne quid molestiæ faciant in Geometria sublimiore quantitates quatuor, quinque &c. dimensionum; cum in rerum natura nulla detur quantitas habens plures, quam tres dimensiones, id est solidum. Sed hic vox *dimensio* inproprie usurpatur.

(*q*) 28. Hic numerus speciei alicui immediate præfixus vocatur *coefficientis*.

29. Nota quod terminus, aut quantitas simplex, proprie loquendo, habet unitatem pro coefficiente, itaque $3a$ non est unus terminus sed tres; aliquando tamen inproprie quævis quantitas quovis coefficiente prædita dicitur terminus.

(*) Nos

X. *Due vel plures species immediate connexæ designant factum, seu quantitatem quæ fit per multiplicationem omnium in se invicem.*

Sic ab denotat quantitatem quæ fit multiplicando a per b . Et abx denotat quantitatem quæ fit multiplicando a per b , & factum illud per x . Puta si a fit 2, & b fit 3, & x fit 5, tum ab erit 6; abx 30.

XI. Inter quantitates sese multiplicantes, nota x , vel vocabulum *in ad factum designandum nonnunquam interscribitur* (*). Sic $3x5$ vel 3 in 5 denotat 15. Sed usus harum notarum præcipuus est, ubi compositæ quantitates sese multiplicant. Veluti si $y-2b$ multiplicet $y+b$, terminos utriusque multiplicatoris lineola super imposita connectimus & scribimus $\frac{y-2b}{y+b}$ in $\frac{y-2b}{y+b}$, vel $y-2bx$ in $y+b$. (**)

XII. Divisio proprie est quæ fit per numeros integros quærendo novam quantitatem toties *minorem* quantitate dividenda quoties unitas fit *minor* divisore. Sed ob analogiam hæc vox etiam usurpari solet cum nova quantitas *in ratione quacunque* ad quantitatem dividendam quæritur, quam habet unitas ad divisorem; sive divisor ille sit fractus aut surdus numerus aut alia cuiusvis generis quantitas (r). Sic ad dividendam lineam AE per lineam AC , TAB. I.
Fig. 3. existente AB unitate, agenda est ED parallela BC , & erit AD quotiens. Imo & divisio propter similitudinem quandam dicitur cum rectangulum ad datam lineam tanquam basem applicatur ut inde noscatur altitudo (s).

XIII.

(*) Nos aliorum exemplum secuti punctum sepe interponimus.

(**) Quantitates compositæ sese multiplicantes etiam unciis includuntur sic, $\frac{y-2b}{y+b}$, quod commodius est.

(r) 30. Quæ Art. VIII. monuimus, facile huc transferri possunt & debent, positis tantum his definitionibus.

31. Quærere quænam quantitas sibi met addita conficiat quantitatem datam, dicitur *hanc dividere*.

32. Quantitas, quæ dividitur, dicitur *dividendum*.

33. Divisor autem numerus exprimens, quoties aliqua quantitas sibi met addita fuerit, ut dividendum constaretur.

34. Quotiens appellatur quantitas, quæ toties repetita quoties unitas est in numero, quem diximus divisorem, dividendum componit. Sic si 12 est dividendum, & 3 divisor, 4 est quotiens.

35. Tantum notabo, quod quantitas per se ipsam divisa dat *unitatem*, quia quantitas quævis *semel* sumi debet, ut seipsam æquet.

(s) 36. Quæritur ex. gr. altitudo rectanguli AF rectæ EG , tanquam basi applicati, sive, data recta EG , quæritur GB , ita ut rectangulum TA Fig. 3. ex EG in GB æquet datum rectangulum AF . Fig. 3. Hæc applicatio dicitur minus proprie divisio, & solum ob *quandam similitudinem*, quæ in hoc sita est. Ut habeatur GB , quærenda est quarta post EG , AD , DF ; (Eucl. 16. VI.); at si pro lineis capiuntur numeri, hæc quarta reperitur invicem ducendo medias & productum hoc per extremam dividendo (ut facile pro-

XIII. *Quantitas infra quantitatem cum lineola interjecta denotat quatum, seu quantitatem quæ oritur ex divisione superioris quantitatis per inferiorem.*

Sic $\frac{1}{2}$ denot quantitatem quæ oritur dividendo 6 per 2, hoc est 3; & $\frac{1}{8}$ quantitatem quæ oritur dividendo 5 per 8, hoc est octavam partem numeri 5; & $\frac{a}{b}$ denotat quantitatem quæ oritur dividendo a per b ; puta si a fit 15 & b 3, tum $\frac{a}{b}$ denotat 5 (t). Et sic $\frac{ab-bb}{a+x}$ denotat quantitatem quæ oritur dividendo $ab-bb$ per $a+x$. Atque ita in aliis.

Hujusmodi quantitates *fractiones* dicuntur, parsque superior *Numerator*, ac inferior *Denominator*.

XIV. Aliquando divisor quantitati divisæ, interjecto arcu, præfigitur.

Sic ad designandum quantitatem quæ oritur ex divisione $\frac{a \times x}{a+b}$ per $a-b$, scribi potest $\overline{a-b} \frac{a \times x}{a+b}$ (*).

XV. Etsi multiplicatio per immediatam quantitatum conjunctionem denotari solet, tamen numerus integer ante numerum fractum denotat summam utriusque. Sic 3 $\frac{1}{2}$ denotat tria cum semisse.

XVI. Si quantitas seipsam multiplicet, numerus factorum, compendii gratia, suffigi solet.

Sic pro aaa scribimus a^3 , pro $aaaa$ scribimus a^4 , pro $aaaaa$ scribimus a^5 , & pro $aaabb$ scribimus a^3bb vel a^3b^2 . Puta si a fit 5 & b fit 2, tum a^3 erit 5.5.5 five 125, & a^4 erit 5.5.5.5 five 625, atque a^3b^2 erit 5.5.5.2.2 five 500 (u).

Ubi

probatur ex EUCL. 19. VII.) atque ex hypoth. factum mediarum, id est rectangulum A F. datum est; ergo facienda restat sola quasi divisio; quarta autem proportionalis post tres datas invenitur per EUCL. 12. VI. Applicatio parallelogrammi ad datam rectam perficitur etiam per EUCL. 44. I.

(t) 42. Si AE fit a , AC b , AB 1, erit $A D \frac{a}{b}$. Secundum exemplum infra explicabitur.

(*) Solet etiam quantitas dividenda prior scribi uncis inclusa, huic adnecti duo puncta, & hinc adjici Divisor un-

cis inclusus, si est compositus. Hoc pacto [$ab-bb$]: [$a+x$]; sed cum hæc duo puncta facile oculos fallant, ab hac scribendi ratione abstinemus, optantes ut aliquis aptius divisionis signum excogitet.

(u) 43. Si a fit linea quævis, erit a^2 tertia proportionalis post 1 & a ; sed a^3 quarta post 1, a , & a^2 , & quarta ex continue proportionalibus post 1, a , a^2 . Siquidem 1 ad a , ut a ad a^2 ; & a ad a^2 , ut a^2 ad a^3 ; At a^2 est tertia post 1, & a^2 , aut quarta post 1, a , & a^2 , aut quinta continue proportionalis post 1, a , a^2 , a^3 , nam 1 ad a , ut a ad a^2 ; a ad a^2 , ut

Ubi nota quod numerus inter duas species immediate scriptus, ad priorem semper pertinet. Sic 3 in quantitate a^3bb non denotat bb ter capiendum esse, sed a in se bis ducendum.

Nota etiam quod hæc ducuntur tot *dimensionum* vel *potestatum* vel *dignitatum* esse dicuntur quot factoribus seu quantitatibus se multiplicantibus constant, & numerus suffixus vocatur *Index* (*) potestatum vel dimensionum. Sic aa est duarum dimensionum vel potestatum, & a^3 trium, ut indicat suffixus numerus 3. (x).

Dicitur etiam aa quadratum, a^3 cubus, a^4 quadrato-quadratum, a^5 quadrato-cubus, a^6 cubo-cubus, a^7 quadrato-quadrato-cubus, & sic porro. Et quantitas a , ex cujus in se multiplicatione hæc potestates generantur, dicitur earum *Radix*, nempe radix quadratica quadrati aa , cubica cubi a^3 , &c.

XVII. Cum autem radix per seipsam multiplicata producat quadratum, & quadratum illud iterum per radicem multiplicatum producat cubum, &c. erit (ex definitione multiplicationis,) ut unitas ad radicem, ita radix ad quadratum, & quadratum ad cubum, &c. Adeoque quantitatis cujusque *radix quadratica* erit medium proportionale inter unitatem & quantitatem illam, & *radix cubica* primum e duobus medie proportionalibus, & *radix quadrato-quadratica* primum e tribus, & sic præterea. Duplici igitur affectione radices innotescunt, tum quod seipsas multiplicando producant superiores potestates, tum quod sint e mediis proportionalibus inter istas potestates & unitatem. Sic numeri 64 radicem quadraticam esse 8 & cubicam 4, vel ex eo patet quod $8 \cdot 8$ & $4 \cdot 4 \cdot 4$ valeant 64, vel quod sit 1 ad

ut a^2 ad a^3 , a^2 ad a^3 , ut a^3 , ad a^4 . (Eucl. 17. VIII.) quæ proportionales reperiendæ sunt per Eucl. 11. VI. Ut autem habeatur a^3b^2 , reperiatur quarta continue proportionalis post 1 & a , id est a^3 : hinc fiat, ut 1 ad a^3 , sic b ad quartam a^3b ; & rursus, ut 1 ad a^3b , sic b ad quartam a^3b^2 quæsitam: seu brevius sic; fiat, 1 ad a , ut b ad quartam ab , & rursus 1 ad ab , ad quartam a^2b^2 , & denique 1 ad a , ut a^3b^2 ad quartam a^3b^2 quæsitam.

(*) Seu *Exponens*.

44. (x) Quantitas, quæ non producta est ex duabus, aut pluribus aliis multiplicatis invicem, dicitur *unius dimensionis*: Sic a , b , &c. sunt quantitates unius dimensionis, & index subintelligitur *unitas*.

45. Si duæ quantitates, quæ singulæ sunt unius dimensionis, ut a , & b in se invicem

ducantur, factum, ut ab , dicitur *duarum dimensionum*.

46. Ubi plures quantitates, quarum singulæ sunt unius pluriumve dimensionum, ut a^2 , b^2c , f , in se invicem ducuntur, factum tot est dimensionum, quot unitates sunt in summa omnium indicum; ita factum a^2b^2cf est sex dimensionum. Si vero quantitas est complexa, dicitur tot dimensionum, quot habet terminus altissimus. Sic quantitas $a^6 + b^5 - c^3 + 1$ dicitur sex dimensionum. Quod si adsit incognita, ejus altissimus terminus dimensionem quantitatis determinat; sic $x^4 - bx^3 + bcx^2 - bcex + bceeb$ est quatuor dimensionum.

47. Ut ergo quantitas quædam ad potestatem daram eleveetur, ei suffigendus est datus index: Sic tertia potestas ipsius a , est a^3 ; & ad evehendam b ad potestatem indeterminatam, cujus index est m , scribatur b^m &c.

B

(y)

TAB. I.
Fig. 4.

ad 8 ut 8 ad 64, & 1 ad 4 ut 4 ad 16 & 16 ad 64. Et hinc si lineæ alicujus AB radix quadratica extrahenda est, produc eam ad C ut sit BC unitas, dein super AC describe semicirculum, & ad B erige perpendiculum huic circulo occurrens in D, eritque BD radix, quia media proportionalis est inter AB & unitatem BC.

XVIII. Ad designandam radicem alicujus quantitatis præfigi solet nota $\sqrt{\quad}$, si radix sit quadratica, & $\sqrt[3]{\quad}$: Si sit cubica, & $\sqrt[4]{\quad}$: Si quadrato-quadratica, &c. (y).

Sic $\sqrt{64}$ denotat 8; & $\sqrt{3:64}$ denotat $\frac{1}{4}$; & \sqrt{aa} denotat a ; & \sqrt{ax} denotat radicem quadraticam ex ax , (z) & $\sqrt[3]{4axx}$ radicem cubicam ex $4axx$. Ut si a sit 3, & x 12; tum \sqrt{ax} erit $\sqrt{36}$, seu 6; & $\sqrt[3]{4axx}$ erit $\sqrt[3]{1728}$, seu 12. Et hæ radices, ubi non licet extrahere, dicuntur *surde quantitates*, ut \sqrt{ax} ; vel *surdi numeri* ut $\sqrt{12}$.

XIX. Nonnulli pro designanda quadratica potestate usurpant q , pro cubica c , pro quadrato-quadratica qq , pro quadrato-cubica qc , &c. Et ad hunc modum pro quadrato, cubo, & quadrato-quadrato ipsius A , scribitur Aq , Ac , Aqq , &c. Et pro radice cubica ex $abb = x^3$ scribitur $\sqrt[3]{c:abb} = x^3$. Alii alias notas adhibent, sed quæ jam fere exoleverunt.

XX. Nota $=$ designat quantitates hinc inde æquales esse.

Sic $x=b$ designat x æqualem esse b .

XXI. Nota $::$ significat quantitates hinc inde proportionales esse.

Sic $a:b :: c:d$, significat esse a ad b ut c ad d . Et $a.b.e :: c.d.f$ esse a, b , & e inter se ut c, d , & f inter se respective, vel esse a ad c, b ad d & e ad f in eadem ratione.

XXII. Denique notarum, quæ ex his componuntur, interpretatio per analogiam facile innotescit. Sic enim $\frac{1}{4}abb$ denotat tres quartas partes ipsius

(y) 48. Sæpius tamen *index* aut *exponens* radices ponitur intra crura ipsius signi radicalis $\sqrt{\quad}$, sic \sqrt{b} , aut $\sqrt[2]{b}$ significat radicem quadraticam ipsius b , aut median proportionalem inter 1 & b ; sed $\sqrt[3]{ab^2}$, & $\sqrt[4]{ab^3}$ significat radicem cubicam, & quadrato-quadraticam ipsarum ab^2 , ab^3 , aut primam ex duabus mediis proportionalibus 1 & ab^2 ; ex tribus autem, inter 1 & ab^3 . Patet autem, quod radix m ipsius a^m , est a , quæ invenitur deleto indice.

(z) 49. Si quantitas expressa per ax sit recta, hæc erit quarta proportionalis post $1, a$, & x (art. VIII.) & tunc habebitur \sqrt{ax} quærendo median proportionalem inter unitatem linearem, & lineam quæ exponitur per ax , ut in art. præcedente.

50. Si vero quantitas ax sit rectangulum ex recta expressa per a , in rectam exponentam per x , tunc \sqrt{ax} invenietur per EUCL. 14. II., aut quæsitæ media proportionali inter a & x per EUCL. 13. VI.

ipſius a^3bb , & $3\frac{a}{c}$ ter $\frac{a}{c}$, & $7Vax$ ſepties Vax . Item $\frac{a}{b}x$ denotat id quod fit multiplicando x per $\frac{a}{b}$, & $\frac{5ee}{4a+9e}Z^3$ id quod fit multiplicando Z^3 per $\frac{5ee}{4a+9e}$, hoc eſt per quorum exortum diſiſione $ſee$ per $4a+9e$, & $\frac{2a^3}{9c}Vax$ id quod fit multiplicando Vax per $\frac{2a^3}{9c}$; & $\frac{7Vax}{c}$ quorum exortum diſiſione $7Vax$ per c ; & $\frac{8aVax}{2a+Vcx}$ quorum exortum diſiſione $8aVcx$ per ſummam quantitatum $2a+Vcx$. Et ſic $\frac{3axx-x^3}{a+x}$ denotat quorum exortum diſiſione differentię $3axx-x^3$ per ſummam $a+x$, & $V\frac{3axx-x^3}{a+x}$ radicem ejus quoti, & $2a+3cV\frac{3axx-x^3}{a+x}$ id quod fit multiplicando radicem illam per ſummam $2a+3c$. Sic etiam $V\frac{1}{2}aa+bb$ denotat radicem ſummę quantitatum $\frac{1}{2}aa$ & bb & $V\frac{1}{2}a+V\frac{1}{2}aa+bb$ radicem ſummę quantitatum $\frac{1}{2}a$ & $V\frac{1}{2}aa+bb$, & $\frac{2a^3}{aa-zz}V\frac{1}{2}a+V\frac{1}{2}aa+bb$ radicem illam multiplicatam per $\frac{2a^3}{aa-zz}$. Et ſic in aliis.

XXIII. Ceterum nota quod in hujusmodi complexis quantitibus non opus eſt ad ſignificationem ſingularum literarum ſemper attendere; ſed ſufficit in genere tantum intelligere, e. g. quod $V\frac{1}{2}a+V\frac{1}{2}aa+bb$ ſignificat radicem $\frac{1}{2}a+V\frac{1}{2}aa+bb$; quodcunque tandem prodeat illud aggregatum cum numeri vel lineę pro litteris ſubſtituuntur. Atque ita quod $V\frac{1}{2}a+V\frac{1}{2}aa+bb$ ſignificat quorum exortum diſiſione quantitatis $a-Vab$

$V\frac{1}{2}a+V\frac{1}{2}aa+bb$ per quantitatem $a-Vab$, perinde ac ſi quantitates illę ſimplices eſſent & cognitę, etſi quam ſint impręſentiarum profuſ ignoretur, & ad ſingularum partium conſtitutionem ſeu ſignificationem neutiquam attendatur. Id quod monendum eſſe duxi ne complexione terminorum Tyrones quaſi conterriti in limine hęreant.

CAPUT TERTIUM DE ADDITIONE.

XXIV. **N**UMERORUM, ubi non sunt admodum compositi, additio per se manifesta est. Sic quod 7 & 9 seu $7 + 9$ faciunt 16, & quod $11 + 15$ faciunt 26 prima fronte patet.

At in magis compositis opus peragitur scribendo numeros serie descendente & summas columnarum sigillatim colligendo.

Quemadmodum si numeri 1357 & 172 addendi sunt, scribe alterutrum 172 infra alterum 1357 ita ut hujus unitates 2 alterius unitatibus 7 subjiciantur, ceterique numeri numeris correspondentibus, nempe deni 7 denis 5, & centenus 1 centenis 3 (a).

$$\begin{array}{r} 1357 \\ 172 \\ \hline \end{array}$$

1529

Tum incipiendo ad dextram, dic 2 & 7 faciunt 9, quem scribe infra. Item 7 & 5 faciunt 12, cujus posteriorem numerum 2 scribe infra, priorem vero 1 asserva proximis numeris 1 & 3 adjiciendum (b). Dic itaque præterea 1 & 1 faciunt 2, cui 3 adjectus facit 5, & scribe 5 infra, & manebit tantum 1 prima figura superioris numeri, quæ etiam infra scribenda est, & sic habebitur summa 1529.

XXV. Sic numeros $87899 + 13403 + 885 + 1920$, quo in unam summam redigantur, scribe in serie descendente ita ut unitates unam columnam, deni numeri aliam, centeni tertiam, milleni quartam constituent, & sic præterea.

87899

(a) 51. NUMERI sedes diversas occupantes in eadem linea constant unitatibus diversis, & diversi generis (Nº. 4.) ergo simul addi nequeunt, ita ut unam summam unius nominis efficiant; sic novem decades cum duabus unitatibus non efficiunt certe undecim unitates, quamvis novem unitates cum duabus unitatibus undecim consent, ergo homogenei nu-

meri homogeneis addendi sunt, quod facilius efficitur alios aliis supponendo.

(b) 52. Hic 12 est duodecim decades, aut unum centenarium cum duabus decadibus; sed locus centenis affectus est tertius, ergo hoc centenarium in tertium locum servandum est, quæ demonstratio de ceteris intelligenda est.

$$\begin{array}{r}
 87899 \\
 13403 \\
 1920 \\
 885 \\
 \hline
 104107
 \end{array}$$

Deinde dic $5 + 3$ valent 8 , & $8 + 9$ valent 17 , scribeque 7 infra, & 1 adice proximis numeris dicendo $1 + 8$ valent 9 , $9 + 2$ valent 11 , ac $11 + 9$ valent 20 ; subscriptoque 0 , dic iterum ut ante $2 + 8$ valent 10 , $10 + 9$ valent 19 , $19 + 4$ valent 23 , & $23 + 8$ valent 31 , adeoque, asservato 3 , subscribe 1 ut ante; & iterum dic $3 + 1$ valent 4 , $4 + 3$ valent 7 , & $7 + 7$ valent 14 . Quare subscribe 4 , denuoque dic $1 + 1$ valent 2 , & $2 + 8$ valent 10 , quem ultimo subscribe, & omnium summam habebis 104107 .

XXVI. Ad eundem modum numeri decimales adduntur ut in annexo paradigmate videre est (c)

$$\begin{array}{r}
 630'953 \\
 51'0807 \\
 305'37 \\
 \hline
 987'4037
 \end{array}$$

XXVII. In terminis algebraicis additio fit connectendo quantitates addendas cum signis propriis, & insuper uniendo quæ possunt uniri.

Sic a & b faciunt $a + b$; a & $-b$ faciunt $a - b$; $-a$ & $-b$ faciunt $-a - b$; $7a$ & $9a$ faciunt $7a + 9a$; $-a\sqrt{ac}$ & $b\sqrt{ac}$ faciunt $-a\sqrt{ac} + b\sqrt{ac}$ vel $b\sqrt{ac} - a\sqrt{ac}$, nam perinde est quo ordine scribantur.

XXVIII. Quantitates affirmative quæ ex parte specierum conveniunt, ununtur addendo numeros præfixos quibus species multiplicantur.

Sic $7a + 9a$ faciunt $16a$.
 Et $11bc + 15bc$ faciunt $26bc$.

Item $3\frac{a}{c} + 5\frac{a}{c}$ faciunt $8\frac{a}{c}$.

& $2\sqrt{ac} + 7\sqrt{ac}$ faciunt $9\sqrt{ac}$,

&

$6\sqrt{ab-xx} + 7\sqrt{ab-xx}$ faciunt $13\sqrt{ab-xx}$.

Et ad eundem modum $6\sqrt{3} + 7\sqrt{3}$ faciunt $13\sqrt{3}$.

Quinetiam $a\sqrt{ac} + b\sqrt{ac}$ faciunt $\frac{a+b}{c}\sqrt{ac}$, additis nempe a & b tanquam si essent numeri multiplicantes \sqrt{ac} .

Et

(c) 53. Reduc numeros decimales ad vulgares (Nº. 9.) & unitatibus unitates subscribe, ac perge juxta regulam superiorem:

aut unitates integras integris unitatibus suppone, cetera vero suis locis pone, & tunc homogenea addes homogeneis.

B 3

Et sic

$$\frac{2a+3c}{2a+3c} \sqrt{\frac{3axx-x^3}{a+x}} + 3a \sqrt{\frac{3axx-x^3}{a+x}}$$

faciunt $\frac{2a+3c}{2a+3c} \sqrt{\frac{3axx-x^3}{a+x}}$ eo quod $2a+3c$ & $3a$ faciant $5a+3c$.

XXIX. *Fractiones affirmativa quarum idem est denominator, ununtur addendo numeratores (d).*

Sic

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{ faciunt } 1,$$

&

$$\frac{2ax}{b} + \frac{3ax}{b} \text{ faciunt } \frac{5ax}{b}$$

&

$$\frac{8a\sqrt{cx}}{2a+\sqrt{cx}} + \frac{17a\sqrt{cx}}{2a+\sqrt{cx}} \text{ faciunt } \frac{25a\sqrt{cx}}{2a+\sqrt{cx}},$$

&

$$\frac{aa}{c} + \frac{bx}{c} \text{ faciunt } \frac{aa+bx}{c}$$

XXX. *Negative quantitates eodem modo adduntur ac affirmativæ.*

Sic

$$-2 \text{ \& } -3 \text{ faciunt } -5;$$

$$-\frac{4ax}{b} \text{ \& } -\frac{11ax}{b} \text{ faciunt } -\frac{15ax}{b}$$

$$-a\sqrt{ax} \text{ \& } -b\sqrt{ax} \text{ faciunt } -(a+b)\sqrt{ax}.$$

Ubi vero *negativa quantitas affirmativæ adjicienda est*, oportet affirmativam negativam diminuerere.

Sic

$$3 \text{ \& } -2 \text{ faciunt } 1;$$

$$-\frac{11ax}{b} \text{ \& } \frac{4ax}{b} \text{ faciunt } -\frac{7ax}{b},$$

$$2\sqrt{ac} \text{ \& } -7\sqrt{ac} \text{ faciunt } -5\sqrt{ac}. \text{ (e).}$$

XXXXI. In additione aut plurium aut magis compositarum quantitarum,

(d) 54. Nam hæ fractiones sunt quantitates ejusdem generis: siquidem ex. gratia, $\frac{1}{2}$ est unitas quæ quinques sumpta valet unitates vulgares, & $\frac{2}{2}$ æquivalet duabus ex his unitatibus.

(e) 55. Hæc omnia clare pateat ex art. VII. hujus, nam cum signum — subtractionem denotet, $a - b$ idem, crit, ac id quod re-

stat postquam quantitas a quantitate b minuta fuerit, ergo (litteras quasvis quantitates significantis) $11 - 4 = 8$; $AB - BC = AC$ Tab. I. &c. Sed si e quantitate aliqua aliam illi æqualem demas, restat 0; si vero illa majorem, minus quam 0, & quantitates nihilo minores, (Art. VI. hujus) signo — afficiuntur, ergo si majus e minore subtrahas, quantitas negativa remanebit.

tum, convenit observare formam operationis supra in additione numerorum expositam. Quemadmodum si

$17ax - 14a + 3$, & $4a + 2 - 8ax$, & $7a - 9ax$ addendæ sunt, dispono eas in serie descendente, ita scilicet ut termini maxime affines stent in iisdem columnis. Nempe numeri 3 & 2 in una columna, species $-14a$ & $4a$ & $7a$ in alia columna, atque species $17ax$ & $-8ax$ & $-9ax$ in tertia.

$$\begin{array}{r} 17ax - 14a + 3 \\ - 8ax + 4a + 2 \\ - 9ax + 7a \end{array}$$

$$* - 3a + 5$$

Dein terminos cujusque columnæ sigillatim addo dicendo 2 & 3 faciunt 5 quod subscribo, dein 7a & 4a faciunt 11a & insuper $-14a$ facit $-3a$ quod iterum subscribo, denique $-9ax$ & $-8ax$ faciunt $-17ax$ & insuper $17ax$ facit 0. Adeoque prodit summa $-2a + 5$.

Eadem methodo res in sequentibus exemplis absolvitur.

$12x + 7a$	$11bc - 7\sqrt{ac}$	$-\frac{4ax}{b} + 6\sqrt{3} + \frac{1}{2}$	$6x^2 + \frac{1}{2}x$
$7x + 9a$	$15bc + 2\sqrt{ac}$	$+\frac{11ax}{b} - 7\sqrt{3} + \frac{2}{3}$	$5x^2 + \frac{1}{3}x$
$19x + 16a$	$26bc - 5\sqrt{ac}$	$\frac{7ax}{b} - \sqrt{3} + \frac{3}{2}$	$5x^2 - 6x^2 + \frac{1}{2}x$

$$\begin{array}{r} aay + 2a^2 - \frac{a^2}{2y} \\ - 2aay - 4aay + a^2 \\ y^2 + 2aay - \frac{1}{2}aay \end{array}$$

$$y^2 * - 3\frac{1}{2}aay + 3a^2 - \frac{a^2}{2y}$$

$$\begin{array}{r}
 5x^4 + 2ax^3 \\
 - 3x^4 - 2ax^3 + 8\frac{1}{2}a^3\sqrt{aa+xx} \\
 - 2x^4 + 5bx^3 - 20a^3\sqrt{aa-xx} \\
 - 4bx^3 - 7\frac{1}{2}a^3\sqrt{aa+xx}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 * + bx^3 + a^3\sqrt{aa+xx} \\
 - 20a^3\sqrt{aa-xx}
 \end{array}$$

CAPUT QUARTUM.

DE SUBDUCTIONE.

XXXII. **N**UMERORUM non nimis compositorum inventio etiam differentiarum per se patet. Quemadmodum quod 9 de 17 relinquit 8.

At in magis compositis subductio fieri solet subscribendo numerum ablativum & sigillatim auferendo figuras inferiores de superioribus (f).

Sic ad auferendum 63543 de 782579, subscripto 63543,

$$\begin{array}{r}
 782579 \\
 63543 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$719036$$

dic 3 de 9 relinquit 6, quod scribe infra: dein 4 de 7 relinquit 3 quod pariter scribe infra: tum 5 de 5 relinquit 0 quod itidem subscribe: postea 3 de 2 auferendum est, sed cum 3 sit majus, figura 1 a proxima figura 8 mutuo sumi debet, quæ una cum 2 faciat 12, a quo auferri potest 3, & restat 9, quod insuper subscribe. Ad hæc cum præter 6 etiam 1 de 8 auferendum sit, adde 1 ad 6, & summa 7 de 8 relinquit 1, quod etiam subscribe. Denique cum in inferiori numero nihil restet auferendum de superiori 7, subscribe etiam 7, & sic tandem habes differentiam 719036.

XXXIII. Ceterum omnino cavendum est ut figure numeri ablativi subscribantur in locis homogeneis.

Nem-

(f) 56. Nam sic primus numerus a dextra subtrahitur, ergo totus e toto. e primo numero, secundus e secundo &c.

Nempe unitates infra alterius numeri unitates, deni numeri infra denos, decimæ partes infra decimas, &c., sicut in additione dictum est. Sic ad auferendum decimalem 0'63 ab integro 547, non dispones numeros hoc modo.

$$\begin{array}{r}
 547 \\
 0'63 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \text{sed sic} \\
 547 \\
 0'63 \\
 \hline
 546'37
 \end{array}$$

Ita nempe ut circulus, qui locum unitatum in decimali occupat, subiiciatur unitatibus alterius numeri. Tum circulis in locis vacuis superioris numeri subintellectis, dic 3 de 0 auferendum esse; sed cum nequeat, debet 1 de loco anteriori mutuo sumi, ut 0 evadat 10 a quo 3 auferri potest, & dabit 7, quod infra scribe. Dein illud 1 quod mutuo sumitur, adjectum 6 facit 7, & hoc de superiore 0 auferendum est; sed cum nequeat, debet iterum 1 de loco anteriori sumi ut 0 evadat 10, & 7 de 10 relinquet 3, quod similiter infra scribendum est. Tum illud 1 adjectum 0 facit 1, & hoc 1 de 7 relinquit 6, quod itidem subscribe. Denique figuras etiam 54, siquidem de illis nihil amplius auferendum restat, subscribe, & habebis residuum 546'37.

Exercitationis gratia plura tum in integris tum in decimalibus numeris exempla subjicimus.

$\begin{array}{r} 1673 \\ 1541 \\ \hline 132 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1673 \\ 1580 \\ \hline 93 \end{array}$	$\begin{array}{r} 458074 \\ 9205 \\ \hline 448869 \end{array}$	$\begin{array}{r} 35'72 \\ 14'32 \\ \hline 21'4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 46,5003 \\ 3,078 \\ \hline 43,4223 \end{array}$	$\begin{array}{r} 208,7 \\ 25,74 \\ \hline 182,96 \end{array}$
---	--	--	--	---	--

XXXIV. Si quando major numerus de minori auferendus est, oportet minorem de majore auferre, & residuo præfigere negativum signum. Veluti si auferendum sit 1673 de 1541, e contra aufero 1541 de 1673, & residuo 132 præfigo signum —.

XXXV. In terminis algebraicis subductio fit connectendo quantitates cum signis omnibus quantitatis subducendæ mutatis, & insuper uniendo quæ possunt uniri (g) perinde ut in additione factum est.

Sic

(g) 57. In subductione duo consideranda sunt: quantitas auferenda & ea, a qua aliquid auferitur. Quantitas, a qua altera demitur, nullam aliam patitur mutationem, quam eam, quæ ex alterius ablatione oritur, quare illa talis, qualis est, restat, aut scribenda est nulla signorum mutatione facta.

Pro quantitate subducenda, patet unicuique simplici positivæ quantitati adscribendum signum subtractionis, ergo signa positiva in negativa sunt mutanda.

Quod si quantitas auferenda sit composita ex quantitatibus positivis & negativis (puta

Sic $+7a$ de $+9a$ relinquit $+9a - 7a$ five $2a$;
 $-7a$ de $+9a$ relinquit $+9a + 7a$ five $16a$;
 $+7a$ de $-9a$ relinquit $-9a - 7a$ five $-16a$;
 $\&$ $-7a$ de $-9a$ relinquit $-9a + 7a$ five $-2a$.

Sic $3\frac{a}{c}$ de $5\frac{a}{c}$ relinquit $2\frac{a}{c}$;

$7\sqrt{ac}$ de $2\sqrt{ac}$ relinquit $-5\sqrt{ac}$;

$\frac{3}{5}$ de $\frac{4}{5}$ relinquit $\frac{1}{5}$;

$-\frac{2}{7}$ de $\frac{3}{7}$ relinquit $\frac{1}{7}$;

$-\frac{2ax}{b}$ de $\frac{3ax}{b}$ relinquit $\frac{5ax}{b}$;

$\frac{8a\sqrt{cx}}{2a+\sqrt{cx}}$ de $\frac{17a\sqrt{cx}}{2a+\sqrt{cx}}$ relinquit $\frac{25a\sqrt{cx}}{2a+\sqrt{cx}}$;

$\frac{aa}{c}$ de $\frac{bx}{c}$ relinquit $\frac{bx-aa}{c}$;

$a-b$ de $2a+b$ relinquit $2a+b - a+b$ five $a+2b$;

$3az - zz + ac$ de $3az$ relinquit $3az - 3az + zz - ac$
 five $zz - ac$;

$\frac{2aa-aa}{c}$ de $\frac{aa+ab}{c}$ relinquit $\frac{aa+ab-2aa+ab}{c}$

five $-\frac{aa+ab}{c}$

Et $\frac{a-x}{x}\sqrt{ax}$ de $\frac{a+x}{x}\sqrt{ax}$ relinquit $\frac{a+x}{x} - \frac{a-x}{x}\sqrt{ax}$
 five $2x\sqrt{ax}$. Et sic in aliis

XXXVI. Ceterum ubi quantitates pluribus terminis constant, operatio perinde ac in numeris institui potest. Id quod in sequentibus exemplis videre est.

$\begin{array}{r} 12x + 7a \\ 7x + 9a \\ \hline 5x - 2a \end{array}$	$\begin{array}{r} 15bc + 2\sqrt{ac} \\ -11bc + 7\sqrt{ac} \\ \hline 26bc - 5\sqrt{ac} \end{array}$	$\begin{array}{r} 5x^3 * + \frac{7}{5}x \\ 6xx - \frac{7}{5}x \\ \hline 5x^3 - 6xx + \frac{7}{5}x \end{array}$
--	--	--

$\frac{11ax}{b}$

$b - c$ constat quod postquam ex a ex. gr. abstrahi b , nimis abstrahi, nam auferre debebam tantum differentiam inter b & c , & hoc nimis abstrahum est ipsa quantitas c , ut liquet, quo circa ea reddenda est, aut residuo invento addenda; quare signa negativa in positiva sunt mutanda.

b rectam CB, & c rectam BE, & ex a subducenda sit $b - c$, seu differentia rectarum CB, BE. Facta subductione algebraica, reliquum exprimitur per $a + c - b$; quarum quantitarum duæ, a & c , additæ sunt, tertia b subtracta: Adde ergo simul rectas expressas per a & c (No. 11.) unde habebis AB, ex qua deme BC, residua AC, erit, ut liquet, recta expressa per $a + c - b$.

TAB. A. 58. Ubi litteræ rectas exprimunt, res nihilo difficilior est: Exprimaunt a rectam AE;

$$\frac{11ax}{b} = 7\sqrt{3} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{4ax}{b} = 6\sqrt{3} - \frac{1}{2} \quad (b)$$

$$\frac{7ax}{b} = \sqrt{3} + \frac{1}{2}$$

C A-

(b) 59. Subtractio, qua datarum quantitarum differentia quaeritur, monet, ut hic adiectam aliqua usu-ventura theorematum de quantitativis aequae differentibus.

60. Relatio aut habitudo, quae est inter quantitates consideratas quoad differentiam, dicitur ratio Arithmetica: Vel ratio Arithmetica est relatio, quae invenitur inter duas quantitates, cum quaeritur quamvis quantitate differant.

61. Ut inveniat ratio arithmetica, quae est inter quasvis duas quantitates a , & b , (quarum a ponitur major) quaerenda est earum differentia $a - b$.

62. Major terminus rationis arithmeticae patet aggregato ex minori & differentia; minor autem differentiae, quae est inter majorem terminum & amborum differentiam: Ex gratia: Sit $a - b = d$, erit (addendo aequalia aequalibus) a , major terminus, $= b + d$, aggregato ex minori & differentia; quia vero $a = b + d$, erit (ex quilibet aequalia demendo) $a - d$, differentia quae est inter majorem terminum, & amborum differentiam, aequalis b minori termino.

63. Quatuor quantitates, quarum duae sunt aliis duabus aequidifferentes, vocantur arithmetice proportionales: tales ex. gr. erunt a, b, c, f , si inter a & b sit eadem differentia, ac inter c , & f .

64. Si quatuor quantitates sint arithmetice proportionales, extremarum & mediarum summae sunt aequales.

Sint arithmetice a ad b , ut c ad f , & sit a major quam b , & ideo c major quam f ; ac differentia inter a & b , sit d : erit $b + d = a$, (Nº. 62.) sed & differentia, inter c & f , est pariter d (Nº. 63.) ergo etiam $c = f + d$, quare summa extremarum est $b + d + f$, ut & summa mediarum, igitur &c. Q. E. D.

65. Si duo medii termini sint aequales inter se, erit summa extremorum aequalis alteri ex mediis bis sumpto.

66. Tunc etiam maximus terminus aequabit summam ex minimo, & duplo differentiae, quae est inter maximum & medium, aut inter medium & minimum; minimus autem differentiam, quae est inter maximum & differentiam maximi a medio, vel medii a minimo bis sumtam: Ex. gr. sit a arithmetice ad b , ut b ad c , & differentia inter a & b sit d , quae debet quoque esse differentia ipsius b a c (Nº. 63.); erit $a = b + d$, & $b = c + d$ (Nº. 62.) ergo $a = c + 2d$: & (aequalibus ex aequalibus demptis) $a - 2d = c$.

67. Ubi secundus proportionis terminus aequat tertium, proportio dicitur continua, ac duo termini aequales pro uno repetito habentur, qui vocatur medius.

68. Plures quantitates, quae sunt in continua proportione arithmetica, dicuntur constituere progressionem arithmeticam.

69. Progressio, cujus primus terminus est omnium minimus, vocatur ascendens; descendens vero, cujus primus terminus est omnium maximus.

70. Datis primo termino, & differentia terminorum, invenire singulos progressionis terminos.

Si progressio debet esse ascendens, adde termino primo, qui datur, datam differentiam; & habebis terminum secundum, huic adde rursus differentiam, unde oriatur tertius terminus &c.: res per se ipsa patet, nec demonstrationis eget.

Si vero progressio debet esse descendens, e primo termino deme differentiam, & habebis secundum, e secundo deme iterum differentiam, hinc exsurget tertius, atque ita porro Q. E. F.

CAPUT V.

DE MULTIPLICATIONE.

XXXVII. **N**UMERI, qui ex multiplicatione duorum quorumvis numerorum non majorum quam 9, oriuntur, memoriter addiscendi sunt. Veluti quod 5 in 7, facit 35, quodque 8 in 9 facit 72, &c. Deinde majorum numerorum multiplicatio ad horum exemplorum normam instituetur.

XXXVIII. Si 795 per 4 multiplicare oportet, subscribe 4, ut vides.

Dein dic, 4 in 5 facit 20, cujus posteriorem figuram 0 scribe infra 4, priorem vero 2 reserva in proximam operationem. Dic itaque præter-

$$\begin{array}{r} 795 \\ 4 \end{array}$$

$$3180$$

ea 4 in 9 facit 36, cui adde præstatum 2 & fit 38, posteriorem figuram 8, ut ante subscribe, & priorem 3 reserva. Denique dic 4 in 7 facit 28, cui adde prædictum 3 & fit 31; eoque pariter subscripto habebitur 3180 numerus qui prodit multiplicando totum 795 per 4.

XXXIX. Porro si 9043 multiplicandus est per 2305, scribe alterutrum 2305 infra alterum 9043 an ante,

$$\begin{array}{r} 9043 \\ 2305 \\ \hline 45215 \\ 0000 \\ 27129 \\ 18086 \\ \hline \end{array}$$

$$2084415$$

& multiplica superiorem 9034 primo per 5 pro more ostenso, & emerget 45215, dein per 0, & emerget 0000, tertio per 3 & emerget 27129, denique per 2 & emerget 18086. Hosque sic emergentes numeros in serie descendente ita scribe, ut cujusque inferioris ultima figura sit uno loco propior sinistra quam ultima superioris. Tandem hos omnes adde & orietur

71. In progressionē ascendente quis terminus æquat aggregatum ex primo termino, & differentia toties sumpta, quot sunt termini ante quæsitum: *Ex. gr.* quintus terminus æquat primum cum differentia quater sumpta. Si vero progressio

fit descendens, quis terminus æquat differentiam primi termini, a progressionis differentia toties repetita, quot termini quæsitum præcedunt, in sextus terminus æqualis est primo multato progressionis differentia quinque sumpta.

rietur 20844115, numerus qui fit multiplicando totum 9043 per totum 2305 (i).

XL. Decimales numeri per integros vel per alios decimales perinde multiplicantur, ut vides in his exemplis.

$\begin{array}{r} 72,4 \\ 29 \\ \hline 6516 \\ 1448 \\ \hline 2099,6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 50,18 \\ 2,75 \\ \hline 25090 \\ 35126 \\ 10036 \\ \hline 137,9950 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3,9025 \\ 0,0132 \\ \hline 78050 \\ 117075 \\ 39025 \\ \hline 0,05151300 \end{array}$
---	---	---

XLI. Sed nota quod in prodeunte numero tot semper figuræ ad dextram pro decimalibus abscindi debent, quot sunt figuræ decimales in utroque numero multiplicante. Et si forte non sint tot figuræ in prodeunte numero, deficientes loci circulis adimplendi sunt, ut hic fit in exemplo tertio (k).

XLII. Simples termini algebraici multiplicantur ducendo numeros in numeros & species in species ac statuendo factum affirmativum si ambo factores sint affirmativi (l), aut ambo negativi (m), & negativum si secus. (n).

Sic

(i) 72. Ut multiplicationis regula demonstretur, sufficit ostendere, quod si due quantitates secantur in quotcunque partes, idem consistat totum in totum, ac partes in partes ducendo.

Sit $a = c + f$, & $b = g + h$, erit (Eucl. I. II.) $ab = bc + bf$, sed $bc = cg + ch$, & $bf = fg + fh$, ergo $ab = cg + ch + fg + fh$. Quod si c, f, g, h , secantur in quolibet partes eadem demonstratio repetetur, quare constat propositum.

73. Si ergo, f, g, h &c. denotant quosvis numeros, ut hi invicem ducantur, omnes partes unius ducendæ sunt in omnes partes alterius, quod manifeste fit per Auctoris regulam.

74. Notandum tamen ab unitatibus incipiendum esse, quia aliquot unitates ductæ in aliquot unitates (ut in subiecto exemplo 3 x 5) possunt conficere decades, quarum sedes est secunda a sinistra, ubi sic facile locari possunt, quia cum 4 decades ducuntur in 5 unitates (quod certe dabit non unitates sed decades, quæ scilicet aliquoties sumuntur) jam notum est quot decades huic producto addendæ sint, quod aliter fieri nequiret.

75. Productum totius superioris numeri per

secundam figuram inferioris ita ponendum est, ut ejus ultima figura sit uno loco propior sinistra, quam ultima superioris id est, ut eandem obtineat sedem, ac in numeris datis decades, quia secunda figura cujusvis numeri est decas, quæ aliquoties sumpta decades conficiet, quare decadam loco ponenda est, & sic de ceteris.

(k) Vide infra (Nº. 89.) de Fractionum multiplicatione.

(l) 76. Quantitas affirmativa est quantitas nihilo addita, si ergo talis quantitas sibi met ipsa aliquoties addatur, factum hinc exurgens certe nihilo additum erit, id est, positivum.

Sic superficies positiva ea erit, quæ ductu linearæ positivæ in positivam constatur. T. A. B. A. Fig. 3.

Ita si FB, FE sint linearæ positivæ, erit FG superficies positiva.

(m) Vide infra (Nº. 79.)

(n) 77. Quantitatem positivam negative, aut negativam positive aliquoties accipere, nihil aliud significat, quam, aut quantitatem positivam aliquoties a semet subducere, aut negativam aliquoties sumer prout est, id est, negativæ.

Sic $2a$ in $3b$, vel — $2a$ in — $3b$ facit $6ab$, vel $6ba$; nihil enim refert quo ordine ponantur (*). Sic etiam $2a$ in — $3b$, vel — $2a$ in $3b$ facit — $6ab$. Et sic $2a$ in $8bc$ facit $16abcc$ sive $16abc^3$; & $7axx$ in — $12aaxx$ facit — $84a^3x^4$; & — $16cy$ in $31ay^3$ facit — $496acy^4$; & — $4z$ in — $3Vaz$ facit $12zVaz$. Atque ita 3 in — 4 facit — 12 & — 3 in — 4 facit 12 .

XLIII.

tive; primum patet ex terminis, quia negative sumere quantitatem est eam subducere: secundum probatur, quia quantitatem positive sumere est eam nihilo aut alicui quantitati addere, sed quantitatem negativam addere est eam subducere, (XXVII hujus) ergo &c.

Vel sic: $+a$ ducenda sit in $o - c$; sit $o - c = f$, igitur $af = a(o - c)$ atqui $o = c + f$, (Eucl. Ax. 2.) quamobrem $a o = a c + a f$. (Eucl. 1. II.) ergo $a o - a c = a f$ | Eucl. Ax. 3. | $a(o - c) = a \times o + a \times (-c)$, sed $a o = a \times o$, ergo, subductis æqualibus, — $a c = a \times (-c)$.

78. Sed superficies negativa ea est quæ positivæ opponitur, & gignitur ducta lineæ negativæ in positivam, aut positivæ in negativam; quare cum jam positivas rectas BF , FE posuerimus, erit FC negativa (VI. hujus), quæ si ducatur in FB positivam, au si FB ducatur in FC negativam, gignetur superficies $FCHB$, quæ (art. VI.) negativa est.

Idem eveniet si recta FE positiva ducatur in FD negativam, aut contra.

79. Quantitatem negativam in negativam ducere est eam aliquoties negative sumere, sed quantitas negativa positive sumpta dat factum negativum, ergo negative, id est ratione positivæ contraria, dabit factum positivum.

Hinc regula quantitatum ducendis proposita: *Signa similia* (sive ambo negativa, sive ambo positiva) *dant factum positivum, signa dissimilia negativum.*

(* Eucl. 16. VII.)

Ita quoque, cum superficies $FCHB$ aut $FIED$ sint negativæ (No. 69), & ambabus opposita sit $FCA D$, ea erit positiva (Art. VI.) quæ tamen gignitur rectis DF , FC , ambabus negativis.

80. Si index n est par, potestas erit positiva, licet ejus radix sit negativa; nam, quia n est numerus par, fac $n = 2c$, radix sit $\pm a$,

$$\text{habebis ergo } \pm a^c \cdot \pm a^c = a^n.$$

81. Omnis potestas, cujus index m est impar, negativæ radicis — a , est negativa; nam tot sunt quantitates invicem multiplicandæ, quos unitates in indice (Art. XVI.) Quævis quantitas habet signum —; ergo signa negativa tot sunt, quot unitates in indice; quare, unitate dempta, signorum numerus erit par; ergo — a evecta ad potestatem $m - 1$,

$$\begin{matrix} m-1 & & m \\ = a & \text{que ducta in} & -a \text{ dat,} & -a. \end{matrix}$$

82. Item si ab evehatur ad potestatem m , habebitur $a^m b^m$, & si invicem ducantur a^m , & b^m idem habebitur, ergo $(ab)^m = a^m b^m$.

83. Si unitas & potestates prima, secunda, tertia, quarta &c. alicujus quantitatis ita disponantur ut sint in proportione geometrica continua (ut monitum est Art. XVII.) erunt exponentes potestatum in proportione arithmetica continua.

Quantitas sit a ; unitas, & potestates ipsius a disponendæ sunt per hypothesein hoc pacto;

$$1, a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7, \dots, a^m, a.$$

Jam exponentes indicant numerum factorum æqualium, quibus constat quivis terminus (Art. XVI.) At quivis terminus, per hypothesein, constat tot factoribus quot præcedens & uno insuper; ergo exponentes differunt unitate, & habent eandem differentiam, quare sunt in proportione arithmetica continua.

84. Differentia exponentium $m, m - 1; \dots, 7, 6$, &c. est unitas, & esse debet ex rei natura. Sed $2 - 1 = 1$; ergo exponentis ipsius radicis debet esse unitas. Quod vel hinc probatur, quod radix constat ex unico factore.

Item $1 - 1 = 0$; quare exponentis unitatis debet esse 0, vel $1 = a^0$; & recipia nullus factor a unitatem constituit.

85. Si ex Serie præcedente excerpas quovis terminos, eos terminos omittens inter primum & ultimum

TAB. A.
Fig. 3.

TAB. A.
Fig. 3.

XLIII. *Fractiones* multiplicantur ducendo numeratores in numeratores ac denominatores in denominatores (o).

Sic $\frac{1}{7}$ in $\frac{1}{7}$ facit $\frac{1}{49}$; & $\frac{a}{b}$ in $\frac{c}{d}$ facit $\frac{ac}{bd}$; & $2\frac{a}{b}$ in $3\frac{c}{d}$ facit $6\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$ seu $6\frac{ac}{bd}$; & $\frac{3cy}{2bb}$ in $-\frac{7cy}{4bb}$ facit $-\frac{21accy^3}{8bb^3}$; & $-\frac{4x}{c}$ in $-\frac{3\sqrt{az}}{c}$ facit $\frac{12\sqrt{az}}{cc}$; & $\frac{a}{b}x$ in $\frac{c}{d}xx$ facit $\frac{ac}{bd}x^3$.

Item 3 in $\frac{1}{7}$ facit $\frac{3}{7}$, ut patet si 3 reducatur ad formam fractionis $\frac{3}{1}$ adhibendo unitatem pro denominatore.

Et sic $\frac{15az}{cc}$ in $2a$ facit $\frac{30a^2z}{cc}$. Unde nota obiter quod $\frac{ab}{c} \& \frac{ac}{c} b$ idem valent; ut $\& \frac{abx}{c}$, $\frac{ab}{c}x$ & $\frac{a}{c}bx$ nec non $\frac{a+\sqrt{cx}}{a} \& \frac{a+b}{a}\sqrt{cx}$, & sic in aliis (q).

XLIV.

cundum excerptorum, quot inter tertium, & quartum, ubicunque incipias, termini excerpti erunt quidem in proportione geometrica sed eorum exponentes in arithmetica.

quare hæ quantitates sunt in proportione geometrica. Sed productum debet esse aliqua e potestatibus ipsius a , nulla enim alia quantitas est neque in multiplicatore neque in multiplicando, ergo exponentes debent esse in proportione arithmetica. Est autem arithmetice o ad m ut n ad $m+n$. Ergo &c.

Quoniam omnes termini sunt in proportione geometrica continua, semper ratio primi (quemcumque primum statuas) ad tertium erit duplicata; ad quartum triplicata, ad $m+n$ num, m ... plicata rationis primi ad secundum, (Eucl. def. 11. V.). Sed, si inter x & y omittas totidem terminos quot inter z & u , ratio ipsius x ad y & z ad u &c. componetur quævis ex totidem rationibus æqualibus. Ergo hæ quantitates $x, y, z, u, \&c.$, erunt in proportione geometrica. Quod erat primum.

Quilibet exponentes præcedentem superat unitate; ergo, si omittas m terminos, exponentes secundi superabit exponentem primi $m+n$ unitatibus (Nº 71.), sed & exponentes quarti superabit exponentem tertii $m+n$ unitatibus. Ergo exponentes erunt in proportione arithmetica. Quod erat alterum.

88. Est si potestas a^m evchenda est ad potestatem n , scribendum est $a^{\frac{m}{n}}$. Nam index erit $m+n$ &c. (Art. XVI.) donec numerus eorum sit n ; id est m .

(a) 89. Ponatur $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{f} = x$, dico $x = \frac{ac}{bf}$.

Ut $\frac{a}{b}$ ducatur in $\frac{c}{f}$ faciendum est $1 \cdot \frac{a}{b} :: \frac{c}{f}$
 x ; quare $b \cdot a :: c \cdot fx$ (Eucl. 17. VII.), ergo $bf x = ac$ (Eucl. 14. VI. & 10. VII.)

& $x = \frac{ac}{bf}$. (Eucl. Ax. 7.)

Si $b = 1$, id est, si $\frac{a}{b}$ sit quantitas integra, ea ducenda erit in numeratorem fractionis, per cujus denominatorem si productum dividatur, habebitur factum ex integro in fractionem, quia tunc $x = \frac{ac}{bf}$ fieret $\frac{ac}{1f} = \frac{ac}{f}$.

(b) 90. Siquidem $\frac{a}{c}b$, ex. gr. est $\frac{a}{c} \cdot b = \frac{ab}{c}$.

86. Si totidem omitti fuissent termini inter primum & secundum; inter secundum & tertium; inter tertium & quartum &c. erunt hi termini in proportione continua geometrica, & exponentes in proportione continua arithmetica.

87. Si igitur multiplicanda sit quantitas a^m per a scribendum est a^{m+n} . Nam esse debet ut unitas ad a ita a ad productum (Art. VIII.)

XLIV. *Quantitates radicales ejusdem denominationis, (hoc est, si sint ambæ radices quadraticæ, aut ambæ cubicæ, aut ambæ quadrato-quadraticæ, &c.) multiplicantur ducendo terminos in se invicem sub eodem signo radicali (q).*

Sic $\sqrt[3]{3}$ in $\sqrt[3]{5}$ facit $\sqrt[3]{15}$, & $\sqrt[3]{ab}$ in $\sqrt[3]{cd}$ facit $\sqrt[3]{abcd}$.

Et $\sqrt[3]{5ayy}$ in $\sqrt[3]{7ayz}$ facit $\sqrt[3]{35aay^3z}$.

Et $\sqrt{\frac{a^3}{c}}$ in $\sqrt{\frac{abb}{c}}$ facit $\sqrt{\frac{a^4b}{cc}}$ hoc est $\sqrt{\frac{a^2b}{c}}$.

Et $2a\sqrt{az}$ in $3b\sqrt{az}$ facit $6ab\sqrt{aaz}$ hoc est $\sqrt{6a^2abz}$.

Et $\frac{3xx}{\sqrt{ac}}$ in $\frac{-2x}{\sqrt{ac}}$ facit $\frac{-6x^3}{\sqrt{aacc}}$ hoc est $\sqrt{-\frac{6x^3}{ac}}$.

Et $-\frac{4\sqrt{ab}}{7a}$ in $-\frac{3d\sqrt{5cx}}{10cc}$ facit $\frac{12dd\sqrt{5abex}}{70acc}$.

XLV. *Quantitates pluribus partibus constantes multiplicantur ducendo singulas unius partes in singulas alterius, perinde ut in multiplicatione numerorum ostensum est (r).*

ut supra probavimus.

Hinc si decimales invicem ducendæ sunt, reducantur ad unitates homogeneas & earum numeratores ac dominatores invicem ducantur (Art. XLIII.) & post fractio exprimitur in ore decimali, sic $72, 4 = \frac{724}{10}$; $29 = \frac{200}{10}$, er-

$80 \frac{724}{10} \cdot \frac{200}{10} = \frac{209960}{100} = 2099,60 = 2099,6$; & sic de ceteris.

(q) 91. Invicem ducendæ sint $\sqrt[n]{a}$ & $\sqrt[n]{b}$ (ubi n denotat quemvis numerum, ex. gr. 2, si radices sint quadraticæ; 3, si cubicæ; 4, si quadrato quadraticæ, &c.) dico factum $= \sqrt[n]{ab}$. Ponatur $\sqrt[n]{a} = x$, & $\sqrt[n]{b} = y$; ergo elevando ad potestatem n (puta secundam, tertiam, quartam &c.) $a = x^n$, & $b = y^n$ quare $ab = x^n y^n$; & extracta radice n , (puta secunda, tertia, &c.) $\sqrt[n]{ab} = xy = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$.

Sic

Hinc sequitur quod 1. $\sqrt[n]{a} :: \sqrt[n]{b} \sqrt[n]{ab}$. (Art. VIII.)

(*) (XVIII. hujus).

(r) Hujus demonstrationem vide supra (N^o. 72.)

92. In omni facto numerus terminorum æquat factum numeri terminorum, qui sunt in multiplicando, per numerum terminorum, qui sunt in multiplicatore.

Sic si trinomium $a + b + c$ ducatur in binomium $f + g$, numerus terminorum in facto erit $= 2 \cdot 3 = 6$, quia totum trinomium ductum in primum binomii terminum dat tres terminos, & totidem habentur ducendo totum trinomium in secundum binomii terminum, &c.

93. Si aggregatum ex indicibus omnium quantitatum, quæ simul multiplicatæ efficiunt aliquam quantitatem, sit æquale aggregato ex indicibus omnium aliarum quantitatum, quæ pariter invicem ductæ efficiunt aliquam; hæc duo facta dicentur *homogenea*.

Sit

Sic $e - x$ in a facit $ae - ax$, & $aa + 2ac - bc$ in $a - b$ facit $a^3 + 2aac - aab - 3abc + bbc$.

Nam $aa + 2ac - bc$ in $-b$ facit $-aab - 2abc + bbc$, & in a facit $a^3 + 2aac - abc$, quorum summa est $a^3 + 2aac - aab - 3abc + bbc$.

Hujus multiplicationis specimen una cum aliis consimilibus exemplis subiectum habes.

$\begin{array}{r} aa + 2ac - bc \\ \hline a - b \\ \hline - aab - 2abc + bbc \\ \hline a^3 + 2aac * \\ \hline a^3 + 2aac - aab - 3abc + bbc \end{array}$	$\begin{array}{r} a + b \\ \hline a + b \\ \hline ab + bb \\ \hline aa + ab \\ \hline aa + 2ab + bb \end{array}$
--	--

$\begin{array}{r} a + b \\ \hline a - b \\ \hline - ab - bb \\ \hline aa + ab \\ \hline aa * - bb \end{array}$	$\begin{array}{r} yy + 2ay - \frac{1}{2}aa \\ \hline yy - 2ay + aa \\ \hline ayy + 2a^2y - \frac{1}{2}a^4 \\ - 2ay^3 - 4aayy + a^3y \\ \hline y^4 + 2ay^3 - \frac{1}{2}aayy \\ \hline y^4 * - 3\frac{1}{2}aayy + 3a^3y - \frac{1}{2}a^4 \end{array}$
--	--

$$\frac{2ax}{c} - \sqrt{\frac{a^3}{c}}$$

$$3a + \sqrt{\frac{abb}{c}}$$

$$\frac{2ax}{c} \sqrt{\frac{abb}{c}} - \frac{aab}{c}$$

$$\frac{6aax}{c} - 3a\sqrt{\frac{a^3}{c}}$$

$$\frac{6aax}{c} - 3a\sqrt{\frac{a^3}{c}} + \frac{2ax}{c} \sqrt{\frac{abb}{c}} - \frac{aab}{c} (s).$$

CAPUT

Sit quantitas a^3b^2c , & alia quævis b^4c^2 : Factores primæ quantitatis sunt a^3, b^2, c ; secundæ vero b^4, c^2 . Summa indicum primorum (3, 2, 1) est 6, ut & summa indicum secundorum (4, 2): hæc duæ quantitates a^3b^2c , b^4c^2 dicuntur homogeneæ.

Hinc si termini multiplicatoris alicujus complexi sint homogenei inter se, ut & termini multiplicandi cujuscvis, licet termini ex multiplicatore non sint homogenei terminis ex mul-

tiplicando, termini in producto erunt homogenei inter se.

Sit multiplicator $a^2b - c^3$, multiplicandum vero $a + f$, termini qui sunt in facto $a^3b - ac^3 + a^2bf - c^3f$ sunt homogenei (Eucl. Ax. 2).

(s) 94. Hic diligenter consideranda est multiplicatio *Binomialium*, ex qua multa utilia sequuntur.

Sint

Sint binomia multiplicanda $A+a$, $B+b$, $C+c$, $D+d$ &c. ad numerum m .

95. *Primos* Factores vocabo quantitates designatas litteris majoribus A , B , C , D , &c. & *secundos* Factores quantitates expositas litteris minoribus a , b , c , d , &c. Nam, ordinis gratia, binomium $A+a$ primo multiplicabitur per B , deinde per b ; & factum hinc ortum statim per C , postea per c , & sic semper. Duos autem Factores A & a , B & b , &c. alterum e *primis*, alterum e *secundis*, pertinentes ad idem binomium, atque ideo expressos eadem littera, majore & minore, appellabo *Factores cognominis*.

96. Termini, quibus constat productum, disponuntur secundum numerum *primorum Factorum*: ita ut primo loco ponatur ille qui plurimos continet *primos Factores*, secundo qui numerum proxime minorem *primorum Factorum*, tertio qui eorundem numerum adhuc proxime minorem &c.

97. Si plures termini simplices habent eundem numerum *Factorum primorum*, omnes hi termini simplices ponentur constituere unum terminum complexum. In posterum dicentes *unum terminum*, intelligemus vel *simplicem* vel *complexum*.

98. Si in polynomiis sese invicem multiplicantibus, numeri *Factorum primorum* qui sunt in singulis terminis, constituent progressionem arithmeticam

$$p, p-q, p-2q, p-3q, p-4q \text{ \&c.}$$

pro uno; &c

$$r, r-q, r-2q, r-3q, r-4q \text{ \&c.}$$

pro altero; eandem autem habeat differentiam utraque progressio; etiam numeri *Factorum primorum*, qui sunt in singulis terminis facti, constituent progressionem arithmeticam cujus eadem erit differentia.

Nam ubi polynomia multiplicantur, debet totum multiplicandum duci ordine in primum, secundum, tertium &c. terminum multiplicatoris (Art. XLV.) Id est numero *primorum Factorum* qui sunt in primo, secundo, tertio &c. termino multiplicandi, addi debet numerus *primorum Factorum* qui sunt in primo termino multiplicatoris; deinde illorum qui sunt in secundo &c. (Art. X.) Ex prima additione, nempe addendo numeros r ; $r-q$; $r-2q$; &c. ordine, ipsi numero p , oriuntur numeri

$$p+r, p+r-q, p+r-2q, p+r-3q, p+r-4q \text{ \&c.}$$

E secunda, nempe addendo numeros r ; $r-q$; $r-2q$; &c. numero $p-q$, oriuntur

$$p+r-q, p+r-q-q \equiv p+r-2q,$$

$$p+r-q-2q \equiv p+r-3q \text{ \&c.}$$

E tertia, nempe addendo numeros r ; $r-q$; $r-2q$; &c. numero $p-2q$, oriuntur

$$p+r-2q, p-q+r-2q \equiv p+r-3q,$$

$$p-2q+r-2q \equiv p+r-4q \text{ \&c.}$$

Cum autem omnes hi numeri consticiantur ex eadem quantitate ordine addita terminis progressionis arithmeticae, manebit progressio & differentia in singulis additionibus. Præterea prima additio auxit quantitate r quantitates

$$p, p-q, p-2q, p-3q \text{ \&c.}$$

Secunda easdem auxit quantitate $r-q$. Tertia quantitate $r-2q$ &c. Unde primi termini singularum additionum consticiunt progressionem arithmeticam, cujus maximus terminus est $p+r$; differentia q . Sed etiam ex prima additione habuimus progressionem arithmeticam, cujus maximus terminus est $p+r$ & differentia q ; Ergo primus terminus secundæ progressionis coincidit cum secundo primæ; primus tertiæ cum tertio primæ &c.

99. In binomiis $A+a$, $B+b$, $C+c$ &c. primi termini habent *Factorum primorum* unum; secundi nullum. Ergo differentia harum progressionum ortarum ex binomiorum multiplicatione est unitas. Quare unitas etiam erit differentia progressionum ortarum ex binomiorum multiplicatione.

100. Sed ubi multiplicantur binomia numero m , primus terminus producti continet *Factores primos*. Ergo erit progressio

$$m, m-1, m-2, m-3, m-4, \dots 0$$

101. Habet autem hæc progressio terminos numero $m+1$; sunt enim tot termini quot differentia; & unus insuper. Sed quoniam $0 \equiv m-m$, differentia; sunt numero m ; & numerus terminorum est $m+1$.

102. Terminus *n...mus* producti habet *Factores primos* numero $m-n+1$. Nam quisvis terminus tot habet *Factores primos*, quot sunt unitates in respondente termino progressionis $m, m-1, m-2, m-3, m-4, m-5$, &c. in hac progressionem tot sunt differentia; in singulis terminis, quot termini eum præcedunt, vel quot sunt termini progressionis a primo ad illum inclusive, unitate dempta; sunt ergo $n-1$ differentia;. Quapropter ipsius termini differentia est $1. (n-1) \equiv n-1$; & terminus ipse est $m-n+1$.

Sed termini sunt homogenei in producto (No. 93.); erit ergo numerus *secundorum Factorum* $n-1$.

103. Si in producto sumantur termini æque distantes a primo & ab ultimo; quot *Factores primos* habet terminus unus, tot *Factores secundos* habebit alter. Sit terminus alter $n...mus$ a primo; alter qui est pariter $n...mus$ ab ultimo, erit $m-n+2...mus$ a primo. Sed terminus $n...mus$ a primo habet *Factores primos* $m-n+1$; & terminus $m-n+2...mus$ a primo habet $m-n+1$ *Factores primos*; habet ergo *Factores secundos* $m-n+1$.

104. Hinc ergo facile multiplicabuntur quotvis binomia. Jungantur tum omnes *primi Factores*, tum omnes *secundi*: Sic habebitur primus & ultimus producti terminus.

Ex gr. binomia multiplicanda sint quatuor $A+a, B+b, C+c, D+d$; erit ABCD primus, & $abcd$ ultimus producti terminus.

105. In primo termino mutantur ordine singuli *Factores primos* in *secundos* cognomines; & in ultimo singuli *secundi* in *primos*; habebitur termini secundus & penultimus complexi.

Sic $aBCD + bACD + cABD + dABC$, erit secundus terminus complexus. Et $bcdA + acdB + abdC + abcD$ erit penultimus.

106. In secundo termino mutantur ordine singuli *Factores primos* in *secundos*, dummodo jam mutati non fuerint; & in penultimo singuli *secundi* in *primos*, orientur termini tertius & ante-penultimus.

Ita $abcd + acBD + adBC + bcAD + bdAC + dcAB$, erit tertius terminus, & $cAB + bDA + bcAD + adBC + acBD + aBCD$ erit ante-penultimus.

Eodem modo procedendum est ad finem usque.

107. Complexus terminus occupans sedem $n...mam$ indicabitur symbolo α ; statim præcedens symbolo β ; hunc statim præcedens symbolo γ , & sic de reliquis.

108. In genere inveniuntur omnes termini simplices constituentes ipsam α ; si in singulis terminis simplicibus componentibus terminum β mutantur ordine *primi Factores* singuli in *se-*

cundos cognomines, & omittantur termini simplices hinc orti, qui alicui jam invento sunt æquales.

Prima pars hujus regulæ patet ex his principiis. Binomia multiplicantia omnia inter se dudenda sunt. Hinc primus terminus primi multiplicabitur per primum & per secundum terminum secundi; unde orientur duo termini alter conitans ex duobus *primis Factoribus*, alter ex primo & secundo. Deinde secundus terminus primi binomii ducendus est in primum & in secundum secundi; unde emergent duo termini, alter conitans ex primo *Factore* & secundo, alter ex duobus *secundis*. Multiplicatio continuatur iisdem legibus. Quare factum habebit, dummodo ordine disponantur termini, primum terminum constantem ex *primis* & ultimum e *secundis*, medios autem ex aliquot *primis* & ex aliquot *secundis*.

Factores cognomines esse non possunt in eodem termino simplici facti, quia *primus Factor* in *secundum* eisdem binomii non ducitur. Sed quia omnia binomia inter se multiplicantur, *Factores non cognomines* juncti debent esse quot modis potest: ea tamen lege ut si terminus β habet *Factores primos* numero $m-n+2$, terminus α habeat numero $m-n+1$. Sed hæc omnia sunt ex prima parte regulæ, quæ ideo recte se habet.

Verumtamen binomia quæ jam in multiplicatione fuerant adhibita, rursus non adhibentur; & omnia binomia diversas habent litteras: ergo idem factum semel occurrit. Sic si multiplicata ponantur binomia $A+a, B+b$, orientur factum $AB + aB + bA + ab$. Hoc si multiplicetur per $C+c$, idem terminus ex gr. aBC non inveniatur repetitus in facto, quia ille oriri potest tantum vel ex a in BC ; vel ex B in aC , vel ex C in aC . Sed terminus BC fit ex $(B+b) \cdot (C+c)$; terminus aC ex $(A+a) \cdot (C+c)$. Oporteret ergo ut bis facta fuisset multiplicatio per $C+c$; quod est contra multiplicationis regulam.

109. Nunc dico quod terminus α occupans in facto sedem $n...mam$, constat ex terminis simplicibus numero

$$\frac{m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot \dots \cdot m-n+2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n-1}$$

Nam primo, ut habeatur terminus complexus α , mutandi sunt in termino aliquo simplici termini complexi β , unus post alium, singuli *Factores primos* in *secundos* cognomines: & singulæ

singulae mutationes dabunt terminos simplices ipsum α constituentis. Ideo hi tot erunt quot sunt *Factores primi* mutandi. Sunt autem in termino β , sedem $n-1 \dots$ *mam* occupante, *Factores primi* numero $m-n+2$. Ergo unus terminus simplex ipsius β producet $m-n+2$ terminos simplices pro α . Atqui eadem mutatio fieri debet in omnibus terminis simplicibus ipsius β . Quare in α toties erit terminorum simplicium numerus $m-n+2$, quot terminos simplices habet complexus β . Habeat p . Ergo α habebit terminos simplices omnino $p \cdot m-n+2$. Sed ex his rejiciendi sunt qui pluries repetuntur; id est tot, quot *Factores secundis* sunt in termino α . Nam ex *gr.* terminus $abcdE$ nascitur ex $bcdAE$, mutata A ; ex $adcBE$, mutata B ; ex $abdCE$, mutata C ; & ex $abcDE$, mutata D . Sunt autem in termino α *Factores secundi* $n-1$. Toties ergo verti debet in unitatem numerus $n-1$, quoties continetur in $p \cdot m-n+2$. Qui numerus cum contineat numerum $n-1$, per illum est dividendus. Et tandem fiet $\frac{p \cdot m-n+2}{n-1}$ numerus terminorum simplicium componentium complexum α .

Hinc reliqua facile deducuntur. Habeat terminus γ terminos simplices numero q . Singuli continent *Factores primos* numero $m-n+3$, & terminus β *Factores secundos* numero $n-2$. Quare $p = \frac{q \cdot m-n+3}{n-2}$; & $\frac{p \cdot m-n+2}{n-1} = \frac{q \cdot m-n+3}{n-2} \cdot \frac{m-n+2}{n-1}$.

Nam ex terminis simplicibus ipsius γ constituuntur termini simplices ipsius β , quemadmodum ex terminis simplicibus ipsius β constituuntur termini simplices ipsius α . Eodem ratiocinio erit

$$q = \frac{r \cdot m-n+4}{n-3}, \text{ \& } \frac{q \cdot m-n+3}{n-2} \cdot \frac{m-n+2}{n-1}$$

$$= \frac{r \cdot m-n+4}{n-3} \cdot \frac{m-n+3}{n-2} \cdot \frac{m-n+2}{n-1}$$

Pariter $r = \frac{s \cdot m-n+5}{n-4}, \text{ \& }$

$$r \cdot \frac{m-n+4}{n-3} \cdot \frac{m-n+3}{n-2} \cdot \frac{m-n+2}{n-1} =$$

$$s \cdot \frac{m-n+5}{n-4} \cdot \frac{m-n+4}{n-3} \cdot \frac{m-n+3}{n-2} \cdot \frac{m-n+2}{n-1}$$

Et sic de reliquis, ad terminum secundum usque, qui constat ex m , terminis simplicibus; quia primus est simplex & continet m *Factores primos*, qui singuli mutandi sunt in

secundus cognomines. Quare progressio consti-tuens numeratorem hujus fractionis erit $m, m-1, m-2, \dots, m-n+5, m-n+4, m-n+3, m-n+2$.

Et progressio constituens denominatorem ejusdem fractionis erit $1, 2, 5, \dots, n-4, n-3, n-2, n-1$.

110. Idem profecto erit productum ex iisdem binomiis, seu multiplicatione incipiatur a *primis*, seu a *secundis Factoribus*. In prima hypothesi terminus sequens a sinistra in dextram invenitur mutando *primos Factores* praecedentis in *secundus cognomines*. In altera hypothesi terminus praecedens invenitur mutando *secundus Factores* sequentis in *primos cognomines* (106. hujus). Haec mutationes determinant numerum terminorum simplicium constituentium singulos terminos complexos, (106. & 108. hujus); & quot sunt *Factores primi* in termino $n \dots$ *mo* a primo tot sunt *Factores secundi* in termino aequae distante ab ultimo (103. hujus).

111. Si nunc omnes *Factores primi* exprimantur eadem littera x , facta ex aliquot *Factoribus primis* mutabuntur in potestates ipsius x , & potestas x^{m-n+1} erit in termino occupante $n \dots$ *mam* sedem.

112. Qua de causa factum ex binomiis $x+a; x+b; x+c; x+d$; &c. ad numerum m usque, continebit, pro *Factoribus primis*, potestates.

$$m \quad m-1 \quad m-2 \quad m-3 \quad m-4 \quad \dots$$

$$x; x^2; x^3; x^4; x^5; \dots x^m$$

113. Quando *Factores primi* exponuntur eadem littera, facta ex *Factoribus secundis*, quorum singulis potestatibus *Factoris primi* juncta sunt, dici solent *coefficients*.

114. Ergo coefficientis secundi termini consistit ex aggregato omnium *Factorum secundorum*; coefficientis tertii termini ex aggregato omnium productorum ex binis *Factoribus secundis*; quarti ex aggregato productorum omnium ex ternis *Factoribus secundis*; $n \dots$ *mi* ex aggregato productorum omnium ex $n-1$ *Factoribus secundis*.

115. Si etiam *Factores secundi* exponuntur eadem littera a , oriatur binomii $x+a$ potestas, cujus exponens est m , numerus binomiorum eorundem se multiplicantium; id est $(x+a)^m$.

116. Quare facta ex *Factoribus secundis*, sicut potestates

potestates ipsius a , & præter x ; x^m ; x^{m-1} ; x^{m-2} ; x^{m-3} ; x^{m-4} ; x^3 ; x^2 ; x ; \dots ; x^0 ; x^1 ; x^2 ; x^3 ; x^4 ; \dots ; x^m ; & ipse terminus $n \dots mus$, quod pertinet ad *Factores* tum primos tum secundos, erit $a^{n-1} x^{m-n+1}$.

117. Sed terminus $n \dots mus$ continebant terminos simplices numero

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \dots m-n+2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots n-1}$$

(109. hujus). Hæc facta sunt eadem, quæ propter unienda sunt, & numeris exprimi debet quot fuerint unita (Art. XXVIII. hujus). Igitur præmittendæ sunt progressionis inventæ ad hunc numerum determinandum.

118. Ideo totus terminus $n \dots mus$ erit

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \dots m-n+2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots n-1} \cdot a^{n-1} x^{m-n+1}$$

119. Terminus generalibus expressionibus ita conceptus, ut, illis diversimode determinatis, præbeat omnes terminos iisdem legibus formatos, dicitur *terminus generalis*.

120. Fractio constans ex duabus progressionibus arithmetiis, & definitis numerum productorum æqualium, quæ unita fuerant in potestate binomii (117. hujus), dicitur *coefficientis numericus potestatis*.

Coefficientis numericus potestatis confundi non debet cum coefficiente producti ex pluribus binomiis primum terminum communem, & secundos diversos habentibus, qui descriptus fuit No. 113. hujus.

Terminus allatus No. 117. hujus, est terminus generalis ipsius $(x+a)^m$, & in eo coefficientis numericus est

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5 \dots m-n+2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \dots n-1}$$

121. Hic terminus hæcenus definitus fuit a numero locorum; sed potest & soler definiri ab exponente ipsius a . Hoc facile fiet si ponatur $n-1 = p$. Tunc habebitur

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5 \cdot m-6 \dots m-p+1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \dots p} \cdot a^p x^{m-p}$$

ubi series 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ... p , eadem est ac series p ; $p-1$; $p-2$; $p-3$; $p-4$... 1 in qua erunt termini $p-1+2$; $p-1+1$; $p-2$; $p-3-1$; $p-3-2$ &c., (diminutio q sit numerus integer numero p minor,) quia hujus seriei termini decreverunt per unitates.

122. Quare terminus generalis No. 117. sic scribi potest

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5 \cdot m-6 \cdot m-7 \dots m-1+1}{p \cdot p-1 \cdot p-2 \cdot p-3 \dots p-1+1 \cdot p \cdot q \cdot p \cdot q \cdot 1 \dots 1} \cdot a^p x^{m-p}$$

123. Hinc facile ad datam potestatem elevabitur datum binomium, ponendo pro m datum exponentem datæ potestatis, & pro p exponentem, quem habet *Factor secundus* in termino quæsto. Semper autem simul inventiuntur duo termini æquidistantes a primo & ab ultimo (No. 110.); atque ideo sufficit operationem producere ad dimidium terminorum numerum.

EXEMPLUM I. Elevandum sit binomium $a+b$ ad quartam potestatem. Hic est $m = 4$; quare

primus terminus $= a^4$; & ultimus $= b^4$; coefficientis secundi $= 4$; secundus ipse $= 4a^3b$, quia nempe $m-1 = 3$; coefficientis tertii $\frac{m \cdot m-1}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$, tertius $= 6a^2b^2$;

coefficientis quarti $\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2}{2 \cdot 3} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 3} = 4$; quartus $= 4ab^3$; coefficientis quinti $\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 1$;

quintus ipse b^4 , quem supra invenimus esse ultimum; unde tota potestas est $a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

EXEMPLUM II. Elevandum sit binomium $a-b$ ad quintam potestatem.

Quia petitur quinta potestas, erit $m = 5$; $m-1 = 4$; $m-2 = 3$; $m-3 = 2$; $m-4 = 1$; $m-5 = 0$ qui sunt exponentes ipsius a . Exponentes autem ipsius b sunt

1; 2; 3; 4; 5; (No. 116. hujus). Erunt ergo Termini $+a^5$; $-4ab^4$; $+6a^3b^2$; $-4a^2b^3$; $+ab^4$ & Coefficientes (No. 117. hujus)

$$\frac{m \cdot m-1}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10; \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2}{2 \cdot 3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{2 \cdot 3} = 10;$$

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 5$$

quare potestas ipsa erit

$$a^5 - 5 a^4 b + 10 a^3 b^2 - 10 a^2 b^3 + 5 a b^4 - b^5.$$

EXEMPLUM III. Evahendum fit ad sextam potestatem binomium $3bc - \frac{ff}{2}$.

Erit

$$m = 6; m-1 = 5; m-2 = 4; m-3 = 3; \\ m-4 = 2; m-5 = 1$$

idcirco Termini

$$+ 729b^6c^6; - \frac{243b^5c^6ff}{2}; + \frac{81b^4c^6ff^2}{4}; \\ - \frac{27b^3c^6ff^3}{8}; + \frac{9b^2c^6ff^4}{16}; - \frac{3bc^6ff^5}{32}; + \frac{f^{12}}{64}$$

Et Coefficientes

$$\frac{m}{2} = 3; \frac{m-1}{2} = 2; \frac{m-2}{2} = 1; \frac{m-3}{2} = 0; \\ \frac{m \cdot m-1}{2 \cdot 3} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 3} = 5; \frac{m-2}{2 \cdot 3} = \frac{4}{2 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

Quare tota potestas

$$729b^6c^6 - 729b^5c^6ff + \frac{1215b^4c^6ff^2}{4} - \frac{135b^3c^6ff^3}{2} \\ + \frac{135b^2c^6ff^4}{16} - \frac{9bc^6ff^5}{16} + \frac{f^{12}}{64}$$

EXEMPLUM IV. Quaratur binomii $\frac{ab}{c} - cff$ quarta potestas

Erit

$$m = 4; m-1 = 3; m-2 = 2; m-3 = 1$$

Unde Termini

$$+ \frac{a^4b}{c^4}; - \frac{a^3b^2ff}{c^2}; + a^2b^2/4; - abc^2f^6; \\ + a^4f^8$$

& Coefficientes

$$4; 6; 4$$

atque potestas

$$\frac{a^4b}{c^4} - \frac{4a^3b^2ff}{c^2} + 6a^2b^2/4 - 4abc^2f^6 + c^4f^8.$$

EXEMPLUM V. Poscatur tertia potestas binomii $a\sqrt{bc} - c\sqrt{ab}$.

Erit

$$m = 3; m-1 = 2; m-2 = 1$$

Hinc Termini

$$+ a^3bc\sqrt{bc}; - a^2bc^2\sqrt{ab}; + a^2bc^2\sqrt{bc}; \\ - abc^3\sqrt{ab}$$

Et Coefficientes

$$3; 3;$$

Totas Potestas

$$a^3bc\sqrt{bc} - 3a^2bc^2\sqrt{ab} + 3a^2bc^2\sqrt{bc} - abc^3\sqrt{ab}$$

123. Polynomium constans ex indefinito terminorum numero, dici solet *Infininitomium*.

124. Sit infininitomium

$x + a + b + c + d + \dots + f + g + \dots + \&c$, evahendum ad potestatem, cujus index est m ; & termini disponendi sint secundum dimensiones ipsius x . Ponatur

$$A = a + b + c + d + \dots + f + g + h + \dots + \&c; \\ \text{infininitomium propositum exponetur per } x + A.$$

Terminus generalis ipsius $(x + A)$ est (Δ^o . 121. hujus)

$$\frac{1 \cdot m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5 \cdot m-6 \cdot \dots}{p \cdot p-1 \cdot p-2 \cdot p-3 \cdot p-4 \cdot p-5 \cdot p-6 \cdot \dots} \\ \frac{m-p \cdot p}{m-p \cdot p} \\ \frac{1}{x} \cdot A.$$

Ponatur $B = b + c + d + \dots + h + i + \dots + \&c$,

erit $A = a + B$, & $A^p = (a + B)^p$, cujus terminus generalis est

$$\frac{p \cdot p-1 \cdot p-2 \cdot p-3 \cdot p-4 \cdot p-5 \cdot p-6 \cdot \dots}{q \cdot q-1 \cdot q-2 \cdot q-3 \cdot q-4 \cdot q-5 \cdot q-6 \cdot \dots} \\ \frac{p-1 \cdot q}{q-1 \cdot q} \\ \frac{p-1 \cdot p-1}{q-1 \cdot q} \cdot a \cdot B.$$

Hic substituatur pro A in termino generali I, hic fiet

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot \dots \cdot m-p+1 \cdot p \cdot p-1 \cdot \dots}{p \cdot p-1 \cdot p-2 \cdot p-3 \cdot \dots \cdot p-p+1 \cdot p \cdot q \cdot \dots} \\ \frac{m-p \cdot p \cdot q}{m-p \cdot p \cdot q} \\ \frac{p-2 \cdot p-3 \cdot \dots \cdot p-1+1}{1 \cdot q \cdot q-1 \cdot q-2 \cdot q-1 \cdot \dots \cdot 1} \cdot a \cdot B.$$

Et, quia numerici $p; p-1; p-2; p-3 \dots p-1+1$, qui sunt tum in numeratore tum in denominatore hujus coefficientis numerici, dant unitatem pro quoto, terminus generalis I; manebit

$$\text{II. } \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5 \cdot \dots \cdot p-q \cdot p-q-1 \cdot p-q-2 \cdot p-q-3 \cdot \dots \cdot 1 \cdot q \cdot m-6 \cdot m-7 \cdot \dots \cdot m-p+1}{q-1 \cdot q-2 \cdot q-3 \cdot \dots \cdot q-1+1 \cdot q-1 \cdot \dots \cdot 1} \cdot x \cdot a \cdot B.$$

Ponatur $C = c + d + \dots + h + i + \dots + \&c$,

erit $B = b + C$, & $B^q = (b + C)^q$, cujus terminus generalis est

$$q \cdot q-1.$$

$$\begin{array}{cccccccc} q & q-1 & q-2 & q-3 & q-4 & q-5 & q-6 & \\ r & r-1 & r-2 & r-3 & r-4 & r-5 & r-6 & \\ & & & & q-r & r & & \\ \hline q-7 & \dots & q-r+1 & b & C & & & \\ r-7 & \dots & & & & I & & \end{array}$$

Hic substituatur pro B in termino generali II., ille, ob numeros a & q ad $q-r+1$, qui erunt tum in numeratore, tum in denominatore sui coefficientis numerici, fiet

$$\begin{array}{cccccccc} m & m-1 & m-2 & m-3 & m-4 & m-5 & & \\ p & q & p-q & I & p-q & 2 & \dots & q-r & q-r-1 & \\ m & m-6 & m-7 & \dots & m-p+1 & & & & & \\ q & r & 2 & \dots & I & r & r-1 & r-2 & \dots & r-s+1 & r-s & \dots & I & \\ & & & & m-p & p-q & q-r & r & & & & & & \\ & & & & x & a & b & C & & & & & & \end{array}$$

Eodem pacto, ponatur
 $D = d + e + f + g + h + i + k + l + \dots$ & c;
 id est $\frac{d+e+f+g+h+i+k+l+\dots}{r}$ & c;
 $C = c + D$; & $C = (c + D)$; deinde
 $E = e + f + g + h + i + k + l + m + \dots$ & c;
 id est $D = d + E$, & $D = \frac{(d+E)}{r}$, & sic

de reliquis. Potestatum $(c+D)$; $(d+E)$ & c, quaerantur termini generales, & substituatur: inveniatur terminus generalis infinitinomii eventi ad potestatem, cujus index est m .

$$\begin{array}{cccccccc} 125. & m & m-1 & m-2 & m-3 & m-4 & & \\ p & q & p-q & I & p-q & 2 & \dots & q-r & q-r-1 & \\ m & m-5 & m-6 & \dots & m-p+1 & & & & & \\ \hline q-r-2 & \dots & I & r & r-1 & r-2 & \dots & I & s-1 & s-1 & \dots & I & \& c. \\ & & & & m-p & p-q & q-r & r & s & s-1 & & & \\ & & & & x & a & b & c & d & \& c. \end{array}$$

Ubi semper in primo termino erit unus Factor; in secundo erunt duo Factores diversi: in tertio vel duo vel tres; in quarto vel duo, vel tres, vel quatuor, in $p+1$...mo a 2 ad $p+1$. Numerator coefficientis numerici est idem, quem invenimus No. 100., ejus vero denominator constat ex tot scribis ab exponente secundi Factoris ad unitatem; ab exponente tertii Factoris ad unitatem, & c., quot sunt Factores praeter primum.

Statim utile est hoc theorema ad inveniendas potestates polynomialium, quod exemplis illustrabimus.

EXEMPLUM I. Sit trinomium $a + b + c$ eventudens ad quartam potestatem.

Quia polynomium propositum tres habet terminos, tres, ut plurimum, esse possunt Factores in termino generali. Is ergo sit

$$\begin{array}{cccccccc} m & m-1 & m-2 & \dots & m-p+1 & & & m-p & p-q & q \\ & & & & & & & a & b & c \\ \hline 1. 2. 3 \dots p-7. 1. 2. 3 \dots q \\ \text{Statim } m = 4, \text{ \& primus terminus est } a^4. \end{array}$$

In secundo est $p = 1$; $m-p+1 = m-1+1 = m = 4$, & numerator coefficientis est 4. Sed aut $q = 0$, aut $q = 1$.

Sit $q = 0$; erit $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^3 b^1 c^0}{a^4 b^4 c^0} = a^{-1} b^{-3} c^0$ & quia $p=1$ & $q=0$, denominator coefficientis fit 1; & secundi termini prima pars cum coefficiente est $4a^3 b$.

Sit $q = 1$; erit $p-q = 1-1 = 0$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^{m-p} b^0 c^1}{a^m b^p c^1} = \frac{a^3 c}{a^4 b^3 c} = \frac{a^0}{a^1 b^3} = \frac{1}{ab^3}$ & quia $p=1$ & $q=1$, denominator coefficientis fit 1; secunda pars secundi termini est $4a^3 c$, & totus terminus $4a^3 (b + c)$.

In tertio termino est $p = 2$; & $m-p = 4-2 = 2$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^2 b^0 c^0}{a^4 b^2 c^0} = \frac{1}{a^2 b^2}$ Item $m-p+1 = 3$; & $m-1 = 3$; & $m-p+1 = 4-3 = 1$. Sed aut $q = 0$; aut $q = 1$, aut $q = 2$.

Sit $q = 0$, erit $p-q = 2-0 = 2$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^2 b^2 c^0}{a^4 b^2 c^0} = \frac{1}{a^2}$ & I. 2. $p-q = 1-2 = -1$. Quare prima pars tertii termini est $\frac{1}{1 \cdot 2} a^2 b = \frac{1}{2} a^2 b$.

Sit $q = 1$; erit $p-q = 2-1 = 1$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^1 b^1 c^1}{a^4 b^2 c^1} = \frac{1}{a^3 b}$, atque I. 2. $p-q = 1-2 = -1$. Ideo secunda pars tertii termini est $\frac{1}{4 \cdot 3} a^2 b c = \frac{1}{12} a^2 b c$.

Sit $q = 2$; erit $p-q = 2-2 = 0$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^2 b^0 c^2}{a^4 b^2 c^2} = \frac{1}{a^2}$, atque I. 2. $p-q = 1-2 = -1$. Ideo secunda pars tertii termini est $\frac{1}{4 \cdot 3} a^2 c^2 = \frac{1}{12} a^2 c^2$, & totus tertius terminus $6 a^2 (b^2 + 2bc + c^2)$.

In quarto termino est $p = 3$; $m-p = 4-3 = 1$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^1 b^0 c^0}{a^4 b^3 c^0} = \frac{1}{a^3 b^3}$ Item $m-p+1 = 2$; & $m-1 = 3$; & $m-p+1 = 4-3 = 1$. Sed aut $q = 0$; aut $q = 1$, aut $q = 2$, aut $q = 3$. Sit $q = 0$, erit $p-q = 3-0 = 3$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^1 b^3 c^0}{a^4 b^3 c^0} = \frac{1}{a^3}$ Item I. 2. $p-q = 1-3 = -2$.

Sit $q = 1$; erit $p-q = 3-1 = 2$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^1 b^2 c^1}{a^4 b^3 c^1} = \frac{1}{a^3 b}$ Item I. 2. $p-q = 1-2 = -1$. Sit $q = 2$; erit $p-q = 3-2 = 1$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^1 b^1 c^2}{a^4 b^3 c^2} = \frac{1}{a^3 b}$ Item I. 2. $p-q = 1-1 = 0$. Sit $q = 3$; erit $p-q = 3-3 = 0$; & $\frac{a^{m-p} b^{p-q} c^q}{a^m b^p c^q} = \frac{a^1 b^0 c^3}{a^4 b^3 c^3} = \frac{1}{a^3}$ Item I. 2. $p-q = 1-3 = -2$.

& prima pars quarti termini $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} ab^3 = 4ab^3$

Sit $q = 1$, erit $p - q = 3 - 1 = 2$, &
 $ab^{\frac{p-q}{c}} = ab^2c$. Item 1. 2... $p - q = 1. 2.$,
 & secunda pars quarti termini $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2} ab^2c =$
 $12 ab^2c$.

Sit $q = 2$, erit $p - q = 3 - 2 = 1$; &
 $ab^{\frac{p-q}{c}} = abc^2$. Item 1. 2... $p - q = 1. 2.$
 $q = 1. 2$; & tertia pars quarti termini $12 abc^2$.

Sit $q = 3$; erit $p - q = 3 - 3 = 0$,
 & $ab^{\frac{p-q}{c}} = ac^3$. Item 1. 2... $p - q = 1. 2.$
 $2... q = 1. 2. 3$. & quarta pars quarti termini $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3}$
 ac^3 , & totus quartus terminus
 $4a(b^3 + 3b^2c + 3bc^2 + c^3)$.

In quinto termino est $p = 4$; $m - p =$
 $\frac{m-p}{a} = 0$, & $a^{\frac{m-p}{a}} = a^0 = 1$. Sed
 $m - p + 1 = 1$, & $m - p = 1. m - 2...$
 $m - p + 1 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Jam aut $q = 0$,
 aut $q = 1$; aut $q = 2$; aut $q = 3$; aut $q = 4$.

Sit $q = 0$; erit $p - q = 4$; & $b^{\frac{p-q}{c}}$
 $= b^4$. 1. 2. 3... $p - q = 1. 2. 3. 4$, &
 prima pars quinti termini est b^4 .

Reliquae partes erunt, ut patet, reliqui ter-
 mini ipsius $(b + c)^4$.

EXEMPLUM. II. *Infinitionis* $a + b + c$ &c.
 ad quartam potestatem elevandi queruntur ter-
 minorum a^4 : a^3b ; & abc^3 ; coefficientes.

Jam m , exponens potestatis, est 4. Quapropter
 pro termino a^4 debet esse $m - p = 3$;
 (exponenti primi factoris a ;) & est $m = 4$,
 ergo $4 - p = 3$; & $p = 1$. Iterum $p - q =$
 1 & $q = 1$, exponenti alterius factoris b ;) &
 est $p = 1$; quare
 $1 - q = 1$ & $q = 0 = r = s$ &c.
 Erit ergo $m - p + 1 = 4 - 1 + 1 = 4 = m$

Quocirca terminus generalis vertitur in $4a^3q$.
 Pro termino a^2b^2 debet esse
 $4 - p = 2$ (exponenti primi factoris a ;)
 ergo $p = 2$.

Item $p - q = 1$, (exponenti secundi facto-
 ris b ;) aut $2 - q = 1$; & $q = 1$.

Pariter $q - r = 1$, (exponenti tertii facto-
 ris f ;) vel $1 - r = 1$, & $r = 0 = s$; &c.
 Quocirca

$$m - p + 1 = 4 - 2 + 1 = 3;$$

$$p - q = 2 - 1 = 1; q - r = 1.$$

Et terminus generalis fit
 $4 \cdot 3 \cdot a^2b^2 = 12 a^2b^2$.

Denique pro termino abc^2 debet esse
 $4 - p = 1$, (exponenti primi factoris
 a ;) igitur $p = 3$

Pariter $3 - q = 1$, (exponenti secundi fa-
 ctoris b ;) unde $q = 2$.

Haud aliter $2 - r = 1$, (exponenti tertii
 factoris c ;) quare $r = 1$.

Denique $1 - s = 1$, (exponenti quarti fa-
 ctoris f ;) & ideo $s = 0 = t$ &c.
 Est igitur

$$m - p + 1 = 4 - 3 + 1 = 2;$$

$$p - q = 3 - 2 = 1; q - r = 1;$$

& terminus generalis $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot abc^2 = 24 abc^2$.

EXEMPLUM III. *In eodem infinitinomio ad sex-
 tam potestatem elato ptinentur terminorum.*

$$a^4cf; a^3f^2g; a^2b^2c^2; a^2b^2cd;$$

$$\& a^2bcde; \text{coefficientes.}$$

Quoniam $m = 6$, pro termino a^4cf debet esse

$$6 - p = 4; \& p = 2; \text{ item } p - q = 1$$

$$= 2 - q = 1; \& q = 1$$

$$\text{pariter } q - r = 1 = 1 - r, \& r = 0.$$

$$\text{Quam ob rem erit } m - p + 1 = 6 - 2$$

$$+ 1 = 5;$$

& terminus generalis fiet $6 \cdot 5 \cdot a^4cf = 30a^4cf$.

Sed pro termino a^3f^2g debet esse

$$6 - p = 3; \& p = 3; \text{ eodem pacto } p - r$$

$$= 2 = 3 - r; \& r = 1; r - s = 1$$

$$= 1 - s; \& s = 0 \&c.$$

Erit igitur $m - p + 1 = 6 - 3 + 1 = 4$;
 & terminus generalis convertetur in $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2}$

$$a^3f^2g = 60 a^3f^2g$$

Haud secus pro termino $a^2b^2c^2$ debet esse

$$6 - p = 2; \& p = 4; \text{ item } p - q = 2 = 4$$

$$- q = 2; \& q = 2; \text{ pariter } q - r$$

$$= 2 = 2 - r; \& r = 0.$$

Et ideo habebitur $m - p + 1 = 6 - 4 +$
 $1 = 3$; & terminus generalis determinabitur

$$\frac{6 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 2} a^2b^2c^2 = 90 a^2b^2c^2.$$

Pariter pro termino a^2b^2cd debet esse

$$6 - p = 2; \& p = 4; \text{ arque}$$

$$p - q = 2 \& q = 2;$$

Sed
 $q = r = 1 = 2 = r$; & $r = 1$; atque
 $r = s = 1$; & $s = 0$.
 Quapropter iterum erit $m = p + 1 = 3$;
 & terminus generalis dabit $\frac{0. 5. 4. 3}{1. 2.}$
 $a^2 b^2 c^2 d = 180a^2 b^2 c^2 d$.

Demum pro termino $a^2 b^2 c^2 d e$ debet esse
 $p = 4$; $4 = q = 1$; & $q = 3$; $q = r = 1$
 $= 3 = r = 1 = 2$; $r = s = 1$; & $s = 1$;
 $s = t = 1$; & $t = 0$.
 Terminus generalis ergo præbabit $6. 5. 4. 3$
 $a^2 b^2 c^2 d e = 360 a^2 b^2 c^2 d e$.

126. Si in singulis infinitinomii terminis est
 alicujus symboli q potestas, cujus exponentes cre-
 scant ut numeri naturales 0; 1; 2; 3; 4; &c. &
 potestates istæ pro coefficientibus ordinantur, dico
 quod in infinitinomii potestate t terminus quilibet
 ex uno pluribusque radicis terminis constat ter-
 modis quot s exponentis, quem q habet in potestate,
 formari potest additione numerorum 0; 1; 2; 3;
 &c. . . s ; quorum aliquos possunt s . . . ies repeti.

Sit infinitinomium ad potestatem r evehen-
 dum
 $a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + o + p + q + r + s + t + u + v + w + x + y + z + \&c.$

Quoniam hoc infinitinomium in se aliquo-
 ties ducendum est, ut habeatur potestas r ,
 quisque ejus terminus & per se & per singu-
 los alios multiplicabitur, id est terminorum
 exponentes invicem addentur. Sed
 $s = 0 + s = s - 1 + 1 = s - 2 + 2 = s -$
 $2 + 1 + 1 = s - 3 + 3 = s - 3 + 2 + 1$
 $= s - 3 + 1 + 1 + 1 = \&c.$ & omnes
 numeri 0; 1; 2; 3; 4; &c. . . s sunt in infi-
 nitinomio ad potestatem r extollendo. Ergo
 exponentis s conficietur additione numerorum
 &c.

127. Quando numeri componentes exponen-
 tent s sunt diversi, puta 2; 3; 4; &c.,
 quantitate q^2 ; q^3 ; q^4 ; &c.; habendæ sunt
 pro diversis factoribus in investigatione coeffi-
 cientis; tales enim sunt, nisi forte symbolum
 q semper idem sit. Sed quando idem nume-
 rus reperitur, puta 2; 2; 2; &c., tunc q^2
 evehitur ad potestatem, cujus exponentis est
 numerus exponentium æqualium, & pro uno
 factore ad illam potestatem elato consideranda
 est quantitas illa. Semper autem adesse intelli-
 gitur primus terminus a evehitur ad potesta-
 tem $r = n$, posito n exponente litteræ, per
 quam multiplicatur potestas ipsius q .

128. Facile igitur inveniatur terminus s hu-
 jusmodi infinitinomii ad potestatem r provehit.
 Nam in illo termino quantitas q habebit expo-
 nentem $s = 1$, ut facile deducitur ex N.º 120.
 hujus. Quare, per N.º 127. quot modis hic
 exponens additione numerorum 0; 1; 2; 3; &c.;
 concipi possit, ac tandem pro singulis modis
 detege coefficientem, ut monstratum est, (N.º
 124. hujus;) probe observans quæ monita
 sunt N.º 127. hujus.

EXEMPLUM I. Queritur infinitinomii evehiti ad
 potestatem r terminus secundus.

Erit exponentis ipsius q in hoc termino $2 =$
 $1 = 1$; quare unico modo formari potest;
 (nempe ex $0 + 1$;) eritque terminus $a^{r-1} b^q$,
 & cum duo tantum sint factores, coefficientis
 erit vulgaris r .

EXEMPLUM II. Si quereretur terminus tertius,
 esset $s = 1 = 3 = 1 = 2$; est autem $2 = 0$
 $+ 2 = 1 + 1$; igitur hic terminus fiet ex primo
 radicis ducto intertium, aut ex secundo
 elevato ad secundam potestatem. In prima
 hypothese terminus erit $a^{r-1} c^q$; & expo-
 nens r . In secunda autem terminus erit
 $a^{r-2} b^2 c^q$; & coefficientis determinabitur ex
 vulgari potestatum generi, quia duo tantum sunt
 factores, eritque $\frac{r. r-1}{1. 2}$.

EXEMPLUM III. Petatur nunc quartus ter-
 minus, atque erit $s = 1 = 4 = 1 = 3$.
 Atqui est $3 = 0 + 3 = 1 + 2 = 1 + 1 + 1$;
 ergo terminus quartus fiet.

Primo ex primo termino radicis ducto in
 quartum, & erit $a^{r-1} d^q$, & ejus coeffi-
 cientis erit r .

Secundo, ex secundo termino radicis du-
 cto in tertium, eritque $a^{r-2} b c^q$;
 $a^{r-2} \times b^q \times c^q$.

Nunc, ut determinetur hujus coefficientis;
 erit

$$r = s = r - 2; \& s = 2; s = m = 2 = 1 = 1; \& m = n = 1; \& n = 0$$

Quare $r \text{---} 1 + 1 \equiv r \text{---} 2 + 1 \equiv r \text{---} 1$;
& coefficientis $\equiv r \cdot r \text{---} 1$.

Tertio terminus quæstus conflabitur ex secundo evescto ad tertiam potestatem, eritque $a^{r \text{---} 3} b^3 q^3$, cujus coefficientis est vulgaris.

EXEMPLUM IV. Demum, si postularetur terminus septimus, esset $s \text{---} 1 \equiv 6$. Sed $6 \equiv 0 + 6 \equiv 1 + 5 \equiv 2 + 4 \equiv 3 + 3 \equiv 1 + 1 + 4 \equiv 1 + 2 + 3 \equiv 2 + 2 + 2 \equiv 1 + 1 + 1 + 3 \equiv 1 + 1 + 1 + 2 + 2 \equiv 1 + 1 + 1 + 1 + 2 \equiv 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$. Igitur terminus septimus conflatur.

Primo, ex septimo radices termino, eritque $a^{r \text{---} 1} g q^6$, & r ejus coefficientis.

Secundo, ex radices termino secundo ducto in sextum, & erit $a^{r \text{---} 2} b^2 q^5 f q^5$; atque illius coefficientis $r \cdot r \text{---} 1$.

Tertio, ex tertio termino radices ducto in quintum, & erit $a^{r \text{---} 2} c q^4 e q^4$, cujus coefficientis reperietur $r \cdot r \text{---} 1$ ut supra.

Quarto, ex termino radices quarto, ad secundam potestatem elato; atque erit $a^{r \text{---} 2} d^2 q^6$, qui pro coefficiente habebit $\frac{r \cdot r \text{---} 1}{2}$.

Quinto, ex secundo radices termino ad secundam potestatem evescto & in quintum ducto, ac reperietur $a^{r \text{---} 3} b^2 q^2 c q^4$; cui tribuendus est coefficientis $\frac{r \cdot r \text{---} 1 \cdot r \text{---} 2}{2}$.

Sexto, ex facto terminorum secundi, tertii, & quarti, eritque $a^{r \text{---} 3} b q c q^2 d q^3$ qui sibi vindicat coefficientem $r \cdot r \text{---} 1 \cdot r \text{---} 2$.

Septimo, ex tertia potestate tertii termini, quæ dat $a^{r \text{---} 3} e^3 q^6$, cui debetur coefficientis $\frac{r \cdot r \text{---} 1 \cdot r \text{---} 2}{1 \cdot 2 \cdot 3}$.

Octavo, ex tertia potestate secundi ducta in quartum, unde oritur $a^{r \text{---} 4} b^3 q^3 d q^3$, atque hujus coefficientis $\frac{r \cdot r \text{---} 1 \cdot r \text{---} 2 \cdot r \text{---} 3}{1 \cdot 2 \cdot 3}$.

Nono, ex secunda secundi termini potestate ducta in secundam tertii, unde exurgit $a^{r \text{---} 4} b^2 q^2 c^2 q^4$, qui postulat coefficientem $\frac{r \cdot r \text{---} 1 \cdot r \text{---} 2 \cdot r \text{---} 3}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2}$.

Decimo, ex quarta potestate secundi termini ducta in tertium, eritque $a^{r \text{---} 5} b^4 q^4 c q^6$, cui convenit coefficientis $\frac{r \cdot r \text{---} 1 \cdot r \text{---} 2 \cdot r \text{---} 3 \cdot r \text{---} 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$.

Undecimo tandem ex sexta secundi termini potestate, quæ dat terminum $a^{r \text{---} 6} b^6 q^6$ & coefficientem $\frac{r \cdot r \text{---} 1 \cdot r \text{---} 2 \cdot r \text{---} 3 \cdot r \text{---} 4 \cdot r \text{---} 5 \cdot r \text{---} 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}$.

129. Cum quantitas quævis sibimet ipsa semper sit æqualis, quis terminus s in potestate infinitinonii incipit a termino s radices ducto in primum; reliquæ autem partes termini s in potestate conflabuntur ex terminis radices ipsum radices s terminum antecedentibus.

130. Quapropter determinandi sunt in potestate coefficientes terminorum ordine, primo primi, deinde secundi, postea tertii &c.

131. Hunc ordinem servans facile coefficientes omnes definit, nihil enim faciendum est quam determinare, quibus quantitatibus notis æqualis sit quantitas unica unius dimensionis, quod semper fieri potest per quatuor primas arithmetice regulas.

132. Si exponentes infinitinonii in No. 126. hujus, essent $0, m; 2m; 3m$ &c. agendum esset, ut si forent $0, 1, 2, 3$, &c. Quoniam enim s *m* debet confici ex $0; m; 2m; 3m$ &c; patet quod haud fecus conflabitur ac s ex $0; 1; 2; 3$ &c.

Si vero exponentes essent $m; m+n; m+2n; m+3n$ &c., totum infinitinonium dividi posset per q^m . Tunc restarent exponentes $0; n; 2n; 3n$; &c.

Tracta infinitinonium, cujus exponentes sunt $0; n; 2n; 3n$; &c.; & quidquid invenieris multiplica per q^m .

(a) CAPUT SEXTUM.

D E D I V I S I O N E .

XLVI. **D**iviso in numeris instituitur querendo quot vicibus divisor in dividendo continetur, totiesque auferendo, & scribendo totidem unitates in quoto. Idque iterato, si opus est, quamdiu divisor auferri potest. (b).

Sic ad dividendum 63 per 7, quære quoties 7 continetur in 63 & emergent 9 pro quoto præcise. Adcoque $9 \cdot 7$ valet 63. Insuper ad dividendum 371 per 7, præfige divisorem 7,

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 371} \quad (53 \\ \underline{35} \\ 21 \\ \underline{21} \\ 0 \end{array}$$

& imprimis opus instituens in initialibus figuris dividendi proxime majoribus divisore, nempe in 37, dic quoties 7 continetur in 37? Resp. 5. Tum scripto 5 in quoto, aufer $5 \cdot 7$ seu 35 de 37, & restabit 2, cui adnecte ultimam figuram dividendi nempe 1, & fit 21 reliqua pars dividendi, in qua proximum opus instituendum est. Dic itaque, ut ante, quoties 7 continetur in 21? Resp. 3. Quare scripto 3 in quoto, aufer $3 \cdot 7$ seu 21 de 21 & restabit 0. Unde constat 53 esse numerum præcise, qui oritur ex divisione 371 per 7. (c).

(d) XLVII.

(a) 133. Quansitas ex plurium multiplicatione ita conflata, potest resolvi in eas omnes, quibus constat: Sic ex. gr. Cum $aa + 2ab + bb = (a+b) \cdot (a+b)$, poterit rursus resolvi in $a+b$, $a+b$ ex quibus composita est:

Hanc resolutionem facere, dicitur *quantitas dividere*.

134. Quantitas dividenda per 1, & quotum hujus divisionis æquantur, nam tunc quantitas dividenda est ad unitatem, ut quotum ad unitatem (Eucl. 9. V.)

(b) 135. Si factum quodvis ab secetur in quotlibet partes, bf , bc , cg eundem factorem b habentes, aggregatum ex omnibus quantitatibus, quæ ductæ erant in b , erit alter factor, $c+f+g = a$.

Nam $ab = bc + bf + bg$ (ex hyp.): si nunc tam ab , quam $bc + bf + bg$ dividantur per b eveniet a , c , f , g , & his junctis signo $+(c+f+g)$ sed $ab = a \cdot b$, & $bc + bf + bg = b(c+f+g)$ ergo $a \cdot b = b(c+f+g)$, quare $a = c+f+g$ (Eucl. Ax. 6.)

(c) 136. In numeris idem fieri liquet, regula Auctoris, nam cum invenio 7 quinquies contineri in 37, divido 37 per 7, cum autem ex 37 subtraham $35 = 5 \cdot 7$, factum totum 371 feco in partes, quarum una factorem habet 7; Jam ex 37 ablato 35 restat 2, id est, duæ decades, quia 37 non exprimit triginta septem unitates, sed 37 decades, quare ipsi 2 subjicienda est unitas, quod dat 21 unitates, aut duas decades cum unitate. Quæro nunc, quoties 7 continetur in 21, & reperio 3: &

E 2

(d) XLVII. Atque ita ad dividendum 4798 per 23, opus primo instituens in initialibus figuris 47 dic quoties 23 continetur in 47? Resp. 2. Scribe ergo 2 in quoto, & de 47 subdue 2 . 23 seu 46, restatque 1, cui subjunge proximum numerum dividendi, nempe 9, & fit 19 in subsequens opus. Dic itaque quoties 23 continetur in 19? Resp. 0. Quare scribe 0 in quoto; & de 19 subduc 0 . 23 seu 0; & restat 19, cui subjunge ultimum numerum 8, & fit 198 in proximum opus. Quamobrem dic ultimo quoties 23 continetur in 198, (id quod ex initialibus numeris 2 & 19 conjici potest animadvertendo quoties 2 continetur in 19.) Resp. 8. Quare scribe 8 in quoto & de 198 subduc 8 . 23 seu 184, restabitque 14 adhuc diuidendus per 23. Adeoque quotus erit 208 $\frac{1}{3}$. Quod si hujusmodi fractio minus placeat, possis divisionem in fractionibus decimzlibus ultra ad libitum profequi, semper adnectendo circulum numero residuo. Sic residuo 14 a hincto 0, fitque 140. Tum dic quoties 23 fit in 140? Resp. 6. scribe ergo 6 in quoto; & de 140 subduc 6 . 23 seu 138, & restabit 2, cui

& hoc faciens alteram partem (quæ est 21) facti 371 divido per 7 (ut supra); ex 21 aufero 3 . 7, id est, feco factum in partem alteram habentem pro factore 7, quod erat faciendum, sic enim invenio $371 = 350 + 21 = 7 \cdot (50 + 3) = 7 \times 53$, & $\frac{371}{7} =$

$$\frac{7 \cdot 53}{7} = 53.$$

(d) 137. Cum divisor constat pluribus numeris, ut si dividendum esset 59598, per 387, primo *ponderandum*, an totus divisor major, an minor sit tot ex initialibus dividendi figuris, quot sunt in divisore; ita in subiecto exemplo, ex dividendo segreco tres primas figuras 595, quia tres omnino sunt figuræ in divisore 387, & perspicio 595 superare 387. Quæro facilitatis gratia quoties prima figura divisoris (3) contineatur in prima dividendi (5); reperio 1, quem numerum scribo in quoto, duco divisorem in 1, & factum 387 subtraho ex 595, restat 208, qui numerus non continet divisorem 387, cum ergo augeo adnectendo 9

$$\begin{array}{r} 387) 59598 \quad (154 \\ \underline{387} \\ 2089 \\ \underline{1935} \\ 1548 \end{array}$$

nunc quæro quoties 3 ut in 20, invenio 6, sed $6 \cdot 387 = 2322$ superat 2089, ergo 6 est quotura æquo majus; quare quæro numerum,

qui ductus in 387 det aut 2089, aut eo minorem: pono igitur 5; ex 2089 subtraho 1935 $= 387 \cdot 5$, remanet 154, cui subnecto 8, & quæro quoties 3 fit in 15, invenio 5, ex 1548 aufero $387 \cdot 5 = 1935$, quod fieri nequit; igitur in quoto pono 4, ex 1548 subtrah, $387 \cdot 4 = 1548$, superest 0: ergo $59598 = 38700 + 19350 + 1548 = 387 \cdot (100 + 50 + 4) = 387 \cdot 154$, & $\frac{59598}{387} = \frac{387 \cdot 154}{387} = 154$.

138. Nota quod semper quotum diminuendum est, cum divisor ductus in quotum, numerum e dividendo sumptum, superat.

139. Si divisor major esset figuris dividendi sumptis juxta N^o. 137, iis sequens figura addenda esset.

Sic si 151998 dividi debeat per 987, quia divisor superat tres priores dividendi figuras (151), iis addo 9, & divido 1519 per 987 modo supra indicaro, unde venit 154:

$$\begin{array}{r} 987) 151998 \quad (154 \\ \underline{987} \\ 5329 \\ \underline{4935} \\ 3948 \\ \underline{3948} \\ 0000 \end{array}$$

cui adnecte 0 ut ante. Et sic opere ad arbitrium continuato, emerget tandem quotus 208, 6086, &c.

$$23) 4798 \text{ (} 208,6086, \&c.$$

46

19

00

198

184

140

138

20

00

200

184

160

XLVIII. Ad eundem modum fractio decimalis 3, 5218 per fractionem decimalem 46, 1 dividitur, & prodit 0, 07639. &c.

$$46, 1) 3, 5218 \text{ (} 0,07639$$

3, 227

2948

2766

1820

1383

4370

Ubi nota quod in quotu tot figurae pro decimalibus abscindendae sunt, quot sunt in ultimo dividuo plures quam in divisore.

Ut in hoc exemplo quinque, quia sex sunt in ultimo dividuo 0,004370 & una in divisore 46, 1. (d).

Exem.

(d) 140. Vel. Reduc datos numeros ad unitates homogeneas; si divisor aliquoties continetur in dividendo, quotum hoc incipiet a numeris integris; sin vero, dividendo adde 0, quo facto si divisio fieri potest, quotum ita inventum incipiet a decimalibus primis; si divisio fieri nequit, adde etiam 0, & quotum incipiet a decimalibus secundis etc. In primo exemplo art. XLVIII, dividendum 3, 5218 continet ad dextram decimales quartas, ad has reduc divisorem 46, 1, addens ter

0, unde fiet 461000; tunc hi numeri tibi sunt ut vulgares, habent enim unitates homogeneas; sed quia 35218 dividi nequit per 461000 illo majorem, dividendo adde 0, & quoti prima figura erit decimalis prima, quia dividendum redactum est ad decimales: cum vero neque nunc 352180 dividi possit per 461000, rursus ei addece 0, & quoti prima figura erit decimalis secunda, perage ergo divisionem, & invenies 0,07639 &c.

E 3

00000

Exempla plura lucis gratia subjungimus

$$\begin{array}{r}
 9043) 20844115 \text{ (2305)} \\
 \underline{18086} \\
 27581 \\
 \underline{27129} \\
 45215 \\
 \underline{45215} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (f) \\
 50,18) 137,995 \text{ (275)} \\
 \underline{10036} \\
 37635 \\
 \underline{35126} \\
 25090 \\
 \underline{25090} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 72,4) 2099,6 \text{ (29 (e))} \\
 \underline{1448} \\
 6516 \\
 \underline{6516} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (g) \\
 0,0132) 0,051513 \text{ (3,9025)} \\
 \underline{396} \\
 1191 \\
 \underline{1188} \\
 330 \\
 \underline{264} \\
 660 \\
 \underline{660} \\
 0
 \end{array}$$

(e) 141. Quia divisor & dividendum hujus exempli tantum habent decimales primas, divide, per regulam jam traditam, 20996 per 724, & quia hæc divisio fieri potest, habebis integros numeros.

$$\begin{array}{r}
 724] 20996 \text{ [29} \\
 \underline{1448} \\
 6516 \\
 \underline{6516} \\
 0000
 \end{array}$$

(f) 142. Divisor redactus ad decimales tertias erit 50180, per quem divide 137995, quod incipit per integros, quia divisio fieri potest: sed post hanc divisionem restat 37635, quod dividi nequit per 50180, ergo adde 0, & quotum incipit a decimalibus, & sic perge.

$$\begin{array}{r}
 50180) 137995 \text{ (2,75)} \\
 \underline{100360} \\
 376350 \\
 \underline{351260} \\
 250900 \\
 \underline{250900} \\
 000000
 \end{array}$$

(g) 143. Redige divisorem ad decimales sextas, habebis 0,013200, dele duas primas cyphras, ut inutiles, & divide 51513 per 13200, quorum incipit ab integris.

Cum vero subtractio det 11913, quod dividi nequit per 13200, ei adde 0, & perge; sed quia residuum 330 auctum 0 dividi nequit, pone in quoto 0, adde rursus 0, & perge ad finem usque.

$$\begin{array}{r}
 13200) 51513 \text{ (3,9025)} \\
 \underline{39600} \\
 119130 \\
 \underline{118800} \\
 33000 \\
 \underline{26400} \\
 66000 \\
 \underline{66000} \\
 00000
 \end{array}$$

XLIX.

XLIX. In terminis algebraicis divisio fit resolvendo quicquid per multiplicationem conflatur.

Sic ab divisa per a dat b pro quoto,

$6ab$ divisa per $2a$ dat $3b$; & divisa per $—2a$ dat $—3b$.

$—6ab$ divisa per $2a$ dat $—3b$; & divisa per $—2a$ dat $3b$.

$16abc^3$ divisa per $2ac$ dat $8bcc$.

$—84a^3x^4$ divisa per $—12aaxx$ dat $7axx$.

Item $\frac{1}{3}$ divisa per $\frac{1}{7}$ dat $\frac{7}{3}$

$\frac{ac}{bd}$ divisa per $\frac{a}{b}$ dat $\frac{c}{d}$.

$—\frac{21accy^3}{8b^5}$ divisa per $\frac{3acy}{2bb}$ dat $—\frac{7cyy}{4b^3}$ (b).

$\frac{1}{7}$ divisa per 3 dat $\frac{1}{21}$; & vicissim $\frac{1}{3}$ per $\frac{1}{7}$ dat $\frac{7}{3}$ seu 3 .

$\frac{30a^3z}{cc}$ divisa per $2a$ dat $\frac{15aaz}{cc}$; & vicissim divisa per $\frac{15aaz}{cc}$ dat $2a$.

(i) Item $\sqrt{15}$ divisa per $\sqrt{3}$ dat $\sqrt{5}$.

Vabcd

(b) 144. Nam $\frac{6}{35} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 7}$; $\frac{ac}{bd} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$;
 $—\frac{21ac^2y^1}{8b^5} = \frac{3acy \cdot 7cy^1}{2b^2 \cdot 4b^3}$ Et sic de fin-
 gulis.

Habebis tamen infra (art. LI. & No. 147.)
 regulam generalem.

Potestas a^m divisa per a^n , dat a^{m-n} .

Concipitur enim a^m conflata ex duabus potestibus ipsius a , in se ductis. Harum una exponentem habet n , quia a^n dividenda est par a^n .

Aliera exponentem habeat x . Erit $a^x = a^n \cdot a^{x-n}$.
 a^x ; & hujus facti exponentem erit (No. 87.)

$n+x = m$, per hyp. Ergo $x = m-n$. Sic
 $\frac{a^7}{a^1} = a^{7-1} = a^6$.

Quare si n fit major quam m ; exponentem
 quoti erit negativus. Sic $\frac{a^1}{a^7} = a^{1-7} =$

a^{-6} . Sed, quia $a^7 = a^1 \cdot a^6$; & $\frac{a^1}{a^1} = 1$; est

$\frac{a^1}{a^7} = \frac{1}{a^6}$. Idem ergo est seu ponas quorum

potestatis majoris divisa per minorem, in denominatore fractionis, cujus numerator 1 cum exponente positivo, seu in numeratore fractionis, cujus denominator 1, cum exponente negativo.

(i) 145. In genere $\sqrt[n]{ab}$ divisa per $\sqrt[n]{bx}$ quat $\sqrt[n]{a}$: Quotum enim exponatur per x ; erit (art.

$Vabcd$ divisa per Vcd dat Vab .

$Vabc$ per Vac dat Vaa seu a .

$V^3 35aay^2$ divisa per $V 5ayy$ dat $V^3 7ayz$.

$V^{\frac{a^2 bb}{cc}}$ divisa per $V^{\frac{a^1}{c}}$ dat $V^{\frac{abb}{c}}$.

$\frac{12ddxV5abcx}{70aee}$ divisa per $\frac{3ddV5cx}{10ee}$ dat $\frac{4xVab}{7a}$ (k).

Atque ita $\sqrt{a+b}Vax$ divisa per $a+b$ dat Vax , & vicissim divisa per Vax dat $\sqrt{a+b}$.

Et $\frac{a}{a+b}Vax$ divisa per $\frac{1}{a+b}$ dat $aVax$; vel divisa per a dat $\frac{1}{a+b}Vax$ five $\frac{Vax}{a+b}$; & vicissim divisa per $\frac{Vax}{a+b}$ dat a .

Ceterum in hujusmodi resolutionibus omnino cavendum est, ut quantitates sint ejusdem ordinis, quæ ad invicem applicantur. Nempe ut numeri applicentur ad numeros, species ad species, radicales ad radicales, numeratores fractionum ad numeratores, ac denominatores ad denominatores, nec non in numeratoribus, denominatoribus, & radicalibus quantitates cujusque generis ad quantitates homogeneas.

L. Quod si quantitas dividenda nequeat sic per divisorem resolvi, sufficit, ubi ambæ quantitates sunt integræ, subscribere Divisorem cum lineola interjecta.

Sic ad dividendum ab per c scribitur $\frac{ab}{c}$; & ad dividendum $\sqrt{a+b}Vcx$ per a scribitur $\frac{a+bVcx}{a}$ vel $\frac{a+b}{a}Vcx$. Et sic $V\sqrt{ax} \overline{xx}$ divisa per Vcx dat

(art. XII. hujus) $x. \sqrt{a^2} :: 1 \sqrt{b}$; sed (No. 56, $\frac{12d^2xV5abcx}{70aee}$; sed $\frac{3d^2V5cx}{10e^2}$ divisa
& art. VIII. hujus) $1. \sqrt{a} :: \sqrt{b}. \sqrt{ab}$, ergo per $\frac{3d^2V5cx}{10e^2}$ $= 1$ (No. 47.) ergo
alternando $1. \sqrt{b} :: \sqrt{a}. \sqrt{ab} :: x. \sqrt{ab}$. $\frac{12d^2xV5abcx}{70aee}$ divisa per $\frac{3d^2V5cx}{10e^2}$ $=$
(Eucl. II. V.) igitur $x = \sqrt{a}$. (Eucl. 9. V.) $\frac{4aVab}{7a} = \frac{4xVab}{7a}$
(k) 146. Siquidem $\frac{3ddV5cx}{10ee} = \frac{4xVab}{7a}$

dat $\sqrt{\frac{ax-xx}{cx}}$ five $\sqrt{\frac{ax-xx}{cx}}$. Et $\sqrt{\frac{aa+ab}{aa-2xx}}$ divisa per $\sqrt{\frac{aa-2xx}{aa-2xx}}$
 $\sqrt{\frac{aa+ab}{aa-2xx}}$ dat $\frac{aa+ab}{a-b} \sqrt{\frac{aa-2xx}{aa-2xx}}$. Et $12\sqrt{5}$ divisa per $4\sqrt{7}$ dat $3\sqrt{\frac{15}{7}}$.

LI. Ubi vero fractæ sunt ille quantitates, duc numeratorem dividendæ quantitatis in denominatorem divisoris, ac denominatorem in numeratorem, & factus prior erit numerator, ac posterior denominator quoti (1).

Sic ad dividendum $\frac{a}{b}$ per $\frac{c}{d}$ scribitur $\frac{ad}{bc}$, multiplicato scilicet a per d & b per c .

Parique ratione $\frac{2}{3}$ divisa per $\frac{1}{4}$ dat $\frac{8}{3}$; & $\frac{3a}{4c} \sqrt{ax}$ divisa per $\frac{2c}{5a}$ dat $\frac{15aa}{8cc} \sqrt{ax}$; divisa autem per $\frac{2c \sqrt{aa-xx}}{5a \sqrt{ax}}$ dat $\frac{15a'x}{8cc \sqrt{aa-xx}}$.

Et ad eundem modum $\frac{ad}{b}$ divisa per c (five per $\frac{c}{1}$) dat $\frac{ad}{bc}$,

Et c (five $\frac{c}{1}$) divisa per $\frac{ad}{b}$ dat $\frac{bc}{ad}$.

Et $\frac{2}{3}$ divisa per $\frac{1}{4}$ dat $\frac{8}{3}$. Et 3 divisa per $\frac{1}{4}$ dat $\frac{12}{1}$. Et $\frac{a+b}{c} \sqrt{cx}$ divisa per a dat $\frac{a+b}{ac} \sqrt{cx}$. Et $\sqrt{\frac{aa+ab}{aa-2xx}}$ divisa per $\frac{a}{c}$ dat $\frac{ac+bc}{a} \sqrt{cx}$.

Et $2 \sqrt{\frac{axx}{c}}$ divisa per $3 \sqrt{cd}$ dat $\frac{2}{3} \sqrt{\frac{axx}{ccd}}$; divisa autem per $3 \sqrt{\frac{cd}{x}}$ dat $\frac{2}{3} \sqrt{\frac{axx'}{ced}}$. Et $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{ax}{y}}$ divisa per $\frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{y}}$ dat $\frac{3}{2} \sqrt{\frac{ax}{y}}$. Et sic in aliis.

LII.

(1) 147. Denotent $\frac{a}{b}$ fractionem quamvis dividendam, & $\frac{c}{f}$ fractionem quamlibet, per quam prior dividenda sit, dico quotum $\frac{af}{cb}$; nam dicens, $\frac{a}{b}$ dividenda est per $\frac{c}{f}$, suppono quod $\frac{a}{b}$ constet duabus fractionibus invicem ductis, ex quibus una est ipsa $\frac{a}{f}$, altera vero quaeritur, sit ergo hæc fractio quaesita $\frac{x}{y}$; igitur $\frac{a}{b} = \frac{cx}{fy}$, & quaeritur valor ipsius

$\frac{x}{y}$: jam quia $\frac{a}{b}$ concipitur divisa per f , ducatur in f ; tum divisa non erit, & habebitur $\frac{af}{b} = \frac{cx}{y}$, sed adhuc $\frac{af}{b}$ concipitur multiplicata per c , dividatur ergo per c , ne amplius multiplicata sit, & habebitur $\frac{af}{bc} = \frac{x}{y} = \frac{a}{b}$ divisa per $\frac{c}{f}$. Vel sic: quotum quaesitum sit x ; erit ergo $x : 1 :: \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{f} :: \frac{af}{b} \cdot c :: af \cdot bc$ (Eucl. 7.VII.) quare $bcx = af$, & $x = \frac{af}{bc}$.

LII. *Quantitas ex pluribus terminis composita dividitur applicando singulos ejus terminos ad diviforem.*

Sic $aa+3ax - xx$ divifum per $a+3x - \frac{xx}{a}$.

At ubi divifor etiam ex pluribus terminis constat, divifio perinde ac in numeris institui debet (*m*).

Sic ad dividendum

$$a^3 + 2aac - aab - 3abc + bbc \text{ per } a - b.$$

Dic quoties *a* continetur in a^3 , nempe primus terminus diviforis in primo dividendi? Resp. *aa*. Quare scribe *aa* in quoto & ablato $a - b$ in aa five $a^3 - aab$ de dividendo, restabit $2aac - 3abc + bbc$ adhuc dividendum.

Dic itaque rursus quoties *a* continetur in $2aac$? Resp. $2ac$. Quare scribe etiam $2ac$ in quoto, & ablato $a - b$ in $2ac$ five $2aac - 2abc$ de præfato residuo, restabit etiamnum $-abc + bbc$.

Quamobrem dic iterum quoties *a* continetur in $-abc$? Resp. $-bc$. Et proinde scribe $-bc$ in quoto, & ablato denuo $a - b$ in $-bc$ five $-abc + bbc$ de novissimo residuo, restabit nihil. Quod indicat divifionem perfectam esse, prodeunte quoto $aa+2ac - bc$ (*n*).

LIII. Ceterum ut hujusmodi operationes ad formam, qua in divifione numerorum usi sumus, debite reducantur,

Termini tum dividende quantitatis tum diviforis juxta dimensiones literæ aliqujus, quæ ad hanc rem maxime idonea judicabitur, in ordine disponendi sunt.

Ita nempe ut illi primum locum occupent, in quibus litera ista est plurimarum dimensionum; iique secundum, in quibus dimensiones ejus ad maximas proximæ sunt; & sic deinceps usque ad terminos, qui per literam istam non omnino multiplicantur, adeoque ultimum locum occupabunt.

Sic

(*m*) 148. Liqueat ratiocinium Ni. 135. hujus ipsum dividendum (No. 34. hujus). Ergo &c. hic facile accommodari posse.

(*n*) 149. Quotum literale tot habet terminos quot sunt unitates in quoto exurgente ex divifione *n* (numeri terminorum quantitatis dividende) per *m* (numerum terminorum diviforis).

Quotus constet numero terminorum *x*. Ergo quotus ductus in diviforem habebit terminos numero *m* *x* (No. 29. hujus). Sed hinc

$mx = n$ & $x = \frac{n}{m}$. Ubi in quantitate dividenda separandi sunt termini coefficientibus numericis uniti, & restituendi termini signis contrariis deleti. Sic quantitas $a^2 + 2ab + b^2$ consistit quatuor terminis, quæ si dividatur per $a + b$, dabit quotum duorum terminorum $(a + b)$ Pariter $a^2 - b^2$ constat quatuor terminis $a + ab - ab + b^2$, quæ divisa per $a + b$, dat quotum duorum terminorum $a - b$.

Sic in allato exemplo si termini ordinentur juxta dimensiones literæ *a*, formam operis exhibebit adjunctum diagramma.

$$\begin{array}{r}
 a - b \) \ a^3 + 2aac \text{ --- } 3abc + bbc \text{ (} aa + 2ac \text{ --- } bc \\
 \underline{\hspace{1.5em} aab \hspace{1.5em}} \\
 a^3 \text{ --- } aab \\
 \text{o} \ + 2aac \text{ --- } 3abc \\
 \underline{\hspace{1.5em} 2aac \text{ --- } 2abc \hspace{1.5em}} \\
 \text{o} \ \text{ --- } abc + bbc \\
 \underline{\hspace{1.5em} \hspace{1.5em} abc + bbc \hspace{1.5em}} \\
 \text{o} \ \text{ \hspace{1.5em} } \text{o}
 \end{array}$$

Ubi videre est, quod terminus a^3 (five *a* trium dimensionum) occupat primum locum dividendæ quantitatis; terminique $\frac{2aac}{aab}$, in quibus *a* est duarum dimensionum, secundum occupant, & sic præterea.

Potuit etiam dividenda quantitas sic scribi

$$a^3 + \frac{2c}{b}aa - 3bca + bbc.$$

Ubi termini secundum locum occupantes, uniuntur aggregando factores literæ, juxta quam fit ordinatio. Et hoc modo si termini juxta dimensiones literæ *b* disponerentur, opus sicut in proximo diagrammate institui deberet, cujus explicationem adnectere visum est.

$$\begin{array}{r}
 -b+a \) \ cbb \text{ --- } 3ac \ b + a^3 \text{ (} -cb \ + 2ac \\
 \underline{\hspace{1.5em} aa \ + 2aac \hspace{1.5em}} \\
 cbb \text{ --- } acb \\
 \text{o} \ \text{ --- } 2ac \ b + a^3 \\
 \underline{\hspace{1.5em} aa \ b + 2aac \hspace{1.5em}} \\
 \text{--- } 2ac \ b + 2aac \\
 \underline{\hspace{1.5em} aa \ b + a^3 \hspace{1.5em}} \\
 \text{o} \ \text{ \hspace{1.5em} } \text{o}
 \end{array}$$

Dic quoties $-b+a$ continetur in cbb ? Resp. $-cb$. Quare scripto $-cb$ in quo, aufer

$$\begin{array}{r}
 -b+a \text{ in } -cb \text{ seu } bbc \text{ --- } abc \\
 \text{\& restabit in secundo loco} \\
 \text{--- } 2ac \\
 \text{--- } aa \ b.
 \end{array}$$

Residuo huic adnecte, si placet, quantitates in ultimo loco, nempe

a^3
+ $2aac$

& dic iterum quoties — b continetur in

— $2ac^2b$? Resp. + $2ab$.
— aa + aa .

Quare his in quoto scriptis, aufer

— $b+a$ in $\frac{+2ac}{+ a^2}$ seu — $2ac^2b + 2aac$
+ a^3

& restabit nihil. Unde constat divisionem perfectam esse, prodeunte quoto

— $cb + 2ac + aa$ ut ante.

Atque ita si dividere oportet

aa^3 — $aac^2 + yyc^2 + y^6$ — $2y^2cc$ — a^6 — $2a^2cc$ — a^4yy
per yy — aa — cc :

Quantitates juxta literam y ad hunc modum ordino,

$$\begin{array}{r} yy \quad \frac{aa}{cc} \Big) y^6 + aa \quad \frac{a^4}{+c^2} yy - \frac{a^6}{2a^2cc} \\ \quad \frac{cc}{cc} \quad \quad \quad \frac{a^4}{+c^2} \quad \quad \quad \frac{a^6}{-aac^2} \end{array}$$

Dein divisionem ut in subjecto diagrammate instituo.

Adjiciuntur & alia exempla, de quibus insuper observandum est, quod ubi dimensiones literæ, ad quam ordinatio fit, non in eadem progressionem arithmetica sed per saltum alicubi procedunt, locis vacuis substituitur nora *

$$\begin{array}{r} \frac{aa}{cc} \Big) y^6 + aa \quad \frac{a^4}{+c^2} yy - \frac{a^6}{2a^2cc} \left(y^4 \frac{+2aa}{cc} yy + a^4 \right) \\ \quad \frac{cc}{cc} \quad \quad \quad \frac{a^4}{+c^2} \quad \quad \quad \frac{a^6}{-aac^2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} y^6 - aa \, y^4 \\ \quad \quad \quad - cc \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 + 2aa \, y^4 \\ \quad \quad \quad - cc \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 2aa \quad \quad \quad - 2a^4 \\ \quad \quad \quad - cc \, y^4 \quad \quad \quad - aaccyy \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad + c^4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \quad \quad \quad + a^4 \\ \quad \quad \quad + aaccyy \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + a^4 \quad \quad \quad - a^6 \\ + aaccyy \quad \quad \quad - 2a^4cc \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad - aac^4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \quad \quad \quad 0 \end{array}$$

$$a + b) aa^* - bb (a - b$$

$$\underline{aa + ab}$$

$$0 - ab$$

$$\underline{-ab - bb}$$

$$yy - 2ay + aa) y^4 * - 3\frac{1}{2}aayy + 3a^3y - \frac{1}{2}a^4 (yy + 2ay - \frac{1}{2}aa.$$

$$\underline{y^4 - 2ay^3 + aayy}$$

$$0 + 2ay^3 - 4\frac{1}{2}aayy$$

$$\underline{+ 2ay^3 - 4aayy + 2a^3y}$$

$$0 - \frac{1}{2}aayy + a^3y$$

$$\underline{-\frac{1}{2}aayy + a^3y - \frac{1}{2}a^4}$$

$$aa + ab\sqrt{2} + bb) a^4 * * * + b^4 (aa - ab\sqrt{2} + bb$$

$$\underline{a^4 + a^3b\sqrt{2} + aabb}$$

$$0 - a^3b\sqrt{2} - aabb$$

$$\underline{-a^3b\sqrt{2} - 2aabb - ab^3\sqrt{2}}$$

$$0 + aabb + ab^3\sqrt{2}$$

$$\underline{+ aabb + ab^3\sqrt{2} + b^4}$$

Aliqui divisionem incipiunt ab ultimis terminis, sed eodem recidit, si inverfo terminorum ordine incipiatur a prioribus. Sunt & aliæ methodi dividendi, sed facillimam & commodissimam nosse sufficit.

C. A.

150. Si in formula jam inventa pro $(p-q)$ ubique in exponentibus ponatur $-m$, & omnes termini, præter primum, ponantur negativi, sic exhibebitur potestas m negativa hoc est potestas $-m$ ipsius binomii.

$$\text{Jam } p + q^{-m} = \frac{1}{p^m} \text{ (No. 144. hujus).}$$

Quare binomium hoc ad negativam potestatem evertit æquabit unitatem dividam per

$$p^{-1} + p^{-2} + q + \frac{m-1}{2} p^{-2} q^2 +$$

$$\frac{m-3}{2} p^{-3} q^3 + \&c.$$

Sed, per divisionis regulas dividi debet

Primo, unitas per p ; unde oritur

$$\frac{1}{p^m} = p^{-m}$$

Deinde, totus divisor multiplicandus est per hunc quotientem, id est dividendus est per p^m ; ex quo obtinebitur

$$1 + m p^{-1} + \frac{m(m-1)}{2} p^{-2} q^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{6} p^{-3} q^3 + \&c.$$

Tertio, hoc factum ex dividendo subducendum est; quod dabit omnes terminos, præter primum; & quidem negativos, & hoc erit novum dividendum.

F 3:

Quar-

Quarto, primus hujus novi dividendi terminus per primum ipsius divisoris terminum dividendus est; unde fiet quotiens

$$\frac{m}{mp} \quad \frac{1}{q}$$

Et sic ratiocinium profequens, observando

divisionis regulas, invenies binomium $p + q$ evectum ad potestatem m esse

$$\begin{array}{r} -m \qquad -m-1 \qquad m-m-1 \qquad 1 \qquad -m-2 \qquad q^1 \qquad - \\ p \quad -mp \quad q \quad - \quad 2 \quad p \quad -m-2 \qquad q^1 \qquad - \\ \hline \quad \quad \quad 2. \quad 3 \quad \quad \quad p \quad -m-3 \qquad q^1 \quad - \&c. \end{array}$$

CAPUT VII.

DE EXTRACTIONE RADICUM. (a)

LIV. CUM numeri alicujus radix quadratica extrahi debet, is in locis alternis, incipiendo ab unitate, punctis notandus est; dein figura in quoto seu radice scribenda, cujus quadratum figuræ vel figuris ante primum punctum aut æquale sit aut proxime minus. Et ablato illo quadrato, ceteræ radicis figuræ sigillatim invenientur dividendo residuum per duplum radicis eatenus extractæ, & singulis vicibus auferendo e residuo illo factum a figura novissime prodeunte & decuplo prædicti divisoris figura illa aucti (b).

Sic

(a) 151. Radix extrahitur e potestate data per divisionem destruendo quæ per multiplicationem facta fuerant, ut per se patet, & ut melius infra declarabitur.

(b) 152. Quadratum unitatum, aut primum a dextris, aut duo prima loca tenebit. Duo rectangula ex unitatibus in decades, efficiunt aut solas decades, aut decades cum centenariis, quare vel tota erunt in secunda, aut partim erunt in secunda, partim in tertia sede; quadratum ex decadibus dabit, aut centenarios, aut centenariorum decades, & primo quidem casu totum erit in tertio loco; secundo vero, pars in tertio, pars in quarto.

153. Quod ratiocinium ad ceteros numeros extendere licet. Ex eo sequitur quod numeris punctis distinguendi sunt, & quidem in binariis, ubi agitur de radice quadrata, incipiendo a dextris. Sic (sumpta quantitate 316, quæ est radix ipsius 99856) quadratum ipsius 6 nempe 36 occupat duo prima loca. Ita & duo rectangula ex 1 in 6, quæ faciunt duodecim decades, tenent secundam, & tertiam sedem, & sic de ceteris præter ultimum factum, quod, aut solum, aut cum aliquo ex præcedentibus, ultimam, aut duas ultimas sedes occupabit.

154. Unde liquet, quod tot erunt numeri in

radice, quot divisiones in quadrato, & quod si, in radice, sinistri numeri quadratum, vel solum, vel cum parte duorum rectangulorum ex seipso in sequentem, occupet duo loca, duo quoque erunt numeri in sinistra quadrati sede; secus vero unus; quod sufficit, nam puncta ad hoc facta sunt, ut noscatur an in una, vel duabus figuris quadratum sit sinistri radicis numeri quadratum. Ipsa enim operandi ratio detegit, ubi sint reliquæ quadrati partes.

Cur cetera fiant facile patebit ex theoremate de quadrato polinomii.

Hæc uno saltem exemplo, & quidem ex Auctore desumpto explicare libet. Extrahenda sit radix ex 99856: quia in sinistra quadrati sede unus numerus est, is (9) debet continere quadratum ex primo, a sinistra, numero radicis, vel solum, vel cum parte dupli rectanguli ex primo numero radicis in secundum; sed ipse 9 est quadratum perfectum, ergo nulla est hic dupli rectanguli pars, quamobrem sumo ejusdem 9 radicem 3, quam in quoto pono. Hic ergo totum quadratum absumptum est, procedo igitur ad numeros sequentes. Duo sequentes numeri 98 debent continere duo facta ex centenis jam inventis, & decadibus, cum quadrato decadem, sed cen-

tena

Sic ad extrahendam radicem ex 99856, imprimis nota cum punctis ad hunc modum 9. 98. 56. Dein quare numerum 3 cujus quadratum æquatur primæ figuræ 9, nempe 3; scribeque in quoto. Et, de 9 ablato quadrato 3×3 seu 9, restabit 0; cui adnecte figuras ante proximum punctum, nempe 98 pro sequente opere. Tum neglecta ultima figura 8, dic quoties duplum 3 seu 6 continetur in priori 9? Resp. 1. Quare scripto 1 in quoto, aufer factum 1×61 seu 61 de 98, restabit 37, cui adnecte ultimas figuras 56, & fiet 3756, numerus in quo opus denuo institui debet. Quare, & hujus ultima figura 6 neglecta; dic quoties duplum 31 seu 62 continetur in 375 (id quod ex initialibus figuris 6 & 37 conjici potest, animadvertendo quoties 6 continetur in 37?) Resp. 6. Et scripto 6 in quoto aufer factum 6×626 seu 3756, & restabit nihil. Unde constat opus præactum esse; prodeunte radice 316.

$$\begin{array}{r}
 9.98.56 \quad (316 \\
 \underline{9} \\
 098 \\
 \underline{61} \\
 3756 \\
 \underline{3756} \\
 0
 \end{array}$$

LV.

tena ducta in decades dant millena, & millenorum locus est quartus a dextris, aut ipsius 9, ergo 9 continet duo rectangula ex 3 jam inventis, & quærenda radicis parte: quapropter divido 9 per 6; quotiens est unitas, quæ quidem est altera radicis pars, & quam pono in quoto; sed quia 98 debet continere duo rectangula ex duabus radicis partibus jam re-pertis cum quadrato ultimæ ex inventis, duco sex centena cum una decade, aut 61 in 1, quod subduco ex 98, ut videam quænam pars duorum factorum ex 3, & ex 1, sit in ipsis 98, quo facto restant 37 (centenarii nempe). In dato numero adhuc perquirenda sunt duo rectangula ex prima radicis parte (3. cent.) in ultimam (unit.) quod dabit aut centenarios, aut centenariorum decades, & duo rectangula ex decadibus, in unitates, unde exsurgunt solæ decades, aut centenarii cum decadibus; quare hæc continebuntur in numeris 375, neglectis 6 unitatibus, in quibus duo hæc rectangula certe esse nequeunt; quare sumo duplum tam centenariorum, quam decadum, id est 6 cent. & 2 decad., aut 62 decad. per quem numerum divido 375, quorum

est 6; multiplico 6 in 62 & factum 372 subtraho ex 375, ut ex residuo noscam, quænam pars quadrati abscondatur in ultima nota 5; restat 3, huic addo 6 ultimam notam dati quadrati, quod facit 36 quadratum ipsum ultimæ partis radicis (6) inventæ.

$$\begin{array}{r}
 9.98.56 \quad (316 \\
 \underline{9} \\
 098 \\
 \underline{61} \\
 375 \\
 \underline{372} \\
 36 \\
 \underline{36} \\
 00
 \end{array}$$

Tirones aptare possunt ratiocinium ad sequens exemplum.

LV. Atque ita si radicem ex 22178791 extrahere oportet, imprimis facta punctatione, quare numerum, cujus quadratum, (siquidem id nequeat æquari,) sit proxime minus figuris 22 antecedentibus primum punctum, & inuenies esse 4. Nam 5×5 sive 25 major est quam 22, 4×4 sive 16 minor. Quare 4 erit prima figura radices. Et hac itaque in quoto scripta, de 22 aufer quadratum 4×4 seu 16, residuoque 6 adijunge desuper proximas figuras 17, & habebitur 617, cujus divisione per duplum 4 elicienda est secunda figura radices. Nempe, neglecta ultima figura 7, dic quoties 8 continetur in 61? Resp. 7. Quare scribe 7 in quoto, & de 617 aufer factum 7 in 87 seu 609, & restabit 8, cui adijunge proximas duas figuras 87, & habebitur 887, cujus divisione per duplum 47 seu 94 elicienda est tertia figura. Utpote dic quoties 94 continetur in 88? Resp. 0. Quare scribe 0 in quoto, adijungeque ultimas duas figura 91,

22'17'87.91 (4709, 43637 &c.
16

6 17
6 09

88791
84681

4110.00
3767 36

342 6400
282 5649

60075100
56513196

356190400
282566169

73624231

& habebitur 88791, cujus divisione per duplum 470 seu 940 elicienda est ultima figura. Nempe dic quoties 940 continetur in 8879? Resp. 9. Quare scribe 9 in quoto, & radicem habebis 4709.

LVI. Ceterum cum factus 9×9409 seu 84681 ablatas de 88791 relinquat 4110, id indicio est numerum 4709 non esse radicem numeri 22178791 præcise, sed ea paulo minorem existere. Et in hoc casu aliisque similibus si veram radicem appropinquare placeat, proseguenda est operatio in decimalibus numeris, adnectendo ad residuum circulos duos in singulis operationibus. Sic residuum 4110, adnexis circulis, evadit 411000; cujus divisione per duplum 4709 seu 9418 elicietur figura prima decimalis, nimi-

rum

rum 4. Dein scripto 4 in quoto, aufer 4×94184 feu 376736 de 411000 & restabit 34264. Atque ita adnexis iterum duobus circulis, opus pro luitu continuari potest, prodeunte tandem radice 4709, 43637, &c.

LVII. Ubi vero radix ad medietatem, aut ultra, extracta est, ceteræ figuræ per divisionem solam obtineri possunt. Ut in hoc exemplo, si radicem ad usque novem figuras extrahere animus esset, postquam quinque priores 4709,4 extractæ sunt, quatuor posteriores 3637 elici possent dividendo residuum 34264 per duplum 4709,4. (c)

LVIII. Et ad hunc modum si radix ex 32976 ad usque quinque figuras extrahi debet; postquam figuræ punctis notantur, scribe 1 in quoto, utpote cujus quadratum 1×1 feu 1, maximum est quod in 3, figura primum punctum antecedente, continetur. Ac de 3 ablato quadrato illo 1, restabit 2. Dein huic 2 annexis proximis figuris 29, quære quoties duplum 1 feu 2 continetur in 22, & invenies quidem plusquam 10, sed nunquam licet divisorem vel decies sumere, imo neque novies in hoc casu quia factus 9×29 five 261 major est quam 129 unde deberet auferri. Quare pone tantum 8. Et perinde scripto 8 in quoto, & ablato 8×23 five 224 restabit 5. Huic insuper annexis figuris 76, quære quoties duplum 18 feu 36 continetur in 57, & invenies 1, adeoque scribe 1 in quoto ac de 576 ablato 1×361 feu 361 restabit 215. Denique ad ceteras figuras eliciendas divide hunc 215 per duplum 181 feu 362 & exibunt figuræ 59, quibus etiam scriptis in quoto, habebitur radix 181, 59.

3267

(c) 155. Nam hæc operatio differt a radicis extractione, tantum quia in hac quadrata ultimorum figurarum subducuntur a dato numero, non vero in illa, & hæc omisso quotum non mutat, cum hoc pendeat a primis numeris a sinistra, & quadratum subducatur ab ultimis. At quælibet divisio auferit primos numeros, unde fit ut tandem divisio incipi debeat ab iis numeris, qui olim fuerant ultimi, nempe dextræ propiores, in quibus est aliquis error, ob omissam quadrati subtractionem. Quod ubi evenit, cessandum est.

Sic in exemplo superiore adde circulum residuo 34264, & divide per 9418,8, duplum ipsius 4709,4, invenies 3, subduc $3 \times 9418,8$, restat 60076; si vero pro divisione radicem extraxisses, duos addere circulos, (unde habuisses 3426400,) & post divisionem, per eundem 9418,8 idem quotum $3 \times 9418,8$, auctum 3×3 subducere debuisses, quod dat 600751, qui differt a superiori solum in duabus ultimis notis, unde patet errorem esse in numero 6, & sequentibus, non autem ante eum, qua-

Tom. I

re illum puncto noto, & semper notabo. Perge ut in schediastate, ac eodem ratiocinio usus, prospicies quatuor divisiones te perducere ad incipiendum ex numero 78, ubi tantum error latet, quare eatenus divisio dedit idem, ac dedisset radicis extractio.

$$\begin{array}{r} 342640 \quad (4709,43637. \\ \underline{282564} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6007.60 \\ \underline{565128} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 356320 \\ \underline{282564} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 737560 \\ \underline{659316} \end{array}$$

$$\underline{78244}$$

(d) 156.

G

$$\begin{array}{r}
 32976 \text{ (181,59)} \\
 \underline{1} \\
 229 \\
 224 \\
 \hline
 576 \\
 361 \\
 \hline
 362)215 \text{ (59)}
 \end{array}$$

LIX. Eadem methodo radices etiam e decimalibus numeris extrahuntur (d). Sic ex 329,76 radix est 18,159. Et ex 3,2976 radix est 1,8159. Et ex 0,032976 radix est 0,18159. Et sic præterea. Sed ex 3297,6 radix est 57,4245. Et ex 32,976 radix est 5,74246. Atque ita ex 9,9856 radix est 3,16. Sed ex 0,99856 radix est 0,999279, &c.

Quemadmodum e subjectis diagrammis constare potest.

$$\begin{array}{r}
 32976 \text{ (5,74247, \&c.)} \\
 \underline{25} \\
 797 \\
 749 \\
 \hline
 4860 \\
 4576 \\
 \hline
 1148)284 \text{ (247)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0,99856 \text{ (0,999279, \&c.)} \\
 \underline{81} \\
 1885 \\
 1701 \\
 \hline
 18460 \\
 17901 \\
 \hline
 1998)559 \text{ (279)}
 \end{array}$$

LX.

(d) 156. Radix fractionis æquat radicem numeratoris divisam per radicem denominatoris.

Siquidem, ut habeatur fractionis potestas, ea aliquoties in seipsam ducenda est, numerator scilicet in numeratorem, denominator vero in denominatorem.

157. Hoc posito liquet, quod quivis numerus compositus ex integris & decimalibus, aut ex decimalibus quibuscvis, exponi potest per fractionem, cujus numerator est numerus datus, denominator autem, numerus exprimens quamnam fractio contineatur in dextro numero; sic $329,76 = \frac{32976}{100}$, & $3,2976 = \frac{32976}{10000}$.

Multiplica (si opus est) numeratorem, & denominatorem, ita ut denominator quadratur;

extrahe radicem numeratoris, qua dividi per debes radicem denominatoris, hanc reipsa divide, & habebis radicem quaesitam.

Sic 329,76 æquat 32976 centesimas unitatis partes, aut $\frac{32976}{100}$ unit. cujus radix $\frac{181}{10}$, cum

215 residuo; sed $\frac{181}{10} = 18, 1$; hæc ergo est radix hæctenus inventa, tum, si libet, perge, res enim non difficilis erit. Eodem pacto, $3,2976 = 32976$ decem milles. $= \frac{32976}{10000}$, cujus radix $\frac{181}{100}$ cum 215 residuo; sed $\frac{181}{100} = 1,81$, ergo &c.

Pariter $0,032976 = 32976$ million. $=$
32976

LX. Extractionem radice cubice & aliarum omnium, regula generali comprehendam, praxi potius intellectu facili quam expeditæ consulens, ne moram in eo, quod raro usu-veniet, discentibus inferam. Nimirum

Tertia quæque figura incipiendo ab unitate, primo punctis notanda est, si radix sit cubica; aut unaquæque quinta, si sit quadrato-cubica, &c. (e) Dein figura in quoto scribenda est cujus maxima potestas (hoc est cubica si radix sit cubica, aut quadrato-cubica si radix sit quadrato-cubica, &c.) aut æquetur figuræ vel figuris ante primum punctum, aut proxime minor sit. Et ablata illa potestate, figura proxima elicitur dividendo residuum proxima numeri resolvendi figura auctum, per potestatem quoti pene-maximam ductam in indicem maxime potestatis, hoc est, per triplum quadratum quoti, si radix sit cubica; aut per quintuplum quadrato-quadratum, si radix sit quadrato-cubica, &c. Rursusque a numero resolvendo ablata maxima quoti potestate, figura tertia invenietur dividendo residuum illud proxima numeri resolvendi figura auctum per potestatem quoti pene-maximam ductam in indicem maxime potestatis. Et sic in infinitum (f).

LXI.

$\frac{32976}{1000000}$, cujus radix $\frac{181}{1000}$, cum 215 residuo; sed $\frac{181}{1000} = 0,181$ &c.

Sed $3297,6 = \frac{32976}{10} = \frac{329760}{100}$ (ut denominator sit quadratum) cujus radix est $\frac{574}{10}$, &

704 resid. atqui $\frac{574}{10} = 57,4$ &c.

Omnibus his addenda est radix residui, quæ invenitur (additis circulis) per generalem methodum.

(e) 158. Datus numerus punctis distinguendus est in partes, quarum quæque tot contineat figuras, quot unitates sunt in potestatis indice, quia potestas unitatum in dato numero potest tot loca occupare.

(f) Formula binomii $p+q$ ad ad potestatem m elevati est $p^m + mp^{m-1}q$

$$+ \frac{m \cdot m-1}{2} p^{m-2} q^2 + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2}{2 \cdot 3} p^{m-3} q^3$$

$$+ \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3}{2 \cdot 3 \cdot 4} p^{m-4} q^4 + \&c.$$

ut hanc facile numeris accomodes, sive primo radicem potestatis solum complecti unita-

tes & decades, vel esse numerum binomiale.

Inventa ergo radice m ipsius p^m , divide partem sequentem $mp^{m-1}q$ per mp^{m-1} , restabit q altera pars radicis, quam te recte vel male determinasse ostendent sequentes partes. Si enim numeri, qui superunt in potestate numerali propolita, sint revera

$$\frac{m \cdot m-1}{2} p^{m-2} q^2; \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2}{2 \cdot 3} p^{m-3} q^3;$$

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3}{2 \cdot 3 \cdot 4} p^{m-4} q^4 \&c.$$

manifeste constabit radicem esse bene determinatam. Si id non acciderit, patebit radicem esse male determinatam, aut esse inaffabilem.

Extrahenda sit radix cubica ex 42875. Hic numerus divisus in partes, quarum prima tribus numeris constet; est 42875. Formula cubi est $p^3 + 3p^2q + 3pq^2 + q^3$. Igitur aut 42 æquat p^3 aut eum continet. Non autem æquat, cum 42 non sit cubus, continebit igitur. Maximus autem cubus in 42 contentus est 27, cujus radix est 3 = p . Nunc 42-27 = 15, cui si adjicias numeros sequentes, invenies 15875, qui simul debent æquare $3p^2q + 3pq^2 + q^3$. Est autem $3p^2 = 27$, per quem divide 158, invenies 5 = q . Sed $3p^2q = 27 \cdot 5 = 135$; restat igitur 23, &c, adjectis numeris sequentibus, 2375 = $3p^2q + q^3$; quod an verum sit, examinandum est. Cum $p = 3$, & $q = 5$,

LXI. Sic ad extrahendam radicem cubicam ex 13312053, numerus ille primo punctis ad hunc modum 13'312.053 notandus est. Deinde in quotu scribenda est illa figura 2 cujus cubus 8, siquidem æquari nequeat, proxime minor sit figuris 13 antecedentibus primum punctum. Et ablato illo cubo restabit 5, quod proxima numeri resolvendi figura 3 auctum, & per triplum quadratum quoti 2 divisum, quærendo nempe quoties 3×4 seu 12 continetur in 53, dat 4 pro secunda figura quoti. Sed, cum quoti 24 prodiret cubus 13824 major quam qui auferri posset de figuris 13312 antecedentibus secundum punctum, scribi debet tantum 3 in quotu. Tum quotus 23, in charta aliqua seorsim per 23 multiplicatus, dat quadratum 529, quod iterum per 23 multiplicatum dat cubum 12167; & hic de 13312 ablatu relinquit 1145; (g) quod proxima resolvendi numeri figura 0 auctum, &

$q \equiv 5$, erit $3p^2 \equiv 225$ decadibus, nam p est 3 decades; atque $q^3 \equiv 125$ unitatibus, quia q est 5 unitates; sed 225 decades cum 125 unitatibus faciunt 2375. Ergo radix recte assignata fuit.

Item extrahenda sit radix quinta ex numero 6436343. Eum divide in duas partes, quarum prima habeat quinque figuras, sic 6436343. Formula quintæ potestatis est

$$p^5 + 5p^4q + 10p^3q^2 + 10p^2q^3 + 5pq^4 + q^5.$$

Igitur 64 aut æquat aut continet p^5 . Non autem æquat, quia nulla radix elevata ad quintam potestatem efficit 64, ergo continet. Sed maxima quinta potestas infra 64 est 32, cujus radix quinta est 2. Ergo $2 \equiv p$; & superest 32, cui adde numerum sequentem habiturus 323. Est autem $p^4 \equiv 16$; & $5p^4 \equiv 80$; divide igitur 323 per 80 invenies 4, & restabit 3, quibus addens numeros sequentes conficies 36343, qui numerus debet æquare

$$10p^3q^2 + 10p^2q^3 + 5pq^4 + q^5.$$

Verum est $p^4 \equiv 8$ millibus; nam tertia potestas decadis est millenarium; & $10p^3 \equiv 80$ millibus; atque $q^2 \equiv 16$ unitatibus, quare $10p^3q^2 \equiv 1280$ millibus.

Item $p^2 \equiv 4$ centenis; $10p^2 \equiv 40$ centenis, $q^3 \equiv 64$ unitatibus, & $10p^2q^3 \equiv 2560$ centenis, quæ addita 1280 millibus supra inventis, conficiunt 2536 centena; hic autem numerus superat 363 centena, quæ supererant in potestate proposita, quare (4) secunda pars radicis male fuit determinata.

Ponamus alteram partem radicis esse 3. Erit $3 \cdot 80 \equiv 240$, & $323 - 240 \equiv 83$; superest ergo 836343, qui debet æquare $10p^3q^2 +$

$10p^2q^3 + 5pq^4 + q^5$. Est autem $10p^3 \equiv 80$ millibus, & $q^2 \equiv 9$ unitatibus, atque $10p^3q^2 \equiv 720$ millibus.

Pariter $p^2 \equiv 4$ centenis, $10p^2 \equiv 40$ centenis; $q^3 \equiv 27$ unitatibus, & $10p^2q^3 \equiv 1080$ centenis, quæ addita 720 millibus supra inventis, faciunt 8280 centena.

Eodem pacto $p \equiv 2$ decadibus, $5p \equiv 10$ decadibus, $q^4 \equiv 81$ unitatibus, & $5p^4 \equiv 810$ decadibus, quæ additæ 8280 centenis, dant 83610 decades.

Denique $q^5 \equiv 243$ unitatibus, quæ adiectæ 83610 decadibus supra repertis, rotundant numerum ipsum 836343.

Si autem potestatis propositæ radix sit polynomia, extunde methodo supra tradita duas primas figuras radicis; has considera tanquam unum numerum, & huic applica quæ jam diximus, sic reperies tertiam radicis figuram, & sic deinceps. Exempla desumemus ex ipso Auctore.

(g) Quanquam Auctor agat methodo paulo diversa a mea, tamen eodem res recidit. E cubo proposito 13'312.053, NEWTONUS primo abscindit partem 13'312, cujus radicem cubicam 23 quærit, & superest 1145. Pone nunc in formula $p \equiv 23$; ergo 1145053 $\equiv 3p^2q + 3pq^2 + q^3$ quare divisus 11450 per $3p^2 \equiv 1587$ dat $7 \equiv q$. Sed $1587 \cdot 7 \equiv 11109$, & $21450 - 11109 \equiv 341$; ergo debet 34153 æquare $3pq^2 + q^3$; est autem $p \equiv 23$ decadibus; $3p \equiv 69$ decadibus; $q^2 \equiv 49$ unitatibus, atque $3p^2 \equiv 3381$ decadibus, & $q^3 \equiv 343$ unitatibus. Decades autem & unitates simul collectæ faciunt 34153, ergo radix bene determinata est.

& per triplum quadratum quoti 23 divisum, quærendo nempe quoties 3×529 seu 1587 continetur in 11450, dat 7 pro tertia figura quoti. Tum quotus 237 per 237 multiplicatus dat quadratum 56169, quod iterum per 337 multiplicatum dat cubum 13312053. & hic de resolvendo numero ablatu relinquit nihil. Unde patet radicem quæsitam esse 237.

$$\begin{array}{r} 13312053 \text{ (237)} \\ \underline{\quad\quad\quad} \\ \text{aufer cubum } 8 \\ \quad 12) \text{ restat } 53 \text{ (4. aut 3.} \\ \underline{\quad\quad\quad} \\ \text{aufer cubum } 12167 \\ \quad 1587) \text{ restat } 11450 \text{ (7.} \\ \underline{\quad\quad\quad} \\ \text{aufer cubum } 13312053 \\ \quad \text{restat } 0. \end{array}$$

LXII. Atque ita ad extrahendam radicem quadrato-cubicam ex 36430820, punctum ponitur ad quintam figuram, & figura 3, cujus quadrato-cubus 243 proxime minor est figuris 364 antecedentibus punctum istud, scribitur in quotu. Dein quadrato-cubo 243 de 364 ablato, restat 121, quod proxima resolvendi numeri figura 3 auctum. & per quinquies quadrato-quadratum quoti divisum, quærendo nempe quoties 5×81 seu 405 continetur in 1213, dat 2 pro secunda figura. Quotus ille 32 in se ter ductus efficit quadrato-quadratum 1048576, & hoc iterum in 32 ductum efficit quadrato-cubum 33554432; qui a numero resolvendo ablatu relinquit 2876388. Itaque 32 est integra pars radices, sed non justa radix, & proinde, si opus in decimalibus numeris prosequi animus est, residuum circulo auctum dividi debet per quinquies prædictum quadrato-quadratum quoti, quærendo quoties 5×1048576 seu 5242880 continetur in 28763880, & prodibit tertia figura, sive prima decimalis, 5. Atque ita auferendo quadrato-cubum quoti 32, 5 de numero resolvendo ac dividendo residuum per quinquies quadrato-quadratum ejus, erui potest quarta figura. Et sic in infinitum.

$$\begin{array}{r} 36430820 \text{ (32, 5)} \\ \underline{\quad\quad\quad} \\ \quad 243 \\ 405) 1213 \text{ (2)} \\ \underline{\quad\quad\quad} \\ \quad 33554432 \\ 5242880) 28763880 \text{ (5)} \end{array}$$

LXIII.

Ceterum potest etiam dispici an radix sit bene determinata, considerando quod omnes termini in formula, præter duos primos, dividi possunt per q^2 ; quod aliquanto faciliorem red-

det numerorum multiplicationem.

Sic in hoc ultimo exemplo esse debet 34153
 $= 3p^2 + q^2 = (3p + q)^2 = 697.49 = 34153.$
G 3 (b) 179.

LXIII. Cum radix quadrato-quadratica extrahenda est, oportet bis extrahere radicem quadraticam, eo quod $\sqrt[4]{}$ valeat $\sqrt{}$. Et cum radix cubo-cubica extrahenda est, oportet extrahere radicem cubicam & ejus radicem quadraticam, eo quod $\sqrt[6]{}$ valeat $\sqrt[3]{}$: Unde aliqui radices hasce non cubo-cubicas sed quadrato-cubicas dixerunt.

Et idem in aliis radicibus, quarum indices non sunt numeri primi, observandum est.

LXIV. E simplicibus quantitibus algebraicis extractio radicum ex ipsa notatione patet. Quemadmodum

quod \sqrt{aa} fit a ,
 & quod \sqrt{aacc} fit ac ,
 & quod $\sqrt{9aacc}$ fit $3ac$,
 & quod $\sqrt{49a^4xx}$ fit $7aax$.

Atque ita quod $\sqrt{\frac{a^4}{cc}}$ seu $\frac{\sqrt{a^4}}{\sqrt{cc}}$ fit $\frac{aa}{c}$,

& quod $\sqrt{\frac{a^4bb}{cc}}$ fit $\frac{aab}{c}$,

Et quod $\sqrt{\frac{9aaz}{25bb}}$ fit $\frac{3az}{5b}$,

& quod $\sqrt[3]{\frac{8b^6}{27a^3}}$ fit $\frac{2bb}{3a}$.

Et quod $\sqrt[3]{\frac{8b^6}{27a^3}}$ fit $\frac{2bb}{3a}$,

Et quod $\sqrt[4]{aabb}$ fit \sqrt{ab} .

Quin etiam quod

$b\sqrt{aacc}$ seu b in \sqrt{aacc} valeat b in ac sive abc .

Et quod $\frac{a+3x}{c} \sqrt{\frac{4bbx^4}{81aa}}$ valeat $\frac{a+3x}{c} \times \frac{2bxx}{9a}$ sive $\frac{2abxx+6bx^3}{9ac}$.

Hæc, inquam, patent, siquidem propositas quantitates e radicibus in se ductis produci (ut aa ex a in a , $aacc$ ex ac in ac , $9aacc$ ex $3ac$ in $3ac$, &c.) prima fronte constare potest. (b) Ubi vero quantitates pluribus terminis constant, opus perinde ac in numeris absolvitur.

Sic

(b) 159. Radix n ipsius a^m est $a^{\frac{m}{n}}$. Sit enim e — fit n , dat $\frac{m}{n} = m$. Ergo &c.

enim ea a^x ergo, evchendo ad potestatem n ; $a^{nx} = a^m$; & $nx = m$; atque $\frac{m}{n} = x$. Vel

fic. Radix n ipsum a^m debet esse factor, qui n ... ies repetitus, debet continua multiplicatione gignere potestatem ipsam a^m ; atque $\frac{m}{n} + \frac{m}{n} + \&c.$, donec numerus fractionum

Vel, quia unitas est ad radicem, ut radix ad hujus secundam potestatem &c., usque ad potestatem a^m , ratio unitatis ad radicem erit sub— n —plicata ejus quam habet unitas ad a^m . Ergo scribi debet $a^{\frac{m}{n}}$.

Dux posteriorum demonstrationes aperient viam solvendi difficultates omnes; ideo illas addidi.

Sic ad extrahendam radicem quadraticam ex $aa+2ab+bb$, imprimis radicem primi termini aa , nempe a , scribe in quoto.

$$\begin{array}{r} aa+2ab+bb \quad (a+b \\ \underline{aa} \\ 0 \\ \underline{2ab+bb} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

Et ablato ejus quadrato $a \times a$ restabit $2ab+bb$ pro elicienda reliqua parte radicis. Dic itaque quoties duplum quoti seu $2a$ continetur in primo residui termino $2ab$? Resp. b . Adeoque scribe b in quoto, & ablato facto b in $2a+b$ seu $2ab+bb$ restabit nihil. Quod indicat opus peractum esse, procedente radice $a+b$.

Et sic ad extrahendam radicem ex

$$a^4+6a^3b+9aabb-12ab^3+4b^4,$$

imprimis pone in quoto radicem primi termini a^2 , nempe aa , & ablato ejus quadrato $aa \times aa$ seu a^4 restabit

$$6a^3b+9aabb-12ab^3+4b^4$$

pro reliqua radice elicienda. Dic itaque quoties $2aa$ continetur in $6a^3b$? Resp. $3ab$ quare scribe in quoto, & ablato facto

$$3ab \text{ in } 2aa+3ab \text{ seu}$$

$$6a^3b+9aabb \text{ restabit etiamnum } 4aabb-12ab^3+4b^4$$

pro opere proseguendo. Adeoque

$$a^4+6a^3b+9aabb-12ab^3+4b^4 \quad (aa+3ab-2bb^2$$

a^2

0

$$\underline{6a^3b+9aabb}$$

$$0-4aabb$$

$$\underline{-4aabb-12ab^3+4b^4}$$

0

0

0

dic iterum quoties duplum quoti, nempe $2aa+6ab$ continetur in $4aabb-12ab^3$; sive, quod perinde est, dic quoties duplum primi termini quoti, seu $2aa$, continetur in primo residui termino $4aabb$? Resp. $2bb$. Et proinde scripto

$2bb$ in quoto, & ablato facto

$$-2bb \text{ in } 2aa+6ab-2bb \text{ seu } 4aabb-12ab^3+4b^4,$$

restabit nihil. Unde constat radicem esse $aa+3ab-2bb$.

Atque

Atque ita quantitatis $xx - ax + \frac{1}{4}aa$ radix est $x - \frac{1}{2}a$,

& quantitatis $y^3 + 4y^2 - 8y + 4$ radix $yy + 2y - 2$,

& quantitatis

$16a^4 - 24aaxx + 9x^4 + 12bbxx - 16aabb + 4b^4$
radix

$3xx - 4aa + 2bb$

ut e subjectis diagrammatis constare potest.

$xx - ax + \frac{1}{4}aa$ ($x - \frac{1}{2}a$).

xx

o

$-ax + \frac{1}{4}aa$

o o

$9x^4 - 24aa$ $+ 16a^4$
 $+ 12bbxx - 16aabb$ ($3xx - 4aa$
 $+ 2bb$
 $+ 4b^4$

$9x^4$

o

$-24aa$ $+ 16a^4$
 $+ 12bbxx - 16aabb$
 $+ 4b^4$

o

o

$y^4 + 4y^3$ * $- 8y + 4$ ($yy + 2y - 2$)

y^4

o

$4y^3 + 4yy$

o $- 4yy$

$- 4yy - 8y + 4$

o

o

o

Si radicem cubicam ex $a^3 + 3aab + 3abb + b^3$ oportet extrahere, operatio est hujusmodi. Extrahe radicem cubicam primi termini a^3

$a^3 + 3aab + 3abb + b^3$ ($a + b$).

a^3

$3aa$) o

$a^3 + 3aab + 3abb + b^3$

o

o

o

o

nempe a , & pone in quot. Tum, ablato ejus cubo a^3 , dic quoties triplum quadratum ejus, seu $3aa$, continetur in proximo residui termino $3aab$? & prodit b . Quare scribe etiam b in quot, & cubo quoti $a+b$ ablato, restabit nihil. Radix itaque est $a+b$.

Eodem modo radix cubica, si extrahatur ex

$$z^3 + 6z^2 - 40z^3 + 96z - 64, \text{ prodit } z + 2z - 4.$$

Atque ita in altioribus radicibus (i).

CA-

(i) In his quoque insignis est opera Theorematum Newtoniani, nam

160. Extrahere radicem r binomii evecti ad potestatem m est binomium evehere ad potestatem $\frac{m}{r}$. Nempe illud primo evehere ad potestatem m , & deinde ex hac potestate quaerere quantitatem, quæ elata ad potestatem r æquet ipsum binomium evectum ad potestatem m . Ubi m & r exponunt numeros integros & positivos.

161. Sit binomium $p+q$, cujus evecti ad potestatem m quaerenda sit radix r . Hoc nihil aliud est quam de erminare terminos &

coefficientes ipsius $\sqrt[m]{p+q}$. Seu ex dato $\sqrt[m]{p+q}$ invenire terminos expressos per p & q una cum coefficientibus quantitatis, quæ elata ad potestatem r æquet ipsam potestatem $\sqrt[m]{p+q}$. Igitur.

162. Quantitatem $\sqrt[m]{p+q}$ consideramus tanquam constantem ex radice, quæ r . et repetita, continua multiplicatione quantitatem ipsam $\sqrt[m]{p+q}$ progignit.

163. Omnes termini hujus radices debent esse homogenei. Si enim in ea forent termini non homogenei p^s ; p^{s+t} ; qui, quia ducendi sunt, tum in se, tum unus in alium, darent facta non homogenea p^{2s} ; p^{2s+t} ; p^{2s+2t} ; quæ rursus darent alia facta non homogenea; tandem deveniretur ad potestatem ipsam $\sqrt[m]{p+q}$, in qua essent termini non homogenei contra N^m . 93. hujus.

164. Radicis hujus, & ideo singulorum ejus terminorum, exponens debet esse $\frac{m}{r}$; quæ enim probavimus supra (No. 159. hujus) spon-

Tom. I.

te se aptant ad polynomia quævis.

165. Si vis primum terminum ipsius $\sqrt[m]{p+q}$ esse aliquam potestatem litteræ p , ea debet esse

$\sqrt[m]{p}$. Siquidem $\sqrt[m]{p+q}$, si evehatur ad potestatem r debet producere $\sqrt[m]{p+q}$ (No. 160. hujus). Sed potestatis $\sqrt[m]{p+q}$ primus terminus est p (No. 112. hujus), qui nullo alio pacto conficitur quam aliquoties repetita multiplicatione primi termini radices, (ut patet ex

Art. XVII., & No. 88. hujus) & $p \times \sqrt[m]{p}$

$\sqrt[m]{p}$ \times $\sqrt[m]{p}$ \times &c., donec numerus factorum sit r , dat p (No. 88. hujus). Ergo &c.

166. Ideo dixi si vis primum terminum ipsius

$\sqrt[m]{p+q}$ esse aliquam potestatem litteræ p , ea &c., quia penes te est incipere a simbolo q , & tunc

primus terminus esset q . Infra videbimus quando ad arbitrium incipere possis ab alterutra specie, & quando debeas ab hac potius quam ab illa initium ducere. Interea supponemus nos incipere a p , quæ litera exponet ambigue illam, a qua statujimus initium facere.

167. Termini ipsius $\sqrt[m]{p+q}$ erunt quales invenimus supra (No. 124. hujus) pro m ponendo $\frac{m}{r}$; nempe

$$\frac{m}{r}; p; p^{\frac{m}{r}-1}; q; p^{\frac{m}{r}-2}; q^2; p^{\frac{m}{r}-3}; q^3; p^{\frac{m}{r}-4}; q^4; \&c.$$

H

Quar

Quantitas $\sqrt[m]{p+r}$ est radix r potestatis m ortæ a binomio $p+r$. Sunt autem bini termini ipsius $\sqrt[m]{p+r^m}$ ut p ad q (No. 116. hujus). Scilicet bini termini potestatis sunt ut bini termini radicis. Ergo bini termini radicis r ipsius $\sqrt[m]{p+r^m}$ sunt ut bini termini potestatis $\sqrt[m]{p+q^m}$; nempe ut p ad q . Atqui primus terminus hu-

jus radicis est $\sqrt[m]{p}$ (No. 174. hujus). Igitur,

quærendo quartam post p ; q ; $\sqrt[m]{p}$; ea erit $\sqrt[m]{p^m} = p$; q ; qui erit secundus terminus. Tertius Terminus erit quarta proportionalis post

$$p; q; \sqrt[m]{p} = I; q; \text{ id est } \sqrt[m]{p^m} = p; q^2.$$

168. Radix in polynomii cuiusvis, tot habere potest terminos quot sunt unitates in radice in numeri terminorum in polynomio.

Habeat polynomium terminos numero t ; radix autem terminos numero x . Erit $x^m = t$

(No. 92. & 115. hujus). Ergo $x = \sqrt[m]{t}$. Si ergo extrahi potest radix m ipsius t , & si polynomium propositum est rationale, inventus & definitus erit numerus terminorum, quibus consistere debet radix, quæ alioquin se extendet ad infinitum terminorum numerum; scilicet radix accurate reperiri non poterit, sed quædam terminorum series, quæ quo magis procedetur, eo proprius ad veritatem accedet.

169. Ut habeatur numerus terminorum, quibus constat polynomium propositum, iidem termini, qui per coefficientem in unum coacti sunt, pro pluribus sunt computandi, ratione habita ad coefficientem. Sic in $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ sunt octo termini. Cum ergo numerus terminorum, quibus radix consistat, sit indefinitus, & tamen hæc radix evehenda sit ad potestatem r , res redit ad infinitomium ad potestatem datam elevandum.

170. Terminus generalis ipsius $\sqrt[m]{p+q}$ habet eundem coefficientem ac terminus generalis

ipsius $\sqrt[m]{p+r}$, si modo pro $I; 2; 3$, ex m , demas $I. 2r. 3r. \&c.$

Jam termini erunt p^m ; $p^{m-1}q$; $p^{m-2}q^2$; &c. Coefficientes determinandi sunt A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; &c., ita ut tota quantitas

$$\begin{aligned} &\sqrt[m]{p+r} \text{ evadat} \\ &\frac{p^m}{r} + A \frac{p^{m-1}}{r} + B \frac{p^{m-2}}{r} + q^2 + \\ &C \frac{p^{m-3}}{r} + D \frac{p^{m-4}}{r} + q^4 + \&c. \\ &\text{Nunc } \sqrt[m]{p+q^m} \text{; id est} \\ &p^m + m p^{m-1} q + \frac{m(m-1)}{1.2} p^{m-2} q^2 + \\ &\frac{m(m-1)(m-2)}{1.2.3} p^{m-3} q^3 + \&c. \end{aligned}$$

debet æquare ipsam $\sqrt[m]{p+r}$ evectam ad potestatem r . Nempe

$$\begin{aligned} &p^m + r A p^{m-1} q + \\ &\frac{r}{1.2} B p^{m-2} q^2 \} \\ &+ r C p^{m-3} q^3 \\ &+ r. r = I \quad A B p^{m-3} q^3 \\ &+ \frac{r. r = I. r = 2}{1.2.3} A^2 p^{m-3} q^3 \\ &+ r D p^{m-4} q^4 + \&c. \\ &+ r. r = I \quad A C p^{m-4} q^4 + \&c. \\ &+ \frac{r. r = I}{1.2} B^2 p^{m-4} q^4 + \&c. \\ &+ \frac{r. r = I. r = 2}{1.2} A^2 B p^{m-4} q^4 + \&c. \\ &+ \frac{r. r = I. r = 2. r = 3}{1.2.3.4} A^3 p^{m-4} q^4 + \&c. \end{aligned}$$

Sed quantitates ipsæ p^m ; $p^{m-1}q$; $p^{m-2}q^2$ &c., æquales sunt in

$$\sqrt[m]{p+q^m} \text{ \& in } \sqrt[m]{p+r} \text{ evectæ ad potestatem } r; \text{ potestates ipsæ debent esse æquales, quare \& coefficientes sunt æquales. Est igitur}$$

$$rA = m; \text{ \& } A = \frac{m}{r}$$

$$rB + \frac{r \cdot r - 1}{1 \cdot 2} A^2 = \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2}; \text{ aut}$$

$$2rB + r^2 - r \times \frac{m^2}{r^2} = m^2 - m,$$

vel

$$2r^2 B + m^2 r - m^2 = m^2 r - m r;$$

$$2rB = m^2 - m r; \text{ atque } B = \frac{m \cdot m - r}{1 \cdot 2 \cdot r^2}$$

Et sic de singulis. Quare constat propositum.

171. Ergo terminus generalis ipsius $\sqrt[r]{p + q}$ est

$$\frac{m \cdot m - r \cdot m - 2r \dots m - rs + r}{r \cdot 2 \cdot r \cdot 3 \cdot r \dots m r - sr} \sqrt[r]{p} - \frac{m}{r} q^s$$

ex quo facile potest deduci formula pro qualibet radice cujusvis potestatis extrahenda, dummodo pro s ponas per vices 0; 1; 3; &c; & oberves in determinatione coefficientium quæ observata fuerunt (N^o. 124. &c. hujus).

Ista autem formula est hujusmodi

$$\sqrt[r]{p} + \frac{m}{r} \sqrt[r]{p} \sqrt[r]{q} + \frac{m \cdot m - r}{r \cdot 2 \cdot r} \sqrt[r]{p} \sqrt[r]{q}^2$$

$$+ \frac{m \cdot m - r \cdot m - 2r}{r \cdot 2 \cdot r \cdot 3r} \sqrt[r]{p} \sqrt[r]{q}^3 + \&c.$$

sive

$$\sqrt[r]{p} + \frac{m}{r} \sqrt[r]{p} \sqrt[r]{q} + \frac{m \cdot m - r}{r \cdot r} \sqrt[r]{p} \sqrt[r]{q}^2$$

$$+ \frac{m \cdot m - r \cdot m - 2r}{r \cdot r} \sqrt[r]{p} \sqrt[r]{q}^3 + \&c.$$

quæ priorem recuperat formam pro $\frac{m}{r}$ ponendo m , quod symbolum potest exponere numeros fractos æque ac integros.

CAPUT OCTAVUM.

DE REDUCTIONE FRACTIONUM ET RADICALIUM.

Præcedentibus operationibus inservit reductio fractarum & radicalium quantitatum, idque vel ad minimos terminos vel ad eandem denominationem.

ARTICULUS I.

DE REDUCTIONE FRACTIONUM

ad minimos terminos.

LXV. *Fractiones ad minimos terminos reducuntur dividendo numeratores ac denominatores per maximum communem divisorem (k).*

Sic

(k) 171. Hic Canon supponit denominatorem, ac numeratorem ductos esse in eandem quantitatem, id est, reliquam fractionem duarum in fractionem, cujus denominator, & numerator sunt æquales, atque quantitas in se

ipsa semel continetur, aut per se ipsa divisa dat unitatem, quæ multiplicans quantitatem, eam non mutat, ergo post hanc reductionem fractiones eædem manent.

Sic

Sic fractio $\frac{aac}{bc}$ reducitur ad simpliciore $\frac{aa}{b}$ dividendo utrumque aac & bc per c ;
 & $\frac{203aac}{667bc}$ reducitur ad simpliciore $\frac{203}{667}$ dividendo utrumque 203 & 667 per 29 ;
 & $\frac{203aac}{667bc}$ reducitur ad $\frac{7aa}{23b}$ dividendo per $29c$.

Atque ita $\frac{6a' - 9acc}{6aa + 3ac}$ evadit $\frac{2aa - 3cc}{2a + c}$ dividendo per $3a$.

Et $\frac{a' - aab + abb - b'}{aa - ab}$ evadit $\frac{aa + bb}{a}$ dividendo per $a - b$.

Et hac methodo termini post multiplicationem vel divisionem plerumque abbreviari possunt. Quemadmodum si multiplicare oportet $\frac{2ab^3}{3ccd}$ per $\frac{9acc}{bdd}$, vel id dividere per $\frac{9acc}{bdd}$, prodibit $\frac{18aab^3cc}{3bccd}$, & per reductionem, $\frac{6aabb}{d}$.

Sed in hujusmodi casibus præstat ante operationem concinnare terminos, dividendo per maximum communem divisorem quos postea dividere oportet. Sic in allato exemplo si dividam $2ab^3$ & bdd per communem divisorem b , & $3ccd$ ac $9acc$ per communem divisorem $3cc$, emerget fractio $\frac{2abb}{d}$ multiplicanda per $\frac{3a}{d}$ vel dividenda per $\frac{dd}{3a}$, procedente tandem $\frac{6aabb}{d}$ ut supra. Atque ita $\frac{aa}{c}$, in $\frac{c}{b}$ evadit $\frac{aa}{1}$ in $\frac{1}{b}$ seu $\frac{aa}{b}$. Et $\frac{aa}{c}$ divisa per $\frac{b}{c}$ evadit aa divisa per b seu $\frac{aa}{b}$. Et $\frac{a' - axx}{xx}$ in $\frac{cx}{aa + ax}$ evadit $\frac{a - x}{x}$ in $\frac{c}{1}$ seu $\frac{ac}{x} - c$. Et 28 divis. per 7 evadit 4 divis. per 7 , seu 12 .

ARTICULUS II.

De inventione Divisorum. (d)

LXVI. **H**Uc spectat inventio divisorum per quos quantitas aliqua dividi possit.

Si quantitas simplex est, divide eam per minimum ejus divisorem, & quotum per minimum divisorem ejus, donec quotus restet indivisibilis, & omnes quantitates

$$\text{Sic } \frac{aac}{bc} = \frac{aa}{b} \times \frac{c}{c}; \text{ sed } \frac{c}{c} = 1,$$

$$\text{ergo } \frac{aac}{bc} = \frac{aa}{b} \times 1 = \frac{aa}{b}$$

(d) 172. Quantitates, in quas alia quantitas resolvi potest, dicuntur ejus *Divisores*.

173. Hos voco *simplices*, cum dividi nequeant.

174. Unitas est semper inter divisores.

175. *Compositos* appello divisores, qui adhuc dividi possunt.

Hæc regula pendet etiam ex EUCLID. 35.

VII.

tatis divisores primos habebis (*m*). Dein horum divisorum singulos binos, ternos, quaternos, &c. duc in se, & habebis etiam omnes divisores compositos.

Ut si numeri 60 divisores omnes desiderentur, divide eum per 2, & quotum 30 per 2, & quotum 15 per 3 & restabit quorundam indivisibilis 5. Ergo divisores primi sunt 1, 2, 3, 5: Ex binis compositi 4, 6, 10, 15: Ex ternis 12, 20, 30. ex omnibus 60 (*n*). Rursus si quantitatis 21abb divisores omnes desiderentur, divide eam per 3, & quotum 7abb per 7, & quotum abb per a, & quotum bb per b & restabit quotus primus b. Ergo divisores primi sunt 1, 3, 7, a, b, b; ex binis compositi 21, 3a, 3b, 7a, 7b, ab, bb; ex ternis 21a, 21b, 3ab, 3bb, 7ab, 7bb; abb; ex quaternis 21ab, 21bb, 3abb, 7abb; ex quinis 21abb (o) Eodem modo ipsius 2abb — 6aac divisores omnes sunt 1, 2, a, bb — 3ac, 2a, 2bb — 6ac, abb — 3aac, 2abb — 6aac.

LXVII.

176 Hi ergo in simplices resolvi possunt, & iis constant.

(*m*) 177. Hujus regulæ ratio patet per se; dico nunc, quod si duo, aut plures ex divisoribus simplicibus, in vicem ducantur, hoc factum dividet quantitatem datam.

Data quantitas sit *p*, ejus divisores simplices *a, b, c, f*, erit ergo $p = abc f$, que dividi potest per *ab, abc, abcf*.

(*n*) 178. Quære divisores omnes simplices scribe unitatem, unum ex divisoribus repetitis, si qui sunt, ejus quadratum, &c., usque ad ejus maximam potestatem, hæc facta duc in alium ex divisoribus repetitis, si adest; unde habebis secundam seriem, hanc seriem duc in eundem divisorem; & sic toties quoties habetur hic divisor; hinc omnia hæc facta, per alterum &c.

Sic in exemplo præcedente divisor 2 bis invenitur, scribe ergo in prima serie 1, 2, 2 x 2. quam seriem duc in 3, habeo secundam seriem 3, 2 x 3, 2 x 2 x 3, & quia hic numerus semel reperitur, ambas duc in 5, invenio 5, 2 x 5, 2 x 2 x 5, 3 x 5, 2 x 3 x 5, 2 x 2 x 2 x 3 x 5.

Series $\left\{ \begin{array}{l} \text{I.} \\ \text{II.} \\ \text{III.} \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 1. \quad 2. \quad 2 \times 2 \\ 2. \quad 2 \times 3. \quad 2 \times 2 \times 3 \\ 5. \quad 2 \times 5. \quad 2 \times 2 \times 5. \quad 3 \times 5. \\ \quad 2 \times 3 \times 5 \quad 2 \times 2 \times 3 \times 5. \end{array} \right.$

(o) 179 Sic secundi exempli divisores simplices sunt 3, 7, a, b, ergo scribe in prima serie 1, b, bb. hanc duc per 3, habeo secundam, has duas per 7 quod efficit tertiam, has tres per a, unde exurgit quarta.

Series $\left\{ \begin{array}{l} \text{I.} \\ \text{II.} \\ \text{III.} \\ \text{IV.} \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 1. \quad b \quad bb \\ 3. \quad 3b \quad 3bb \\ 7. \quad 7b \quad 7bb \quad 21 \quad 21b \quad 21bb \\ a. \quad ab. \quad abb. \quad 3a. \quad 3ab. \quad 3abb. \quad 7a. \\ 7ab. \quad 7abb. \quad 21a. \quad 21ab. \quad 21abb. \end{array} \right.$

Detur quantitas *a³b³cc*, scribe in prima serie 1, a, a², a³, quia a in data quantitate evecta est ad tertiam potestatem; hanc primam seriem duc in b, & habeo secundam *b, ab, aab, a³b*, tum quia b est duarum dimensionum, secundam hanc rursus duc in b, unde excudo tertiam *bb, abb, aabb, a³bb*, has tres duc in c quod procreat quartam *c, ac, aac, a³c, bc, abc, aabc, a³bc, bbc, abbc, aabbc, a³b³cc*, & hanc rursus in c ex quo fit quinta *cc, acc, aacc, a³cc, bcc, abcc, aabcc, a³b³cc, lbcc, abb³cc, aabb³cc, a³b³ccc*.

Series $\left\{ \begin{array}{l} \text{I.} \\ \text{II.} \\ \text{III.} \\ \text{IV.} \\ \text{V.} \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 1. \quad a \quad . \quad aa \quad . \quad a^3 \\ b. \quad ab \quad . \quad a^2b \quad . \quad a^3b \\ b^2. \quad ab^2. \quad a^2b^2. \quad a^3b^2 \\ c. \quad ac \quad . \quad a^2c \quad . \quad a^3c \\ bc. \quad abc \quad . \quad a^2bc \quad . \quad a^3bc \\ b^2c. \quad ab^2c \quad . \quad a^2b^2c \quad . \quad a^3b^2c \\ c^2. \quad ac^2 \quad . \quad a^2c^2 \quad . \quad a^3c^2 \\ bc^2. \quad abc^2 \quad . \quad a^2bc^2 \quad . \quad a^3bc^2 \\ b^2c^2. \quad ab^2c^2 \quad . \quad a^2b^2c^2 \quad . \quad a^3b^2c^2. \end{array} \right.$

Ut perspicui possit, utrum omnes divisores sic inventi sint, libet demonstrare sequens theorema.

180. Numerus omnium divisorum ipsius $a^m b^n c^p$, &c. est $(m+1)(n+1)(p+1)$ &c.

Nam

H 3

LXVII. Si quantitas postquam divisa est per omnes simplices divisores manet composita & suspicio est eam compositum aliquem divisorem habere, dispone eam secundum dimensionem literæ alicujus quæ in ea est, & pro litera illa substitue sigillatim tres vel plures terminos hujus progressionis arithmeticæ, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ac terminos totidem resultantes una cum omnibus eorum divisoribus statue e regione correspondentium terminorum progressionis, positis divisorum signis tam affirmativis quam negativis. Dein e regione etiam statue progressionem arithmeticam, quæ per omnium numerorum divisores percurrunt pergentes a majoribus terminis ad minores eodem ordine, quo termini progressionis 3, 2, 1, 0, — 1, — 2 pergunt, & quarum termini differunt vel unitate vel numero aliquo qui dividit altissimum terminum propositæ quantitatis. Si qua occurrit ejusmodi progressio, sic termini ejus, qui stat e regione termini 0 progressionis primæ, divisus per differentiam terminorum, & cum signo suo annexus literæ præfatæ, componet quantitatem per quam divisio tentanda est.

Ut si quantitas sit $x^3 - xx - 10x + 6$; pro x substituendo sigillatim terminos progressionis 1, 0, — 1, orientur numeri — 4, 6, + 14, quos cum omnibus eorum divisoribus colloco e regione terminorum progressionis 1, 0, — 1 hoc modo.

$$\begin{array}{r|l|l|l} 1 & 4 & 1.2.4. & + 4. \\ 0 & 6 & 1.2.3.6 & + 3. \\ -1 & 14 & 1.2.7.14 & + 2. \end{array}$$

Dein quoniam altissimus terminus x^3 per nullum numerum, præter unitatem, divisibilis est, quæro in divisoribus progressionem cujus termini differunt unitate, & a superioribus ad inferiora pergendo decrescunt perinde ac termini progressionis lateralis 1, 0, — 1. Et hujusmodi progressionem unicam tantum invenio nempe 4, 3, 2, cujus itaque terminum + 3 seligo qui stat e regione termini 0 progressionis primæ 1, 0, — 1, tentoque divisionem per $x + 3$. Et res succedit, prodeunte $xx - 4x + 2$.

Rursus si quantitas sit $6y^3 - y^3 - 21yy + 3y + 20$; pro y substituo sigillatim 2, 1, 0, — 1, — 2, & numeros resultantes 30, 7, 20, 3, 34 cum omnibus eorum divisoribus e regione colloco ut sequitur.

$$\begin{array}{r|l|l|l} 2 & 30 & 1.2.3.5.6.10.15.30 & + 10. \\ 1 & 7 & 1.7 & + 7. \\ 0 & 20 & 1.2.4.5.10.20 & + 4. \\ -1 & 3 & 1.3 & + 1. \\ -2 & 34 & 1.2.17.34 & - 2. \end{array}$$

Et

Nam ex regula, termini primæ seriei erunt numero $m + 1$: hæc series totidem dabit sibi æquales, quot sunt unitates in n , vel tot, quot sunt unitates in $(m + 1)n$, cui adde terminos primæ seriei, habebis pro numero omnium $(m + 1)n + (m + 1)$, sed $m + 1 = 1$ ($m + 1$), erit ergo hi numerus $(m + 1)(n + 1)$ ($m + 1$) = $(m + 1)(n + 1)$ (EVL. I. II)

atque hæc series rursus totidem series dabit sibi numero terminorum æquales, quot sunt unitates in p ; erunt ergo termini ultimæ seriei $(m + 1)$, $(n + 1)p$, his adde terminos secundæ, ac primæ, & erit omnium numerus $(m + 1)(n + 1)p + 1$ ($m + 1$) ($n + 1$) = $(m + 1)(n + 1)(p + 1)$ Q. E. D.

Et in divisoribus hanc solam esse animadverto decrefcentem progressionem arithmetica $+10, +7, +4, +1, -2$. Hujus terminorum differentia 3 dividit altissimum quantitatis terminum $6y^4$. Quare terminum $+4$ qui stat e regione termini 0, divisum per differentiam terminorum 3 adjungo literæ y , tenoque divisionem per $y + \frac{1}{3}$, vel, quod perinde est, per $3y + 4$, & res succedit prodeunte $2y^3 - 3yy - 3y + 5$.

Atque ita si quantitas sit

$$24a^5 - 50a^4 + 49a^3 - 140aa + 64a + 30;$$

operatio erit ut sequitur.

2	42	1.2.3.4.5.6.7.14.21.42	+ 3. + 3. + 7.
1	23	1.2.3.	+ 1. — 1. + 1.
0	30	1.2.3.5.6.10.15.30.	— 1. — 5. — 5.
—1	297	1.3.9.11.27.33.99.297.	— 3. — 9. — 11.

Tres occurrunt hic progressionēs, quarum termini $—1, —5, —5$ divisi per differentias terminorum 2, 4, 6, dant tres divisores tentandos $a - \frac{1}{2}$, $a - \frac{1}{4}$ & $a - \frac{1}{6}$. Et divisio per ultimum divisorem $a - \frac{1}{6}$ seu $6a - 5$ succedit prodeunte $4a^4 - 5a^3 + 4aa - 20a - 6$ (e).

Si

DEMONSTRATIO.

CLAR. DAN. BERNOULLI.

{	II qui sunt	II. I. O. — I. — II.
	6	6. 3. 2. 1. 0. — 1. — 2. — 3. 6.
	—9	9. 3. 1. 0. — 1. — 3. — 9.
	—10	10. 5. 2. 1. 0. — 1. — 2. — 5. — 10.

(e) 181. Sit divisor unius dimensionis inventendus hujus quantitatis

(A) $2x^4 + xx + g$,
ponatur ille divisor
(B) $mx + n$,

ubi m , & n , quantitates denotant incognitas, & determinandas. Positis nunc successive in quantitatibus (A), & (B), loco ipsius x numeris progressionem arithmetica formantibus, puta 2. 1. 0. — 1, dabit numerus sequentes 11. 6. — 0. — 10, & (B) acquiret hos valores $2m+n$, $1m+n$, $0m+n$, $1m+n$, (ubi patet coefficientes ipsius m esse numeros assumptos 2. 1. 0. — 1). Cum vero quantitas (B) generaliter dividere debeat quantitatem (A), necesse est ut divisio illa quoque succedat in omni casu particulari, unde oportet ut,

$$P \left\{ \begin{array}{l} -2m+n \\ 1m+n \\ 0m+n \\ 1m+n \end{array} \right\} \text{ sit } \text{æqualis uni ex divisoribus numeri}$$

sed quantitates P sunt arithmetice proportionales, (quia numeri 2. 1. 0. — 1, per constructionem sunt tales,) ergo, & numeri ex prima secunda, tertia, & quarta classe eligendi debent esse arithmetice proportionales; quod est primum NEWTONI assertum. Deinde quia tertius numerus $m+n$, nihil aliud est, quam n , sequitur numerum e regione cyphæ existentem esse æqualem ipsi n , seu numero, quo x aliquoties sumptum augeri debet, quod est alterum NEWTONI assertum.

Tandem si subtrahis $1m+n$, ex $2m+n$, remanet m , quod proin æquale est differentię numerorum arithmetice proportionalium, & ex numeris (Q) selectorum, id quod tertium format assertum NEWTONI, dicentis ipsum x in divisore quæsito toties esse sumendum, quot unitatibus primus terminus progressionis ex (Q) desumptæ secundum superat. @. E. D.

SCHOLIUM.

182. In nostro exemplo numeri arithmetice proportionales, qui ex prima, secunda, tertia, & quarta classe numerorum (Q) desumi possunt, sunt $—1, +1, +3, +5$, quorum tertius

Si nullus occurrit hac methodo divisor, vel nullus qui dividit propositam quantitatem; concludendum erit quantitatem illam non admittere divisorem unius dimensionis. Potest tamen fortasse, si plurium sit quam trium dimensionum, divisorem admittere duarum. Et si ita, divisor ille investigabitur hac methodo.

In quantitate illa pro litera substitue, ut ante, quatuor vel plures terminos progressionis hujus.

$$3, 2, 1, 0, \text{---} 1, \text{---} 2, \text{---} 3,$$

Divisores omnes numerorum resultantium sigillatim adde & subduc quadratis correspondentium terminorum progressionis illius ductis in divisorem aliquem numeralem altissimi termini quantitatis propositæ, & summas differentiasque e regione progressionis colloca. Dein progressionem omnes collaterales nota, quæ per istas summas differentiasque percurrunt. Sit $\pm C$ terminus istiusmodi progressionis qui stat e regione termini 0 progressionis primæ, $\pm B$ differentia quæ oritur subducendo $\pm C$ de termino proxime superiori qui stat e regione termini 1 progressionis primæ, A prædictus termini altissimi divisor numeralis, & l litera quæ in quantitate proposita est, & erit $All \pm Bl \pm C$ divisor tentandus.

Ut si quantitas proposita sit

$$x^4 \text{---} x^3 \text{---} 5xx + 12x \text{---} 6,$$

pro x scribo successive 3; 2; 1; 0; --- 1; --- 2; & prodeuntes numeros

$$39; 6; 1; \text{---} 6; \text{---} 21; \text{---} 26,$$

una cum eorum divisoribus e regione dispo, addoque & subduco divisores terminis progressionis illius quadratis ductisque in divisorem numeralem termini x^4 , qui unitas est, videlicet terminis 9; 4; 1; 0; 1; 4; & summas differentiasque e latere pariter dispo. Dein progressionem, quæ in iisdem obveniunt, e latere etiam scribo, ut sequitur. Harum progressionum terminos 2 & --- 3, qui stant e regione termini 0 progressionis illius quæ in columna prima est, usurpo successive pro $\pm C$, differentias quæ oriuntur

3139

sius 3 stat e regione cyphra, seu om $+n$, unde sequitur $n = 3$, & subtrahendo secundum a primo habetur --- 2, qui erit valor ipsius m , est ergo divisor quaesitus --- $2x + 3$.

Notandum est progressionem arithmeticam, cujus termini sunt aequales, uti semper esset 1. 1. 1. 1. 1, nunquam esse considerandam, quia inde sequetur $m = 0$, quod nunquam contingere potest; sed, si præter talem, adhuc alia progressionem arithmetica ex numeris (2) elici potuissent, plures quam quatuor substitutiones pro x faciendæ sunt, donec

nulla talis, præter uitem, progressio formari possit. Si numeri (2) prorsus nullam suppeditans, indicium est quantitatem propositam non admittere divisorem unius dimensionis. Si, non obstantibus pro x substitutionibus, plures arithmeticae progressionem ex numeris (2) deduci possunt, suspicandum plures quoque divisores propositi satisfacere. Miror quod NEWTONUS semper in recensione numerorum (2) cyphras omiserit, omnes terminos dividendentes, & quandoque necessario considerandas.

3	39	1.3.13.39.	9	—30.—4.6.8.10.12.22.48.	—4. 6.
2	6	1.2. 3. 6.	4	— 2. 1. 2.3.5. 6. 7.10	—2. 3.
1	1	1.	1	0. 2.	0. 0.
0	6	1.2. 3. 6.	0	— 6.—3.—2.—1.1.2.3.6.	2.—3.
—1	21	1.3. 7.21.	1	—20.—6.—2.0.2.4.8.22.	4.—6.
—2	26	1.2.13.26.	4	—22.—9.2.3.5.6.17.30.	6.—9.

subducendo hos terminos de terminis superioribus 0 & 0, nempe — 2 & + 3, usurpo respectively pro $\pm B$; unitatem item pro A ; & x pro l . Et sic pro $A \parallel \pm B \parallel \pm C$, habeo divisores duos tentandos

$$xx + 2x \text{ — } 2 \text{ \& } xx \text{ — } 3x + 3,$$

per quorum utrunque res succedit.

Rurfus si proponatur quantitas

$$3y^5 \text{ — } 6y^4 + y^3 \text{ — } 8yy \text{ — } 14y + 14,$$

Operatio erit ut sequitur. Primo rem tento addendo & subducendo divisores quadratis terminorum progressionis 2, 1, 0, 1 usurpato 1 pro A , sed res non succedit. Quare pro A usurpo

3	170		27		—7. 17
2	38	1.2.19.38	12	—26.—7.10.11.13.14.31.50.	—7. 11
1	10	1.2. 5. 10.	3	— 7.—2. 1. 2. 4. 5. 8.13.	—7. 5
0	14	1.2. 7.14.	0	—14.—7.—2.—1. 1. 2. 7.14.	—7.—1
—1	10	1.2. 5. 10.	3	— 7.—2. 1. 2. 4. 5. 8.13.	—7.—7
—2	190		12		—7.—13

3, alterum nempe termini altissimi $3y^5$ divisorem numeralem, & quadratis istis multiplicatis per 3, hoc est numeris 12; 3; 0; 3; addo subducoque divisores; & progressionem in terminis resultantibus hasce duas invenio —7; —7; —7; —7; & 11; 5; —13; —7. Expeditionis gratia neglexeram divisores extimorum numerorum 170 & 190. Quare continuatis progressionibus sumo proximos earum hinc inde terminos, videlicet —7 & 17 superius, & —7, & —13 inferius, ac tento si subductis his de numeris 27 ac 12, qui stant e regione in quarta columna, differentia dividunt istos 170 & 190 qui stant e regione in columna secunda. Et quidem differentia inter 27 & —7, id est 34, dividit 170; & differentia 12 & —7, id est 19, dividit 190. Item differentia inter 27 & 17, id est 10, dividit 170, sed differentia inter 12 & —13, id est 25, non dividit 190. Quare posteriorem progressionem rejicio. Juxta priorem $\pm C$ est —7, & $\pm B$ nihil; terminis progressionis nullam habentibus differentiam. Quare divisor tentandus

tandus $All \pm B1 \pm C$ erit $3yy + 7$. Et divisio succedit, procedente
 $y^1 - 2yy - 2y + 2$. (q)

LXIX.

(q) 183. Sequitur nunc methodus NEWTONI
 inveniendorum divisorum duarum dimensio-
 num demonstranda. Sit proposita quantitas

$$(C) 3x^3 + 2x^2 + 2xx + 3x - 5,$$

cuius divisor inveniendus sit
 (D) $fx + gx + h$

(ubi f, g, h , sunt quantitates incognitæ, &
 determinandæ.) Positis nunc iterum successively
 pro x numeris arithmetice proportionalibus,
 ut 1, 0. (C) 5. — 11. — 115, &
 pro quantitate (D) habebuntur quantitates
 $1f + 1g + h$, $0f + 0g + h$, $1f - 1g + h$, $4f - 2g + h$
 (ubi probe notandum est coefficientes ipsius f
 esse quadrata numerorum assumptorum 1;
 0; — 1; — 2, & coefficientes ipsius g ,
 esse ipsos hos numeros). Cum autem quan-
 titas (D) generaliter debeat dividere quan-
 titatem (C), oportet, ut divisio illa quoque
 succedat in omni casu particulari, unde

quantitates æquabunt unum ex divisoribus
 numeri

$$\begin{aligned} 1f + 1g + h \\ 0f + 0g + h \\ 1f - 1g + h \\ 4f - 2g + h \end{aligned}$$

qui sunt

$$\begin{aligned} 5.1.0. - 1. - 5. \\ 5.1.0. - 1. - 5. \\ 11.1.0. - 1. - 11. \end{aligned}$$

$$115.23.5.1.0. - 1. - 5. - 23. - 115.$$

& ideo quantitates

$$F \left\{ \begin{aligned} 1g + h \\ 0g + h \\ 1g + h \\ - 2g + h \end{aligned} \right.$$

æquabunt

vel vel vel vel

$$H \left\{ \begin{aligned} 5 - 1f & | 1 - 1f & | 0 - 1f & | -1 - 1f & | -5 - 1f & | \\ 5 - 0f & | 1 - 0f & | 0 - 0f & | -1 - 0f & | -5 - 0f & | \\ 11 - 1f & | 1 - 1f & | 0 - 1f & | -1 - 1f & | -11 - 1f & | \\ 115 - 4f & | 23 - 4f & | 5 - 4f & | 1 - 4f & | 0 - 4f & | \end{aligned} \right.$$

vel

$$1 - 1f | 1 - 5f | 1 - 23f | 1 - 115f$$

Sed quantitates (F) sunt arithmetice pro-
 portionales; ergo & quantitates ex (H) se-
 ligendæ, debent esse tales; patet insuper quod

f esse debeat numerus submultiplicus ipsius ter-
 narii, seu (ut generaliter rem exprimam) num-
 eri maximo termino quantitatis (C) præ-
 fixi, unde suppono primum $f = 1$, & quæro
 divisorem, ut supra; sed nullum invenio. Ex
 quo iudico quod f nequit esse $= 1$, ergo sup-
 pono $f = 3$, quo facta, eruo ex quantitati-
 bus (H) numeros arithmetice proportionales
 hos 2. 5. 8. 11. quorum secundus et regione
 quantitatis $0g + h$ existentis, est $= h$, &
 differentia inter primum, & secundum, quæ
 est $= 3 = g$, atque proin

$$3xx + gx + h = 3xx - 3x + 5,$$

quæ omnia NEWTONI regulæ sunt conformia.
 Q. E. D.

S C H O L I U M.

184. Cum quantitas f hoc modo, non nisi
 tentando cruarur, clarum est regulam hanc tam
 esse operosam, ut ad praxin revocari nequeat
 quandoque; sic se proponeretur quantitas, cuius
 maximo termino præfixus foret numerus 60, ejus-
 que quantitatis divisor dimensionum duarum qua-
 rendus esset, undecim substitutiones pro f facien-
 da essent, antequam præcisa responsio dari posset:
 dem raro sufficiunt quatuor substitutiones pro x ,
 ut nulla alia progressio arithmetica, præter uti-
 lem, ex quantitatibus (H) deduci possit, unde
 plures sæpe substitutiones pro x ponendæ, quæ om-
 nia, ut in effectum deducerentur, infinitum quasi
 laborem requirerent.

Notandum hic quamlibet progressionem arithme-
 ticam, siue differentia eius sit nulla siue aliqua,
 subsistere posse, nihil enim impedit, quinominus se-
 cundus divisoris quæstus terminus æqualis esse possit
 cyphræ.

185. NEWTONUS, adhibitis hæc duabus regu-
 lis, addit methodum suam etiam ad altio-
 res divisores inveniendos se extendere. Ver-
 um illud est, & demonstratio facile ex huc-
 usque dictis patet, sed non termini arithmeti-
 ce proportionales essent quaerendi ex quanti-
 tatis (H), alio etiam modo construendis,
 sed termini quorum differentia primæ, se-
 cundæ, &c. sint arithmetice proportionales.
 Cum vero tales numeri non in oculis currant,
 sicut numeri simpliciter arithmetice proportio-
 nales; imo, quasi omni adhibita opera digno-
 sci nequeant, impossibile est regulas illas in
 effectum deducere. Operæ pretium tamen erit,
 ostendere regulam a modo dicta diversam, qua
 divisor

LXIX. Si nullus inveniri potest hoc pacto divisor qui succedit, concludendum est quantitatem propositam non admittere divisorem duarum dimensionum. Posset eadem methodus extendi ad inventionem divisorum plurium, quærendo in prædictis summis differentiisque progressiones non arithmeticas quidem, sed alias quasdam quarum terminorum differentiarum primæ, secundæ, tertiæ, &c. sunt in arithmetica progressione: At in his Tyro non est detinendus.

LXX. Ubi in quantitate proposita due sunt literæ, & omnes ejus termini ad dimensiones æque altas ascendunt; pro una istarum literarum pone unitatem, per regulas præcedentes quære divisorem, ac divisoris hujus comple deficientes dimensiones restituendo literam illam pro unitate.

Ut si quantitas sit

$$6y^4 - cy^3 - 21cyy + 3c^2y + 2c^4$$

ubi termini omnes sunt quatuor dimensionum; pro c pono 1, quantitas evadit

$$6y^4 - y^3 - 21yy + 3y + 20,$$

cujus

divisor duarum dimensionum eruitur, & quidem scientifice, id est abique ut necesse sit numerum f tentando determinare, quo ipso simul patebit quomodo NEWTONUS progressiones terminorum, quorum differentiarum sunt arithmetice proportionales applicare possit.

Sit itaque quantitas.

$$(S) 4x^4 + 2xx - 16x + 7$$

(talem quantitatem commoditatis calculi causa eligo, quamvis proprie quantitas plurium dimensionum assumenda esset, quia quantitas trium dimensionum divisa per quantitatem unius dimensionis, eo ipso, pro quotiente exhibet divisorem duarum dimensionum) cujus divisor quæsitus sit (T) $fx + gx + h$, dico f, g, h tali modo determinari posse. Ponatur x successive æqualis numeris arithmetice proportionalibus, & (quod in hac regula essentialis est, secus ac in præcedentibus, unitate differentibus). Sint numeri hi, 2. 1. 0. - 1. - 2, qui collocentur uti in apposita figura videre cit.

$$C \begin{cases} \{ & 2 & + & 15 & | & 15.5.3 & + \\ & 1 & - & 3 & | & 3.1.0 & - \\ & 0 & + & 7 & | & 7.1.0 & - \\ & -1 & + & 21 & | & 21.7.3 & + \\ & -2 & + & 15 & | & 15.5.3 & + \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} 1.0. - 1. - 3. - 5. - 15. \\ 1. - 3. \\ 1. - 7. \\ 1.0. - 1. - 3. - 7. - 21. \\ 1.0. - 1. - 3. - 5. - 15. \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 5 \\ -3 \\ -7 \\ -7 \\ -3 \end{array} \right. \begin{array}{l} A \\ 8 \\ 4 \\ 0 \\ -4 \end{array}$$

quibus apponantur numeri ex quantitate S post substitutionem resultantis nempe 15; - 3; + 7, + 21; + 15, postea apponantur horum numerorum divisores, uti in præsentè schedamate. Ex hisce divisorum classibus eligantur tales numeri, ut eorum differentiarum sint arithmetice proportionales, sique ponantur in latere: tales numeri in nostro exemplo sunt 5; - 3; - 7; - 7; - 3, quorum differentiarum arithmetice proportionales 8. 4. 0. - 4, iterum ad latus ponantur, sed uno loco inferius, quo factò erit f æqualis dimidiæ differentiarum terminorum arithmetice proportionalium, postea que inventus valor ipsius f subtrahatur a termino progressions (A) e regione cypharæ progressions (C) existente, erit residuum æquale ipsi g , & tandem h erit æqualis termino progressions (B) e regione cypharæ progressions (C) existenti, unde in nostro exemplo

$$f = \frac{8-4}{2} = 2, \quad g = 4 - 2 = 2, \quad \&$$

$h = - 7$, adeoque divisor quæsitus est $2xx + 2x - 7$, qui revera quantitatem propositam dividit. Hæc regula longe esset præferenda regulæ NEWTONI, nisi difficulter admodum termini progressions (B) eruerentur.

cujus divisor, ut supra, est $3y + 4$, & completa deficiente dimensione posterioris termini per dimensionem, c , fit $3y + 4c$ divisor quæsitus. Ita si quantitas sit

$$\begin{array}{r} x^4 - bx^3 - 5bbxx + 12b^2x - 6b^3; \\ \text{posito } 1 \text{ pro } b, \text{ \& quantitates resultantis} \\ x^4 - x^3 - 5xx + 12x - 6 \end{array}$$

invento divisore $xx + 2x - 2$, compleo ejus deficientes dimensiones per dimensiones b , & sic habeo divisorem quæsitum $xx + 2bx - 2bb$.

LXXI. Ubi in quantitate proposita tres vel plures sunt literæ, & ejus termini omnes ad easdem dimensiones ascendunt; potest divisor per præcedentes regulas inveniri; sed expeditius hoc modo:

Quære omnes divisores terminorum omnium in quibus literarum aliqua non est, item terminorum omnium in quibus alia aliqua literarum non est, pariter & omnium in quibus tertia litera, quartaque, & quinta non est, si tot sunt literæ. Et sic percurre omnes literas. Et e regione literarum colloca divisores respective. Dein vide si in serie aliqua divisorum per omnes literas pergente, partes omnes unicam tantum literam involventes tot vicibus reperiantur quot sunt literæ una dempta in quantitate proposita: Et partes duas literas involventes tot vicibus quot sunt literæ demptis duabus in eadem quantitate. Si ita est; partes istæ omnes sub signis suis semel sumptæ erunt divisor quæsitus.

Ut si proponatur quantitas

$$\begin{array}{r} 12x^3 - 14b^2x^2 - 12bb^2 + 8b^3 \\ + 9c \quad + 8cc \quad + 6c^2 \\ \quad \quad \quad + 6c^3 \end{array}$$

terminorum

$$8b^3 - 12bbc - 4bcc + 6c^3$$

in quibus non est x , divisores unius dimensionis per præcedentes regulas inventi erunt $2b - 3c$ & $4b - 6c$;

terminorum

$$12x^3 + 9cxx + 8ccx + 6c^3$$

in quibus non est b , divisor unicus $4x + 3c$;

ac terminorum

$$12x^3 - 14bxx - 12bbx + 8b^3$$

in

in quibus non est c , divisores $2x - b$ & $4x - 2b$. Hos divisores e regione literarum x, b, c dispono ut hic vides.

$$\begin{array}{l|l} x & 2b - 3c. \quad 4b - 6c. \\ b & 4x + 3c. \\ c & 2x - b. \quad 4x - 2b. \end{array}$$

Cum tres sint literæ & divisorum partes singulæ non nisi singulas literas involvant, in serie divisorum debent partes illæ bis reperiri. At divisorum $4b - 6c$ & $2x - b$ partes $4b, 6c, 2x, b$ non nisi semel occurrunt. Extra divisorem illum, cujus sunt partes, non reperiuntur. Quare divisores illos negligo. Restant tantum tres divisores $2b - 3c, 4x + 3c$ & $4x - 2b$. Hi in serie sunt per omnes literas x, b, c pergente, & eorum partes singulæ $2b, 3c, 4x$, bis reperiuntur in ipsis ut oportuit, idque cum signis iisdem, si modo signa divisoris $2b - 3c$ mutantur, & ejus loco scribatur $2b + 3c$. Nam signa divisoris cujuscvis mutare licet. Sumo itaque horum partes omnes $2b, 3c, 4x$ semel sub signis suis, & aggregatum $-2b + 3c + 4x$ divisor erit quem invenire oportuit. Nam si per hunc dividas quantitatem propositam prohibet $3xx - 2bx + 2cc - 4bb$.

Rursus si quantitas sit

$$\begin{array}{r} 12x^2 - 10a - 26aa + 24a^3 - 4a^2b + 12a^2b \\ - 9b \quad x^2 + 12ab \quad x^2 - 8a^2b \quad x^2 + 6a^2b^2 \quad x + 32a^2b^2 \\ + 6bb - 8ab^2 \quad x - 12ab^2 \quad x + 18b^4 - 12b^2 \end{array}$$

divisores terminorum, in quibus x non est, colloco e regione x ; illos terminorum, in quibus a non est, e regione a ; & illos terminorum, quibus b non est, e regione b , ut hic vides.

$$\begin{array}{l|l} x & b, 2b, 4b, aa + 3bb, 2aa + 6bb, 4aa + 12bb, bb - 3aa, \\ & 2bb - 6aa, 4bb - 12aa. \\ a & 4xx - 3bx + 2bb, 12xx - 9bx + 6bb. \\ b & x, 2x, 3x - 4a, 6x - 8a, 3xx - 4ax, 6xx - 8ax, \\ & 2xx + ax - 3aa, 4xx + 2ax - 6aa. \end{array}$$

Dein illos omnes qui sunt unius dimensionis rejiciendos esse sentio, quia simplices $b, 2b, 4b, x, 2x$, & partes compositorum $3x - 4a, 6x - 8a$, non nisi semel in omnibus divisoribus reperiuntur; tres autem sunt literæ in quantitate proposita, & partes illæ unicam tantum involvunt, atque adeo bis reperiri deberent. Similiter divisores duarum dimensionum $aa + 3bb, 2aa + 6bb, 4aa + 12bb, bb - 3aa$ & $4bb - 12aa$ rejicio, quia partes eorum $aa, 2aa, 4aa, bb$ & $4bb$, unicam tantum literam a vel b involventes, non nisi semel reperiuntur. Divisoris autem $2bb - 6aa$, qui solus restat e regione x , partes $2bb$ & $6aa$ quæ similiter unicam tantum literam involvunt, iterum reperiuntur, nempe pars $2bb$ in divisore

$$+ cx^3 - acxx - 8aacx + 6a^3c$$

in quibus c unius est tantum dimensionis, & terminorum reliquorum

$$x^4 - 3ax^3 - 8aaxx + 18a^3x - 8a^4$$

ac divisor ille, nempe $xx + 2ax - 2aa$, dividet totam quantitatem.

LXXIV. Ceterum maximus duorum numerorum divisor communis, si prima fronte non innotescit, invenitur perpetua ablatione minoris de majori & reliqui de ablato. Nam questus erit divisor qui tandem nihil relinquit. *

Sic ad inveniendum maximum diviforem numerorum 203 & 667, aufer ter 203 de 667, & reliquum 58 ter de 203, & reliquum 29 bis de 58, restabitque nihil: quod indicat 29 esse diviforem quæsitum.

LXXV. Haud secus in speciebus communis divisor, ubi compositus est, invenitur subducendo alterutram quantitatem, aut multiplicem ejus de altera: Si modo & quantitates illæ & residuum juxta literæ alicujus dimensiones, ut in divisione ostensum est, ordinentur, & qualibet vice concinnentur dividendo ipsas per suos omnes divifores qui aut simplices sunt, aut singulos terminos, instar simplicium, dividunt.

Sic ad inveniendum communem diviforem numeratoris ac denominatoris fractionis hujus.

$$\frac{x^4 - 3ax^3 - 8aaxx + 18a^3x - 8a^4}{x^3 - axx - 8aax + 6a^3},$$

multiplica denominatorem per x , ut primus ejus terminus evadat idem cum primo termino numeratoris. Dein aufer, & restabit $-2ax^3 + 12a^2x - 8a^3$, quod concinnatum dividendo per $-2a$, evadit $x^3 - 6aax + 4a^2$. Hoc aufer de denominatore & restabit $-axx - 2aax + 2a^3$. Quod idem per $-a$ divisum fit $xx + 2ax - 2aa$. Hoc autem per x multiplica, ut ejus primus terminus evadat idem cum primo termino novissimi ablatis $x^3 - 6aax + 4a^2$, de quo auferendum est; & restabit $-2aax - 4aax + 4a^3$, quod per $-2a$ divisum fit etiam $xx + 2ax - 2aa$. Et hoc cum idem sit ac superius residuum, proindeque ablatum relinquat nihil, quæsitus erit divisor per quem fractio proposita, facta numeratoris ac denominatoris divisione, reduci potest ad simpliciozem, nempe ad $\frac{xx - 5ax + 4aa}{x - 3a}$.

Atque ita si habeatur fractio

* Eucl. 2. VII.

$$\frac{6a^3 + 15a^2b - 4a^2cc - 10aabcc,}{9a^2b - 27aabc - 6abcc + 18bc^2}$$

termini ejus imprimis abbreviandi sunt dividendo numeratorem per aa ac denominatorem per $3b$ Dein ablato bis

$$3a^3 - 9aac - 2acc + 6c^2 \text{ de } 6a^3 + 15aab - 4acc - 10bcc,$$

restabit

$$\begin{array}{r} 15b \quad aa \quad - \quad 10bcc \\ + 18c \quad aa \quad - \quad 12c^2 \end{array}$$

Quod concinnatum dividendo terminum utrumque per $5b + 6c$ perinde ac si $5b + 6c$ simplex esset quantitas, evadit $3aa - 2cc$. Hoc multiplicatum per a aufer de $3a^3 - 9aac - 2acc + 6c^2$ & secunda vice restabit $-9aac + 6c^2$ quod itidem concinnatum per applicationem ad $-3c$, evadit etiam $3aa - 2cc$ ut ante. Quare $3aa - 2cc$ quæsitus est divisor. Quo invento, divide per eum partes fractionis propositæ & obtinebitur

$$\frac{2a^3 + 5aab}{3ab - 9bc}$$

LXXVI. Quod si divisor communis hoc pacto non inveniatur, certum est nullum omnino existere, nisi forsan e terminis prodeat per quos numerator ac denominator fractionis abbreviantur. Ut si habeatur fractio

$$\frac{aadd - cddd - aacc + c^4}{4aad - 4acd - 2acc + 2c^3}$$

ac terminis ejus juxta dimensiones litteræ d disponantur, ita ut evadat

numerator

$$\begin{array}{r} aa \quad dd \quad - \quad aacc \\ - \quad cc \quad \quad + \quad c^4 \end{array}$$

denominator

$$\begin{array}{r} 4aa \quad d \quad - \quad 2acc \\ - \quad 4ac \quad \quad + \quad 2c^3 \end{array}$$

Hos imprimis oportet abbreviare dividendo utrumque numeratoris terminum per $aa - cc$ & utrumque denominatoris per $2a - 2c$ perinde ac si $aa - cc$ & $2a - 2c$ essent simplices quantitates. Atque ita vice numeratoris

toris emerget $dd - cc$, & vice denominatoris $2ad - cc$, ex quibus sic præparatis nullus communis divisor obtineri potest. Sed e terminis $aa - cc$ & $2a - 2c$, per quos numerator ac denominator abbreviati sunt, prodit ejusmodi divisor, nempe $a - c$, cujus ope fractio ad hanc

$$\frac{add + edd - acc - c^3}{4ad - 2cc}$$

reduci potest. Quod si neque termini $aa - cc$ & $2a - 2c$ communem divisorem habuissent, fractio proposita fuisset irreducibilis.

LXXVII. Et hæc generalis est methodus inveniendi communes divisores:

Sed plerumque expeditius inveniuntur querendo omnes alterutrius quantitatis divisores primos, hoc est, qui per alios dividi nequeunt, ac dein tentando siqui alteram dividant absque residuo.

Sic ad reducendum $\frac{a^2 - aab + abb - b^2}{aa - ab}$ ad minimos terminos, inveniendi sunt divisores quantitatis $aa - ab$ nempe a & $a - b$. Dein tentandum est an alteruter a vel $a - b$ dividat etiam $a^2 - aab + abb - b^2$ absque residuo.

Regulam generalem tradidit Cel. Nicol. Leibnitii & Bernoullii. T. 2. p. 189. &c. noullius, quam vide in commercio epistolico

ARTICULUS III.

DE REDUCTIONE FRACTIONUM

ad communem denominatorem.

LXXVIII. **F**ractiones ad communem denominatorem reducuntur multiplicando terminos utriusque per denominatorem alterius (r).

Sic habitis $\frac{a}{b}$ & $\frac{c}{d}$, duc terminos unius $\frac{a}{b}$ in d , & vicissim terminos alterius $\frac{c}{d}$ in b , & evadent $\frac{ad}{bd}$ & $\frac{bc}{bd}$, quarum communis est denominator

(r) EUCL. 17. VII. Vel sic
186. Fractiones $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{d}$ habebunt eundem denominatorem si ambarum denominator fit bd ; hoc efficiendum est, ita ut fractiones valorem non mutant; fractio $\frac{a}{b}$ sic dividitur

per d , & ideo minor fit, quare est $\frac{ad}{bd}$ in d , ne valorem mutet, siquidem $\frac{ad}{bd} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{d} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}$. Idem dicendum de reliqua.

tor bd . Atque ita a & $\frac{ab}{c}$ five $\frac{a}{1}$ & $\frac{ab}{c}$ evadunt $\frac{ac}{c}$ & $\frac{ab}{c}$. Ubi vero denominatores communem habent diviforem, fufficit multiplicare alterne per quotientes. Sic fractiones $\frac{a^1}{bc}$ & $\frac{a^1}{bd}$ ad hanc $\frac{a^1d}{bcd}$ & $\frac{a^1c}{bcd}$ reducuntur, multiplicando alterne per quotientes c ac d ortos divifione denominatorum per communem diviforem b .

LXXIX. Hæc autem reductio præcipue ufui est in additione & subtractione fractionum, quæ, fi diverfos habent denominatores, ad eundem reducendæ sunt antequam uniri poffunt.

Sic $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ per reductionem evadit $\frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd}$, five $\frac{ad+bc}{bd}$.

Et $a + \frac{ab}{c}$ evadit $\frac{ac+ab}{c}$.

Et $\frac{a^1}{bc} - \frac{a^1}{bd}$ evadit $\frac{a^1d - a^1c}{bcd}$ vel $\frac{d-c}{bcd} a^1$.

Et $\frac{c^4 + x^4}{cc - xx} - cc - xx$ evadit $\frac{2x^4}{cc - xx}$ (s).

Atque ita $\frac{1}{7} + \frac{1}{7}$ evadit $\frac{1+1}{7}$ five $\frac{14+15}{21}$ hoc est $\frac{29}{21}$.

Et $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ evadit $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ five $\frac{1}{2}$.

Et $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ evadit $\frac{2}{2} - \frac{1}{2}$ five $\frac{1}{2}$ hoc est $\frac{1}{2}$.

Et $3\frac{1}{7}$ five $\frac{1}{7} + \frac{4}{7}$ evadit $\frac{1}{7} + \frac{4}{7}$ five $\frac{5}{7}$.

Et $25\frac{1}{2}$ evadit $\frac{1}{2}$.

LXXX. Fractiones, ubi plures, sunt gradatim uniri debent.

Sic habito $\frac{aa}{x} - a + \frac{2xx}{3a} - \frac{ax}{a-x}$; ab $\frac{aa}{x}$ aufer a & restabit $\frac{ax - xa}{x}$, huic adde $\frac{2xx}{3a}$ & prodibit $3a^3 - 3aax + 2x^1$ unde aufer denique $\frac{ax}{a-x}$ & restabit $\frac{3a^4 - 6a^3x + 2ax^3 - 2x^4}{3aax - 3axx}$.

(s) 187. Nam reducendo has fractiones

$$\frac{c^4+x^4}{cc-xx}, \frac{cc}{1}, \frac{xx}{1} \text{ ad eundem denominatorem, habetur,}$$

$$\frac{c^4+x^4}{cc-xx}; \frac{c^4}{cc-xx}; \frac{ccxx}{cc-xx} - \frac{2x^4}{cc-xx};$$

At- fed duæ secundæ subducendæ sunt a primis, ergo erit

$$\frac{c^4+x^4 - c^4 - ccxx - ccxx + x^4}{cc-xx}$$

$$\frac{2x^4}{cc-xx}$$

Atque ita si habeatur $3\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$, imprimis aggregatum $3\frac{1}{2}$ inveniendum est nempe $\sqrt{}$ dein ab hoc auferendum $\frac{1}{2}$ & restabit $\frac{1}{2}$ (t).

ARTICULUS IV.

DE REDUCTIONE RADICALIUM;

ad minimos terminos.

LXXXI. **R**adicalis, ubi totius radix extrahi nequit, plerumque concinnatur extrahendo radicem divisoris alicujus.

Sic \sqrt{aabc} extrahendo radicem divisoris aa fit $a\sqrt{bc}$ (u).

Et $\sqrt{48}$ extrahendo radicem divisoris 16 fit $4\sqrt{3}$.

Et $\sqrt{48abc}$ extrahendo radicem divisoris $16aa$ fit $4a\sqrt{3bc}$.

Et $\sqrt{\frac{a^2b - 4abb + 4ab^2}{cc}}$ extrahendo radicem divisoris $\frac{aa - 4ab + 4bb}{cc}$ fit $\frac{a - 2b}{c} \sqrt{ab}$.

Et $\sqrt{\frac{a^2amm}{ppzz} + \frac{4am^2}{pzz}}$ extrahendo radicem divisoris $\frac{a^2amm}{ppzz}$ fit $\frac{am}{pz}$ in $\sqrt{00 + 4mp}$.

Et $6\sqrt{\frac{1}{17}}$ extrahendo radicem divisoris $\frac{1}{17}$ fit $\frac{1}{17}\sqrt{6}$, five $\frac{1}{17}\sqrt{6}$ radicemque denominatoris adhuc extrahendo, fit $\frac{1}{17}\sqrt{6}$.

Et sic $a\sqrt{\frac{b}{a}}$ five $a\sqrt{\frac{ab}{aa}}$ extrahendo radicem denominatoris fit \sqrt{ab} (x).

Et $\sqrt[3]{8a^3b + 16a^2}$ extrahendo radicem cubicam divisoris $8a^3$ fit $2a$ in $\sqrt[3]{b + 2a}$.

Haud secus $\sqrt[4]{a^4x}$ extrahendo radicem quadraticam divisoris aa fit \sqrt{a} in $\sqrt[4]{ax}$ (y) vel extrahendo radicem quadrato-quadraticam divisoris a^4 fit $a\sqrt[4]{\frac{x}{a}}$ (z).

At-

(i) 188. Nam $3\frac{4}{7} = \frac{3 \cdot 7 + 4}{7} = \frac{25}{7}$; $= \frac{a}{a} \sqrt{ab}$ (quia $\sqrt{\frac{1}{aa}} = \frac{1}{a}$) $= \sqrt{ab}$.

& $\frac{25}{7}$; $\frac{2}{3}$ ad eundem denominatorem reducuntur dant $\frac{75 \& 14}{21}$ quarum differentia $= \frac{61}{21}$.

(u) 189. Siquidem $\sqrt{aabc} = \sqrt{bc} \cdot \sqrt{aa}$ (192. hujus) sed $\sqrt{aa} = a$, ergo &c.

(x) Ductis denominatore, ac numeratore in a , fit $a\sqrt{\frac{b}{a}} = a\sqrt{\frac{ab}{aa}} = a\sqrt{\frac{1}{aa}} \cdot \sqrt{ab}$

(y) Nam $\sqrt[4]{a^4x} = \sqrt[2]{a^2} \cdot \sqrt[2]{ax} = \sqrt{a} \cdot \sqrt[2]{ax}$ (ex $\sqrt[2]{a^2}$ extracta radice quadrata).

(z) Item $\sqrt[4]{a^4x} = \sqrt[2]{\frac{a^4x}{a}} = \sqrt[2]{a^4} \cdot \sqrt[2]{\frac{x}{a}}$

$= a\sqrt[2]{\frac{x}{a}}$.

Atque ita $\sqrt[6]{a^7x^5}$ convertitur in $a\sqrt[6]{ax^5}$, (a) vel in $ax\sqrt[6]{\frac{a}{x}}$ (b) vel in $\sqrt{ax} \cdot \sqrt[3]{axx}$ (c).

LXXXII. Ceterum hæc reductio non tantum concinnandis radicalibus infervit, sed & earum additioni & subductioni, si modo ex parte radicali convenient ubi ad formam simplicissimam reducuntur. Tunc enim uniri possunt, quod aliter non fit.

Sic $\sqrt{48} + \sqrt{75}$ per reductionem evadit $4\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$ hoc est $9\sqrt{3}$.

Et $\sqrt{48} - \sqrt{\frac{75}{4}}$ per reductionem evadit $4\sqrt{3} - \frac{5}{2}\sqrt{3}$ hoc est $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ (d).

Et sic $\sqrt{\frac{4ab^1}{cc}} + \sqrt{\frac{a^1b - 4abb + 4ab^1}{cc}}$ extrahendo quicquid est rationale, evadit $\frac{2b}{c}\sqrt{ab} + \frac{a - 2b}{c}\sqrt{ab}$ (e) hoc est $\frac{a}{c}\sqrt{ab}$.

Et $\sqrt[3]{8a^1b + 16a^1} - \sqrt[3]{b^1 + 2ab^1}$ evadit $2a\sqrt[3]{b + 2a} - b$ in $\sqrt[3]{b + 2a}$ (f) hoc est $\frac{2a - b}{\sqrt[3]{b + 2a}}$.

ARTICULUS V.

DE REDUCTIONE RADICALIUM.

ad eandem denominationem.

LXXXIII. CUM in radicalibus diversæ denominationis instituenda est multiplicatio vel divisio, oportet omnes ad eandem denominationem reducere, idque præfigendo signum radicale, cujus index est minimus numerus, quem earum indices dividunt absque residuo, & suffixas quan-

(a) Enim $\sqrt[6]{a^7x^5} = \sqrt[6]{a^6} \cdot \sqrt[6]{ax^5} = \sqrt[6]{ax^5}$. $\sqrt[6]{\frac{16}{27}}$ & omnibus divisus per $\sqrt[6]{3}$, $x = \sqrt[6]{\frac{16}{27 \cdot 3}}$

(b) Pariter $\sqrt[6]{a^7x^5} = \sqrt[6]{a^7x^6} = \sqrt[6]{a^6x^6} \cdot \sqrt[6]{\frac{a}{x}} = \sqrt[6]{\frac{16}{81}} = \frac{4}{9}$ quare $\frac{4}{9}\sqrt[6]{3} = \sqrt[6]{\frac{16}{27}}$.
 $= ax\sqrt[6]{\frac{a}{x}}$.

(c) Siquidem $\sqrt{\frac{4ab^1}{cc}} = \sqrt{\frac{4b^2}{c^2}} \cdot \sqrt{ab} = \frac{2b}{c}$

(c) Denique $\sqrt[6]{a^7x^5} = \sqrt[6]{a^1x^1} \cdot \sqrt[6]{a^6x^4}$.
 Cum vero ex harum nulla extrahere possim radicem sextam, & prima quantitas sit cubica secunda quadrata, e prima cubicam, e secunda quadratam radicem extraho, & invenio $\sqrt[3]{ax} \cdot \sqrt[3]{a^2x}$.

\sqrt{ab} , & $\sqrt{\frac{(a^1b - 4abb + 4ab^1)}{cc}} =$
 $\sqrt{\frac{(a^1 - 4ab + 4b^1)}{cc}} \sqrt{ab} = \frac{(a - 2b)}{c} \sqrt{ab}$.

(f) Est enim $\sqrt[3]{(8ab + 16a^1)} = \sqrt[3]{8a^1}$.

(d) Jam $\sqrt{48} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$. quærenda est igitur quantitas ducta in $\sqrt{3}$ & æqualis ipsi $\sqrt{\frac{16}{27}}$: sit hæc x , ergo $x\sqrt{3} =$
 $\sqrt[3]{(l + 2a)} = 2 \cdot \sqrt[3]{(l + 2a)}$ & $\sqrt[3]{(l + 2ab)}$
 $= \sqrt[3]{b^1} \cdot \sqrt[3]{(b + 2a)} = b\sqrt[3]{(b + 2a)}$.

quantitates toties, dempta una vice, in se ducendo quoties index ille jam major evaserit (g).

Sic enim $\sqrt[n]{ax}$ in $\sqrt[n]{aax}$ evadit $\sqrt[n]{a^2x^2}$ in $\sqrt[n]{a^3x^3}$ hoc est $\sqrt[n]{a^2x^2}$.

Et $\sqrt[n]{a}$ in $\sqrt[n]{ax}$ evadit $\sqrt[n]{a^2}$ in $\sqrt[n]{a^3}$ hoc est $\sqrt[n]{a^2}$.

Et $\sqrt[n]{6}$ in $\sqrt[n]{\frac{1}{2}}$ evadit $\sqrt[n]{36}$ in $\sqrt[n]{\frac{1}{2}}$ hoc est $\sqrt[n]{36}$.

Eadem ratione $\sqrt[n]{abc}$ evadit $\sqrt[n]{a^2abc}$ in $\sqrt[n]{bc}$ hoc est $\sqrt[n]{a^2abc}$.

Et $2\sqrt[n]{3bc}$ evadit $\sqrt[n]{16a^2}$ in $\sqrt[n]{3bc}$ hoc est $\sqrt[n]{48a^2bc}$.

Et $2a\sqrt[n]{(b+2a)}$ evadit $\sqrt[n]{8a^3}$ in $\sqrt[n]{(b+2a)}$ hoc est $\sqrt[n]{(8a^3b+16a^4)}$.

Atque ita $\frac{\sqrt[n]{ac}}{b}$ fit $\frac{\sqrt[n]{ac}}{\sqrt[n]{bb}}$ five $\sqrt[n]{\frac{ac}{bb}}$.

Et $\frac{6abb}{\sqrt[n]{18ab}}$ fit $\frac{\sqrt[n]{36aab^4}}{\sqrt[n]{18ab}}$ five $\sqrt[n]{2ab}$. Et sic in aliis.

ARTICULUS VI.

DE REDUCATIONE RADICALIUM.

ad simpliciores radicales per extractionem radicum.

LXXXIV. **R** Adices quantitatuum quæ ex integris & radicalibus quadraticis componuntur sic extrahe.

Designet A quantitatis alicujus partem majorem, B partem minorem: Et erit $\frac{A + \sqrt{(AA - BB)}}{2}$ quadratum majoris partis radicis; & $\frac{A - \sqrt{(AA - BB)}}{2}$ qua-

(g) 191. In sequentibus radices notabimus, ut dictum est (N^o. 159. hujus) commodo Typo-
pothetarum inservientes.

Radicum eundem denominatorem habentium jam tradita est multiplicatio (XLIV. hujus) & divisio (XLIX. hujus): cum vero diversum habent denominatorem ad eundem sunt reducendæ. Su-

mamus a^p ; b^q . Jam patet $a^q = a^*$, &

$a^p q = a^p$. Item $b^p q = b^q$, quare reductio facta est.

Si vero p, & q, communem habeant mensuram. ex. gr. si p = rs, & q = rs, habere-

mus a^{rrs} & b^{rrs} , indices fracti reducuntur ad minimos terminos per LXXV. hujus, re-

stat a^{rs} , & b^{rs} eundem habentes denomi-

natorem, (quod erat faciendum) & prioribus simpliciores (quod semper est querendum) quam ob rem invenitur ist minus numerorum, quos duo dati metiuntur (Eucl. 17. VII.) hic dividatur per rs indicem unius ex radicalibus, unde habetur r; elevetur aⁿ ad potestatem 1, & ex ea extrahatur radix rst. Idem fiat de secunda, & voti compotes facti erimus.

Sic minimus numerus quem 2, & 3 metiuntur est 6; $\frac{6}{2} = 3$, ergo ax elevanda ad tertiam potestatem, unde a³x³, & ejus radix sexta $a^{\frac{3}{2}}x^{\frac{3}{2}} = \sqrt[n]{ax}$: sed $\frac{6}{3} = 2$, quare eleva aax ad quadratum, habiturus a⁴xx, & $a^{\frac{4}{2}}x^{\frac{4}{2}} = \sqrt[n]{aax}$.

quadratum partis minoris, quæ quidem majori adnectenda est cum signo ipsius B (b).

Ut

(h) 192. Ad hanc regulam intelligendam observa tacite supponere Auctorem.

193. Quod termini, quibus constat quantitates complexa reducenda, sint incommensurabiles, & quidem ita ut commensurabiles fieri nullo pacto queant.

Hinc excluduntur quantitates huiusmodi $a + \sqrt{b^2}$; quia $\sqrt{b^2} = b$; atque a & b sunt commensurabiles; aut $\sqrt{a^2 c} + \sqrt{b^2 c} = a\sqrt{c} + b\sqrt{c}$ (art. LXXXI. hujus) $= (a + b)\sqrt{c}$ (art. LXXXII. hujus); aut denique $\sqrt{a + \frac{b}{\sqrt{a}}}$ (art. XLIV. LXXVIII. & LXXIX. hujus).

194. Quod quantitas reducenda constet ex integris & radicalibus, & quidem quadraticis, aut ex quantitatibus quæ ad integras & radicales quadraticas reduci possint; ut melius videbimus infra N^o. 203. 204. 205.

195. Quod omnes quantitates commensurabiles pro una sumantur.

Sic infra, ubi quantitatem $ax + 5ax - 2a$ $\sqrt{ax + 4xy}$ reducendam proponit NEWTONUS, commensurabiles ax & $5ax$ pro una sumit.

Eodem pacto si haberemus $100 + \sqrt{3267} + \sqrt{867}$, quantitates $\sqrt{3267}$, & $\sqrt{867}$ reducendæ essent ad minimos terminos per (art. LXXXI. hujus); quo facto obtinebimus $3\sqrt{3}$ & $1\sqrt{3}$, quæ conjunctæ (art. LXXXII. hujus) dabant $100 + 5\sqrt{3}$.

196. Quod omnia quadrata simplicia sint commensurabilia, non autem rectangula cum quadratis.

197. In hoc articulo quantitas complexa vocabitur *binomium*, si constet duabus partibus incommensurabilibus; *trinomium* si ex tribus; *quadrinomium* si ex quatuor &c.; & in genere *polynomium* si ex pluribus, quamvis pars integra sit complexa.

198. *Quadratum radices polynomia*, (nisi plures termini coaluerint) continet tot terminos quot sunt unitates in dimidiato numero terminorum radices ducto in eundem numerum unitate auctum.

Sit numerus terminorum in radice $= m$.

In quadrato numerus terminorum æquat numerum terminorum radices ductum in se. (N^o. 92. hujus). Est ergo $m \cdot m$. Tot autem sunt quadrata simplicia, quot sunt termini in radice; igitur eorum numerus est m ; qui si dematur ex numero terminorum omnium, supererit $m \cdot m - m$ pro numero rectangulorum. Sed bina quæque rectangula sunt æqualia & in unum coeunt; quare, hac reductione facta, eorum numerus erit $\frac{m \cdot m - m}{2}$. Redde numerum quadratorum, & fiet numerus terminorum distinctorum $\frac{m \cdot m - m}{2} + m = \frac{m \cdot m - m + 2m}{2}$ (Art. LXXIX. hujus) $= \frac{m \cdot m + m}{2} = \frac{m}{2} (m + 1)$.

Hinc facile dignoscemus utrum in polynomio, quod tanquam quadratum proponitur, omnes termini adiant, an aliqui coaluerint, & quot. Pone tantum pro m successive numeros naturales 2, 3, 4 &c. & dispice num $\frac{m}{2} (m + 1)$ det numerum terminorum polynomii propositi. Si hoc fit, omnes termini aderunt. Secus vero, ex variis numeris, qui oriuntur ex $\frac{m}{2} (m + 1)$ sume numerum proximæ majorem numero terminorum polynomii; hunc ex illo subduc; differentia adde unitatem, & habebis numerum terminorum qui in unum coevertunt.

Habeat, ex. gr. polynomium propositum quinque terminos. Pone $m = 2$; erit $\frac{m}{2}$

$= 1$; & $m + 1 = 3$; ergo $\frac{m}{2} (m + 1) = 1 \cdot 3$

Nunc pone $m = 3$; erit $\frac{3}{2}$ & $m + 1 = 4$;

& $\frac{m}{2} (m + 1) = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$; qui numerus superat datum terminorum numerum unitate; huic differentia adde unitatem, & duos terminos coaluisse reperies.

Est quidem directæ methodus inveniendi utrum numerus terminorum assignatus possit æquare $\frac{m}{2} (m + 1)$; sed cum ea pendeat ab articulo XI. Sect. II. infra legendo; & cum me-

methodus indirecta non nimis sit difficilis, hac nos docet esse contentos.

199. Si, præter bina rectangula, omnia quadrata in unum coeant; erit numerus terminorum $\frac{m^m - m}{2} + 1$.

200 Binomium oritur ex radice binomiali, & duæ quadrati partes in unam coalescunt.

201. Si quadratum radicis polynomia involvit radicales, & omnia quadrata sunt commensurabilia, quadratum hoc erit factum polynomii compositi ex integris & radicalibus quadraticis in aliam quamvis radicalem.

Sit radix polynomia $a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{m}} + c^{\frac{1}{r}} +$
 $\&c.$, ejus quadratum erit $a^{\frac{2}{n}} + 2a^{\frac{1}{n}}b^{\frac{1}{m}} +$
 $b^{\frac{2}{m}} + 2a^{\frac{1}{n}}c^{\frac{1}{r}} + b^{\frac{2}{m}}c^{\frac{1}{r}} + c^{\frac{2}{r}} +$
 $\&c.$ Jam, ut quadrata sint commensurabilia, opus est ut, saltem, revocari possint ad eundem radicalem. Sit ego

$$a^{\frac{2}{n}} = \gamma x^s; b^{\frac{2}{m}} = \alpha x^s; c^{\frac{2}{r}} = \mu x^s$$

&c.

Erit, extrahendo radices quadraticas, (N^o. 161. huius)

$$a^{\frac{1}{n}} = \gamma^{\frac{1}{2}} x^{\frac{s}{2}}; b^{\frac{1}{m}} = \alpha^{\frac{1}{2}} x^{\frac{s}{2}}; c^{\frac{1}{r}} = \mu^{\frac{1}{2}} x^{\frac{s}{2}}$$

& superius quadratum fiet

$$\gamma x^s + 2\gamma^{\frac{1}{2}}\alpha^{\frac{1}{2}}x^{\frac{s}{2}}x^{\frac{s}{2}} + 2\gamma^{\frac{1}{2}}\mu^{\frac{1}{2}}x^{\frac{s}{2}}x^{\frac{s}{2}} +$$

$$+ \alpha x^s + 2\alpha^{\frac{1}{2}}\mu^{\frac{1}{2}}x^{\frac{s}{2}}x^{\frac{s}{2}} + \mu x^s + \&c.$$

id est

$$(\gamma + \alpha + \mu + \&c. + 2\gamma^{\frac{1}{2}}\alpha^{\frac{1}{2}} + 2\gamma^{\frac{1}{2}}\mu^{\frac{1}{2}} +$$

$$+ 2\alpha^{\frac{1}{2}}\mu^{\frac{1}{2}} + \&c.) x^s$$

Ergo &c.

Ita $\sqrt[3]{3087} + \sqrt[6]{139968} = (7 + 2\sqrt{3})\sqrt[3]{9}$;
 est enim, quævis divisoribus, $3087 = 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$.

& $\sqrt[3]{3087} = \sqrt[3]{7 \cdot 7 \cdot 7} \sqrt[3]{3} = 7\sqrt[3]{3}$
 $139968 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$;
 atque

$$\sqrt[6]{139968} = \sqrt[6]{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} =$$

$$3 \cdot 3 = 2 \cdot \sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{3}$$

202. Quin & hujusmodi quadratorum radices recidunt in polynomia composita ex radicalibus quadraticis ductis in eandem radicalem quamlibet, cujus radicalis exponens est par. Si quidem ea radix sit

$$y^{\frac{1}{2}} x^{2s} + z^{\frac{1}{2}} x^{2s} + u^{\frac{1}{2}} x^{2s} + \&c.$$

$$= (\sqrt{y} + \sqrt{z} + \sqrt{u}) \sqrt{x^s}$$

203. Ubi omnia quadrata sunt inter se commensurabilia, rectangula fieri commensurabilia nequeunt. Nam, ut \sqrt{yz} , & \sqrt{yz} sicut commensurabilia, opus est ut vel

1^o Quadrata sint x , & u & quidem ex radicibus commensurabilibus; sit $x = \alpha\alpha$, & $u = \beta\beta$; tunc polynomium N^o. 201. fit

$$(\gamma + \alpha\alpha + \beta\beta + (2\alpha + 2\beta) \sqrt{\gamma + 2\alpha\beta}) x^s$$

& ejus radix descripta N^o. 202. evadit

$(\sqrt{\gamma + \alpha + \beta}) x^{\frac{s}{2}}$; cum autem α & β sint commensurabiles; radix trinomia fit binomia, contra hypothesein.

2^o Sit $\sqrt{yz} = \alpha\sqrt{\beta}$, & $\sqrt{yu} = \kappa\sqrt{\beta}$; & sint commensurabiles α & κ ; erit quadrando,

$$yz = \alpha\alpha\beta; \& yu = \kappa\kappa\beta, \& y = \frac{\alpha\alpha\beta}{\beta} = \frac{\alpha\alpha}{1}$$

ergo multiplicando in cruce & dividendo per β , $\alpha\alpha u = \kappa\kappa z$, & $z = \frac{\alpha\alpha u}{\kappa\kappa}$, quare yz

$$= \frac{\gamma\alpha\alpha u}{\kappa\kappa} = \alpha\alpha\beta, \& \text{dividendo } \frac{\gamma\alpha\alpha u}{\kappa\kappa} \& \alpha\alpha\beta \text{ per}$$

$$\alpha\alpha; \text{ fiet } \frac{\gamma u}{\kappa\kappa} = \beta; \text{ ac multiplicando per } \kappa\kappa \&$$

dividendo per u , $\gamma = \frac{\kappa\kappa\beta}{u}$; quocirca radix descripta N^o. 202. fiet $(\kappa\sqrt{\frac{\beta}{u}} + \frac{\alpha}{x}\sqrt{u} +$
 $+ \sqrt{u})$

$\sqrt{u} \times \frac{1}{2}$ aut reducendo $\frac{a}{x} \sqrt{u}$, & \sqrt{u} ad eundem denominatorem ($\frac{a}{x} \sqrt{\frac{a}{u}} \rightarrow \frac{a+x}{x}$ in $\sqrt{u} \times \frac{1}{2}$, quæ iterum est binomia.

204. Non ergo necesse est ut quantitas reducenda nullas contineat radicales præter quadraticas, sed ut ad integras & quadraticas quantitates reduci possit.

205. Hoc evenit etiam ubi $y = 2$; id est ubi nullæ sunt radices nisi quadraticæ, tunc enim quadratum fit

$$(y+z+u+2\sqrt{yz}+2\sqrt{yu}+2\sqrt{zu})\sqrt{x}.$$

Sic infra proponit Auctor reducendam quantitatem $\sqrt{32} - \sqrt{24}$, quæ abit in $(4 - 2\sqrt{3}) \cdot \sqrt{2}$, est enim $32 = 2 \cdot 16$, & $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, atque $24 = 4 \cdot 2 \cdot 3$, & $\sqrt{24} = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$.

Eodem pacto $\sqrt{12} + \sqrt{24}$ fit $2\sqrt{3} + 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = (2 + 2\sqrt{2})\sqrt{3}$.

206. Hac divisione facta, radicales residuæ sunt cuævis duplum rectangulum; ergo dividi singulæ poterunt per $\sqrt{4} = 2$; alioquin frustra quæretur radix quantitatis propositæ.

207. Si radicales, quibus constat quisque quadrati termini ad eundem exponentem reducuntur, radicales rectangulorum habebunt exponentem duplum exponentis radicalium ap quadratis.

208. In quadrato binomii summa quadratorum major est summa rectangulorum.

Primum quadratum est ad rectangulum ut rectangulum ad alterum quadratum (Eucl. I. VI. aut I. VII. vel I. VIII.). Harum quantitatum media non potest esse neque maxima neque minima (ut facile deducitur ex Eucl. def. 5. & 7. aut prop. 14. V.); ergo quadratorum alterum erit quantitatis maxima, alterum minima; & semper summa quadratorum major quam summa rectangulorum (Eucl. 25. V.) Q. E. E. D.

209. Si ergo, facta reductione de qua Nis. 203. 204. 205. quantitas integra minor sit quantitate radicali, frustra adhibebis Regulam NEWTONI.

Quamvis autem quantitas; reducenda revocari

possit ad polynomium constans ex integris & radicalibus quadraticis, & quævis radicalis dividi possit per $\sqrt{4} = 2$; & in binomio, quantitas integra major sit radicali, non semper tamen ea quantitas reduci potest, quia non semper est quadratum. Igitur Regula supponit quantitatem reducendam esse quadratum.

Nunc demonstremus regulam Auctoris.

Sit primo quantitas reducenda binomium.

Quoniam, ex hypothesi, $A + B$ est quadratum, concipi potest ejus radix, quæ erit binomialis, nam ex radice simplici oritur quadratum simplex, & ex radice binomiali quadrinomiali (No. 92.). Quadratum autem radices binomialis continet quadratum primæ partis radices, duo rectangula ex prima parte in secundam, & quadratum secundæ (No. 122. hujus & Eucl. 4. 11. & A exponit aggregatum quadratorum ex hypothesi; ergo B exprimit duo rectangula. Quomobrem quadratum ipsius A continet quadrato-quadratum primæ partis radices, duo facta ex quadrato primæ partis in quadratum secundæ, & quadrato-quadratum secundæ; & quadratum ipsius B erit quater factum ex quadrato primæ partis radices in quadratum secundæ. Igitur differentia quadratorum ex A & B continet quadrato-quadratum primæ partis radices, & quadrato-quadratum secundæ multata bis facto ex quadrato primæ partis radices in quadratum secundæ; cujus aggregati radix est differentia quadratorum primæ partis radices & secundæ (Eucl. 7. 2.). Huic adde A, vel ambo quadrata, & habebis bis quadratum primæ partis; quod erat primum.

Ex ambobus quadratis deme eorum differentiam, supererit bis quadratum secundæ partis, quod erat alterum.

Hoc ratiocinium ita symbolis poni sub oculis potest. Erto radix quantitatis reducendæ $x + y$. Quantitas ipsa æquivalet huic

$$xx + 2xy + yy = A + B.$$

Jam est

$$A = xx + yy \text{ ergo } AA = x^4 + 2x^2y^2 + y^4$$

&

$$B = 2xy; BB = 4x^2y^2; \text{ quare}$$

$$AA - BB = x^4 - 2x^2y^2 + y^4,$$

quapropter

$$\sqrt{AA - BB} = x^2 - y^2;$$

$$A + \sqrt{AA - BB} = x^2 + y^2 + x^2 - y^2 = 2x^2$$

Ut si quantitas sit $3 + \sqrt{8}$, scribendo 3 pro A, & $\sqrt{8}$ pro B, erit $\sqrt{(AA - BB)} = 1$, indeque quadratum majoris partis radicis $\frac{3 + \sqrt{8}}{2}$ id est 2, & quadratum minoris partis $\frac{3 - \sqrt{8}}{2}$ id est 1. Ergo radix est $1 + \sqrt{2}$.

Rurfus si ex $\sqrt{32} - \sqrt{24}$ radix extrahenda sit, ponendo $\sqrt{32}$ pro A & $\sqrt{24}$ pro B erit $\sqrt{(AA - BB)} = \sqrt{8}$, & inde $\frac{\sqrt{32} + \sqrt{8}}{2}$ & $\frac{\sqrt{32} - \sqrt{8}}{2}$ hoc est $3\sqrt{2}$ & $\sqrt{2}$ (i) quadrata partium radicis. Radix itaque est $\sqrt[4]{18} - \sqrt[4]{2}$.

Eodem modo si de $aa + 2x\sqrt{(aa - xx)}$ radix extrahi debet, pro A scribe aa , & pro B $2x\sqrt{(aa - xx)}$ & erit $AA - BB = a^4 - 4a^2xx + 4x^4$. Cujus radix est $aa - 2xx$. Unde quadratum unius partis radicis erit $aa - xx$; illud alterius xx ; adeoque radix $x + \sqrt{(aa - xx)}$.

Rurfus si habeatur $aa + 5ax - 2a\sqrt{(ax + 4xx)}$, scribendo $aa + 5ax$ pro A & $2a\sqrt{(ax + 4xx)}$ pro B, fiet $AA - BB = a^4 + 6a^3x + 9a^2xx$, cujus radix est $aa + 3ax$. Unde quadratum majoris partis radicis erit $aa + 4ax$, illud minoris ax , & radix $\sqrt{(aa + 4ax)} - \sqrt{ax}$.

De-

atque

$$\frac{A - \sqrt{(AA - BB)}}{2} = x^2 + y^2 - x^2 + y^2 = 2y^2;$$

$$\frac{A + \sqrt{(AA - BB)}}{2} = x^2; \quad \frac{A - \sqrt{(AA - BB)}}{2} = y^2.$$

Vel, cum A sit aggregatum duorum quadratorum, & B summa duorum rectangularium; & cum primum quadratum sit ad rectangularium ut rectangularium ad alterum quadratum; ita in duas partes dividenda est quantitas A ut prima pars sit ad dimidium B, ut dimidium B est ad alteram partem;

Sit ergo $A = 2x$, & prima pars (nempe quadratum maximæ partis radicis) sit $x + y$; reliqua pars, (scilicet quadratum minimæ partis radicis,) erit $A - x - y = 2x - x - y = x - y$. Est ergo $x + y = \frac{B}{2} :: \frac{B}{2} : x - y$, & $xx - yy = \frac{BB}{4}$; sed $AA = 4xx$, & $\frac{AA}{4} = xx$; quare $\frac{AA}{4} - yy = \frac{BB}{4}$; aut (addendo hinc

inde yy) $\frac{AA}{4} = \frac{BB}{4} + yy$; & (utrinque demendo $\frac{BB}{4}$) $\frac{AA - BB}{4} = yy$; & extracta radice, $\frac{1}{2} \sqrt{(AA - BB)} = y$. Sed $x = \frac{A}{2}$; quapropter $\frac{A + \sqrt{(AA - BB)}}{2} = x + y$; quod est quadratum primæ partis radicis, & $\frac{A - \sqrt{(AA - BB)}}{2} = x - y$, quod est quadratum secundæ partis radicis.

Cetera, quæ pertinent ad polynomia reducenda, leguntur infra suo loco.

(i) Est enim, $32 = 16 \cdot 2$, & $\sqrt{32} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. Item $8 = 4 \cdot 2$, & $\sqrt{8} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

ideo

$$\frac{\sqrt{32} + \sqrt{8}}{2} = \frac{4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}; \text{ pariter}$$

$$\frac{\sqrt{32} - \sqrt{8}}{2} = \frac{4\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

Denique si habeatur $6 + \sqrt{8} - \sqrt{12} - \sqrt{24}$, ponendo $6 + \sqrt{8} = A$ & $-\sqrt{12} - \sqrt{24} = B$, fiet $AA - BB = 8$. Unde radicis pars major $\sqrt{3 + \sqrt{8}}$ hoc est (ut supra) $1 + \sqrt{2}$, & pars minor $\sqrt{3}$, atque adeo radix ipsa $1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}$ (k).

Cc-

(k) 210. Polynomium $6 + \sqrt{8} - \sqrt{12} - \sqrt{24}$ habet quatuor terminos; ergo certe non oritur a radice binomiali. Quamobrem ponamus in formula Ni. 198. $m = 3$. Erit

$$\frac{mm}{2} = 9; \frac{mm}{2} - m = 9 - 3 = 6;$$

$$\frac{mm}{2} - m = 3; \frac{mm}{2} - m + 1 = 4.$$

Unde sequitur radicem trinomialem præbere quadratum constans quatuor terminis, si quadrata omnia in unum fuerint coacta; quæ est nostra hypothesis.

211. Si in quadrato radicis trinomialis omnia quadrata simplicia in unum redacta sint, dico quod alterum terminorum par, quomodocumque sumptum, continet quadratum duarum partium radicis junctim sumptarum una cum quadrato reliquæ.

Sit radix trinomialis $x + y + z$; cujus quadratum erit

$$x^2 + 2xy + 2xz + y^2 + 2yz + z^2.$$

Est, secundum hypothesisim, $x^2 + y^2 + z^2 = u^2$, & fiet

$$x^2 + 2xy + 2xz + y^2 + 2yz + z^2 = u^2 + 2xy + 2xz + 2yz.$$

Nunc sumere potes

$$aut u^2 + 2xy; aut u^2 + 2xz; aut u^2 + 2yz.$$

Nam, si inde sumis duo rectangula quævis, semper hinc restabit u^2 cum altero rectangulo.

Est autem

$$u^2 + 2xy = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy = z^2 + (x + y)^2$$

&c

$$u^2 + 2xz = x^2 + y^2 + z^2 + 2xz = y^2 + (x + z)^2$$

atque

$$u^2 + 2yz = x^2 + y^2 + z^2 + 2yz = x^2 + (y + z)^2$$

Ego, &c.

212. Si igitur concipis quadratum binomii $x + y$, vel $x + z$, vel $y + z$, tanquam unum quadratum, demonstratio regulæ *Newtonianæ*,

quam pro binomiis reducendis tradidimus, extendetur ud quadrinomia.

213. Quamquam hoc Theorema non supponat reductionem N^o. 201., tamen sine ea vix, ac ne vix quidem, fieri potest reductio quadrinomialium radicalium.

Proponatur, exempli gratia, reducendum quadrinomialium

$$\sqrt[3]{4000} + \sqrt[6]{221184} + \sqrt[6]{1024000} + \sqrt[6]{3456000}$$

& fit

$$A = \sqrt[3]{4000} + \sqrt[6]{3456000} = \sqrt[6]{16000000} + \sqrt[6]{3456000}$$

&c

$$B = \sqrt[6]{221184} + \sqrt[6]{1024000}$$

erit

$$AA = \sqrt[3]{1600000} + 2\sqrt[6]{5529600000000} + \sqrt[3]{3456000}$$

atque

$$BB = \sqrt[3]{221184} + 2\sqrt[6]{226492416000} + \sqrt[3]{1024000}$$

unde $AA - BB$ erit quantitas sex nominum, quæ multo difficilius reduci potest quam proposita.

Sed præliminaris reductio nostra Ni. 201., ostendit esse

$$\sqrt[3]{4000} = 10\sqrt[3]{4}$$

&c

$$\sqrt[6]{221184} = \sqrt[6]{16 \cdot 13824} = \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{24}$$

$$= \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{4 \cdot 6} = 2\sqrt[6]{4}$$

atque

$$\sqrt[6]{1024000} = \sqrt[6]{16 \cdot 64000} = \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{40}$$

$$= \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{4 \cdot 10} = 2\sqrt[6]{10}$$

deni-

Ceterum ubi plures sunt hujusmodi termini radicales, possunt partes radicis citius inveniri dividendo factum quarumvis duarum radicalium per tertiam aliquam radicalem quæ producit quatum rationalem & integrum. Nam dupli quoti istius radix erit duplum partis radicis quæ sita (1). Ut in exemplo novissimo $\frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{12}}{\sqrt{24}} = 2$, $\frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{24}}{\sqrt{12}} = 4$, $\frac{\sqrt{12} \cdot \sqrt{24}}{\sqrt{8}} = 6$.

Er

denique

$$\sqrt[6]{3456000} = \sqrt[6]{16 \cdot \sqrt[6]{216000}} = \sqrt[6]{4 \cdot \sqrt[6]{60}} \\ = \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[4]{15} = 2\sqrt[3]{15} \cdot \sqrt[4]{4}$$

quapropter polynomium propositum evadit

$$(10 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{10} + 2\sqrt[3]{15})\sqrt[4]{4}$$

Sit nunc

$$A = 10 + 2\sqrt{6} \quad B = 2\sqrt{10} + 2\sqrt[3]{15}$$

erit

$$AA = 100 + 40\sqrt{6} + 24 = 124 + 40\sqrt{6} \& \\ BB = 40 + 8\sqrt{150} + 60 = 100 + 40\sqrt{6} \\ \text{nam } 150 = 25 \cdot 6; \sqrt{150} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{6} = 5\sqrt{6}, \\ \& 8\sqrt{150} = 40\sqrt{6}$$

quocirca

$$AA - BB = 24 = 4 \cdot 6 \text{ atque } \sqrt{AA - BB} \\ = \sqrt{4 \cdot 6} = 2\sqrt{6}$$

unde

$$\frac{A + \sqrt{AA - BB}}{2} = \frac{10 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{6}}{2} \\ = 5 + 2\sqrt{6}$$

sed

$$\frac{A - \sqrt{AA - BB}}{2} = \frac{10 + 2\sqrt{6} - 2\sqrt{6}}{2} = 5$$

& hinc conficitur alteram quæ sita radicis partem esse $\sqrt{5}$. Reliquæ duæ investigantur quærendo radicem quadratam binomii $5 + 2\sqrt{6}$.

Sit ergo

$$A = 5; B = 2\sqrt{6}; \text{ erit } AA = 25; BB = 24; \\ AA - BB = 1; 1 = \sqrt{AA - BB}$$

&

$$\frac{A + \sqrt{AA - BB}}{2} = \frac{5 + 1}{2} = 3, \text{ atque}$$

$$\frac{A - \sqrt{AA - BB}}{2} = \frac{5 - 1}{2} = 2$$

qua de causa duæ residuæ partes radicis erunt $\sqrt{2}$; & $\sqrt{3}$ atque radix tota

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})\sqrt[3]{2}, \text{ nam } \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{4}$$

Sed in polynomiis non raro incideret in perplexas & arduas rationes subducendas qui vellet uti hac methodo. Sequens facilius est.

(1) 214. Quælibet pars polynomii, quod sumitur pro quadrato, aut est quadratum aliqujus partis radicis, aut duplum factum ex una parte radicis in alteram. Facta reductione Ni. 201. omnia quadrata simul conficiunt quantitatem integram; quare singulæ radicales sunt duplum factum ex una parte radicis in alteram; & duæ radicales invicem multiplicatæ quadruplum factum est quatuor partibus radicis, aut, (si eadem pars radicis occurrat in utraque radicali,) quadruplum factum ex quadrato unius partis radicis in duas alias; quod si dividas per aliam radicalem quæ sit hoc ipsum factum ex duabus aliis partibus radicis, quotus erit duplum quadratum alterius partis radicis, & hujus quoti duplum erit quadruplum quadratum, cujus radix est dupla pars radicis.

215. Sicuti magis placeat rationes subducere; en superius ratiocinium calculis explicatum.

$$\text{Quadratum ipsius } \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} + \\ \sqrt{u} + \sqrt{t} \&c. \text{ est.}$$

$$x + 2\sqrt{xy} + 2\sqrt{xz} + 2\sqrt{xu} + 2\sqrt{xt} + y \\ + 2\sqrt{yz} + 2\sqrt{yu} + 2\sqrt{yt} + z + 2\sqrt{zu} \\ + 2\sqrt{zt} + u + 2\sqrt{ut} + t \&c.$$

sit $x + y + z + u + t \&c. = s$, quadratum superius fiet

$$s + 2\sqrt{xy} + 2\sqrt{xz} + 2\sqrt{xu} + 2\sqrt{xt} \\ + 2\sqrt{yz} + 2\sqrt{yu} + 2\sqrt{yt} + 2\sqrt{zu} \\ + 2\sqrt{zt} + 2\sqrt{ut}$$

duc, exempli gratia $2\sqrt{xy}$ in $2\sqrt{xt}$, habebis $4\sqrt{x^2yt}$; hanc divide per $2\sqrt{yt}$, restabit $2\sqrt{x^2}$, cujus duplum est $4\sqrt{x^2}$, hujus dix $2\sqrt{x}$, dupla pars radicis quæ sita,

Ergo partes radices sunt 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ut supra (m).

LXXXV.

(m) 216. Si omnes radicales dividas per $\sqrt{4} = 2$, (quod semper fieri potest si quantitas proposita est quadratum, (N^o. 206.) facilius erit usus hujus regulæ. Sic in exemplo proposito fit

$$6 + \sqrt{8} - \sqrt{12} - \sqrt{24} = 6 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 2\sqrt{6}$$

tum autem sume pro multiplicatione & divisione imperata radicales ipsas, omissis coefficiente 2, & quotus erit quadratum partis radices. Itaque

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}; \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = 1; \text{pariter } \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}; \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2$$

cujus radix est $\sqrt{2}$. Eodem pacto

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}; \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3,$$

cujus radix est $\sqrt{3}$.

Haud aliter facillime reduces polynomium

$$\sqrt{3179} - \sqrt{264} + \sqrt{440} + \sqrt{616} + \sqrt{660} + \sqrt{1540}$$

si animadvertas esse

$$\sqrt{3179} = 17\sqrt{11}; \sqrt{264} = \sqrt{24} \cdot \sqrt{11} = 2\sqrt{6} \cdot \sqrt{11}; \sqrt{440} = \sqrt{40} \cdot \sqrt{11} = 2\sqrt{10} \cdot \sqrt{11}$$

&

$$\sqrt{616} = \sqrt{56} \cdot \sqrt{11} = 2\sqrt{14} \cdot \sqrt{11}; \sqrt{660} = \sqrt{60} \cdot \sqrt{11} = 2\sqrt{15} \cdot \sqrt{11}$$

atque

$$\sqrt{1540} = \sqrt{140} \cdot \sqrt{11} = 2\sqrt{35} \cdot \sqrt{11}$$

unde polynomium propositum fit

$$(17 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{10} + 2\sqrt{14} + 2\sqrt{15} + 2\sqrt{35}) \sqrt{11}$$

Est autem

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{60} = 2\sqrt{15}; \frac{2\sqrt{15}}{\sqrt{15}} = 2,$$

cujus radix est $\sqrt{2}$.

Item

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{15} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}; \frac{3\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = 3;$$

cujus radix est $\sqrt{3}$.

Pariter

$$\sqrt{10} \cdot \sqrt{15} = \sqrt{150} = 5\sqrt{6}; \frac{5\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = 5,$$

cujus radix est $\sqrt{5}$.

Denique

$$\sqrt{14} \cdot \sqrt{35} = \sqrt{490} = 7\sqrt{10}; \frac{7\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = 7,$$

cujus radix est $\sqrt{7}$.

quare tota radix est

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7}) \cdot \sqrt{11}$$

217. Sed, inventis omnibus partibus radices præter ultimam, hæc facile invenitur per subtractionem. Nam, quantitas integræ est aggregatum omnium quadratorum. Hinc ergo demè quadrata omnium partium inventarum, restabit quadratum partis quæsitæ.

Sic in exemplo proposito est $17 - 2 - 3 - 5 = 7$.

218. Si radix est polynomia, fieri non potest ut in ejus quadrato tota rectangula coeant quot sunt radices partes.

Sit q numerus terminorum seu partium in radice. Quadratum continebit $\frac{q}{2}$ rectangula nullam literam communem habentia. Nam duo termini diversi dant unum rectangulum. Ergo in q rectangulis, aut quibus terminus radices bis, aut aliquis sæpius repetitus & semper in terminum diversum ductus invenietur.

Sint ergo $a^m b^n$; $a^m c^r$ duo rectangula

in quibus adest idem radices terminus $a^{\frac{1}{m}}$.

Jam $a^{\frac{1}{m}} b^{\frac{1}{n}}$ ad $a^{\frac{1}{m}} c^{\frac{1}{r}}$ ut $b^{\frac{1}{n}}$ ad $c^{\frac{1}{r}}$, sunt

autem commensurabiles quantitates $a^{\frac{1}{m}}$.

$b^{\frac{1}{n}}$, & $a^{\frac{1}{m}} c^{\frac{1}{r}}$ per hypothesin, ergo & $b^{\frac{1}{n}}$

atque $c^{\frac{1}{r}}$ (EVEL. 10. X).

Eodem pacto $c^{\frac{1}{r}}$ probabitur commensurabilis alteri radices termino, & sic in infinitum; Ergo omnes termini radices erunt commensur-

LXXXV. Est & regula extrahendi altiores radices ex quantitativibus numerabilibus duarum potentia commensurabilium partium.

Sit quantitas $A \pm B$. Ejus pars major A. Index radice extrahendæ c.

Quære minimum numerum n, cujus potestas n^c dividitur per AA — BB sine residuo, & sit quotus Q. Computa $\sqrt{(A + B) \sqrt{Q}}$ in numeris integris proximis. Si illud r. Divide $A \sqrt{Q}$ per maximum divisorem rationalem: Sit

quotus s, sitque $\frac{r + \frac{n}{2s}}{2s}$ in numeris integris proximis r. Et erit $\frac{rs + \sqrt{(rtss - n)}}{2c \sqrt{Q}}$

radix quesita, si modo radix extrahi potest.

Ut

rabiles (Eucl. 12. X.) contra hypothefim.

$$\frac{1}{b^n} \frac{1}{c^r}; f^t g^p; c^r f^t; b^n g^p; \&c.$$

219. Quot rectangula sunt in quadrato commensurabilia, siue coalescunt, tot in radice termini sunt commensurabiles, & coeunt.

quæ non habent eandem rationem. Jam est

Si q, numerus terminorum in radice, esset impar, ex eo deme unitatem, & $\frac{q-1}{2}$ erit numerus rectangulorum diversorum; ut patet; quocirca idem radice terminus saltem ter reperitus esset in quadrato. Qua hypothefi ratiocinium nostrum confirmatur & fortius evadit.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{b^n} \frac{1}{c^r} \text{ ad } \frac{1}{c^r} \frac{1}{f^t} \text{ ut } \frac{1}{b^n} \text{ ad } \frac{1}{f^t} \\ & \frac{1}{b^n} \frac{1}{c^r} \text{ ad } \frac{1}{b^n} \frac{1}{g^p} \text{ ut } \frac{1}{c^r} \text{ ad } \frac{1}{g^p} \\ & \frac{1}{f^t} \frac{1}{g^p} \text{ ad } \frac{1}{c^r} \frac{1}{f^t} \text{ ut } \frac{1}{g^p} \text{ ad } \frac{1}{f^t} \end{aligned}$$

220. Si radix est polynomia, fieri non potest ut in quadrato alterum quadratum simplex, & tot rectangula, quot sunt partes radice, una demta, coeant, nisi hæc rectangula sint in eadem ratione.

Et rectangula sunt commensurabilia per hypothefim; commensurabiles ergo sunt quantitates

$$\frac{1}{b^n}; \frac{1}{c^r}; f^t; g^p; \&c.; \text{ id est omnes ter-}$$

Quoniam, si q est numerus terminorum in radice, numerus rectangulorum nullam literam communem habentium est in quadrato $\frac{q}{2}$; in $q-1$ rectangulis quivis terminus radice saltem bis repetetur, nisi $\frac{q}{2} = q-1$, aut $q = 2$; & tunc polynomium recideret in binomium, in quo est primum quadratum ad rectangulum ut rectangulum ad alterum quadratum (Eucl. 1. VI. aut 17. VII., vel 11. VIII.) sed, ex hypothefi alterum quadratum & rectangulum sunt commensurabilia, ergo & rectangulum atque reliquum quadratum (Eucl. 12. X.). Quare totum polynomium coalescet,

mini radice, saltem præter a^m , erunt commensurabiles, & radix fiet binomia, contra hypothefim.

Nunc rectangula commensurabilia sint in eadem ratione, puta,

$$\frac{1}{b^n} \frac{1}{c^r}; \frac{1}{b^n} \frac{1}{g^p}; f^t c^r; f^t g^p; \&c.$$

Probabitur, ut supra, esse $\frac{1}{c^r}$ & $\frac{1}{g^p}$; $\frac{1}{b^n}$

Sit ergo $q-1$ major quam $\frac{q}{2}$; & rectangula commensurabilia inter se & cum quadrato ipsius a^m , sint

& f^t commensurabiles binæ inter se, sed non omnes. Unde conficietur radicem quidem habere minorem terminorum numerum, quam supponebatur, sed non esse binomiam.

Ut si radix cubica extrahenda sit ex $\sqrt[3]{968 + 25}$; erit $AA - BB = 343$; (n) ejus divisores 7, 7, 7, ergo $n = 7$ & $Q = 1$. Porro $(A + B)\sqrt[3]{Q}$, seu $\sqrt[3]{968 + 25}$, extracta prioris partis radice, fit paulo major quam 56; ejus radix cubica in numeris proximis est 4 (ρ). Ergo $r = 4$. Insuper $A\sqrt[3]{Q}$ seu $\sqrt[3]{968}$ extrahendo quicquid rationale est fit $22\sqrt[3]{2}$ (p). Ergo

$\sqrt[3]{2}$, ejus pars radicalis, est s , & $\frac{r + \frac{n}{r}}{2s}$ seu $\frac{5 \frac{3}{4}}{2\sqrt[3]{2}}$ in numeris integris proximis est 2 (q). Ergo $t = 2$. Denique ts est $2\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{ts^3} - n$ est 1 & $\sqrt[3]{Q}$ seu $\sqrt[3]{1}$ est 1. Ergo $2\sqrt[3]{2} + 1$ est radix quaesita si modo radix extrahi queat. Tento itaque per multiplicationem si cubus ipsius $2\sqrt[3]{2} + 1$ fit $\sqrt[3]{968 + 25}$ & res succedit.

Rursus si radix cubica extrahenda sit ex $68 - \sqrt[3]{4374}$; erit $AA - BB = 250$ (r). Cujus divisores sunt 5, 5, 5, 2. Ergo $n = 5 \cdot 2 = 10$, & $Q = 4$ (s). Et $\sqrt[3]{(A + B)\sqrt[3]{Q}}$ seu $\sqrt[3]{(68 + \sqrt[3]{4374})2}$ in numeris proximis integris est 7 = r . Insuper $A\sqrt[3]{Q}$ seu $68\sqrt[3]{4}$ extrahendo quicquid rationale est fit $136\sqrt[3]{1}$. Ergo $s = 1$, & $\frac{r + \frac{n}{r}}{2s}$ seu $\frac{7 + \frac{10}{7}}{2}$ in numeris integris proximis est 4 = t (t): Ergo $ts = 4$, $\sqrt[3]{ts^3 - n} = \sqrt[3]{6}$ & $\sqrt[3]{Q} = \sqrt[3]{4}$ seu

(n) Pone $A = \sqrt[3]{968}$, & $B = 25$; & erit $AA = 968$, $BB = 625$, unde $AA - BB = 968 - 625 = 343$.

(ρ) Siquidem quadratum proximum ipsi 968 est 961, cujus radix est 31; & $31 + 25 = 56$. cui proximus cubus est 64, hujusque radix $= 4 = r$.

(p) Nam $\sqrt[3]{968} = \sqrt[3]{484 \cdot 2}$, & $\sqrt[3]{484} = 22$.

(q) Est enim $r + \frac{n}{r} = 4 + \frac{7}{4} = 5 \frac{3}{4}$.

$= \sqrt[3]{5 \frac{3}{4}} \cdot \sqrt[3]{5 \frac{3}{4}} = \sqrt[3]{25 + \frac{30}{4} + \frac{9}{16}}$

$= \sqrt[3]{33 \frac{1}{16}}$; quaesitum per $2s = 2\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{8}$

dat $\sqrt[3]{4 \frac{17}{128}}$; negligo $\frac{17}{128}$; quia quaeritur numerus integer, restat $\sqrt[3]{4} = 2 = t$.

(r) Fac $A = 68$; $B = \sqrt[3]{4374}$; ergo AA

$= 4624$; $BB = 4374$.

(s) Nempe quia $n^3 = 1000$, & $\frac{n^3}{A^3 - B^3}$

$= \frac{1000}{250} = 4$.

(t) Quadratum proximum ipsi 4374 est 4356, cujus radix = 66, & $(68 + 66)2 = 268$; cui proximi cubi sunt 343, aut 216, illius radix = 7; hujus = 6; alterutram sume; si pri-

ma, erit $r = 7$, & $\frac{r + \frac{n}{r}}{2s} = \frac{7 + \frac{10}{7}}{2}$

$= \frac{50}{14} = 4 = t$; si secundam erit $r = 6$,

$\frac{r + \frac{n}{r}}{2s} = \frac{6 + \frac{10}{6}}{2} = \frac{23}{6} = 4 = t$;

nam enim a vero aberrabis si pro $\frac{23}{6}$ ponas 3.

scu $\sqrt[3]{2}$ atque adeo radix tendanda $\frac{4 - \sqrt{6}}{\sqrt[3]{2}}$.

Iterum si radix quadrato-cubica extrahenda sit ex $29\sqrt{6} + 41\sqrt{3}$; erit $AA - BB = 3$, adeoque $n = 3$, $Q = 81$, $r = 5$, $s = \sqrt{6}$, $t = 1$, $ts = \sqrt{6}$, $\sqrt{(ts - n)} = \sqrt{3}$ & $\sqrt{Q} = \sqrt{81}$ scu $\sqrt[5]{9}$ (u) atque adeo radix tendanda $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt[5]{9}}$ (x).

LXXXVI.

(u) Sit $A = 29\sqrt{6}$; $B = 41\sqrt{3}$; $AA = 5046$; $BB = 5043$; $AA - BB = 3 = n$; $\frac{AA - BB}{AA - BB} = \frac{243}{3} = 81 = Q$; $\sqrt{Q} = 9 = (A + B)\sqrt{Q} = 261\sqrt{6} + 369\sqrt{3} = \sqrt{408726} + \sqrt{408483} = 639 + 639$ (sicilicet in numeris integris promis,) quare $\sqrt{(A + B)\sqrt{Q}} = \sqrt{1278}$; proximiores potestates quintæ sunt 3125; & 1024 illius radix ≈ 5 hujus ≈ 4 ; sumpta prima habes

$$\frac{r + \frac{n}{r}}{2t} = \frac{5 + \frac{3}{5}}{2 \cdot 5} = \frac{\sqrt{31 + \frac{9}{25}}}{\sqrt{24}} = 1 = t \text{ in numeris integris; sumpta secunda reperies}$$

$$\frac{r + \frac{n}{r}}{2t} = \frac{4 + \frac{3}{4}}{2 \cdot 4} = \frac{\sqrt{22 + \frac{9}{16}}}{\sqrt{24}} = 1. \text{ (in numeris integris).}$$

(x) 221. In geometrica proportione continua descendente $a : b :: b : c$, dico quod $a - b$ differentia inter primum, & secundum terminum superat $\frac{a - c}{2}$ semissem differentiam inter primum, & tertium.

Nam $a + c$ superat $2b$. (Eucl. 25. V.); ergo a superat $2b - c$, & $a - 2b$ superat $-c$, & addita utrinque a , $2a - 2b$ superat $a - c$, ac dividendo per 2, $a - b$ superat $\frac{a - c}{2}$.

222. Si dua continua proportiones geometrica $a : b :: b : c$, & $f : b :: b : g$, habuerint eandem mediam b , & sit a major quam f , erit vice versa g major quam c .

Siquidem $ac = bb = fg$, ergo $a : g :: f : c$ (Eucl. 16. VI.), sed per hypothesin a major quam f , ergo g major quam c (Eucl. 16. V.)

223. Si dua geometrica proportiones continua decrescentes $a : b :: b : c$, & $f : b :: b : g$, habeant communem mediam b , dico $(a - f)$ differentiam inter primos terminos majorem esse $(c - g)$ differentiam inter ultimos.

Est enim $a : g :: f : c$ (No. 222. huius) ergo $a - f : g - c :: f : c$ (Eucl. 19. V.) sed quia proportiones decrescunt f major quam b , & b major quam c ; ergo & c.

224. Si $\sqrt[m]{p}$ sit quantitas surda, & sumatur in integris numeris potestas perfecta a^m , illi proxima, ita ut $p = a^m \pm b$, dico a differre a vera radice $\sqrt[m]{(a^m + b)}$ & quidem quantitate positiva, sed differentiam unitate minorem esse.

Sit x quævis quantitas, ita ut $(a \pm x)^m = a^m \pm b$, ostendendum est esse x minorem unitate.

Jam a^m minor quam $a^m + b$, at $a^m + b$ ponitur $= (a + x)^m$, ergo a^m minor quam $(a + x)^m$ & a minor quam $a + x$: Item $a^m - b$ minor quam a^m , sed $a^m - b = (a - x)^m$, igitur a major quam $a - x$; quare semper x major quam $a - a$, id est nihilo, adeoque x est quantitas positiva.

Rursus $a^m \pm b$ minor quam $(a \pm 1)^m$, secus enim a^m non esset potestas in numeris integris omnium proxima ipsi $a^m \pm b$, ac ob eandem rationem $a^m \pm b$ major quam $(a - 1)^m$, ergo $\sqrt[m]{(a^m \pm b)}$, aut $a \pm x$ minor quam $a + 1$, & major quam $a - 1$, igitur $a + 1$ minus

LXXXVI. Ceterum in hujusmodi operationibus si quantitas fractio sit, vel partes ejus communem habeant divisorem; radices denominatoris & factio-

minus differt ab $a \pm x$, quam ab $a - 1$, id est $a + 1 - a \pm x$ minor quam $a + 1 - a + 1$, aut $1 \mp x$ minor quam 2, aut $\mp x$ minor quam $2 - 1$, id est, unitate.

225. Si due geometrica proportiones continua^m $\sqrt[m]{(a^m + b)}$. c. : c. f. & a. c. : c. g. habeant mediam communem c, & sit $\sqrt[m]{(a^m + b)} - c$ major unitate; a vero sit radix proxima ipsi $\sqrt[m]{(a^m + b)}$, in numeris integris, dico quod a est major quam c.

Est ex hyp. $\sqrt[m]{(a^m + b)} - c$, major unitate; ergo $\sqrt[m]{(a^m + b)} - 1$ major quam c, sed $\sqrt[m]{(a^m + b)} - a$ est minor unitate, aut a est major quam $\sqrt[m]{(a^m + b)} - 1$, ergo fortius a major est quam c.

226. Si ad potestatem c, elevetur binomium $a + b$, & hujus potestatis

$$\begin{aligned} & a^c + ca^{c-1}b + \frac{c \cdot c-1}{2} a^{c-2}b^2 \\ & + \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2}{2 \cdot 3} a^{c-3}b^3 \\ & + \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2 \cdot c-3}{2 \cdot 3 \cdot 4} a^{c-4}b^4 \&c. \end{aligned}$$

sermini

$$\begin{aligned} & a^c + \frac{c \cdot c-1}{2} a^{c-2}b^2 \\ & + \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2 \cdot c-3}{2 \cdot 3 \cdot 4} a^{c-4}b^4, \&c \\ & ca^{c-1}b + \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2}{2 \cdot 3} a^{c-3}b^3 \&c. \end{aligned}$$

alternatim sumantur, dico quod

$$\begin{aligned} & (a^c + \frac{c \cdot c-1}{2} a^{c-2}b^2 \&c.)^2 \\ & - (ca^{c-1}b + \\ & \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2}{2 \cdot 3} a^{c-3}b^3 \&c.)^2 \end{aligned}$$

differentia nempe quadratorum partium
 $= (aa - bb)^c$.

$$\text{Pone } a^c + \frac{c \cdot c-1}{2} a^{c-2}b^2 \&c. = f,$$

$$\&c. ca^{c-1}b$$

$$+ \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2}{2 \cdot 3} a^{c-3}b^3 \&c. = g$$

erit tota potestas

$$a^c + ca^{c-1}b + \frac{c \cdot c-1}{2} a^{c-2}b^2 \&c.$$

$$= (a + b)^c = f + g,$$

&c partium differentia

$$a^c - ca^{c-1}b + \frac{c \cdot c-1}{2} a^{c-2}b^2$$

$$- \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2}{2 \cdot 3} a^{c-3}b^3 \&c.$$

$$= (a - b)^c = f - g$$

sed &c

$$(a^c + \frac{c \cdot c-1}{2} a^{c-2}b^2) \&c. = ff, \text{ atque}$$

$$(ca^{c-1}b + \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2}{2 \cdot 3} a^{c-3}b^3)^2$$

$$\&c. = gg,$$

quapropter

$$\begin{aligned} & (a^c + \frac{c \cdot c-1}{2} a^{c-2}b^2)^2 - (ca^{c-1}b \\ & + \frac{c \cdot c-1 \cdot c-2}{2 \cdot 3} a^{c-3}b^3)^2 = ff - gg \end{aligned}$$

&c est

$$\begin{aligned} & ff - gg = (f + g) \cdot (f - g) = (a + b)^c \cdot (a - b)^c \\ & = (aa - bb)^c. \text{ (Eucl. 5. II.)} \end{aligned}$$

227. In numeris, si a superat b, & c sit nu-

torum seorsim extrahe. Ut si ex $\sqrt[3]{242 - 12}$ radix cubica extrahenda sit; hoc, reductis partibus ad communem denominatorem, fiet $\frac{\sqrt[3]{968 - 27}}{2}$;

Dein

merus impar, erit $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^c$ binomium, cujus membrum majus ductum est in \sqrt{a} , & minus in \sqrt{b} .

Cum c sit impar, erit $c-1$ par. Ponatur $c-1 = 2n$. Erit

$$\begin{aligned} c &= 2n + 1; & c-2 &= 2n - 1; \\ c-3 &= 2n - 2; & c-4 &= 2n - 3; \\ c-5 &= 2n - 4 & \&c. \end{aligned}$$

Jam, $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^c$, neglectis signis & coefficientibus, (de quibus hic non agitur) fit

$$\begin{aligned} &\sqrt{a}^c; \sqrt{a}^{c-1} \cdot \sqrt{b}; \sqrt{a}^{c-2} \cdot b; \\ &\sqrt{a}^{c-3} \cdot b\sqrt{b}; \sqrt{a}^{c-4} \cdot bb; \\ &\sqrt{a}^{c-5} \cdot bb\sqrt{b} \&c. \end{aligned}$$

aut, positis pro c ; $c-1$; $c-2$; &c. valoribus supra determinatis,

$$\begin{aligned} &\sqrt{a}^{2n+1}; \sqrt{a}^{2n} \cdot \sqrt{b}; \sqrt{a}^{2n-1} \cdot b; \\ &\sqrt{a}^{2n-2} \cdot b\sqrt{b}; \sqrt{a}^{2n-3} \cdot bb; \\ &\sqrt{a}^{2n-4} \cdot bb\sqrt{b} \&c. \end{aligned}$$

est autem

$$\sqrt{a}^{2n+1} = a^n \sqrt{a}; \sqrt{a}^{2n} = a^n;$$

$$\sqrt{a}^{2n-1} = \frac{a^n}{\sqrt{a}}.$$

$$= \frac{a^{n-1} \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a}} = a^{n-1} \sqrt{a};$$

$$\sqrt{a}^{2n-2} = a^{n-1} \&c.$$

Igitur termini superiores mutabuntur in

$$a^n \sqrt{a}; a^n \sqrt{b}; a^{n-1} b \sqrt{a}; a^{n-1} b \sqrt{b};$$

$$a^{n-2} bb \sqrt{a}; a^{n-2} bb \sqrt{b} \&c.$$

quare termini alternatim ducti sunt in \sqrt{a} ; & \sqrt{b} ; si ergo alternatim excerptant, habebitur numerus rationalis ductus in \sqrt{a} unum terminum efficiens, ut alter pariter rationalis ductus in \sqrt{b} .

Item bini termini proximi habent $a^n \sqrt{a}$; $a^n \sqrt{b}$ &c., scilicet habent eandem quantitatem rationalem, tantum ergo irrationali dif-

ferunt; sed \sqrt{a} major est \sqrt{b} , ergo $a^n \sqrt{a}$ major est $a^n \sqrt{b}$, & sic de ceteris.

228. Si pro \sqrt{a} , aut \sqrt{b} , habeatur quantitas rationalis f , membrum quod nunc est ductum in \sqrt{a} , aut \sqrt{b} , erit rationale, eritque rationale membrum potestatis altero majus, si rationalis terminus radicis alterum superet.

229. *Idem* positis, si numerus c fuerit par; potestas erit binomium, cujus membrum unum rationale, alterum erit ductum in \sqrt{ab} .

$$\begin{aligned} &\text{Nam tunc } c = 2m, \&c. \frac{c}{2} = a^m; \\ &\frac{c-1}{2} \sqrt{b} = a^m - \frac{1}{2} \sqrt{b} = a^{m-1} \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \\ &= a^{m-1} \sqrt{ab}, \quad a^{c-2} b = a^{m-1} b, \\ &\frac{c-3}{2} b \sqrt{b} = a^{m-1} b \sqrt{ab} \&c. \end{aligned}$$

230. Si pro \sqrt{a} , aut \sqrt{b} scribatur quantitas rationalis f , irrationale binomii membrum ducetur tantum in quantitate irrationali, quae superest.

231. Tunc ergo $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^c = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^{2m}$, sed $\sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^{2m}} = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^m$ (N^o. 159. hujus). Tunc igitur potest extrahi radix quadrata ex binomio proposito.

232. Potestas continens radices quadratas habet radicem compositam pariter ex radicibus quadratis.

233. Non potest ex binomio radix c extrahi; nisi differentia quadratorum partium habeas radicem c rationalem.

Radix, si potest exprimi, continet solum radices quadratas, fit ergo haec $\sqrt{a + \sqrt{b}}$, ita ut binomium datum aequet $(\sqrt{a + \sqrt{b}})^c$, differentia quadratorum partium est $(a - b)^c$ (N^o. 226. hujus) cujus radix c est $a - b$.

Dein extracta seorsim numeratoris ac denominatoris radice cubica oriatur
 $\frac{2\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}}$. Rursus si ex $\sqrt[3]{3993} + \sqrt[6]{17578125}$ radix aliqua extrahenda

234. Non potest ex binomio $A + B$ radix c extrahi, cum c est par, & $\frac{n}{r} = 2m$, nisi rationale binomii membrum A , sit altero majus.

Ponamus $A+B = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^c$
 $\Rightarrow (\sqrt{a} + \sqrt{b})^{2m}$, ergo $\sqrt{A+B}$
 $= (\sqrt{a} + \sqrt{b})^m$. Facio $\sqrt{A+B} = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^m =$
 $f\sqrt{a} + g\sqrt{b}$; igitur quadrando $A+B$,
 $= ffa + 2fg\sqrt{ab} + ggb$, quare $A = ffa + ggb$,
 & $B = 2fg\sqrt{ab}$, sed $ffa = fg\sqrt{ab}$, $ggb = fg\sqrt{ab}$,
 & $B = 2fg\sqrt{ab}$, sed $ffa = fg\sqrt{ab}$, $ggb = fg\sqrt{ab}$,
 & $B = 2fg\sqrt{ab}$, ergo A superat B .

His positis sic demonstratur Auctoris regula

235. Binomium datum est $A \pm B$; n detegitur, & Q determinatur, ita ut $\Delta A Q - B B Q$
 $= n^c$.

Non binomii dati, sed hujus $A\sqrt{Q} \pm B\sqrt{Q}$, radicem quærit Auctor, & ubi hanc detectam habet, ipsam dividit per \sqrt{Q} ipsius \sqrt{Q} , id est, per \sqrt{Q} , ut habeat radicem binomii dati $A \pm B$.

Præparatione hac binomium acquirit conditiones, sine quibus ipsius radix exprimi non posset, (No. 233. hujus); est nunc n^c differentia quadratorum membrorum $A\sqrt{Q}$, & $B\sqrt{Q}$, ex qua si \sqrt{Q} extrahatur, habemus rationalem numerum n .

Ponamus $x\sqrt{y} \pm \sqrt{z}$ exprimere radicem quæsitam binomii $A\sqrt{Q} \pm B\sqrt{Q}$, & $x\sqrt{y}$, esse partem majorem. Cum nunc de fractionibus non agatur, de quibus Auctor separatim tractat, erunt x, y, z , numeri integri, nam cum in potestate proposita non dentur fractiones, neque in radice dantur.

Differentia quadratorum membrorum binomii $x\sqrt{y} \pm \sqrt{z}$ elevati ad potestatem c , id est differentia quadratorum $A\sqrt{Q}$, & $B\sqrt{Q}$, est $(xxy - z)^c$ (No. 226. hujus) ergo $(xxy - z)^c$

$$= AAQ - BBQ = n^c, \text{ \& } xxy - z = n.$$

Ex hac æquatione deducimus decrecentem proportionem $x\sqrt{y} + \sqrt{z} : \sqrt{n} :: \sqrt{n} : x\sqrt{y} - \sqrt{z}$.

Sed $r : \sqrt{n} :: \sqrt{n} : r$; & r superat \sqrt{n} (No.

fit;
 234. hujus) ergo \sqrt{n} superat $\frac{n}{r}$, & $\frac{n}{r}$ superat $x\sqrt{y} - \sqrt{z}$, aut o superat $x\sqrt{y} - \sqrt{z} - \frac{n}{r}$, si $x\sqrt{y} + \sqrt{z}$ superat r , aut vice versa (No. 222. hujus) & $x\sqrt{y} + \sqrt{z} - r$ minor 1 , (No. 223. hujus) & $x\sqrt{y} - \sqrt{z} - \frac{n}{r}$ minor o , ergo $2x\sqrt{y} - r - \frac{n}{r}$, (differentia inter $2x\sqrt{y}$, & $r + \frac{n}{r}$, inulto minor unitate, quare $x\sqrt{y} - \frac{r + \frac{n}{r}}{2}$ minor $\frac{1}{2}$.

His positis quatuor casus examinandi sunt, nam $A\sqrt{Q}$, est aut rationalis, aut surda, & in utroque casu, c est par, aut impar.

I. Rationalis est quantitas $A\sqrt{Q}$, & c impar.

In hoc casu $x\sqrt{y}$ pars major radices est rationalis, (No. 228. hujus); est ergo numerus integer; non enim hic, ut jam monuimus,

agitur de fractionibus, idcirco $\frac{r + \frac{n}{r}}{2}$ est ipsum membrum maximum radices; nam numeri integri ad minimum unitate differunt, & quantitas hæc non $\frac{1}{2}$ differt a membro maximo.

Tunc etiam $s = 1$, & ideo $\frac{r + \frac{n}{r}}{2}$
 $= \frac{r + \frac{n}{r}}{2} = s = 1$, & membrum maximum bene per regulam Auctoris determinatum est.

II. Irrationalis est quantitas $A\sqrt{Q}$, & numerus c impar.

Est nunc $x\sqrt{y}$ numerus surdus, & quantitas $A\sqrt{Q}$ ad minimos terminos reducta eandem radicalem habet cum $x\sqrt{y}$ (No. 227. hujus) radicalem hanc Auctor quærit, & vocat s , ergo $s = \sqrt{y}$.

fit; divide partes per communem divisorem $\sqrt[3]{3}$; & emerget $11 + \sqrt{125}$

Vidimus $\frac{r + \frac{n}{r}}{2}$ ab $\sqrt[3]{xy}$ non differre $\frac{1}{2}$, minus differunt si per s , aut $\sqrt[3]{y}$ dividantur, quia quantitas hæc superat unitatem. Idcirco

$\frac{r + \frac{n}{r}}{2s}$, & x , minus differunt $\frac{1}{2}$, & ideo x

est numerus integer proximus ipsi $\frac{r + \frac{n}{r}}{2s}$, id est $t = x$.

Sed jam habuimus $s = \sqrt[3]{xy}$, ergo $ts = \sqrt[3]{x^2y}$, & bene radices membrum fuit determinatum.

III. Rationalis est quantitas $\sqrt[3]{VQ}$, & e numerus par.

In hoc casu, non ut casu I., constat $\sqrt[3]{xy}$ esse rationale (N^o. 229. hujus); ideo casus hic tertius in duos subdividitur.

Quando $\sqrt[3]{xy}$ est rationale, demonstratio casus primi locum habet, & detegitur pars major radices.

Si vero $\sqrt[3]{xy}$ sit furda quantitas, methodus ad veram radicem non conducit, nam propter rationale $\sqrt[3]{VQ}$, semper $s = 1$, & non $\sqrt[3]{y}$, quod desideratur ut in casu 2. demonstravimus.

IV. Irrationalis est quantitas $\sqrt[3]{VQ}$, & e numerus par.

Ex hac quantitate radix quaesita non potest extrahi (N^o. 234. hujus) & inutile foret Auctoris regulam, aut aliam quamcunque, tali quantitati applicare.

Dato nunc $\sqrt[3]{xy}$ maximo membro radices æquale ts , demonstramus $\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{(ts^3 - n)}$, id est $z = ts^3 - n$.

Habemus

$$\sqrt[3]{xy} = ts \text{ \& \ } xxy = ts^3$$

sed, ut superius vidimus, $xxy - z = n$.

Ergo subtrahendo æquationem ultimam ex præcedenti.

$$xxy - xxy + z = z = ts^3 - n.$$

Quod demonstrandum erat.

Eodem signo radices membra jungenda esse, quo membra quantitatis propositæ junguntur, clarum est.

Radicem detectam tentandam esse dicit au-

tor, quia demonstratio ponit, radicem posse exprimi per $\sqrt[3]{xy} = \sqrt[3]{z}$, & ideo locum tantum habet quando radix extrahi potest; sed minime ex demonstratione sequitur semper posse.

Ex demonstratis sequentia deducimus corollaria, quibus methodus auctoris illustratur.

236. Quando e est numerus impar, semper methodus Auctoris conducit ad veram radicem, quando hæc extrahi potest.

237. Quando e est par, & radix extrahi potest, detegitur hæc si alterutrum membrorum radices fuerit rationale.

Constat hoc esse demonstratis, si rationale fuerit membrum majus radices (N^o. 234. hujus); sed si membrum hoc irrationale fuerit, detegitur radix si $\sqrt[3]{VQ}$ adhibeatur in detegendo s , non $\sqrt[3]{VQ}$, ut hoc patet hisce casibus applicando demonstrata, constat enim in hoc casu etiam esse $s = \sqrt[3]{y}$ (N^o. 230. hujus).

Unde deducimus, cum ante initam operationem non possimus prævidere utrum membrum radices rationale sit majus an minus, si radix per methodum Auctoris detecta, quæ semper habebit majus membrum rationale, non sit vera, aliam quærendam esse, in qua majus membrum sit irrationale.

238. Si nulla ex ambabus radicibus in corollario præcedenti memoratis vera sit, neque inde poterimus concludere radicem extrahi non posse.

Si enim membra ambo radices fuerint irrationalia $\sqrt[3]{xy}$, & $\sqrt[3]{z}$, erit tamen $\sqrt[3]{VQ}$ rationale (N^o. 234. hujus), & $s = 1$ (Cas. I. hujus), per methodum Auctoris. Si juxta observata in corollario præcedenti, in subsidium vocemus $\sqrt[3]{VQ}$ erit $s = \sqrt[3]{yz}$, (N^o. 229. hujus) & non incipias ire possimus in hoc casu fallere Auctoris methodum, qui defectus tamen usum ipsius methodi non minuit, si, ut in sua methodo præscribit VAN SCHOOTEN, extractione radices quadratæ, per methodum notissimam, problema reducamus ad extractionem radices, cujus index est numerus impar.

239. Quando index radices est numerus par, & majus membrum binomii propositi est irrationale, non potest radix exprimi, & non quærenda est, ut jam monuimus (Cas. IV. hujus).

(y). Unde quantitas propofita valet $\sqrt[3]{3}$ in $(11 + \sqrt{125})$ cujus radix invenietur extrahendo feorfim radicem factoris utriusque $\sqrt[3]{3}$ & $11 + \sqrt{125}$.

Hæc demonstratio eſt Clariffimi ſ'GRAVESANDE, quam pauliſper mutavimus propter principia a nobis jam poſita.

$$= \sqrt[6]{9}, \text{ atque } \frac{\sqrt[6]{17578125}}{\sqrt[6]{9}} = \sqrt[6]{1953125} =$$

$$(y) \text{ Nam } \frac{\sqrt[3]{3993}}{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{1331} = 11; \text{ \& } \sqrt[3]{3} \sqrt[3]{125}.$$

SECTIO SECUNDA.

CAPUT PRIMUM.

DE FORMA ÆQUATIONIS.

I. **Æ**quationes, quæ sunt quantitatum aut sibi mutuo æqualium, aut simul nihilo æquipollentium, congeries, duobus præcipue modis considerandæ veniunt; vel ut ultimæ conclusiones ad quas in problematis solvendis devenit, vel ut media quorum ope finales æquationes acquirendæ sunt.

Prioris generis æquatio ex unica tantum incognita quantitate cognitis involuta conflatur, modo problema sit definitum & aliquid certi quærendum innuat.

Sed ex posterioris generis involvunt plures quantitates incognitas, quæ ideo debent inter se comparari & ita connecti ut ex omnibus una tandem emergat æquatio nova cui inest unica, quam quærimus, incognita quantitas admista cognitis. Quæ quantitas ut exinde facilius eliciatur, æquatio ista variis plerumque modis transformanda est, donec evadat ea simplicissima quæ potest, atque etiam similis alicui ex sequentibus earum gradibus, in quibus x designat quantitatem quæsitam ad cujus dimensiones termini, ut vides, ordinantur, & p, q, r, s alias quascunque quantitates ex quibus determinatis & cognitis etiam x determinatur, & per methodos explicandas investigari potest.

$$\begin{aligned} x &= p. \\ xx &= px + q. \\ x^3 &= pxx + qx + r. \\ x^4 &= px^3 + qxx + rx + s. \\ &\text{\&c.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - p &= 0. \\ \text{Vel } xx - px - q &= 0. \\ x^3 - pxx - qx - r &= 0. \\ x^4 - px^3 - qxx - rx - s &= 0. \\ &\text{\&c.} \end{aligned}$$

II. Ad horum normam itaque termini æquationum secundum dimensiones

nes

nes incognitæ quantitatis in ordinem semper redigendi sunt, ita ut primum locum occupent in quibus incognita quantitas est plurimarum dimensionum, instar x , xx , x^3 , x^4 , & secundum locum in quibus ea est una dimensione minor, instar p , px , pxx , px^3 , & sic præterea. Et, quod signa terminorum attinet, possunt ea omnibus modis se habere: Imo & unus vel plures ex intermediis terminis aliquando deesse.

Sic $x^3 - bbx + b^3 = 0$ vel $x^3 = bbx - b^3$, est æquatio tertii gradus

$$Z^4 - \frac{a}{b} Z^3 + \frac{ab^3}{b^4} = 0, \text{ æquatio quarti.}$$

Nam gradus æquationum æstimantur ex maxima dimensione quantitatis incognitæ, nullo respectu ad quantitates cognitæ habito, nec ad intermedios terminos.

Attamen ex defectu intermediorum terminorum æquatio plerumque fit multo simplicior, & nonnunquam ad gradum inferiorem quodammodo deprimitur. Sic enim $x^4 = qxx + s$, æquatio secundi gradus censenda est, siquidem ea in duas secundi gradus æquationes resolvi potest. Nam supposito $xx = y$, & y pro xx in æquatione illa perinde scripto, ejus vice prodibit $yy = qy + s$, æquatio secundi gradus; cujus ope cum y inventa fuerit, æquatio $xx = y$ secundi etiam gradus, dabit x . (*)

Atque hæc sunt conclusiones ad quas problemata deduci debent. Sed antequam eorum resolutionem aggrediar, opus erit ut modos transformandi & in ordinem redigendi æquationes, & ex mediis eliciendi finales æquationes abstracte doceam. Æquationis autem solitariæ reductionem in sequentibus regulis complectar.

CAPUT SECUNDUM.

De concinnanda Æquatione solitaria.

REGULA I.

III. **S**iquæ sunt quantitates quæ se mutuo destruere, vel per additionem aut subtractionem coalescere possunt, termini perinde minuendi sunt.

Veluti si habeatur $sb - 3a + 2x = sa + 3x$, aufer utrinque $2x$ & adde

(*) 1. Hoc totum Caput continet duas definitiones; prima explicat quid intelligatur nomine æquationis, secunda quid innuatur per gradus æquationum. Præterea hic supponitur, quod jam habentur æquationes effectæ, quæ solum in alias simpliciores sunt conver-

tendæ. Nemo igitur sollicitus sit de ratione inveniendarum æquationum; aut distinguendi quando eæ sint ultima conclusiones, aut media, quorum ope finales æquationes acquiruntur, neque de aliis similibus, quæ omnia suis locis explicata reperientur.

de $3a$, proditque $fb = 8a + x$. Atque ita $\frac{2ab + bx}{a} - b = a + b$,

delendo æquipollentes $\frac{2ab}{a} - b = b$, evadit $\frac{bx}{a} = a$ (a).

Ad hanc regulam referri debet etiam ordinatio terminorum æquationis, quæ fieri solet per translationem ad contrarias partes cum signo contrario.

Ut si habita æquatione $fb = 8a + x$ desideretur x ; aufer utrinque $8a$, vel, quod eodem recidit, transfer $8a$ ad contrarias partes cum signo mutato, & prodibit $fb - 8a = x$ (b).

Eodem modo si habeatur $aa - 3ay = ab - bb + by$ ac desideretur y , transpone $-3ay$ & $ab - bb$, eo ut ex una parte consistant termini multiplicati per y , & ex altera reliqui termini, & prodibit $aa - ab + bb = 3ay + by$, unde y elicitur per regulam quintam sequentem, dividendo scilicet utramque partem per $3a + b$, prodibit enim $\frac{aa - ab + bb}{3a + b} = y$.

Atque ita æquatio $abx + a^3 - aax = abb - 2abx - x^3$ per debitam transpositionem & ordinationem evadit

$$x^3 = \frac{+aa}{-3ab} x - \frac{a^3}{+abb} \text{ vel } x^3 - \frac{aa}{+3ab} x + \frac{a^3}{-abb} = 0 \text{ (c).}$$

REGULA II.

IV. *Siqua compareat quantitas, per quam omnes æquationis termini multiplicantur, debent omnes per illam quantitatem dividi; vel, si per eandem quantitatem omnes dividantur, debent omnes per illam multiplicari.*

Sic habito $15bb = 24ab + 3bx$, divide terminos omnes per b & fit $15b = 24a + 3x$. Deinde per 3 & fit $fb = 8a + x$.

Vel

(a) Nam si $\frac{2ab + bx}{a} - b = a + b$, du-

catur in a erit $2ab + bx - ab = aa + ab$ (Eucl. Ax. 6.) sed $2ab - ab = ab$ ergo $ab + bx = aa + ab$, & utrinque deleta ab (Eucl. Ax. 3.) $bx = aa$, cunctisque demum

divisis per a (Eucl. Ax. 7.) $\frac{bx}{a} = a$.

(b) Quantitas auferitur operatione contraria illi, qua fuit posita. Hic $8a$ jungitur ipsi x per additionem, ergo subtractione auferenda est, sed ut æqualitas maneat, ex æqualibus æqualia sunt demenda (Eucl. Ax. 3.) ergo $8a$ demum debet hinc inde, quod dat $fb - 8a = 8a$

$-8a + x = x$ quia $8a - 8a = 0$.

(c) Siquidem addito x^3 hic inde fit $x^3 + abx + a^3 - aax = abb - 2abx$, & cunctis, præter x^3 , in contrariam partem translatis

$$x^3 = \frac{+aa}{-3ab} x - \frac{a^3}{+abb}$$

vel, his omnibus in eam partem, ubi est x^3 translatis

$$x^3 - \frac{aa}{+3ab} x + \frac{a^3}{-abb} = 0.$$

Vcl habito $\frac{b^3}{ac} - \frac{bbx}{cc} = \frac{xx}{c}$, multiplica omnes per c & prodibit

$$\frac{b^3}{a} - \frac{bbx}{c} = xx.$$

REGULA III.

V. Siqua sit fractio irreducibilis in cujus denominatore reperitur litera illa ad cujus dimensiones æquatio ordinanda est, omnes æquationis termini per istum denominatorem, aut per aliquem divisorem ejus multiplicandi sunt.

Ut si æquatio $\frac{ax}{a-x} + b = x$ secundum x ordinanda sit, multiplicentur omnes ejus termini per $a - x$, denominatorem fractionis $\frac{ax}{a-x}$, siquidem x inibi reperitur, & prodit

$$ax + ab - bx = ax - xx, \text{ seu } ab - bx = -xx,$$

& facta utriusque partis translatione, $xx = bx - ab$.

Atque ita, si habeatur $\frac{a^3 - abb}{2cy - cc} = y - c$ terminique juxta y ordinandi sint, multiplicentur per denominatorem $2cy - cc$ vel saltem per divisorem $2y - c$, quo y tollatur e denominatore, & exsurget

$$\frac{a^3 - abb}{c} = 2yy - 3cy + cc \text{ \& ordinando } \frac{a^3 - abb}{c} - cc + 3cy = 2yy.$$

Ad eundem modum $\frac{aa}{x} - a = x$ multiplicando per x evadit $aa - ax = xx$, & $\frac{aabb}{cxx} = \frac{xx}{a+b-x}$ multiplicando primo per xx , dein per $a+b-x$ evadit $\frac{a^3bb + aab^3 - aabbx}{c} = x^4$.

REGULA IV.

VI. Sicur surdæ quantitati irreducibili litera illa involvatur, ad cujus dimensiones æquatio ordinanda est, ceteri omnes termini ad contrarias partes cum signis mutatis transferendi sunt (d), & utraque pars æquationis in se semel multiplicanda si radix quadratica sit, vel bis si sit cubica, &c.

Sic ad ordinandum juxta x æquationem $\sqrt{aa - ax} + a = x$, transfe-

(d) Ne scilicet quadrandum sit binomium ex rationale, & surda quantitate conitans, quod certe dabit duo rectangula ex rationale in surdam (Eucl. 4. II.); quare surda necdum

ablata foret, nec unquam, ex præcedenti ratiocinio, auferri possit, nisi sola hinc vel inde remaneret.

ratur a ad alteras partes, fitque $\sqrt{aa - ax} = x - a$; & quadratis partibus, $aa - ax = xx - 2ax + aa$, seu $0 = xx - ax$ hoc est $x = a$ (e).

Sic etiam $\sqrt{^3}: (aax + 2axx - x^3) = a + x = 0$, transponendo $-a + x$ evadit $\sqrt{^3}: (aax + 2axx - x^3) = a - x$, & partibus cubice multiplicatis $aax + 2axx - x^3 = a^3 - 3aax + 3axx - x^3$, seu $xx = 4ax - aa$ (f).

Et sic $y = \sqrt{ay + yy - aV(ay - yy)}$ quadratis partibus evadit $yy = ay + yy - aV(ay - yy)$ & terminis debite transpositis (g) $ay = aV(ay - yy)$ seu $y = V(ay - yy)$, & partibus iterum quadratis $yy = ay - yy$, & transponendo denuo, $2yy = ay$, five $2y = a$.

REGULA V.

VII. Terminis secundum dimensiones literæ alicujus, ope præcedentium regularum, dispositis, si maxima ejusdem literæ dimensio per cognitam quamlibet quantitatem multiplicetur, debet tota æquatio per eandem dividi.

Sic $2y = a$ dividendo per 2 evadit $y = \frac{1}{2}a$.

$$\text{Et } \frac{bx}{a} = a \text{ dividendo per } \frac{b}{a} \text{ evadit } x = \frac{as}{b}$$

Et

$$\frac{2ac}{cc} x^3 + \frac{a^3}{aac} xx - \frac{2a^3c}{cc} x - \frac{a^3cc}{cc} = 0$$

dividendo per $2ac - cc$ evadit

$$\frac{x^3}{2ac - cc} + \frac{a^3}{aac} xx - \frac{2a^3c}{cc} x - \frac{a^3cc}{cc} = 0,$$

five

$$x^3 + \frac{a^3 + aac}{2ac - cc} xx - aax - \frac{a^3}{2a - c} = 0.$$

RE-

(e) Deletis $aa - ax$, restat

$$xx - ax = 0,$$

& ax translato, $ax = xx$,

cunctisque divis, per x , $a = x$.

Vel etiam $x = 0$.

Uno verbo dico, quod si $a + c^{\frac{n}{m}}$ elevatur ad quamlibet potestatem p , semper surda remanebit, quia (Nº. 122. Sect. I.)

$$\left(a + c^{\frac{n}{m}}\right)^p = a^p + p a^{p-1} c^{\frac{n}{m}} + \&c.,$$

ubi invenitur ipsissima $c^{\frac{n}{m}}$, quare efficiendum est, ne quantitas surda sit binomii pars, tunc enim eam elevando ad potestatem m , asymmetria, vel, ut ita dicam, irrationalitas au-

feretur, quod constat.

(f) Deletis æqualibus habetur

$$a^3 - 4aax + axx = 0;$$

& cunctis, præter axx , translatis in contrarias partes (Reg. I.)

$$4aax - a^3 = axx,$$

atque omnibus per a divis (Reg. II.)

$$4ax - aa = xx.$$

(g) Nam per (Reg. I.),

$$0 = ay - aV(ay - yy),$$

$$\& \frac{0}{a} = \frac{ay}{a} - \frac{aV(ay - yy)}{a},$$

& per (Reg. II.), $y = V(ay - yy)$

(dividendo scilicet per $-a$). Idem tamen

$$-y = -V(ay - yy),$$

& quadrando $yy = ay - yy$ &c.

REGULA VI.

VIII. Aliquando reductio institui potest dividendo æquationem per compositam aliquam quantitatem.

Sic enim $y^3 = \frac{2c}{+b} y^3 + 3bcy - bbc$, ad hanc $yy = -2cy + bc$ reductur transferendo terminos omnes ad easdem partes hoc modo, $y^3 + \frac{2c}{-b} yy - 3bcy + bbc = 0$, & dividendo per $y - b$, ut in Capite de divisione ostensum est. Prodibit enim $yy + 2cy - bc = 0$. Ast hujusmodi divisorum inventio difficilis est, & eam prius docuimus.

REGULA VII.

IX. Aliquando etiam reductio per extractionem radice ex utraque æquationis parte instituitur.

Quemadmodum si habeatur $xx = \frac{1}{4}aa - bb$, extracta utrobique radice prodit $x = \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$.

Quod si habeatur $xx + aa = 2ax + bb$, transfer $2ax$, & exsurget $xx - 2ax + aa = bb$, extractisque partium radicibus $a - x = +$ vel $-b$, (b) seu $x = a \pm b$.

Sic etiam habito $xx = ax - bb$, adde utrinque $-ax + \frac{1}{4}aa$, & prodit $xx - ax + \frac{1}{4}aa = \frac{1}{4}aa - bb$, & extracta utrobique radice, $x - \frac{1}{4}a = \pm \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$ seu $x = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$.

X. Et sic universaliter: Si sit $x = px. q.$ erit $x = \frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}pp. q.}$

Ubi $\frac{1}{2}p$ & q iisdem signis ac p & q in æquatione priori afficienda sunt; sed $\frac{1}{2}pp$ semper affirmative ponendum (*i*). Estque hoc exemplum *regula*

ad

(b) Paulisper sustineant Tirones, quam primum perfecturi quomodo & quando una incognita valores duos, tres &c. habere possit.

(i) Æquationes duarum dimensionum alicui ex his quatuor necessario similes esse debent.

$$\begin{array}{l} xx = px + q \\ xx = px - q \\ xx = -px + q \\ xx = -px - q \end{array}$$

Tom. I.

Nam si p exprimere ponatur omnes quantitates notas secundi termini, & q omnes notas tertii, aut potius omnes eas, quæ terminum constituunt, illæ æquationes inter se solis signis differre possunt, quæ nullo alio modo mutari posse liquido constat.

Sed $xx = px + q$, est idem ac $xx - px = q$, & si $xx - px$ esset quadratum perfectum, ex eo extrahi posset radix; atqui quadratum quantitatis simplicis esse nequit, quia

N

duos

regula ad cujus similitudinem æquationes omnes quadratice ad formam simplicissimam reduci possunt. E. g. Proposita æquatione $yy = \frac{2xx^2}{a} + xx$, ad extrahendam radicem y confer $\frac{2xx^2}{a}$ cum p , & xx cum q , hoc est scribe $\frac{xx}{a}$

pro $\frac{1}{2}p$ & $\frac{x^2}{aa} + xx$ pro $\frac{1}{2}pp$. q . atque oriatur $y = \frac{xx}{a} + \sqrt{\left(\frac{x^2}{aa} + xx\right)}$, vel $y = \frac{xx}{a} - \sqrt{\left(\frac{x^2}{aa} + xx\right)}$.

Eodem modo æquatio $yy = ay - 2cy + aa - cc$ conferendo $a - 2c$ cum p , & $aa - cc$ cum q , dabit $y = \frac{1}{2}a - c + \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - ac\right)}$. (k)

Quin etiam æquatio quadrato-quadratica $x^4 = -aaxx + ab^2$ cujus termini impares defunt, ope hujus regulæ evadit $xx = -\frac{1}{2}aa + \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^4 + ab^2\right)}$, & extracta iterum radice $x = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}aa + \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^4 + ab^2\right)}\right)}$. Et sic in aliis.

Suntque hæ regulæ pro concinnanda æquatione solitaria, quarum usum cum Analysta satis perspexerit, ita ut æquationem quamcumque propositam secundum quamlibet literarum in ea complexarum disponere noverit, & ejusdem literæ, si ea unius sit dimensionis, aut maximæ potestatis ejus, si plurium, valorem elicere, haud difficilem sentiet comparisonem plurium æquationum inter se, quam pergo jam docere.

duos habet terminos; quadratum vero binomii debet habere tres terminos; igitur addi debet aliquid ipsi $xx - px$, ut fiat quadratum binomii: hoc autem constare debet (EUCL. 4. II.) quadrato primæ partis radicis, quod hic est xx , duobus factis ex prima parte radicis in secundam, & quadrato secundæ. At hic habetur factum ex x (prima radicis parte) in p , ergo p debet esse dupla secundæ partis, quare $ea = \frac{p}{2}$ cujus quadratum $\frac{pp}{4}$, ergo hoc hinc inde addito

$$xx - px + \frac{pp}{4} = \frac{pp}{4} + q,$$

& extracta radice

$$x - \frac{p}{2} = \pm \sqrt{\left(\frac{pp}{4} + q\right)},$$

& $-\frac{p}{2}$ translato

$$x = \pm \frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{pp}{4} + q\right)}.$$

Ubi apparet quod quantitas nota secundi termini, & tertius terminus servant signum, quod habebant in æquatione $xx = px + q$, sed $\frac{pp}{4}$ semper positiva quantitas erit, quia tam

$$-\frac{p}{2} \text{ quam } +\frac{p}{2} \text{ dant } \frac{pp}{4}.$$

Hoc ratiocinium aliis quoque facile aptatur.

$$(k) \text{ Nam } y = \frac{a - 2c}{2} \pm$$












$$\sqrt{\left(\frac{a^2 - 4ac + 4c^2}{4} + a^2 - c^2\right)},$$

$$\& \sqrt{\left(\frac{a^2 - 4ac + 4c^2}{4} + a^2 - c^2\right)}$$

(per reductionem ad eundem denom.)

$$= \sqrt{\left(\frac{a^2 - 4ac + 4c^2 + 4a^2 - 4c^2}{4}\right)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{5a^2 - 4ac}{4}\right)} = \sqrt{\left(\frac{5a^2}{4} - ac\right)}.$$



CAPUT TERTIUM.

De duabus pluribusve æquationibus in unam transformandis, ut incognitæ quantitates exterminentur.

XI. **C**um in alicujus problematis solutionem plures habentur æquationes statum quæstionis comprehendentes, quarum unicuique plures etiam incognitæ quantitates involvuntur; æquationes istæ, (duæ per vices, si modo sint plures duabus,) sunt ita connectendæ ut una ex incognitis quantitatibus per singulas operationes tollatur, & emergat æquatio nova.

Sic habitis æquationibus (a) $2x = y + 5$, & $x = y + 2$, demendo æqualia ex æqualibus prodibit $x = 3$.

Et sciendum est quod per quamlibet æquationem una quantitas incognita potest tolli; atque adeo, cum tot sunt æquationes quot quantitates incognitæ, omnes possunt ad unam denique reduci, in qua unica manebit quantitas incognita. Sin quantitates incognitæ sint una plures quam æquationes habentur, tum in æquatione ultimo resultante duæ manebunt quantitates incognitæ; & si sint duabus plures quam æquationes habentur, tum in æquatione ultimo resultante manebunt tres, & sic præterea.

Possunt etiam duæ vel plures quantitates incognitæ per duas tantum æquationes fortasse tolli.

Ut si sit $ax - by = ab - az$, & $bx + by = bb + az$: Tum æqualibus ad æqualia additis prodibit (b) $ax + bx = ab + bb$, exterminatis utrisque y & z .

Sed ejusmodi casus vel arguunt vitium aliquod in statu quæstionis latere, vel calculum erroneum esse aut non satis artificiosum. Modus autem quo una quantitas incognita per singulas æquationes tollatur ex sequentibus patebit.

(a) Nam si ex $2x$ demas x restat x , ut ex $y + 5$ dempto $y + 2$ remanet 3 , quare (EUCL. Ax. 3.) $x = 3$.

(b) 2. Siquidem habetur

$$ax + bx = by + by =$$

$$ab + bb = az + az;$$

sed $by + by = 0 = az + az$,

$$\text{ergo } ax + bx = ab + bb.$$

Ceterum si in duabus æquationibus quantitates eadem habeant eadem signa, ab æqualibus æqualia demenda sunt; addenda vero si habeant signa contraria; quia nihil quærimus, nisi rationem incognitas eliminandi, & signa

contraria sese invicem destruant.

Sic datas duas priores æquationes

$$2x = y + 5; \text{ \& } x = y + 2$$

aliam ex alia subducimus, quia incognitæ x & y habent in utraque eadem signa; æquationes autem $ax - by = ab - az$,

$$\text{\& } bx + by = bb + az$$

addimus, quia termini continentes ipsas y , & z habent signa contraria.

Sed ut additio, & subtractio locum habeant necesse est, ut termini incogniti sint ejusdem dimensionis, & eisdem literis quantitas continent, non vero coefficiente.



CAPUT QUARTUM.

Exterminatio quantitatis incognitæ per æqualitatem valorum ejus.

XII. Cum quantitas tollenda unius est tantum dimensionis in utraque æquatione, valor ejus uterque per regulas jam ante traditas quærendus est, & alter valor statuendus æqualis alteri.

Sic positus $a + x = b + y$ & $2x + y = 3b$, ut exterminetur y , æquatio prima dabit $a + x - b = y$, & secunda dabit $3b - 2x = y$. Est ergo $a + x - b = 3b - 2x$, sive ordinando $x = \frac{4b - a}{3}$.

Atque ita $2x = y$, & $5 + x = y$ dant $2x = 5 + x$ seu $x = 5$.

Et $ax - 2by = ab$, & $xy = bb$ dant $\frac{ax - ab}{2b} (= y) = \frac{bb}{x}$; sive ordinando $xx - bx - \frac{2b^2}{a} = 0$. (a)

Item $\frac{bbx - aby}{a} = ab + xy$, & $bx + \frac{ayy}{c} = 2aa$ tollendo x dant $\frac{aby + aab}{bb - ay}$

(= x) = $\frac{2aac - ayy}{bc}$: Et reducendo

$y^3 - \frac{bb}{a}yy - \frac{2aac - bbc}{a}y + bbc = 0$. (b)

Deni-

(a) Translatis in contrarias respective partes $-2by$; & ab ; æquatio $ax - 2by = ab$ vertitur in hanc $ax - ab = 2by$; & cunctis divisus per $2b$ fit $\frac{ax - ab}{2b} = y$. Item

$xy = bb$ dividendo per x dat $y = \frac{bb}{x}$; ergo $\frac{ax - ab}{2b} = \frac{bb}{x}$ (Eucl. Ax. 1.), & cunctis

ductis in x habetur $\frac{axx - abx}{2b} = bb$ & rursus omnibus per $2b$ multiplicatis, $axx - abx = 2b^2$; ac transferendo $2b^2$ in contrarias partes, & omnia dividendo per a tandem obtinetur

$xx - bx - \frac{2b^2}{a} = 0$.

(b) Ex his æquationibus eligo x auferendum, quia in utraque est unius dimensionis, & idcirco facilius eliminari potest. Ut hoc fiat duo primam in a , unde

$bbx - aby = aab + axy$; & translatis in contrarias respective partes ipsis axy ; $-aby$ (ut scilicet omnes termini continentes x sint in eodem membro) $bbx - axy = aab + aby$, & ut x unice habeatur, divido

$\frac{bbx - axy}{bb - ay}$ per $bb - ay$; fit $x = \frac{aab + aby}{bb - ay}$. Pro secunda vero trans-

fero $\frac{ayy}{c}$ in contrarias partes, quo fit

$bx = 2aa - \frac{ayy}{c} =$ (reducendo ad eundem denominatorem) $\frac{2aac - ayy}{c}$; & divi-

dendo per b obtineo $x = \frac{2aac - ayy}{bc} =$

$\frac{aab + aby}{bb - ay}$; quare (omnibus ductis in $bb - ay$)

$$\frac{2aabbc - 2a^2cy - ab^2y^2 + a^2y^2}{bc} = aab$$

Denique $x + y - z = 0$ & $ay = xz$ tollendo z dant $x + y (= z)$
 $= \frac{ay}{x}$ five $xx + xy = ay$.

Hoc idem quoque perficitur subducendo alterutrum valorem quantitatis incognitæ ab altero, & ponendo residuum æquale nihilo. Sic in exemplorum primo tolle $3b - 2x$ ab $a + x - b$ & manebit $a + 3x - 4b = 0$, five $x = \frac{4b - a}{3}$.

CAPUT QUINTUM.

Exterminatio quantitatis incognitæ substituendo pro ea valorem suum.

XIII. Cum in altera saltem æquatione, tollenda quantitas unius tantum dimensionis exilit, valor ejus in ea quærendus est; & pro se in æquationem alteram substituendus.

Sic propositis $xyy = b^3$ & $xx + yy = by - ax$; ut exterminetur x , prima dabit $\frac{b^3}{yy} = x$: Quare in secundam substituo $\frac{b^3}{yy}$ pro x , & prodit $\frac{b^6}{y^4} + yy = by - \frac{ab^3}{yy}$, ac reducendo $y^6 - by^5 + ab^3yy + b^6 = 0$. (a)

Propositis autem $ayy + aay = z^3$; & $yz - ay = az$, ut y tollatur, secunda dabit $y = \frac{az}{z - a}$. Quare pro y substituo $\frac{az}{z - a}$ in primam (b), proditque $\frac{a^3zz}{zz - 2az + aa} + \frac{a^3z}{z - a} = z^3$ (c). Et reducendo, $z^4 - 2az^3 + aaz^2 - 2a^2z + a^4 = 0$.

Pari

$= aab + aby$; & rursus cunctis per bc multiplicatis $2a^2b^2c - 2a^2cy - ab^2y^2 + a^2y^3 = aabbc + abbcy$; ac in contrarias partes translatis ipsis $aabbc + abbcy$ omnibus per a^2 divisis, & juxta dimensionem literæ y ordinatis &c.

(a) Etenim quia $\frac{b^3}{y^2} = x$ erit (quadrando) $\frac{b^6}{y^4} = x^2$, & (multiplicando $\frac{b^3}{y^2} = x$ per $-a$) $-\frac{ab^3}{y^2} = -ax$; quibus positis in secunda æquatione, ea vertetur in quæsitam $\frac{b^6}{y^4} + y^2 = by - \frac{ab^3}{y^2}$; & cunctis ductis in

y^4 fiet $b^6 + y^6 = by^5 - ab^3y^2$, & ordinando &c.

(b) Et pro yy substituo $\frac{aaz^2}{zz - 2az + aa}$.

(c) Id est cuncta ducendo $zz - 2az + aa$ (quod fit ducendo ipsam $\frac{a^3z}{z - a}$ in $z - a$, quia $zz - 2az + aa = (z - a)(z - a)$ ergo $a^3z(z - 2az + aa) = \frac{a^3z(z - a)(z - a)}{z - a} = a^3z(z - a)$) obtinetur $a^3z^2 + a^3z^2 - a^4z = 2z^3 - 2az^2 + aaz^2$, & cunctis divisis, per z ; & transpositis, &c.

Pari modo propositis $\frac{xy}{c} = z$ & $cy + zx = cc$, ad z tollendum pro eo substituo $\frac{xy}{c}$ in æquationem secundam, & prodit $cy + \frac{xy}{c} = cc$.

Ceterum qui in hujusmodi computationibus exercitatus fuerit sæpenu-mero contractiores modos percipiet quibus incognita quantitas exterminari possit. Sic habitis $ax = \frac{bbx - b^3}{z}$ & $x = \frac{az}{x - b}$ si æqualia multiplicentur æqualibus, prodibunt æqualia $axx = abb$ five $x = b$ (d). Sed casus ejusmodi particulares studiosis proprio Marte, cum res tulerit, investigandos linquo.

CAPUT SEXTUM.

Exterminatio quantitatis incognitæ quæ plurium in utraque æquatione dimensionum existit.

XIV. Cum in neutra æquatione tollenda quantitas unius tantum dimensionis existit, valor maximæ potestatis ejus in utraque quærendus est; deinde, si potestates istæ non sint eadem, æquatio potestatis minoris multiplicanda est per tollendam quantitatem aut per ejus quadratum aut cubum, &c., ut ea evadat ejusdem potestatis cum æquatione altera. Tum valores illarum potestatum ponendi sunt æquales, & æquatio nova prodibit ubi maxima potestas five dimensio tollendæ quantitatis diminuitur. Et hanc operationem iterando quantitas illa tandem auferetur.

Quemadmodum sit $xx + 5x = 3yy$ & $2xy - 3xx = 4$; ut x tollatur, prima dabit $xx = -5x + 3yy$ & secunda $xx = \frac{2xy - 4}{3}$. Pono itaque $3yy - 5x = \frac{2xy - 4}{3}$, & sic x ad unicam tantum dimensionem reducitur, adeoque tolli potest per ea quæ paulo ante ostendi. Scilicet, æquationem novissimam debite reducendo (a), prodit $9yy - 15x = 2xy - 4$, five (b)

(d) Est enim $\frac{bbx - b^3}{z} = \frac{bb}{z}(x - b)$,

quapropter ductis æqualibus in æqualia

$axx = \frac{abbx(x - b)}{z(x - b)} = abb$, & dividendo per a , $xx = bb$, ac extracta radice $x = b$.

(a) Id est ducendo cuncta in 3.

(b) Quod invenietur ipsis $-15x; -4$; in contrarias respectivè partes transpositis, & cunctis divis per $2y + 15$.

$x = \frac{9y^4 + 4}{2y + 15}$. Hunc itaque valorem pro x (ϵ) in aliquam ex æquationibus primo propositis (velut in $xx + 5x = 3yy$) substituo, & oritur $\frac{81y^4 + 72yy + 16 + 45yy + 20}{4yy + 60y + 225} = 3yy$. Quam, ut in ordinem redigatur, multiplico per $4yy + 60y + 225$, & prodit $81y^4 + 72yy + 16 + 90y^3 + 40y + 675yy + 300 = 12y^4 + 180y^3 + 675yy$,

five
 $69y^4 - 90y^3 + 72yy + 40y + 316 = 0. (d)$

Præterea si sit $y^3 = xyy + 3x$, & $yy = xx - xy - 3$, ut y tollatur multiplico posteriorem æquationem per y & fit $y^3 = xxy - xyy - 3y$ totidem dimensionum quot prior. Jam ponendo valores ipsius y^3 sibimet æquales habeo $xyy + 3x = xxy - xyy - 3y$, ubi y deprimitur ad duas dimensiones. Per hanc itaque & simplicioribus ex æquationibus primo propositis $yy = xx - xy - 3$ quantitas y prorsus tolli potest insistendo vestigiis prioris exempli. (e)

XV. Sunt & alii modi quibus hæc eadem absolvi possunt; idque sæpe numero contractius.

Quemadmodum ex $yy = \frac{2xxy}{a} + xx$ & $yy = 2xy + \frac{x^4}{aa}$; ut y deleatur, extrahe in utraque radicem y sicut in Regula septima ostensum est, & prodibunt $y = \frac{xx}{a} + \sqrt{\left(\frac{x^4}{aa} + xx\right)}$, & $y = x + \sqrt{\left(\frac{x^4}{aa} + xx\right)}$. Jam hos ipsius y valores ponendo æquales habebitur $\frac{xx}{a} + \sqrt{\left(\frac{x^4}{aa} + xx\right)} = x + \sqrt{\left(\frac{x^4}{aa} + xx\right)}$, & rejiciendo æqualia $\sqrt{\left(\frac{x^4}{aa} + xx\right)}$, restabit $\frac{xx}{a} = x$, vel $xx = ax$ & $x = a$.

Porro

3. (c) Et pro xx quadratum ipsius x ; si vero haberetur x^3 , vel x^4 , aut x^5 , vel denique x^m , valor ipsius x , ad 3, 4, 5, m , potestatem evehendus esset, quod semel monuisse sufficiat.

(d) Nempe deletis æqualibus.

(e) Quærendo scilicet valorem ipsius yy , ex $xyy + 3x = xxy - xyy - 3y$ quod obtinebis in contrarias respectue partes transferendo $+ 3x$; $- xyy$; omniaque dividendo per $2x$; unde habebis

$yy = \frac{xxy - 3y - 3x}{2x} = xx - xy - 3$, quare duc omnia in $2x$, dele æqualia, in eadem partes tranjice omnes terminos conti-

nentes y , aut x , divide per $3xx - 3$, & habebis $y = \frac{2x^3 - 3x}{3xx - 3}$, quem valorem substitue in $yy = xx - xy - 3$, ut pote simpliciorum, erit $\frac{4x^6 - 12x^4 + 9x^2}{9x^4 - 18xx + 9} =$

$xx - \frac{2x^4 + 3xx}{3xx - 3} - 3$, jam duc $xx - 3$ in $9x^4 - 18xx + 9$, sed $-2x^4 + 3xx$ in $3xx - 3$ unde $4x^6 - 12x^4 + 9xx = 9x^6 - 18x^4 + 9x^2 - 6x^6 + 9x^4 + 6x^4 - 9x^2 - 27x^4 + 54x^2 - 27$

dele æqualia, & transfer omnia in eadem partes habiturus demum $x^6 + 18x^4 - 45x^2 + 27 = 0$.

Porro ut ex æquationibus $x + y + \frac{yy}{x} = 20$, & $xx + yy + \frac{y^4}{xx} = 140$ tollatur x , aufer y de partibus æquationis primæ, & restat $x + \frac{yy}{x} = 20 - y$, & partibus quadratis fit $xx + 2yy + \frac{y^4}{xx} = 400 - 40y + yy$ tollendoque utrinque yy restat $xx + \frac{y^4}{xx} = 400 - 40y$. Quare cum $400 - 40y$ & 140 iisdem quantitibus æquentur, erit $400 - 40y = 140$, five $y = 6\frac{1}{2}$. (f) Et sic opus in plerisque aliis æquationibus contrahere liceat.

XVI. Ceterum cum quantitas exterminanda multarum dimensionum existit, ad eam ex æquationibus tollendam calculus maxime laboriosus nonnunquam requiritur: Sed labor tunc plurimum minuetur per exempla sequentia tanquam regulas adhibita.

R E G U L A I.

$$\text{Ex } axx + bx + c = 0, \text{ \& } fxx + gx + b = 0,$$

Exterminato x prodit

$$(ab - bg - zcf) ab + (bb - eg) bf + (agg + cff) c = 0.$$

R E G U L A II.

$$\text{Ex } ax^3 + bxx + cx + d = 0, \text{ \& } fxx + gx + b = 0.$$

Exterminato x prodit

$$(ab - bg - zcf) abb + (bb - eg - zdf) bfb + (cb - db) \\ (agg + cff) + (3agb + bgg + dff) df = 0.$$

R E G U L A III.

$$\text{Ex } ax^4 + bx^3 + cxx + dx + e = 0, \text{ \& } fxx + gx + b = 0,$$

Exterminato x prodit

(ab

(f) Nam translatis $- 40y$, & 140 fit $400 - 140$ (id est 260) $= 40y$; & dividendo per 40 , $6\frac{1}{2} = y$.

$$\begin{aligned} (ab - bg - cf) ab^3 + (bb - cg - 2df) bfbh + (agg + eff) \\ (chb - dgb + egg - 2efb) + (3agb + bgg + dff) dfb \\ + (2abb + 3bgb - dfg + eff) eff - (bg - 2ab) \\ cgg = 0. \end{aligned}$$

REGULA IV.

Ex $ax^3 + bxx + cx + d = 0$, & $fx^3 + gxx + bx + k = 0$,

Exterminato x prodit

$$\begin{aligned} (ab - bg - cf) (adbb - achk) + (ak + bb - cg - 2df) bdfb - \\ (ak + bb + 2cg + 3df) aakk + (cdb - ddg - cck + 2bdk) (agg \\ + eff) + (3agb + bgg + dff - 3afk) ddf - (3ak - bb \\ + cg + df) bcfk + (bk - 2dg) bbfk - \\ (bbk - 3adb - cdf) agk = 0. \end{aligned}$$

Verbi gratia, ut ex æquationibus

$$xx + 5x - 3yy = 0, \text{ \& } 3xx - 2xy + 4 = 0$$

exterminetur x : in regulam primam pro $a, b, c, f, g, \& h$ respective substituo 1, 5, — 3yy; 3, — 2y, & 4. Et signis + & — probe observatis oritur

$$(4 + 10y + 18yy) 4 + (20 - 6y^3) 15 + (4yy - 27yy) - 3yy = 0.$$

Sive

$$16 + 40y + 72yy, + 300 - 90y^3, + 69y^4 = 0.$$

Simili ratione ut y deleatur ex æquationibus

$$y^3 - xyy - 3x = 0 \text{ \& } yy + xy - xx + 3 = 0,$$

in regulam secundam pro $a, b, c, d, f, g, h, \& x$ substituo, 1, — $x, 0$, — $3x; 1, x, - xx + 3$, & y , respective, proditque $(3 - xx + xx) (9 - 6xx + x^4) - (3x + x^3 + 6x) - (3x + x^3) + 3xx \cdot xx + (9x - 3x^3 - x^3 - 3x) - 3x = 0$. Tum delendo superflua & multiplicando, fit

$$27 - 18xx + 3x^4, - 9xx + x^6, + 3x^4, - 18x^4 + 12x^4 = 0.$$

Et ordinando

$$x^6 + 18x^4 - 45xx + 27 = 0.$$

Hactenus de unica incognita quantitate e duabus æquationibus tollenda. Quod si plures e pluribus tollendæ sunt, opus per gradus peragetur. Ex æquationibus $ax = yz; x + y = z; \& 5x = y + 3z$, si quantitas y elicienda sit, imprimis tolle alteram quantitatum x aut z , puta x , substituendo

pro ea valorem ejus $\frac{yz}{a}$ (per æquationem primam inventum) in æquationem secundam ac tertiam. Quo pacto obtinetur $\frac{yz}{a} + y = z$, & $\frac{5yz}{a} = y + 3z$; e quibus deinde tolle z ut supra.

CAPUT SEPTIMUM

De modo tollendi quantitates quocunque surdas ex æquationibus.

XVIII. **H**uc referre licet quantitatum surdarum exterminationem fingendo eas literis quibuslibet æquales. Quemadmodum fit $Vay - V(aa - ay) = 2a + V^3: ayy$, scribendo t , pro Vay , v pro $V(aa - ay)$, & x pro $V^3: ayy$ habebuntur æquationes $t - v = 2a + x$, $tt = ay$, $vv = aa - ay$, & $x^3 = ayy$, ex quibus tollendo gradatim t , v , & x resultabit tandem æquatio libera ab omni asymmetria (a).

(a) Quod sic fieri potest. Jam $x = t - u - 2a$; & datur valor ipsius x^3 , quem duobus modis expressum habeo factò cubo ipsius $t - u - 2a$. Formula cubi est

$$t^3 + 3t^2q + 3tq^2 + q^3,$$

fit ergo $t = u$; & $q = u - 2a$, eritque $t^3 = u^3 + 3u^2q + 3uq^2 + q^3$; sed

$$q^2 = u^2 + 4au + 4a^2 =$$

(ponendo $a^2 = ay$ pro u^2) $5a^2 = ay + 4au$,

$$\text{et } q^3 = u^3 + 6au^2 =$$

$$12a^2u - 8a^3 = (\text{ponendo } a^2u = au^2$$

$$\text{pro } u^3 = u^2u, \text{ et } a^2 = ay \text{ pro } u^2)$$

$$= 14a^3 + 6a^2y - 13a^2u + au^2.$$

Quare

$$x^3 = (t - u - 2a)^3 =$$

(reductione facta)

$$= 2aty - 2au^2 + 15a^2t +$$

$$12atu - 13a^2u - 14a^3 = ay^3;$$

& transpositis terminis in quibus t non apparet, ac dividendo

$$\frac{y^3 + 2uy + 13au + 14a^3}{12u + 15a - 2y} = t; \text{ et quadrando}$$

$$y^4 + 4uy^3 + 26au^2y^2 + 28a^2y^2 + 4u^2y^2$$

$$+ 52a^2y^2 + 56a^2uy + 169a^2u^2 + 364a^3u$$

$$+ 106a^4 \text{ divis. per } 144u^2 + 360au - 48uy$$

$$+ 225a^2 - 60ay + 4y^2 = t^2 = ay,$$

ac (substituto ipsius u^2 valore, reductione facta, & sublata fractione) $y^4 + 4uy^3 - 4ay^3$

$$+ 26au^2y^2 - 20a^2y^2 - 117a^3y + 56a^2uy$$

$$+ 365a^4 + 364a^3u = 4ay^3 - 48au^2y - 204a^2y^2$$

$$+ 360a^2uy + 369a^3y,$$

ac (terminis primi membri, in quibus est u ,

conjectis in secundum, & terminis secundi,

e quibus abest u , in primum, deletis delendis, & dividendo)

$$y^4 - 8ay^3 + 184a^2y^2 - 486a^3y + 365a^4 = u$$

$$- 4y^3 - 74ay^2 + 304a^2y - 364a^3 = u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

$$= u$$

S E C T I O T E R T I A.

C A P U T P R I M U M.

Quomodo Quæstio aliqua ad æquationem redigatur (a).

I. **P**ostquam Tyro in æquationibus pro arbitrio transformandis & concinnandis aliquamdiu exercitatus fuerit, ordo exigit ut ingenii vires

(a) Ut melius intelligantur, qua Auctor noster hic asserit, & qua jam asseruit Sect. I. Cap. IX. Art. LXXXVII., pauca pramittenda puto de Problematum natura.

1. Sub universali quantitatis appellatione plura continentur quantitatum genera, qua in alia subalterna genera dividi possunt; & hæc rursus in alia &c.

Ita generale quantitatis nomen complectitur extensionem, velocitatem, tempus &c. Rursus generale extensionis vocabulum continet solida, superficies, & lineæ; lineæ vero sunt aut rectæ, aut curvæ. Item curvæ in suos ordines &c. distinguuntur; &c.

2. Quantitas, quæ a genere aliquo separatur, & in immediate inferius genus transferatur, dicitur *determinata*.

Sic si e superficiesium genere sumo superficiem rectilineam; hæc relative ad superius genus, e quo segregata fuit, dicitur *determinata*, haud secus ac quadrilaterum relative ad superficies rectilineas, parallelogrammum ad quadrilatera; parallelogrammum habens datum angulum (ut rectangulum) ad parallelogramma; parallelogrammum habens datum angulum, & rationem laterum angulum continentium item datam (ut quadratum) ad rectangula; parallelogrammum habens datum angulum, & latera angulum comprehendentia pariter data (ut quadratum datæ rectæ) ad supra descripta &c.

3. Quævis determinata quantitas habet proprietates aliquas sibi cum quantitatis omnibus communes.

Ea enim est ex quantitatum genere, & idcirco debet habere id, quod quantitatis in genere convenit.

Quædam vero proprietates præterea habet sibi

communes cum pluribus aliis quantitatis, at non cum omnibus, nonnullas denique sibi ita peculiare, & proprias, ut nunquam alicui alieri quantitati ea proprietates inesse possint.

Quia scilicet determinata est, & a quantitatis aliis distincta.

Sic triangulum est in infinitum divisibile ut omnes quantitates: undique circumclusum est ut omnes figuræ: tum duas habet dimensiones, ut omnes superficies: denique tribus lateribus circumscinditur; quod uni triangulo proprium est. Si vero triangulum sit rectilineum, habebit tria latera, ut omnia triangula, sed ab aliis distinguetur eo ipso quod latera sint lineæ rectæ. Item, si sit rectangulum, a rectilineis triangulis separabitur æqualitate quadrati ex hypotenusa & quadratorum ex aliis lateribus. Si præterea sit isoscele, eo quod quadratum hypotenuse duplum sit quadrati ex uno latere, & sic de ceteris determinationibus.

4. Proprietates hæc determinatæ quantitati ita peculiare, ut aliis nunquam competere possint, vocabo *characteristicas*.

5. Una eademque quantitas potest habere plures proprietates characteristicas.

Ex. gr. circulus habet eas omnes, quas invenies (Eucl. 35. 36. III.), aut quod omnes perpendiculares tangentibus a puncto contractus ductæ in unum idemque punctum eocant; aut quas leges (Eucl. 45. 46. III.) &c.

6. Quia quantitas magis aut minus potest determinari, vel quia strictior, aut laxior esse potest significatio vocis *quantitas determinata*, potest characteristicarum numerus augeri, & minui, quin ipse ita possint immutari, ut quæ jam characteristicæ fuerat, nunc non sit.

Ita inter quadrilatera determinatur parallelogrammum parallelismo laterum oppositorum, aut

aut parallelismo & æqualitate duorum e lateribus oppositis, ubi neque angulus comprehensus neque magnitudo laterum angulum comprehendentium consideratur. Sed e parallelogrammis unum determinabitur magnitudine laterum angulum constituentium, & angulo. Inter figuras curvilineas circulus determinabitur aliqua ex supra recensitis characteristicis, inter quas centri positio, & radii magnitudo non affertur. Sed ex circulis aliquis determinabitur radii magnitudine &c., & ex omnibus circulis æqualibus unus ipsa centri positione.

7. Cum igitur assignatur determinata quantitas, una dantur etiam ejus proprietates, tum communes, tum peculiare (u pote quæ assignatæ quantitati insint), & nihil est in ipsa re, quod vetet, quo minus hæ proprietates erui possint, & inveniri.

Sic, cum ex infinito figurarum rectilinearum numero unam eximo atque determino, puta, triangulum, una assigno omnes proprietates, quibus gaudet, & quia est et quantitarum genere, ut est divisibilitas, & quia est superficiem una, quo nomine longitudine, & latitudine prædium, profunditatis expertus est; & quia de figurarum grege est, & idcirco finitum, & undique circumclusum; & quia est rectilineum, qua de causa rectis lineis terminatum; & quia est e triangulorum numero, quapropter tribus lineis terminatur & tres angulos habet; & quia demum simul est triangulum, & rectilineum, quapropter tres ejus anguli simul sumpti duobus rectis æquivalent &c. Quid autem est in triangulo, quo vetet hæ leges investigare, & assequi? Quin imo triangulum rectilineum se mihi sistens ultro ponit sub oculis proprietates suas, quæ ei necessario adherent, solumque mihi restat, ut eas recte & graviter quæram.

8. Rursus proprietatum alia competunt omnibus & quibusvis quantitatibus, ut divisibilitas, alia quantitatibus numero quidem infinitis, sed non omnibus.

Ut infinitis numeris esse bisariam divisibiles, sed non omnibus, quia numeri impares hujus dotis exfortes sunt; item infinitis figuris esse rectilineas, sed non omnibus, sunt enim, & curvilineæ, & mixtæ.

Alia proprietates insunt quantitatibus aliquot, & quarum numerus finitus est atque determinatus.

Sic quinarium metiri quidem potest plures e numeris, qui sunt supra unitatem & infra centenarium, sed numerorum talium quantitas

determinata est; sic a puncto dato extra circulum duæ tantum tangentes duci possunt ad circulum; sic super data recta utrinque terminata duo triangula æquilatera constituere licet, unum scilicet supra, alterum infra datam rectam.

Alia denique conveniunt uni.

Ut uni circulo transire per tria data puncta, quæ in eadem recta non sunt.

9. Cum igitur assignatur proprietas aliqua, vel proprietatum congeries, una assignantur quantitates omnes, quibus competunt.

Quia proprietas quantitatibus, & quantitates proprietatibus necessario junctæ sunt.

Ergo ex proprietatibus quantitates investigari possunt.

10. Omnis questio, que potest insitui, intra duo genera omnino continetur. Aut enim datur quantitas, & queruntur ejus proprietates omnes, vel earum aliqua determinata. Aut datur una proprietas, vel aliquis proprietatum complexus, & petuntur quantitates proprietatibus his insistentia.

Primi generis exempla sint hæc. Dantur (in EUCL. 1.) rectæ parallelæ, & omnes earum proprietates queruntur (EUCL. 29. I.) Datur (in EUCL. 5. I.) triangulum isoscele, queritur determinata proprietas, quæ nempe conveniat illi considerato, quo ad angulos positos super lateris inæquale.

En secundi generis exempla. Datur (in EUCL. 27. I.) proprietas in eo sita, ut duæ rectæ a tertia quamlibet sectæ faciant æquales angulos alternos, & queruntur duæ rectæ, quibus hæc proprietas conveniat. Datur (in EUCL. 44. I.) proprietas habendi angulum dato æqualem, datam rectam pro uno laterum, & superficiem dato triangulo æqualem, petitur cui parallelogrammo omnes hæ proprietates simul competant.

11. Posset quidem & tertium questionum genus afferri, quæ scilicet dantur tum determinata quantitas, tum determinata proprietas, & queritur utrum hæc illi conveniat.

Sic datur (in EUCL. 47. 1.) triangulum determinatum, nempe rectangulum, & determinata proprietas, id est æqualitas quadrati ex hypothenusa, & duorum simul quadratorum ex ceteris duobus lateribus, sciendum est utrum triangulum rectangulum hæc proprietate fruatur, necne.

Sed hæc questiones facile ad alterum e superioribus generibus revocari posse videntur, sumendo tanquam datam proprietatem, & quæ-

quærendo cui quantitati competat, aut vice versa.

Sic quæstio (EucL. 47. 1.) proponi posset hoc pacto. Datur æqualitas quadrati ex uno latere, & duorum simul quadratorum ex reliquis duobus trianguli lateribus, quæritur utrum triangulum hac proprietate gaudens sit rectangulum, an obtusangulum, an acutangulum, ut in 48. 1. Vel sic; Datur triangulum rectangulum, petitur proprietates, quam habet si consideretur quoad laterum quadrata. Si quis vero tertium hoc genus prioribus addendum, & tria omnino esse quæstionum genera contendar, non repugnabo. Certum saltem, & evidens est præter hæc tria nullum aliud dari posse.

12. Propositio, in qua investigatur quænam proprietates datæ quantitati competat, vel utrum determinata proprietates insit determinatæ quantitati dicitur *Theorema*.

13. Sed propositio, in qua requiritur quibusnam quantitatibus conveniat vel data proprietates, vel data proprietatum congeries, appellatur *Problema*.

14. *Theorema investigatum*, vel *Problema solutum* dicitur, cum inventæ, & assignatæ sunt, aut proprietates omnes, quæ utrum datæ quantitati conveniant, nec-ne, dubitabatur; aut quantitates omnes, quibus datæ proprietates inhærent, & quando, quomodo, ac quotuplîciter hæ quantitates assignari possint, ac quando nullo modo possint.

15. Theoremata & problemata non raro vocantur *Propositiones*, quibus alios docemus veritates a nobis repertas, id est id, quod nos theoremata vel problemata investigantes, invenimus. Sed hoc nobis non nocet, quia nunc de sola veritatis perquisitione solliciti sumus; Item aliquando *problema* vocatur *theoremata investigandum*. Sed ratio solvendi problemata parum differt a ratione investigandorum theorematum, & quæ differunt suo loco tradentur.

16. Quævis ex proprietatibus, quæ dantur cum problema solvendum proponitur, nuncupatur *lex*, aut *conditio* problematis.

17. Ex propositis legibus, aut aliqua uni quantitati convenit; aut singulæ pluribus, sed nulla infinito quantitatuum numero; aut aliæ pluribus, aliæ verum numero infinitis; aut aliæ pluribus, aliæ verum numero infinitis; aut

singulæ quantitatibus numero infinitis.

Patet quintum non dari.

18. Si una ex datis legibus in una quantitate potest inveniri, *ceteræ leges aut necessario huic quantitati insunt, aut necessario absunt*, nihil enim fortuitum, & contingens admittit Mathefis.

Si insunt, frustra in problematis enunciatione fuerunt expresse. Quoniam enim una data dantur reliquæ, unam sufficit attulisse.

Si autem absunt; contradictoria sunt, & problema reddunt impossibile.

Reperendi enim esset quantitas prædita proprietatibus, quibus necessario caret.

Ex. gr. Ex dato puncto D ducenda propositio TAB. A. natur in subjectam rectam AC perpendiculari Fig. 4.

ris datæ longitudinis. Quia ex uno puncto in eandem rectam una perpendicularis agi potest, secunda lex supervacanea est, si punctum datum ita distat a subjecta linea, ut perpendicularis DB sit petitæ longitudinis; sin minus est contradictoria.

19. Si secundum, *harum legum congeries inveniri solum potest in tot quantitatibus, quot competit lex minus generalis*.

Hæc enim, ubi se generalioribus addit, quantitatuum respondentium numerum minuit.

Sic, si petitur numerus par, qui viginti non superet, & quem ternarius metiatur. Prima lex, ut numerus viginti major non sit, congruit viginti numeris: secunda, ut par numerus ille, decem: tertia, ut ternarius eum metiatur, convenit sex numeris, ambæ simul, ut patet, servatæ reperiri possunt (ut plurimum) in sex numeris, quia lex secunda, quæ inest solum sex numeris, pluribus adesse nequit.

Potest autem fieri, ut plures leges cum simul uniantur, minuant numerum quantitatuum problemata solvendum.

Quia potest accidere, ut una ex iis conveniat nonnullis quantitatibus, quibus altera non convenit. Sic in exemplo nuper allato, tertia lex convenit sex numeris, 3, 6, 9, 12, 15, 18, & quibus tres aufert secunda, si eam tertiæ jungas, nam ex his tres tantum sunt pares, 6; 12; 18; & vice versa, e decem quibus secunda lex inerat, tertia delet septem.

20. Si tertium, *numerus quantitatuum problemata solvendum; nunquam erit infinitus; & nunquam major numero quantitatuum legi minus generali satisfaciendum, quo tamen numero potest esse minor*.

Proponantur *ex. gr.* inveniendi tres numeri integri continue proportionales, quorum minimus infra unitatem, maximus supra decadem

non

non sit, duo vero primi sint pares. Numeri continue proportionales infiniti sunt, ut & ii, qui sunt inter unitatem, & decadem, sed quinque sunt numeri pares, & duæ sunt, series numerorum problema solventes, 2; 4; 8; & 2, 2, 2.

21. Si quartum, numerus quantitatum problema solventium potest esse infinitus, sed etiam finitus.

Quia, licet quævis lex infinitis quantitibus competat, duæ simul possunt solum inveniri in determinato quantitatum numero.

Sic si recta agenda est, quæ transeat per datum in data recta punctum, & quæ ad datam rectam sit normalis: infinitæ sunt rectæ, quæ per datum punctum transire possunt, infinitæ etiam normales ad datam rectam, tot enim sunt, quot puncta in recta; tamen hæ duæ leges simul in una recta servatæ comperiuntur. Sic etiam in aliis exemplis, leges, quas consideravi tanquam convenientes dato quantitatum numero, infinitis reipsa & in abstracto conveniunt, sed quia facile constat, quot & quibus competant in relatis casibus, ideo eas pro peculiaribus habui.

22. Igitur ex legum consideratione prævideri potest, utrum una, vel plures, vel infinitæ quantitates problemati competant, & illud solvant. Numerus enim harum quantitatum a legibus tum seorsim sumptis, tum simul connexis omnino pendet.

23. Qua superius dicta sunt, intelligi debent de legibus, quæ respiciunt quantitates omnes, quas problema invenienda proponit. Nam si lex una pertinet ad unam quantitatem, altera ad alteram, fieri posset, ut numerus quantitatum problemati respondentium esset major numero quantitatum unam legem servantium; quia quantitates, quæ uni legi parent, diversimode jungi & combinari possunt cum aliis alteram legem servantibus; quo pacto numerus quantitatum mirum quantum augetur.

Ex. gr. proponantur inveniendi tres numeri continue proportionales, quarum duo primi sint pares, & neuter horum duorum sit vel infra unitatem, vel supra decadem. Prima lex inveniri debet, ex terminis, in tribus numeris quæsitis, secunda vero, & tertia lex non obstringunt tertium numerum. Numeri autem pares ab unitate ad decadem quinque omnino sunt; 2; 4; 6; 8; 10; multo tamen plures quam quinque proportionem inveniri possunt; siquidem si primus ex assumptis ponatur minimus, jam habentur quatuordecim proportio-

nes; 2.2.2. 2.4.8: 2.6.18: 2.8.32: 2.10.50
4.4.4: 4.6.9: 4.8.16: 4.10.25: 6.6.6: 6.8.

16 $\frac{2}{3}$: 6.10.16. $\frac{1}{3}$: 8.8.8: 8.10.12 $\frac{1}{2}$:
10.10.10: & iterum quatuordecim habebuntur si primus ex assumptis sit maximus, ut facile constat.

24. Problema, cui certus quantitatum numerus satisfacit, dicitur determinatum; indeterminatum vero, cui infinitus.

DE NATURA ÆQUATIONUM.

25. Cum de solis quantitibus agat Mathesis, & quantitates solum æqualitatis ac inæqualitatis sint capaces; inæqualitates autem, seu proportionibus, seu aliis modis ad æqualitates revocari possunt, per æquationem exprimere semper licet quamvis problematis legem.

26. Tot ergo statim æquationes præbet problema, quot sunt ejus leges.

27. Quævis lex haberi potest pro peculiari problemate, nam idem est legem per æquationem exprimere, & quærere quantitates proprietate data præditas.

28. Igitur ex quavis lege per æquationem exposita excudi possunt quantitates, quibus hæc proprietates convenit, quæ quantitates aliquibus aliis reperientur æquales (per æquationis definitionem).

29. Quantitates, quæ simul alicui sunt æquales, hujus valores dicuntur.

Sic, si proponantur inveniendæ tres quantitates continue proportionales, & prima dicatur x ; secunda y ; tertia z , quia, ex hypothesi, $x. y :: y. x$, erit $zx = y^2$ (Eucl. 16. VI.), quæ æquatio exprimit unam problematis legem. Jam vero cunctis per x divisus est $z = \frac{y^2}{x}$; & est $\frac{y^2}{x}$ valor ipsius z .

30. Æquatio exprimens unam problematis legem, aut dans quantitates unam proprietate præditas dicitur *primaria*.

Ex. gr. Æquatio superior $xz = y^2$; aut $z = \frac{y^2}{x}$ est æquatio *primaria*; & tales erunt (si ponantur hæ tres quantitates simul æquales 20; & earum quadrata æqualia 140) æquationes $x + y + z = 20$; & $x^2 + y^2 + z^2 = 140$.

31. Si ergo hæc per æquationem primariam expressa conveniat quantitatibus numero infinitis, æquatio primaria habebit valores numero infinitos, plures vero si solummodo pluribus.

Nam hæc æquatio solum legem exprimit, & quantitates, quas præbet, ab hac lege sola determinantur; sed hæc lex determinare nequit nisi quantitates numero infinitas, per primam hypothese[m], aut plures per secundam, ergo &c.

Inferius explicabimus, quænam sit æquatio habens valores numero infinitos, & quando, & quomodo hoc accidere possit. Nunc probaffe sufficiat, quod si æquatio primaria, (puta $x = \frac{y^2}{x}$; aut $x + y + z = 20$; vel $x^2 + y^2 + z^2 = 140$) habere potest valores plures, aut etiam numero infinitos; reipsa habet, & quidem necessario.

32. Si quantitatis valor repertus ut supra, ponatur in alias æquationes primarias pro simbolo quantitatem illam exponente, hæc æquatio, quæ prius exprimebat unam problematis legem, duas simul exprimet.

Nam valor inventus continet unam legem; æquatio, in qua valor simbolo substituitur, continet legem aliam a prima diversam; ergo æquatio, & valor simul duas leges contingebunt, & expriment.

Sic, si in æquatione $x + y + z = 20$ pono $\frac{y^2}{x}$ pro z habeo $x + y + \frac{y^2}{x} = 20$; quæ simul indicat tres hos numeros esse in proportionem continuam (nam aliter tertius esse nequit æqualis quadrato secundi diviso per primum) & hos tres simul sumptos æquare 20.

Si vero in æquatione $x + y^2 + z^2 = 140$, pono pro z^2 ejus valorem $\frac{y^4}{x^2}$; æquatio hinc exurgens ($x^2 + y^2 + \frac{y^4}{x^2} = 140$) significabit rursus hos tres numeros esse in proportionem continuam (quia enim $x : y :: y : z$; etiam $x^2 : y^2 :: y^2 : z^2$ (Eucl. 27. VI.) & $z^2 = \frac{y^4}{x^2}$) & eorum quadrata simul æquare 140.

33. Ex una harum æquationum duas simul leges experimentium haberi potest valor alicujus quantitatis, quæ dabit quantitates duabus proprietatibus simul gaudentes; & hæc quantitates erunt numero infinitæ, si duæ leges, de quibus agitur, junctæ ininitis quantitatibus conveniant.

34. Æquatio exprimens una duas leges, aut duas quantitates, in quibus hæc duæ leges junctæ reperiuntur, vocatur *secundaria*.

35. Si valor erutus ex una æquationum secundarium, in aliis secundariis ponatur, habebitur æquatio exprimens tres leges simul atque ita porro.

Hoc pacto æquatio $x + y + \frac{y^2}{x} = 20$ dat per methodum explicatam Sect. II. Art. XI. & XIV. valorem ipsius y , aut x , qui valor si scribatur in $x^2 + y^2 + \frac{y^4}{x^2} = 140$; habebitur æquatio continens tres leges simul; duas enim jam continebat, & tertiam nunc addimus.

36. Si quando indicare voluerimus æquationes continentes tres leges, aut quatuor &c. liceat eas dixisse (barbaro verbo, & inusitato sit venia) *tertiarias*; *quartarias* &c.

37. Jungendo sic leges, ex numero quantitatum, quibus priores leges conveniebant, eæ delentur, quæ novas leges respuant, aut seorsim consideratæ & per se, aut cum jam appofitis connexas.

38. Pergendo ut docuimus *perveniemus tandem ad æquationem unam omnes problematis leges continentem; ea tot præbetit valores, quot sunt quantitates problema solventes.*

Quia quævis operatio solum e majore numero expulit quantitates, quibus novæ leges aptari non poterant, quare manserunt omnes illæ, quibus leges nuper introductæ conveniebant.

Insuper hæc æquatio liberata est a tot incognitis, a quot per leges problematis liberari poterat.

Nam quævis lex dat æquationem suam, & docti sumus (Sect. II. ab Art. XI. ad XVI. inclusive) tot incognitas tollere, quot habemus æquationes.

Ceterum puto, quod nulli molestiam parient mutationes, quæ per additionem, subtractionem, multiplicationem, divisionem, & extractionem radicis, sunt æquationibus, jam enim demonstratum est has operationes æqualitatem non turbare, & evidentius est, quam demonstrari debeat, eas nullo pacto leges immutare, cum ex his legibus directe fluant.

39. Æquatio continens omnes problematis leges nuncupatur *Finalis*, aut *Solitaria*.

Hic autem repetenda, & obicienda sunt, quæ

quæ de concinnanda æquatione solitaria dicta fuerunt (Sect. II. Cap. II. ab Art. III. ad X. inclusive).

40. Si ergo tot leges problemata circumscribunt, quot sunt diversæ quantitates quærendæ, aut quot incognitæ sumptæ fuerint in æquationibus primariis, habebit æquatio finalis unicam incognitam. Si vero una lex deest, duas quæritas habebit, tres, quatuor, &c.; si tres, quatuor, &c., leges abint, &c.

41. Æquatio unius dimensionis, in qua est unica incognita, habet unum valorem.

Sume quamvis æquationem unius dimensionis $x = b - a + \frac{c^2}{f}$ &c. fac additiones, subtractiones &c. ab æquatione præscriptas, & unum semper invenies valorem; ratio autem nimis evidens est, hic enim una quantitas uni dato datarum aggregato est æqualis, ergo non pluribus.

42. Quotvis æquationes unius dimensionis simul junctæ per additionem, aut subtractionem dant semper æquationem unius dimensionis (Sect. I. No. 22.). Divisio autem quantitatum dimensionis minuit (Sect. I. No. 99.) igitur multiplicatio sola constituere potest æquationem plurium dimensionum; si hæc æquatio constet ex pluribus, quarum singula sunt unius dimensionis.

43. Cum eadem incognita indicat plures valores idem problema solvens, plerumque quisque valor facit cum cognita æquationem unius dimensionis.

Proponantur Ex. gr. inveniendi tres numeri continue proportionales, ut minimus, & maximus simul conficiant 30, & medius, ac maximus simul 36. Hic numeri sunt 3. 9. 27; & 6. 12. 24. Si igitur minimus dictus fuerit x ; medius y , maximus z ; habebo $x = 3$, & $x = 6$; item $y = 9$, & $y = 12$; denique $z = 24$, & $z = 27$, quæ omnes sunt æquationes unius dimensionis constantes ex ignota, & valore suo. Hoc autem non semper accidit, quamvis quisquis valor in se sit determinatus & unicus, vel quia deest regula generalis solvendi æquationes, vel forte ob alias rationes, de quibus in capite de Natura radicum æquationis.

44. Sed, cum æquatio finalis habet unicam incognitam, & plures sunt quantitates problemata solventes, hæc æquatio quantitates has omnes complecti debet (No. 38. hujus). Tunc

ergo æquatio finalis constatur ex tot æquationibus unius dimensionis quot sunt quantitates problemati satisfaciendæ, & hæc quantitates per multiplicationem in unam coactæ sunt (No. 42. hujus), ac æquatio ad tot dimensiones ascendit, quot sunt quantitates problemati respondentes, aut (quod idem est) æquationes simplices, e quibus constat (Sect. I. No. 47.).

Detur Ex. gr. æquatio

$$\begin{array}{r} \text{--- } a \quad + \quad ab \\ x^1 \text{--- } b \ x^2 \quad + \quad ac \ x \text{--- } abc \quad = \quad 0; \\ \text{--- } c \quad + \quad bc \end{array}$$

quæ est trium dimensionum; quærendo ejus divisores per regulas supra traditas invenio eos esse $x = a$; $x = b$; & $x = c$; unde dici potest $x = a$; $x = b$; & $x = c$. Non tamen semper inveniri sic possunt æquationes simplices, quibus constat composita, quia aliquando valores sunt fardi, regulæ autem supra traditæ non docent invenire valores furdos. Vide caput de Natura radicum æquationis.

45. Rursus æquatio finalis unicam incognitam continens tot habere potest valores, quot dimensiones.

Nam quantitas ad plures dimensiones non evehitur nisi multiplicatione, & ad tot dimensiones ascendit, quot sunt factores, æquatio autem finalis solum completitur quantitates problema solventes; & eas quidem omnes (No. 38. hujus) ergo factores erunt hæc quantitates ipsæ; quæ ideo tot erunt, quot æquationis dimensiones.

Non tamen hoc semper accidit, ut melius infra in capite de Natura radicum æquationis.

46. Igitur harum quantitatum numerus determinatus est, ubi æquatio ista ad indeterminatum dimensionum numerum non ascendit. Quare omnis æquatio finalis ad quemlibet, sed certum gradum se extollens, & unicam incognitam continens semper pertinet ad problema determinatum, & problema determinatum semper dat æquationem unicam incognitam impeditam & ad certum gradum erectam.

47. Æquatio duas incognitas complectens semper spectat problema indeterminatum.

Nam altera ex incognitis determinata non est, alioquin valor ejus inveniri posset, & ipsa a data æquatione exterminari: debet igitur habere infinitum valorum numerum, quare & altera incognita, cujus valor ab hac pendet.

Res manifesta fiet exemplo, sed prius observe

servo omnes quantitates, quæ ad absurdum non deducunt, posse esse valores datæ æquationis, aut propositum problema solvere: aliter enim possent, quia hoc absurdum non est, & non possent ex hypothesi.

Sit ergo æquatio $x \pm 16 = y$: Hic x potest esse numerus infinitus, quia tunc $x \pm 16$ esset adhuc infinitus, & ideo y ; quod nullam contradictionem involvit. Rursus x potest esse æqualis nihilo, fieret enim tunc $\pm 16 = y$, quod item fieri potest. Sed & negativa potest esse x & ad infinitum negativum ascendere, quia $-x + 16$ est quantitas infinita negativa, & talis est etiam y , quod absurdum non est. Potest igitur x esse negative & positive infinita, & habere valores omnes intermedios, ut patet ponenti pro x numerum quemvis. Quare tunc æquatio $\pm x \pm 16 = y$ est indeterminata; sed, si pro 16 substituas generalem symbolum m , hæc æquatio complectetur omnes æquationes unius dimensionis, quæ duas habent incognitas. Idem intellige de æquationibus plurium dimensionum, quæ duas habent incognitas.

Quin, etsi x infinita nunquam esse possent, sed nunquam data minor, & nunquam altera data major fieret, tamen problema esset indeterminatum, quia excessus majoris ex datis supra minorem est in infinitum divisibilis; id est ex eo quantitatium inæqualium numerus infinitus sumi potest, & quivis ex his valor æquationis esse potest, quia est intra præscriptos limites.

Ex. gr. Sit æquatio $16 - 8x + xx = 6y - yy$. Tunc x esse nequit æqualis nihilo, si enim esset, haberemus $16 = 6y - yy$; & (hinc inde addendo yy) $yy + 16 = 6y$; & (utrinque auferendo 16) $yy = 6y - 16$, & $y = 3 \pm \sqrt{(9 - 16)}$ Sect. II. Art. X. $= 3 \pm \sqrt{(-7)}$, quod est absurdum (Sect. I. No. 80.), & idem invenitur si x ponatur minor quam 0: Sit enim $x = -a$, erit $16 - 8x + xx = 16 + 8a + a^2 = 6y - y^2$; ac (in contrarias respectue partes translatis $16 + 8a + a^2$, ac $-y^2$) $y^2 = 6y - 16 - 8a - a^2$, & extracta radice, $y = 3 \pm \sqrt{(9 - 16 - 8a - a^2)}$ $= 3 \pm \sqrt{(-7 - 8a - a^2)}$.

Item x nequit esse major quam 7, at potest $x = 7$. Tunc enim æquatio foret $16 - 56 + 49 = 6y - yy = 9$, & (hinc inde addendo yy) $9 + 6y = yy$, & $y = 3 \pm \sqrt{(9 - 9)}$ $= 3$; quod fieri potest. Si vero ponatur x major quam 7 erit semper quod restat post substitutionem majus quam 9, & ideo inventenda esset radix quadrati negativi, quod fieri non potest. Quod autem semper majus sit in hac hypothesi, quod superest post substitu-

tionem facile probatur; est enim 9 supra re-
pertus $= 16 - 8 \cdot 7 + 7 \cdot 7$. Atqui (si x
major sit quam 7) hic numerus minor est quam
 $16 - 8 \cdot x + xx$, demtis enim utrinque æ-
qualibus 16, restat illinc $-8 \cdot 7 + 7 \cdot 7$;
 $= (-8 + 7) \cdot 7$: hinc vero $-8 \cdot x + xx$;
 $(-8 + x) \cdot x$, & esse debet $-8 + x$ ma-
jor quam $-8 + 7$, quia ex majore x tan-
tundem auferatur ac ex minore 7; igitur
 $(-8 + 7) \cdot 7$ minor est quam $(-8 + x) \cdot 7$,
& fortius quam $(-8 + x) \cdot x$. Igitur x con-
tinetur intra 7 & 1, sed infiniti numeri sunt in-
tra hos fines, ergo &c.

Res autem potest aliter demonstrari. Dux
sunt incognitæ in æquatione quia deest una lex;
sed lex una ab altera non pendet, imo pendere
non potest (esset enim superflua), ergo infi-
nitæ sunt leges, quæ pro arbitrio præscribi
possunt; ergo infiniti etiam valores incognitæ,
qui ab infinitis legibus determinantur.

Ex. gr. in problemate (Ni. 43. hujus) tres
sunt leges; ut numeri sint proportionales; ut
maximus & minimus simul faciant 30; medius
vero & maximus 36; & tres pariter quæsitæ
 x ; y ; z . prima lex ($x \cdot y :: y \cdot x$) dat æqua-

tionem $x = \frac{y^2}{x}$; secunda $x + z = 30$; tertia
 $y + z = 36$, aut (ponendo in secunda, & ter-
tia valorem z repertum in prima) $x + \frac{yy}{x}$

$= 30$; $y + \frac{yy}{x} = 36$, sive (sublatis fractioni-

bus) $xx + yy = 30x$, & $xy + yy = 36x$, &
(transfendo in prima xx , & in secunda xy)
 $30x - xx = yy = 36x - xy$; quare (trans-
ferendo xy) $xy + 30x - xx = 36x$; & (trans-
ferendo $30x - xx$, ac dividendo per x)
 $y = 6 + x$, & quadrando $yy = 36 + 12x + xx$,
qui valor si ponatur in æquatione $xx + yy$
 $= 30x$ dat $36 + 12x + 2xx = 30x$, & (cun-
ctis divisus per 2 & translatis $12x + 3(xx) xx$,
 $= 9x - 18$, & $x = \frac{9}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{81}{4} - 18\right)} = \frac{9}{2}$

$\pm \sqrt{\left(\frac{81 - 72}{4}\right)} = \frac{9}{4} \pm \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{9 \pm 3}{2} = 6$; aut
 $= 3$, ut supra; quare $y = 6 + x = 12$, aut
 $= 9$; & $z = 30 - x = 24$, aut $= 27$.

Hic tres leges dant problema determinatum;
at pone alteram, (puta primam) abesse; igitur
inveniendi sunt tres numeri, ita ut maxi-
mus & minimus simul faciant 30; medius ve-
ro & maximus 36; sint hi tres numeri x ; y ; z ;
igitur $x + z = 30$; & $y + z = 36$; quare ex
illa $z = 30 - x$; ex hac $z = 36 - y$; id
est $30 - x = 36 - y$; & $y - x = 6$.
Quid

res in quæstionibus ad æquationem redigendis tentet. Proposita autem aliqua quæstione, Artificis ingenium in eo præsertim requiritur ut omnes ejus conditiones totidem æquationibus designet. Ad quod faciendum perpendet imprimis an propositiones sive sententiæ, quibus enunciatur, sint omnes aptæ quæ terminis algebraicis designari possint, haud secus quam conceptus nostri characteribus græcis vel latinis. Et si ita, (ut solet in quæstionibus quæ circa numeros vel abstractas quantitates versantur,) tunc nomina quantitativis ignotis, atque etiam notis, si opus fuerit, imponat; & sensum quæstionis sermone, ut ita loquar, analytico designet. Et conditiones ejus ad algebraicos terminos sic translatae tot dabunt æquationes, quot ei solvendæ sufficiunt.

Quemadmodum si quærantur tres numeri continue proportionales quorum summa sit 20, & quadratorum summa 140; positis x , y & z nominibus numerorum trium quæsitorem, quæstio e latinis literis in algebraicas vertetur ut sequitur.

Quæstio enunciata.

Latine Quærantur tres numeri his conditionibus,
Algebraice $x. y. z?$

Latine Ut sint continue proportionales,

Algebraice $x. y :: y. z.$ sive $xx = yy.$

Latine Ut omnium summa sit 20.

Algebraice $x + y + z = 20.$

Latine Et ut quadratorum summa sit 140.

Algebraice $xx + yy + zz = 140.$

Atque ita quæstio deducitur ad æquationes $xx = yy$, $x + y + z = 20$
 &c

Quid tum? quomodo determinabimus x , aut y ? Ex alia lege, sed ex qua? Superior jam dedit quantitates quas invenimus. Pone *Ex. gr.* quod $x + y = 14$; & habebis $y = 14 - x$; qui valor substitutus in $y - x = 6$ dat $14 - 2x = 6$; & $x = 4$; unde $y = 10$, & $z = 26$; pro 14 pone quemvis ex infinitis numeris, quos conciperè potes, & invenies infinitos valores diversos. Muta legem, ponendo *Ex. gr.* pro summa ipsarum x , & y eorum differentiam datam, & rursus infinitos numeros invenies. Innumeræ vero sunt leges (salvis duabus jam assignatis) quas comminisci potes, ut, quod hi tres numeri sint in proportione arithmetica; quod factum primi in secundum, aut primi in tertium, aut secundi in tertium detur; quod ratio primi ad secundum, aut primi ad tertium, aut secundi ad tertium detur, aut ratio cujusvis potestatis pri-












mi ad æque altam potestatem secundi, vel tertii &c. quare patet propositum.

48. Igitur problemata, in quibus tres incognite sunt, longius absunt a problematibus determinatis, quam quæ duas tantum involvunt.

Quia scilicet una lex his deest, ut indeterminata fiant, & de hac lege dici possunt, quam numero præcedenti fuerunt allata.

49. Problemata, in quorum æquationibus solitaris tres sunt incognitæ, dixisse liceat plusquam indeterminata.

50. Problema determinatum, dempta una lege vertitur in indeterminatum, & vice versa. Item problema indeterminatum, una lege subblata fit plusquam indeterminatum &c.



& $xx + yy + zz = 140$. quarum ope x , y & z per regulas supra traditas investigandi sunt. (b)

II. Ceterum notandum est solutiones quæstionum eo magis expeditas & artificiosas ut plurimum evadere quo pauciores incognitæ quantitates sub initio ponuntur (c). Sic in hac quæstione posito x pro primo numero & y pro secundo, erit $\frac{yy}{x}$ tertius continue proportionalis, quem proinde ponens pro tertio numero quæstionem ad æquationes sic reduco.

Quæstio enunciata

Latine Quærentur tres numeri continue proportionales,

Algebraice $x. y. \frac{yy}{x}$?

Latine Quorum summa sit 20,

Algebraice $x + y + \frac{yy}{x} = 20$.

Latine Et quadratorum summa 140.

Algebraice $xx + yy + \frac{y^4}{xx} = 140$.

Habentur itaque æquationes $x + y + \frac{yy}{x} = 20$ & $xx + yy + \frac{y^4}{xx} = 140$ quarum reductione x & y determinandi sunt.

Aliud exemplum accipe. Mercator quidam nummos ejus triente quotannis adauget, demptis 100 fb. quas annuatim impendit in familiam, & post tres annos fit duplo ditior. Quærentur nummi.

Ad hoc autem resolvendum sciendum est quod plures latent propositiones, quæ omnes sic eruuntur & enunciantur.

Latine Mercator habet nummos quosdam.

Algebraice x .

Latine Ex quibus anno primo expendit 100 fb.

Algebraice $x - 100$.

Latine Et reliquum adauget triente.

Al-

(b) Vide supra Sect. II. Art. III, & seq. & præcipue XV., item infra.

(c) Hoc nihil aliud est, quam statim invenire quantitatem, cui aliqua ex problematis legibus competeat. Hoc autem facere uno intuitu & sine calculi ambagibus sane ingeniosum

est, & hercle ingeniosissimum esset ita uno ictu oculi problemata solvere, sed hoc difficillimum est, & ideo Algebra fuit inventa; nec sanctoribus facile est hanc viri acutissimi regulam servare, & ideo debent initio eam negligere, donec usus vires ingenii auxerit.

Algebraice $x - 100 + \frac{x - 100}{3}$ sive $\frac{4x - 400}{3}$.

Latine Annoque secundo expendit 100 lb.

Algebraice $\frac{4x - 400}{3} - 100$ sive $\frac{4x - 700}{3}$.

Latine Et reliquum adauget triente.

Algebraice $\frac{4x - 700}{3} + \frac{4x - 700}{9}$ sive $\frac{16x - 2800}{9}$.

Latine Et sic anno tertio expendit 100 lb.

Algebraice $\frac{16x - 2800}{9} - 100$ sive $\frac{16x - 3700}{9}$.

Latine Et reliquum trientem similiter lucratus est.

Algebraice $\frac{16x - 3700}{9} + \frac{16x - 3700}{27}$ sive $\frac{64x - 14800}{27}$.

Latine Fitque duplo ditior quam sub initio.

Algebraice $\frac{64x - 14800}{27} = 2x$.

Quæstio itaque ad æquationem $\frac{64x - 14800}{27} = 2x$ redigitur; cujus reductione erudendus est x . Nempe duc eam in 27 & fit $64x - 14800 = 54x$; subduc $54x$ & restat $10x - 14800 = 0$, seu $10x = 14800$, & dividendo per 10 fit $x = 1480$. Quare 1480 lb sunt nummi sub initio ut & lucrum.

Vides itaque quod ad solutiones quæstionum, quæ circa numeros vel abstractas quantitatum relationes solummodo versantur, nihil aliud fere requiritur quam ut e sermone latino vel alio quovis, in quo problema proponitur, translatio fiat in sermonem (si ita loquar) algebraicum, hoc est in characteres qui apti sunt ut nostros de quantitatum relationibus conceptus designent. Nonnunquam vero potest accidere quod sermo quocum status quæstionis exprimitur ineptus videatur qui in algebraicum possit verti; sed paucis mutationibus adhibitis, & ad sensum potius quam verborum sonos attendendo, versio reddetur facilis. Sic enim quælibet apud Gentes loquendi formæ propria habent idiomata, quæ ubi obvenerint, translatio ex unis in alias non verbo tenus instituenda est, sed ex sensu determinanda. Ceterum ut hujusmodi problemata hac methodo ad æquationes redigendi familiaritatem convincam & illustrem, & cum artes exemplis facilius quam præceptis addiscantur, placuit sequentium problematum solutiones adjungere:

CAPUT SECUNDUM.

PROB. I.

I. **D**ata duorum numerorum summa a & differentia quadratorum b , invenire numeros?

Sit eorum minor x , & erit alter $a - x$, eorumque quadrata xx & $aa - 2ax + xx$: Quorum differentia $aa - 2ax$ supponitur b . Est itaque $aa - 2ax = b$, indeque per reductionem $aa - b = 2ax$ seu

$$\frac{aa - b}{2a} (= \frac{1}{2} a - \frac{b}{2a}) = x. (a)$$

EXEMPLUM.

Si summa numerorum, seu a , sit 8, & quadratorum differentia, seu b , 16; erit $\frac{1}{2} a - \frac{b}{2a} (= 4 - 1) = 3 = x$, & $a - x = 5$. Quare numeri sunt 3 & 5.

PROB. II.

IV. *Invenire tres quantitates x , y & z quarum paris cujusque summa datur.*

Si summa paris x & y sit a ; paris x & z , b ; ac paris y & z , c . Pro determinandis tribus quaesitis x , y & z tres habebuntur aequationes $x + y = a$, $x + z = b$, & $y + z = c$. Jam ut incognitarum duarum, puta y & z , exterminentur, aufer x utrinque in prima & secunda aequatione, & emergent

(a) Hoc problema potest aliter quoque solvi, sed prius demonstrandum hoc theorema utilissimum.

51. Ex duabus quantitatibus major aequat aggregatum ex semisumma ambarum, & ex earum semidifferentia; minor vero excessum semisumma supra semidifferentiam.

TAB. A
Fig. 5. Recta BC majorem; CA minorem quantitatem; tota AB summam earum; AF dimidiatam summam expriment; & sumatur BE aequalis CA, erit ergo EC aequalis differentiae ipsarum BC; CA; sed quia BF aequat FA, & AC aequat EB; erit ergo (Eucl. Ax. 2.) CF aequalis FE semidifferentiae. At

BC aequat BF; FC simul; AC aequat differentiam ipsarum AF; FC; ergo &c.

His politis, sint duo numeri in problemate quaesiti x ; y , & $x + y = 2c$; $x - y = 2z$ erit $x = c + z$; $xx = cc + 2cz + zz$; & $y = c - z$; $yy = cc - 2cz + zz$; at $b = xx - yy = cc + 2cz + zz - cc + 2cz - zz = 4cz$;

ergo $b = 4cz$, & $\frac{b}{4c} = z$, si jam $2c = a$;

fiet $z = \frac{b}{2a}$, $x = \frac{a}{2} + \frac{b}{2a}$; at y minor

$= \frac{a}{2} - \frac{b}{2a}$ ut in Auctoris solutione.

gent $y = a - x$, & $z = b - x$, quos valores pro y & z substitue in tertia, & orietur $a - x + b - x = c$ & per reductionem $x = \frac{a + b - c}{2}$. Invento x æquationes superiores $y = a - x$ & $z = b - x$ dabunt y & z . (b)

E X E M P L U M.

Si summa paris x & y sit 9, paris x & z 10, & paris y & z 13, tum in valoribus x , y & z scribe 9 pro a , 10 pro b , & 13 pro c ; & evadet $a + b - c = 6$, adeoque $x (= \frac{a + b - c}{2}) = 3$, $y (= a - x) = 6$, & $z (= b - x) = 7$.

P R O B. I I I.

V. *Quantitatem datam ita in partes quotcunque dividere ut majores partes superent minimam per datas differentias.*

Sit a quantitas in quatuor ejusmodi partes dividenda, ejusque prima atque minima pars x , & super hanc excessus secundæ partis b , tertiæ partis c & quartæ partis d ; & erit $x + b$ secunda pars, $x + c$ tertia pars & $x + d$ quarta pars, quarum omnium aggregatum $4x + b + c + d$ æquatur toti lineæ a . Aufer jam utrinque $b + c + d$ & restat $4x = a - b - c - d$ five $x = \frac{a - b - c - d}{4}$. (i)

E X E M -

(b) Vel inventurus x subduc $y + z = c$ ex $x + z = b$; fiet $x - y = b - c$; quam adde ipsi $x + y = a$; erit

$$2x = a + b - c; \text{ \& } x = \frac{a + b - c}{2}.$$

Ut reperias y subtrahe $x + z = b$ ex $x + y = a$; supererit $y - z = a - b$;

huic adde $y + z = c$; obtinebis

$$2y = a - b + c, \text{ \& } y = \frac{a - b + c}{2};$$

Pro z ex $y + z = c$ deme $x + y = a$; restabit $z - y = b - a$, cui adde $y + z = c$,

$$2z = b - a + c; \text{ \& } z = \frac{b - a + c}{2}.$$

Aut quia $x + z = b$, erit $z = b - x$; ergo $x + y + z = a + b - x$ (Eucl. Ax. I.) est enim $x + y = a$, & transponendo

$$2x = a + b - y - z = \text{(quia } y + z = c) \\ a + b - c, \text{ \& } x = \frac{a + b - c}{2}.$$

(c) Sit data quantitas a dividenda in tot par-

tes, quot unitates sunt in m , & detur differentia inter partium minimam x , & proximam, inter eandem x & sequentem, & sic de ceteris. Jam data a debet æquare mx auctam omnibus differentis (Eucl. Ax. 19.) quæ cum dentur, omnes exprimantur symbolo d ,

$$\text{ergo } a = mx + d, \\ \text{\& } \frac{a - d}{m} = x.$$

Nunc pro m substitue quemvis numerum, ex. gr. 7; pro a , 50, fitque $d = c + f + g + h + l + m = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$, erit

$$x = \frac{50 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7}{7}$$

$$= \frac{23}{7} = 3 \frac{2}{7}, \text{ proxima pars } = 5 \frac{2}{7}; \text{ alia}$$

$$6 \frac{2}{7}, \text{ alia } = 7 \frac{2}{7}, \text{ sequens } = 8 \frac{2}{7},$$

$$\text{tum } 9 \frac{2}{7}, \text{ demum } 10 \frac{2}{7}.$$

E X E M P L U M.

Proponatur linea 20 pedum sic in 4 partes distribuenda ut super primam partem excessus secundæ sit 2 pedum, tertiæ 3 pedum, & quartæ 7 pedum. Et quatuor partes erunt x ($= \frac{a-b-c-d}{4}$ sive $\frac{20-2-3-7}{4}$)
 $= 2$, $x + b = 4$, $x + c = 5$, & $x + d = 9$.

Eodem modo quantitas in plures partes iisdem conditionibus dividitur.

P R O B. I V.

VI. *Viro cuidam nummos inter mendicantes distribuere volenti desunt octo denarii quo minus det singulis tres denarios. Dat itaque singulis duos denarios & tres denarii supersunt. Queritur numerus mendicantium.*

Esto numerus mendicantium x & decerunt 8 denarii quo minus det omnibus $3x$ denarios; habet itaque $3x - 8$ denarios. Ex his autem dat $2x$ denarios, & reliqui denarii $x - 8$ sunt tres. Hoc est $x - 8 = 3$ seu $x = 11$.

P R O B. V.

VII. *Si Tabellarii duo A & B, 59 milliariibus distantes tempore matutino obviam eant, quorum A conficit 7 milliaria in 2 horis, & B 8 milliaria in 3 horis, ac B una hora serius iter instituit quam A: queritur longitudo itineris quod A conficiet antequam conveniet B.*

Dic longitudinem illam x ; & erit $59 - x$ longitudo itineris B. Et cum A pertranseat 7 milliaria in 2 horis, pertransibit spatium x in $\frac{2x}{7}$ horis, eo quod sit 7 milliaria. 2 horas :: x milliaria. $\frac{2x}{7}$ horas. Atque ita cum B pertranseat 8 milliaria in 3 horis, pertransibit spatium suum $59 - x$ in $\frac{177 - 3x}{8}$ horis. Jam cum horum temporum differentia sit 1 hora, ut evadant æqualia adde differentiam illam breviori tempori, nempe tempori $\frac{177 - 3x}{8}$, & emerget $1 + \frac{177 - 3x}{8} = \frac{2x}{7}$. Et per reductionem $35 = x$. Nam multiplicando per 8 fit $185 - 3x = \frac{16x}{7}$. Dein multiplicando etiam per 7 fit $1295 - 21x = 16x$, seu $1295 = 37x$. Et di-
 vi-

videndo denique per 37, exoritur $35 = x$. Sunt itaque 35 milliaria iter quod A conficiet antequam conveniet B. (d)

Idem

(d) Vel etiam sic. Cum A peragat 7 milliaria in 2 horis, una hora percurret $\frac{7}{2}$ milliaria; eadem ratione B una hora perficiet $\frac{8}{3}$ milliaria; si ergo fiat $\frac{7}{2} \cdot \frac{8}{3} :: x \cdot \frac{16x}{21}$, erit $\frac{16x}{21}$ iter, quod B percurret eodem tempore, quo A peragat iter x , sed B iter incipit una hora ferius, quam A, ergo iter illius $= \frac{16x}{21} - \frac{8}{3}$. Est autem iter B una cum itinere A $= 59$; igitur $x + \frac{16x}{21} - \frac{8}{3} = 59$, & reducendo x ad eandem denominationem ac $\frac{16x}{21}$, & transponendo $\frac{8}{3}$, $\frac{21x + 16x}{21} = 59 + \frac{8}{3}$, ac redigendo ad simpliciores expressionem primæ æquationis membrum, & secundum ad eundem denominatorem $\frac{37x}{21} = \frac{185}{3}$, & omnia multiplicando per 21 (nempe in primo membro deducendo 21, & in secundo 3, & idem secundum multiplicando per 7. ob 21 $= 7 \cdot 3$) $37x = 1295$, & dividendo per 37 &c.

Si vero quaeratur tempus concursus; sit tempus, per quod A moveri pergit, $= y$; si fiat ut 2 horæ ad y horas sic 7 milliaria ad $\frac{7y}{2}$ milliaria; exprimet $\frac{7y}{2}$ spatium ab A peractum tempore y . Sed iter ipsius B durat per tempus $y - 1$, ex conditione problematis, fac ergo ut 3 horæ ad $y - 1$ horas sic 8 milliaria ad $\frac{8y - 8}{3}$; hæc quantitas exponet spatium a B percursum tempore $y - 1$; hoc spatium deinceps 59 milliariis, quibus A distat a B, & $59 - \frac{8y - 8}{3}$ erit spatium, quod separat locum ubi erat A, cum moveri cepit, a loco ubi est B postquam iter fecit per $y - 1$ horas, atqui in eodem loco esse debet etiam A quia nempe A, & B conveniunt) ergo $59 - \frac{8y - 8}{3} = \frac{7y}{2}$; & cunctis ductis in 2; $118 - \frac{16y + 16}{3}$

$= 7y$; ac omnibus in 3 ductis, $354 - 16y + 16 = 21y$, & redigendo ad simpliciores expressionem $370 = 37y$ seu $y = \frac{370}{37} = 10$ debet ergo A iter facere per 10 horas, B vero per 9.

Methodus superior aptari potest etiam aliis hypothesebus. Crescant *Ex. gr.* spatia peracta ut quadrata temporum, quibus peraguntur: id est si A una hora perficit duo milliaria, duabus horis peragat octo, tribus octodecim (est enim ut 1, quadratum primi temporis, ad 4, quadratum secundi sic 2 spatium primo tempore decursum ad 8 spatium secundo tempore dimensum, & ut 1 ad 9 ita 2 ad 18) & sit y spatium a B conficiendum antequam mobilis conveniat, erit $c - y$ spatium conficiendum ab A, & sit m tempus quo A peragit spatium a ; Fac. a. $c - y :: m^2$ ad quartam $\frac{cm^2 - m^2y}{a}$, hoc erit quadratum temporis, quo A perficiet spatium $c - y$. Pariter pone n tempus, quo B percurrit spatium b , & sic $b \cdot y :: n^2 \cdot \frac{n^2y}{b}$ erit hoc quadratum temporis a B impensum. Figurat A motum incepisse tempore p citius quam B; & erit

$$m\sqrt{\left(\frac{c-y}{a}\right)} - p = n\sqrt{\frac{y}{b}},$$

& quadrando

$$\frac{mmc - mmy}{a} - 2mp\sqrt{\left(\frac{c-y}{a}\right)} + p^2 = \frac{n^2y}{b},$$

quare

$$\frac{m^2c + ap^2}{a} - y\left(\frac{bm^2 + an^2}{ab}\right) = 2mp\sqrt{\left(\frac{c-y}{a}\right)};$$

pone

$$\frac{m^2c + ap^2}{a} = h^2; \quad \frac{bm^2 + an^2}{ab} = g;$$

$$\& 2mp = f^2;$$

eritque

$$h^2 - gy = f^2\sqrt{\left(\frac{c-y}{a}\right)};$$

& quadrando

$$h^4 - 2h^2gy + g^2y^2 = \frac{cf^4 - f^2y}{a};$$

Idem generalius.

VIII. Datis duorum mobilium A & B eodem cursu pergentium celeritatibus, una cum intervallo locorum ac temporum a quibus incipiunt moveri; determinare metam in qua convenient.

Pone mobilis A eam esse celeritatem qua spatium c pertransire possit in tempore f , & mobilis B eam esse qua spatium d pertransire possit in tempore g ; & locorum intervallum esse e , ac b temporum in quibus moveri incipiunt.

C A S U S I.

Deinde, si ambo ad easdem plagas tendant, & A sit mobile quod sub initio motus longius distat a meta; pone distantiam illam esse x , indeque aufer intervallum e , & restabit $x - e$ pro distantia B a meta. Et cum A pertransfeat spatium c in tempore f , tempus in quo pertransibit spatium x erit $\frac{fx}{c}$, eo quod sit spatium c ad tempus f , ut spatium x ad tempus $\frac{fx}{c}$. Atque ita, cum B pertransfeat spatium d in g , tempus in quo pertransibit spatium $x - e$ erit $\frac{g(x - e)}{d}$. Jam, cum horum temporum differentia supponatur b , ut ea evadant æqualia, adde b breviori tempore, nempe tempore $\frac{fx}{c}$ (si modo B prius incipiat moveri), & evadet $\frac{fx}{c} + b = \frac{g(x - e)}{d}$.

Et per reductionem $\frac{ceg + cdb}{cg - df}$ vel $\frac{ge + db}{g - \frac{d}{c}f} = x$.

Sin A prius moveri incipiat, adde b tempore $\frac{gx - ge}{d}$, & evadet $\frac{fx}{c} = b + \frac{gx - ge}{d}$, & per reductionem $\frac{ege - cdb}{cg - df} = x$. (c)

C A S U S

aut $y^2 = \frac{2ab^2gy - f^4y - ab^4 + cf^4}{ag^2}$;

& $y = \frac{2ab^2g - f^4}{2ag^2}$;

$\sqrt{\left(-\frac{ab^4 + cf^4}{ag^2} + \left(\frac{2ab^2g - f^4}{2ag^2}\right)^2\right)}$.

(c) Hic quoque valet superius ratiocinium: B peragens tempore g spatium d percurrent tempore b spatium $\frac{db}{g}$; & cum sit $\frac{c}{f} : \frac{d}{g} :: x : \frac{dfx}{cg}$, mobile B perficiet spatium $\frac{dfx}{cg}$ eodem

tempore quo A percurrent x , nempe ab initio motus mobilis A ad punctum temporis, quo hæc duo mobilia eodem perveniunt, mobile B transibit spatium $\frac{dfx}{cg}$, sed ut hæc duo spatia æqualia sunt, huic adjiciendum est spatium quo mobilia distant, & spatium $\frac{db}{g}$ a mobile B peractum, A adhuc quiescente, ergo $x = \frac{dfx}{cg} + e + \frac{db}{g}$, & omnibus per cg multiplicatis

CASUS II.

Quod si mobilia obviam eant, & x , ut ante, ponatur initialis distantia mobilis A a meta, tum $e - x$ erit initialis distantia ipsius B ab eadem meta; & $\frac{fx}{c}$ tempus, in quo A conficiet distantiam x , atque $\frac{ge - gx}{d}$ tempus, in quo B conficiet distantiam suam $e - x$. Quorum temporum minori ut supra, adde differentiam b , nempe temporis $\frac{fx}{c}$ si B prius incipiat moveri, & sic habebitur $\frac{fx}{c} + b = \frac{ge - gx}{d}$, & per reductionem $\frac{ege - cdb}{cg + df} = x$. Sin A prius incipiat moveri, adde b temporis $\frac{ge - gx}{d}$ & evadet $\frac{fx}{c} = b + \frac{ge - gx}{d}$, & per reductionem $\frac{ege + cdb}{cg + df} = x$.

EXEMPLUM I.

Si quotidie Sol unum gradum conficit & Luna tredecim, & ad tempus ali-

$$egx = dfx + ceg + cdb;$$

& per reductionem, $x = \frac{ceg + cdb}{cg - df}$

Quod si A prius moveri cœperit, spatium ab eo percursum tempore b , futurum est $\frac{cb}{f}$.

ob $f : b :: c : \frac{cb}{f}$. Postquam igitur A hoc spatium perfecit, ambo mobilia simul movebuntur, & quidem per tempora æqualia; quo tempore A transibit spatium

$$x - \frac{cb}{f} = \frac{fx - cb}{f};$$

$$\frac{e}{f} : \frac{d}{g} :: \frac{fx - cb}{f} : \frac{dfx - dcb}{cg},$$

spatium a B eodem tempore percursum: ut vero hæc duo spatia æqualia sint, minori (nempe $\frac{dfx - dcb}{cg}$) addendum est spatium, quo mobilia, cum ambo moveri cœperunt, distabant, scilicet

$$\frac{cb}{f} = \frac{ef - cb}{f},$$

ergo

$$\frac{fx - cb}{f} = \frac{dfx - dcb}{cg} + \frac{ef - cb}{f};$$

& utrumque delecto $\frac{cb}{f}$,

$$\frac{fx}{f} = \frac{dfx - dcb}{cg} + \frac{ef}{f}$$

$$= x = \frac{dfx - dcb}{cg} + e,$$

cunctis in eg ductis,

$$egx = dfx - dcb + ceg,$$

& reducendo

$$x = \frac{ceg - cdb}{cg - df}.$$

Si vero quæretur tempus concursus; sit tempus, quo durat motus ipsius A, $= y$; & quia $f, y :: c : \frac{cy}{f}$, hoc erit spatium ab A peractum.

Jain B movetur per tempus $y + b$; sed

$$g \cdot y + b :: d : \frac{dy + db}{g},$$

quod est spatium a B perfectum, cui adde e , & erit

$$\frac{cy}{f} = \frac{dy + db}{g} + e$$

& (cunctis prius in f , deinde in g ductis)

$$cgy = dty + dfb + efg$$

& transponendo, ac per $cg - df$ dividendo,

$$y = \frac{dfb + efg}{cg - df}$$

tempus, per quod A motum continuare debet.

aliquod, Sol fit in principio Cancrī atque post tres dies Luna in principio Arietis: quæritur locus conjunctionis proxime futuræ. Resp. in $10\frac{3}{4}$ gradu Cancrī. Nam, cum ambo ad eandem plagas eant, & serior fit epocha motus Lunæ quæ longius distat a meta; erit A Luna, B Sol, & $\frac{ege + cdb}{eg - df}$ longitudo itineris Lunarī, quæ, si scribatur 13 pro e ; 1 pro f ; d , ac g ; 90 pro e ; & 3 pro b ; evadet $\frac{13 \cdot 1 \cdot 90 + 13 \cdot 1 \cdot 3}{13 \cdot 1 - 1 \cdot 1}$; hoc est $\frac{1209}{12}$, sive $100\frac{3}{4}$. Hos itaque gradus adjice principio Arietis & prodibit $10\frac{3}{4}$ gradus Cancrī.

E X E M P L U M II.

Si Tabellarii duo A & B, 59 miliaribus distantes, tempore matutino obviam eant, quorum A conficit 7 miliaria in 2 horis, & B 8 miliaria in 3 horis, & B una hora serius iter instituit quam A: quæritur iter quod A conficiet antequam conveniat B. Resp. 35 miliaria. Nam cum obviam eant & A primo instituat iter, erit $\frac{ege + cdb}{eg + df}$ iter quæsitum. Et hoc, si scribatur 7 pro e , 2 pro f , 8 pro d , 3 pro g , 59 pro e , & 1 pro b , evadet $\frac{7 \cdot 3 \cdot 59 + 7 \cdot 8 \cdot 1}{7 \cdot 3 + 8 \cdot 2}$; hoc est $\frac{1295}{37}$ sive 35

P R O B. VI.

IX. Data agentis alicujus potestate, invenire quot ejusmodi agentes datum effectum a in dato tempore b producent.

Sit ea agentis potestas, qua effectum e producere potest in tempore d , & erit ut tempus d ad tempus b , ita effectus e quem agens iste producere potest in tempore d , ad effectum quem potest producere in tempore b , qui proinde erit $\frac{bc}{d}$. Deinde ut unius agentis effectus $\frac{bc}{d}$ ad omnium effectum a , ita agens iste unicus ad omnes agentes: adeoque agentium numerus erit $\frac{ad}{bc}$.

E X E M P L U M.

Si scriba in 8 diebus 15 folia describere potest, quot ejusmodi scribæ requiruntur ad describendum 405 folia in 9 diebus? Resp. 24. Nam si substituuntur 8 pro d , 15 pro e , 405 pro a & 9 pro b , numerus $\frac{ad}{bc}$ evadet $\frac{405 \cdot 8}{9 \cdot 15}$ hoc est $\frac{3240}{135}$, sive 24.

Q 2

PROB.

PROB. VII.

X. *Datis plurium agentium viribus, tempus x determinare in quo datum effectum d conjunctim producent.*

Agentium A, B, C, vires ponantur quæ in temporibus e, f, g, producant effectus a, b, c respective; & hæc in tempore x producent effectus $\frac{ax}{e}$, $\frac{bx}{f}$, $\frac{cx}{g}$. Quare est $\frac{ax}{e} + \frac{bx}{f} + \frac{cx}{g} = d$, & per reductionem

$$x = \frac{d}{\frac{a}{e} + \frac{b}{f} + \frac{c}{g}}$$

EXEMPLUM.

Tres mecenarii opus aliquod certis temporibus perficere possunt, videlicet, A semel in tribus septimanis, B ter in octo septimanis, & C quinques in duodecim septimanis. Quæritur quanto tempore simul absolvent? Sunt itaque Agentium A, B, C vires, quæ temporibus 3, 8, 12 producant effectus 1, 3, 5 respective: Et quæritur tempus quo absolvent effectum 1, quare pro a, b, c, d, e, f, g scribe 1, 3, 5, 1, 3, 8, 12, & proveniet $x = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{3}{8} + \frac{5}{12}}$ sive $\frac{8}{9}$ septimanæ, hoc est 6 dies $\frac{1}{3}$ horæ, tempus quo simul absolvent.

PROB. VIII.

XI. *Dissimiles duarum pluriumve rerum misturas ita componere, ut res illæ commistæ datam inter se rationem acquirant.*

Sit unius misturæ data quantitas $dA + eB + fC$, alterius eadem quantitas $gA + hB + kC$, & eadem tertiæ $lA + mB + nC$; ubi A, B, & C denotent res mistas, & d, e, f, g, h, &c. proportionones earundem in misturis. (f) Et sit $pA + qB + rC$ mistura quam ex his tribus oportet componere; fingeque x, y, z numeros esse, per quos si tres datæ misturæ

res-

(f) Sint Ex. gr. tres laminæ, quarum quævis conflatur tribus metallis (puta Auro, Argento, Ære) variorum ponderum. Ex earum laminarum partibus simul mistis & confusis effici debeat quarta lamina continens Auri pondus p; Argenti q; Æris r. Indicent A Aurum; B Argentum; C Æs, & prima lamina (cujus symbolum est O) consistet quantitate d Auri; e Argenti; f Æris; unde ea tota

est $dA + eB + fC = O$. Secunda (quam expono symbolo P) componatur quantitate g Auri; h Argenti; k Æris; igitur $gA + hB + kC = P$; Eadem ratione tertia data $Q = lA + mB + nC$; & conflanda sit quarta $R = pA + qB + rC$.

respective multiplicentur, earum summa evadet $pA + qB + rC$ (g).

Est itaque

$$\left. \begin{array}{l} dx A + ex B + fx C \\ + gy A + by B + ky C \\ + lz A + mz B + nz C \end{array} \right\} = pA + qB = rC,$$

Adeoque collatis terminis,

$$dx + gy + lz = p, \quad ex + by + mz = q, \quad \& \quad fx + ky + nz = r, \quad (b)$$

& per reductionem

$$x = \frac{p - gy - lz}{d} = \frac{q - by - mz}{e} = \frac{r - ky - nz}{f}.$$

Et rursus æquationes

$$\frac{p - gy - lz}{d} = \frac{q - by - mz}{e} \quad \& \quad \frac{q - by - mz}{e} = \frac{r - ky - nz}{f}$$

per reductionem dant

$$\frac{ep - dq + dmz - elz}{eg - db} (= y) = \frac{fq - er + enz - fmz}{fb - ek}.$$

Quæ, si abbrevietur scribendo

$$\begin{array}{l} \alpha \text{ pro } ep - dq, \quad \beta \text{ pro } dm - el, \quad \gamma \text{ pro } eg - db, \\ \delta \text{ pro } fq - er, \quad \zeta \text{ pro } en - fm, \quad \& \quad \theta \text{ pro } fb - ek, \end{array}$$

evadet

$$\frac{\alpha + \beta z}{\gamma} = \frac{\delta + \zeta z}{\theta} \quad \& \quad \text{per reductionem} \quad \frac{\theta\alpha - \gamma\delta}{\gamma\zeta - \beta\theta} = z.$$

Invento z pone

$$\frac{\alpha + \beta z}{\gamma} = y \quad \& \quad \frac{p - gy - lz}{d} = x.$$

E X E M P L U M.

Si tres sint metallorum colliquefactorum mixturæ, quarum primæ pondo continet argenti unc. 12, æris unc. 1, & stanni unc. 3; secundæ pondo continet argenti unc. 1, æris unc. 12, & stanni unc. 3; & tertiæ pondo continet æris unc. 14, stanni unc. 2, & argenti nihil; sintque hæ mixturæ ita componendæ, ut pondo compositionis contineat argenti unc. 4, æris unc. 9, & stanni unc. 3; Pro $d, e, f; g, b, k; l, m, n; p, q, r$ scribe 12, 1, 3; 1, 12, 3; c, 14, 2; 4, 9, 3 respective, & erit

$$a (=$$

(g) Sumis, Ex. Gr. quantitatem x ex Lamina O; quantitatem y ex P, & z ex Q; &

ex lege problematis, esse debet

$$xO + yP + zQ = R = pA + qB + rC.$$

Ast

$$xO = xdA + xeB + xfC;$$

&

$$yP = ygA + ybB + ykC;$$

ac

$$zQ = zlA + zmB + znC, \text{ ergo } \&c.$$

(h) Siquidem quantitas auri, quæ est in R æquat omnes suas partes, vel quantitates Auri ex O; P; Q sumptas; ergo

$$zdA + ygA + zlA = pA,$$

&

$$xd + yg + zl = p$$

& sic de ceteris,

$$\alpha (= cp - dq = 1 \cdot 4 - 12 \cdot 9) = -104,$$

&

$$\beta (= dm - el = 12 \cdot 14 - 1 \cdot 0) = 168,$$

& sic

$$\gamma = -143, \delta = 24, \zeta = -40, \text{ \& } \theta = 33.$$

Adeoque

$$z (= \frac{\theta\alpha - \gamma\delta}{\gamma\zeta - \beta\theta} = \frac{-3432 + 3432}{5720 - 5544}) = 0.$$

$$y (= \frac{\alpha + \beta z}{\gamma} = \frac{-104 + 0}{-143}) = \frac{8}{11}, \text{ \& } x (= \frac{p - \gamma y - lz}{d})$$

$$= \frac{4 - \frac{8}{11}}{12} = \frac{3}{11}.$$

Quare si misceantur $\frac{8}{11}$ partes pondo misturæ secundæ, $\frac{3}{11}$ partes pondo primæ & nihil tertiæ, aggregatum erit pondo continens quatuor uncias argenti, novem æris, & tres stanni.

PROB. IX.

XII. *Datis plurium ex iisdem rebus misturarum pretiis, & proportionibus mistorum inter se, pretium cujusvis e mistis determinare.*

Cujusvis rerum A, B, C, misturæ $dA + gB + lC$ pretium esto p , misturæ $eA + hB + mC$ pretium q , & misturæ $fA + kB + nC$ pretium r , & rerum illarum A, B, C quærantur pretia x , y & z . Utpote pro rebus A, B, & C substitue earum pretia x , y , & z , & exsurgent æquationes

$$dx + gy + lz = p, \quad ex + hy + mz = q, \quad \text{\& } fx + ky + nz = r,$$

ex quibus pergendo ut in præcedente problemate, elicientur itidem

$$\frac{\theta\alpha - \gamma\delta}{\gamma\zeta - \beta\theta} = z, \quad \frac{\alpha + \beta z}{\gamma} = y, \quad \text{\& } \frac{p - \gamma y - lz}{d} = x.$$

EXEMPLUM.

Emit quidam 40 modios tritici, 24 modios hordei, & 20 modios avenæ, simul 15 libris 12 solidis: Deinde consimilis grani emit 26 modios tritici, 30 modios hordei, & 50 modios avenæ, simul 16 libris: Ac tertio consimilis etiam grani emit 24 modios tritici, 120 modios hordei & 100 modios avenæ, simul 34 libris. Quæritur quanti æstimandus sit modius cujusque grani? Resp. Modius tritici 5 solidis, hordei 3 solidis, & avenæ 2 solidis. Nam pro $d, g, l; e, h, m; f, k, n; p, q, \text{ \& } r$ scribendo respecti-

ve 40, 24, 20; 26, 30, 50; 24, 120, 100; $15 \frac{3}{5}$: 16, & 34; prodidit

$$\alpha (= ep - dq = 26 \cdot 15 \frac{3}{5} - 40 \cdot 16) = -234 \frac{2}{5};$$

$$\beta (= dm - el = 40 \cdot 50 - 26 \cdot 20) = 1480.$$

Atque ita
 $\gamma = -576, \delta = -500, \zeta = 1400, \text{ \& } \theta = -2400.$

Adeoque
 $x (= \frac{\theta\alpha - \gamma\delta}{\gamma\zeta - \beta\theta} = \frac{-562560 - 288000}{-806400 + 3552000} = \frac{274560}{2745600}) = \frac{1}{10},$

$$y (= \frac{\alpha + \beta x}{\gamma} = \frac{-234 \frac{2}{5} + 148}{-576}) = \frac{3}{20}$$

Et

$$z (= \frac{\nu - \gamma y - I z}{d} = \frac{15 \frac{3}{5} - \frac{18}{5} - 2}{40}) = \frac{1}{4}.$$

Constitit itaque modius tritici $\frac{1}{4}$ lb seu 5 solidis, modius hordei $\frac{3}{20}$ lb seu 3 solidis, & modis avenæ $\frac{1}{10}$ lb seu 2 solidis.

PROB. X.

XIII. *Datis & mixturæ & misſorum gravitatibus ſpecificis invenire proportionem miſſorum inter ſe.*

Sit e gravitas ſpecifica mixturæ $A+B$ cujus A gravitas ſpecifica eſt a , & B gravitas b : & cum gravitas abſoluta ſeu pondus componatur ex mole corporis & gravitate ſpecifica, erit aA pondus ipſius B & $eA+eB$ pondus aggregati $A+B$, adeoque $aA+bB=eA+eB$, indeque $aA - eA = eB - bB$ ſeu $e - b \cdot a = e :: A \cdot B$.

EXEMPLUM.

Sit auri gravitas ut 19, argenti ut $10 \frac{1}{3}$, & coronæ Hieronis ut 17; eritque 10. 3 ($:: e - b \cdot a = e :: A \cdot B$) :: moles auri in corona, ad molem argenti, vel 190. 31 ($:: 19 \cdot 10$ ad $10 \frac{1}{3} \cdot 3 :: a(e - b)$ ad $b(a - e)$) :: pondus

us auri in corona, ad pondus argenti, & 221. 31 :: pondus coronæ, ad pondus argenti. (i)

PROB. XI.

XIV. Si boves a depascant pratum b in tempore c; & boves d depascant pratum æque bonum e in tempore f, & gramen uniformiter crescat: quaeritur quot boves depascant pratum simile g in tempore h.

Si boves a in tempore c depascant pratum b; tum per analogiam boves

(k) $\frac{e}{b} a$ in eodem tempore c, vel boves $\frac{e}{bf} a$ in tempore f, vel boves $\frac{e}{bb} a$

(i) Fiat moles auri = A, argenti = B; gravitas specifica cujusdam molis ex auro (19)

= a; ejusdem molis ex argento (10 $\frac{1}{3}$) = b;

æqualis molis ex mistura (17) = e, erit e—b

(= 17—10 $\frac{1}{3}$) = 7 $\frac{1}{3}$ = 6 $\frac{2}{3}$ = $\frac{20}{3}$;

a—e (= 19—17) = 2; atqui, ex superioribus, e—b. a—e :: A. B, ergo A. B::

$\frac{20}{3} . 2 :: 10.2$ ad 3.2 :: 10 ad 3. Sed pondus

componitur ex mole & gravitate specifica; igitur pondus auri ad pondus argenti ut 10.19

ad 3.10 $\frac{1}{3}$. At ex aggregato molis Auri (10)

cum argenti mole (3) constat coronæ moles; ea igitur est ut 13. Atqui pondus coronæ ad

pondus argenti est in ratione composita gravitatum coronæ & argenti (17.10 $\frac{1}{3}$) & mo-

lum coronæ atque argenti (13.3) est ergo pondus coronæ ad argenti pondus ut 13.17 (221)

ad 3.10 $\frac{1}{3}$ (31.)

ad 3.10 $\frac{1}{3}$ (31.)

ALITER.

Sit mistura quædam M (cujus moles = e) composita duobus mistis O, & P; capiatur ex singulari O ac P moles = c; & sit molis e mistura M gravitas specifica = f; & molis c metalli O, = g, ac demum molis e metalli P, = h, quaeritur quanta sit moles ex ipsis O & P ex quibus moles e mistura M constat est.

Jam patet misturam esse specificè levioiorem misto graviore, & graviorem leviori, sit specificè gravius O.

Moles fiat = x; erit moles P = e—x;

igitur e. x :: g. $\frac{gx}{c}$; & e.—x :: h. $\frac{eh—bx}{c}$;

atqui gravitas specifica f misturae M nihil est nisi aggregatum ex gravitatibus specificis metallorum componentium, ut patet, ergo

$$\frac{gx—bx+ch}{c} = f;$$

& per reductionem

$$x = \frac{cf—cb}{g—h};$$

id est

$$g—h. f—h :: e. x,$$









ut excessus graditatis specificæ metalli gravio-
tis supra specificam levioris ad excessum gravi-
tatis specificæ misturae supra specificam gravi-
tatem levioris, ita moles misturae ad molem
metalli gravioris.

Quia g—h. f—h :: e. x, erit etiam
g—h. (g—h—f+h)g—f :: e. e—x,
nempe, ut excessus majoris gravitatis specificæ
unius misti supra minorem alterius, ad excessum
ejusdem majoris gravitatis misti supra gravi-
tatem specificam misturae, ita moles misturae
ad molem misti levioris.

Item f—h. g—h :: x. c
& f—h. g—h :: x. c—x;
scilicet, ut excessus specificæ gravitatis mi-
sturae supra levioiorem ad excessum gravioris
supra eandem levioiorem, ita moles metalli gra-
vioris ad molem levioris.

(k) Si tempora sint æqualia & prata æque
bona, patet esse ut superficies prati b ad super-
ficiem prati e, ita numerus boum a ad nume-
rum boum eodem tempore c depascantium
pratum e, qui numerus erit $\frac{ae}{b}$.

Sed si tempora sint inæqualia, pratum vero
idem, tunc duo boum numeri erunt in reci-
proca temporum ratione; constat enim, quod,
numerus boum decrescente, augetur tempus
ad



in tempore b , depascunt pratum e ; puta si gramen post tempus e non cresceret. (l) Sed, cum propter graminis incrementum, boves d in tempore f depascant solummodo pratum e , ideo graminis in prato e incrementum illud per tempus $f - e$ tantum erit quantum per se sufficit pas-

scendis bobus $d - \frac{eca}{bf}$ per tempus f , (m) hoc est quantum sufficit pas-
cendis bobus $\frac{df}{b} - \frac{eca}{bh}$ per tempus b . (n) Et in tempore $b - e$ per analogiam tantum erit incrementum quantum per se sufficit pas-
cendis bobus

$$\frac{b-e}{f-e} \text{ in } \frac{df}{b} - \frac{eca}{bh} \text{ sive } \frac{bdfh - ecab - bdcf + aece}{bfh - bch}$$

Hoc incrementum adijce bobus $\frac{aec}{bh}$ (o) & prodebit

$\frac{bdfh - ecab - bdcf + aece}{bfh - bch} + \frac{aece}{bh}$ numerus boum quibus pas-
cendis sufficit pratum e per tempus b . Adeoque per analogiam (p) pratum g bobus
 $bdfgh$

ad pas-
cendum necessarium, & contra; ergo
tempus f ad tempus e ut $\frac{ae}{b}$ numerus boum
patum e tempore e depascentium, ad nume-
rum boum idem pratum e tempore f tenden-
tium; qui numerus erit $\frac{aec}{bf}$, & eadem ratione

$$b, e :: \frac{ae}{b} \cdot \frac{aec}{bf}$$

(l) Gramen enim crescat non crescat, dum-
modo jugerum ex prato b tantum fœni profes-
rat tempore e quantum producit jugerum ex
prato e per idem tempus, semper duplus erit
numerus boum depascentium pratum duplum,
eodem tempore &c. Restat igitur invenien-
dus numerus boum exhaurientium gramen sub-
crescens in prato e tempore $f - e$.

(m) Quia boves d pratum e depascunt tem-
pore f , cum herba crescit; & boves $\frac{aec}{bf}$
idem faciunt eodem tempore, sed herba non
succrescit, oportet ut numerus d major sit
numero $\frac{aec}{bf}$, quare hic ab illo demendus est,
ut habeatur numerus boum tempore f consu-
mentium herbam, quæ in illo prato e super-
venit. Erit autem $d - \frac{aec}{bf}$.

(n) Et quia numerus boum est in recipro-
Tom. I.

ca temporum ratione, fac

$$b, f :: \frac{bdf - aec}{bf} \text{ ad quartam } \frac{bdf - aec}{bn}$$

Hæc exponet numerum boum consumentium
tempore b gramen in prato e subotiens tem-
pore $f - e$. Ast in eodem prato duplum
crescit duplo tempore (externis impedimentis
remotis) triplum, triplo tempore &c.; igitur
numerus boum depascendum herbam crescen-
tem in prato e tempore $b - e$, invenietur fa-
ciendo $f - e, b - e :: \frac{bdf - aec}{bn}$

ad quartam

$$= \frac{bdfh - bdcf - aece + aece}{bfh - bch}$$

(o) Numero boum derodentium pratum e
tempore b , si herba post tempus e non cre-
sccret. Hujus vero additionis causa est, quod
supra invenimus numerum boum pro herba,
quæ crescit tempore $b - e$; si igitur huic ad-
das numerum boum consumentium herbam,
quæ jam erat in prato e , & quæ creverat tem-
pore e , habebis numerum boum comedentium
herbam, quæ erat in prato e , & eam, quæ
creverat tempore b .

(p) Id est ponendo

$$e, g :: \frac{bdfh - bdcf - aece + aece}{bfh - bch}$$

ad quartam,

R

$\frac{bd f g h - e c a g h - b d c g f + e c f g a}{b e f h - b c e h}$ per idem tempus h pascendis sufficiet.

E X E M P L U M.

Si 12 boves depascant $3\frac{1}{3}$ jugera prati in 4 septimanis; & 21 boves depascant 10 jugera consimilis prati in 9 septimanis; quæritur quot boves depascant 24 jugera in 18 septimanis? Resp. 36. Iste enim numerus invenietur substituendo in $\frac{bd f g h - e c a g h - b d c g f + e c f g a}{b e f h - b c e h}$ numeros 12,

$3\frac{1}{3}$, 4, 21, 10, 9, 24, & 18 pro literis a, b, c, d, e, f, g & h respective.

Sed solutio forte haud minus expedita erit si e primis principiis ad formam solutionis præcedentis literalis eruatur. Ut pote si 12 boves in 4 septimanis depascant $3\frac{1}{3}$ jugera, tum per analogiam 36 boves in 4 septimanis, vel 16 boves in 9 septimanis, vel 8 boves in 18 septimanis depascant 10 jugera: puta si gramen non cresceret. Sed cum propter graminis incrementum 21 boves in 9 septimanis depascant solummodo 10 jugera, illud graminis in 10 jugeris per posteriores 5 septimanas incrementum tantum erit quantum per se sufficit excessui boum 21 supra 16, hoc est 5 bobus per 9 septimanas, vel quod perinde est $\frac{5}{2}$ bobus per 18 septimanas pascendis. Et in 14 septimanis (excessu 18 supra 4 primas) incrementum illud graminis per analogiam tantum erit quantum sufficiat 7 bobus per 18 septimanas pascendis; est enim 5 septiman. ad 14 septiman. $:: \frac{5}{2}$ boves. 7 boves.

Quare 8 bobus, quos 10 jugera sine incremento graminis pascere possunt per 18 septimanas, adde holce 7 boves quibus pascendis solum incrementum graminis sufficit, & summa erit 15 boves. At denique si 10 jugera 15 bobus per 18 septimanas pascendis sufficiant, tum per analogiam 24 jugera per idem tempus sufficient 36 bobus.

P R O B. XII.

XV. *Datis sphericorum corporum, in eadem recta motorum sibi que occurrentium, magnitudinibus & motibus, determinare motus eorundem post reflexionem.*

Hujus resolutio ex his dependet conditionibus, ut corpus utrumque tantum reactione patiatum quantum agit in alterum, & ut eadem celeritate post reflexionem recedant ab invicem qua ante accedebant. His positis sint corporum A & B celeritates a & b respective; & motus (siquidem componantur

tur ex mole & celeritate corporum) erunt aA & bB . Et si corpora ad eandem plagas tendant, & A celerius movens insequatur B, pone x decrementum motus aA , & incrementum motus bB percussione exortum; & post reflexionem motus erunt $aA - x$ & $bB + x$; & celeritates $\frac{aA - x}{A}$ ac $\frac{bB + x}{B}$ quarum differentia æquatur $a - b$ (q) differentie

celeritatum ante reflexionem. Habetur itaque æquatio (r) $\frac{bB + x}{B} -$

$$\frac{aA + x}{A} = a - b, \text{ \& inde per reductionem fit (s) } x = \frac{2aAB - 2bAB}{A + B},$$

quo pro x in celeritatibus $\frac{aA - x}{A}$ & $\frac{bB + x}{B}$ substituto prodeunt (t)

$$\frac{aA - aB + 2bB}{A + B} \text{ celeritas ipsius A, \& } \frac{2aA - bA + bB}{A + B} \text{ celeritas ipsius}$$

B post reflexionem. (v)

Quod si corpora obviam eant, tum signo ipsius b ubique mutato, celeritates post reflexionem erunt $\frac{aA - aB - 2bB}{A + B}$ & $\frac{2aA + bA - bB}{A + B}$:

Quarum alterutra si forte negativa obvenerit, id arguit motum illum post reflexionem ad plagam dirigi ei contrariam ad quam A tendebat ante reflexionem. Id quod etiam de motu ipsius A in casu priori intelligendum est.

E X E M P L U M.

Si corpora homogenea A trium librarum cum celeritatis gradibus 8, & B novem librarum cum celeritatis gradibus 2 ad eandem plagas tendant: tunc pro

(q) Jam NEWTONUS duos casus distinguit, in quorum primo liquet fore a majorem quam b , fecus enim sphaeræ nunquam concurrerent; sed (si $b = a$) semper æquidistant, aut (ubi b major quam a) semper remotiores fierent, contra Hypothesim.

(r) Ambæ ponuntur tendere ad eandem partes, ambarum ergo velocitates positivæ sunt; sed etiam post conflictum velocitas ipsius B debet esse positiva, quia conspirans A potest & debet percussione sua velocitatem B augere, directionem vero mutare nequit; quare bene Auctor noster differentiam sumpsit.

(s) Nam (ducendo primum in A, deinde in B) $bAB + Ax - aAB + Bx = aAB - bAB$, & transponendo $Ax + Bx = 2aAB - 2bAB$, ac dividendo per $A + B$, $x = \&c.$

$$(t) \text{ Quia nempe } \frac{aA - x}{A} = a - \frac{2aB + 2bB}{A + B} \\ = \frac{aA + aB - 2aB + 2bB}{A + B} = \frac{aA - aB + 2bB}{A + B}.$$

Similiter de $\frac{bB + x}{B}$ ratiocinandum.

(v) Sponte patet, quod nunquam corpus lentius B quiescet ab ictu, conspirant enim percussiones & ipsius B directiones, quæ ideo se mutuo destruere non possunt.

92. Ut perspiciamus quo casu A restet immobilis ponenda est hujus velocitas post collisionem $(\frac{aA - aB + 2bB}{A + B}) = 0$; unde conficitur $2bB = aB - aA$, vel $2B.B - A :: a.b$, aut per conversionem rationis $2B.B + A :: a.a - b.$

pro A, a, B & b scribe 3, 8, 9 & 2; & $(\frac{aA - aB + 2bB}{A + B})$ evadit -1 ; ac $(\frac{2aA - bA + bB}{A + B})$ 5. Recedet itaque A cum uno gradu celeritatis post reflexionem, & B cum quinque gradibus progreditur.

PROB. XIII.

XVI. Invenire tres numeros continue proportionales quorum summa sit 20, & quadratorum summa 140.

Pone numerorum primum x , & secundum y ; eritque tertius $\frac{yy}{x}$, adeoque

$$x + y + \frac{yy}{x} = 20; \text{ \& } xx + yy + \frac{y^3}{xx} = 140.$$

Et per reductionem

$$xx + \frac{y}{20}x + yy = 0, \text{ \& } x^3 + \frac{yy}{140}xx + y^3 = 0.$$

Jam ut exterminetur x , pro a, b, c, d, e, f, g & b in Regula III. substitue respective

$$1, 0, yy - 140, 0, y^3; 1, y - 20, \text{ \& } yy;$$

Et emerget

$$\begin{aligned} & (-yy + 280)y^5 + (2yy - 40y + 260)(260y^4 - 40y^3) \\ & + 3y^4 \cdot y^3 - 2yy(y^5 - 49y^3 + 400y^2) = 0. \end{aligned}$$

Et per multiplicationem

$$1600y^6 - 20800y^5 - 67600y^4 = 0.$$

Ac reducendo $4yy - 52y + 169 = 0$. Sive (radice extracta)

$$2y - 13 = 0 \text{ seu } y = 6\frac{1}{2}$$

Id quod etiam brevius alia methodo, sed minus obvia, supra inventum est.

Porro ut inveniatur x substitue $6\frac{1}{2}$ pro y in æquatione

$$xx + \frac{y}{20}x + yy = 0. \text{ Et exsurget } xx - 13\frac{1}{2}x + 42\frac{1}{4} = 0: \text{ seu } xx = 13\frac{1}{2}x + 42\frac{1}{4}. \text{ Et extracta radice } x = 6\frac{3}{4} + \text{vel } -\sqrt{3\frac{5}{16}}. \text{ Nempè } 6\frac{3}{4} + \sqrt{\quad}$$

$\pm \sqrt{3} \frac{5}{16}$ est maximus quæstorum trium numerorum, & $6\frac{3}{4} - \sqrt{3} \frac{1}{16}$ minimus. Nam x alterutrum extremorum numerorum ambigue designat; indeque gemini procedunt valores, quorum alteruter potest esse x , existente altero $\frac{yy}{x}$.

ALITER.

Positis numeris x, y , & $\frac{yy}{x}$ ut ante, erit $x + y + \frac{yy}{x} = 20$, seu $xx = + \frac{20}{y} x - yy$ & extracta radice $x = 10 - \frac{1}{2}y + \sqrt{100 - 10y - \frac{3}{4}yy}$ primus numerus: Hunc & y aufer de 20 & restat $\frac{yy}{x} = 10 - \frac{1}{2}y - \sqrt{100 - 10y - \frac{3}{4}yy}$ tertius numerus. Estque summa quadratorum a tribus hisce numeris $400 - 40y$, adeoque $400 - 40y = 140$, five $y = 6\frac{1}{2}$. Invento medio numero $6\frac{1}{2}$, substitue eum pro y in primo ac tertio numero supra invento; & evadet primus $6\frac{3}{4} + \sqrt{3} \frac{5}{16}$ ac tertius $6\frac{3}{4} - \sqrt{3} \frac{5}{16}$ ut ante. (x)

PROB. XIV.

XVII. Invenire quatuor numeros continue proportionales quorum duo medii simul constituunt 12, & duo extremi 20.

ALITER.

(x) Pone $20 = a, 12 = b$, ergo x, y, z, z .
 (tertium) unde $xx = yy$, & $x + y + z = a$,
 atque
 $xx + yy + zz = b = xx + xz + xz$,
 adde, ut habes quadratum, hinc inde xz ,
 & erit $1 + xz = xx + 2xz + xz$,
 $= (x + z)^2$, sed $x + z = a - y$,
 & $xx + 2xz + xz = aa - 2ay + yy$ (vel xz)
 quare
 $b + xz = aa - 2ay + xz$,
 aut, $b = aa - 2ay$, & $y = \frac{a}{2} - \frac{b}{2a}$,
 quod pone, $= c$, erit igitur $xz = cc$, &
 $x + z = a - c$, quod fac $= 2f$: fit ergo

Sit
 $x - z = 2u$, unde $x = f + u$, &
 $z = f - u$, & $xz = ff - uu = cc$,
 atque
 $uu = ff - cc$, & $u = \sqrt{ff - cc}$.
 idcirco
 $x = f + \sqrt{ff - cc}$,
 & $u = f - \sqrt{ff - cc}$.
 In proposito exemplo
 $c = \frac{a}{2} - \frac{b}{2a} = 10 - \frac{7}{2}$
 $= 6\frac{1}{2} = y$, quapropter $f = 6\frac{3}{4}$;
 $u = \sqrt{\frac{729}{16} - \frac{169}{4}} = \sqrt{\frac{729 - 676}{16}}$

$= \sqrt{\frac{53}{16}} = \sqrt{3} \frac{5}{16}$.
 R 3

Sit x secundus numerus; & erit $12 - x$ tertius; $\frac{xx}{12 - x}$ primus; & $\frac{144 - 24x + xx}{x}$ quartus; adeoque $\frac{xx}{12 - x} + \frac{144 - 24x + xx}{x} = 20$. Et per reductionem $xx = 12x - 30\frac{6}{7}$ seu $x = 6 + \sqrt{5}\frac{1}{7}$. Quo invento ceteri numeri e superioribus dantur. (y)

P R O B . X V .

XVIII. *Invenire quatuor numeros continue proportionales, quorum datur summa a, & summa quadratorum b.*

Et si desideratas quantitates ut plurimum immediate quærere solemus, siquando tamen duæ obvenerint ambiguae, hoc est quæ conditionibus omnino similibus præditæ sunt, (ut hic duo medii & duo extremi numerorum quatuor proportionalium) præstat alias quantitates non ambiguas quærere per quas hæ determinantur, quemadmodum harum summam vel differentiam

A L I T E R .

(y) Sit primus numerus y , secundus x , tertius z , quartus u , statuo y majorem quam x , & x majorem quam z , & z majorem quam u , quia hic dantur duæ summæ quæro differentias (No. 51. hujus) quam ob rem pono.

$$x + z = 12 = 2a, \text{ \& } x - z = 2s;$$

Unde.

$$x = a + s, \text{ \& } z = a - s;$$

Pariter.

$$y + u = 20 = 2b, \text{ \& } y - u = 2t,$$

$$\text{aut } y = b + t, \text{ \& } u = b - t,$$

ubi duæ tantum quæsitæ, atqui numeri debent esse continue proportionales, quare

$$b + t . a + s :: a + t . a - s,$$

&c

$$a + t . a - t :: a - t . b - s,$$

Denique

$$b + t . a + t :: a - t . b - s.$$

Tertia analogia dat

$$bb - ss = aa - tt.$$

Secunda

$$aa - 2at + tt = ab - as + bt - ts;$$

Prima tandem

$$aa + 2at + tt = ab + as - bt - ts.$$

ex hac subduc secundam æquationem habiturus.

$$4at = 2as - 2bt, \text{ vel } 2at + bt = as,$$

$$\text{at } t = \frac{as}{2a + b},$$

$$\text{fac brevitatís gratia } 2a + b = c,$$

$$\text{\& } t = \frac{as}{c} \text{ aut } tt = \frac{a^2s^2}{cc} =$$

(ex prima æquatione) $aa + ss = bb$, unde

$$a^2s^2 = a^2c^2 + c^2s^2 - b^2c^2,$$

$$\text{\& } a^2s^2 - c^2s^2 = a^2c^2 - b^2c^2,$$

$$\text{\& } ss = \frac{a^2c^2 - b^2c^2}{aa - cc}, \text{ ac } s = \sqrt{\frac{a^2c^2 - b^2c^2}{aa - cc}},$$

quo valore posito in $t = \frac{as}{c}$ exurgit

$$t = a\sqrt{\frac{aa - bb}{aa - cc}}, \text{ \& } \text{positis numeris,}$$

$$x = 6 + \sqrt{5}\frac{1}{7}, \text{ } z = 6 - \sqrt{5}\frac{1}{7};$$

$$\text{atque } s = 22\sqrt{\frac{1}{7}}, \text{ ergo } y = 10$$









$$+ 22\sqrt{\frac{1}{7}} = \frac{41\frac{1}{7} + 12\sqrt{5}\frac{1}{7}}{6 - \sqrt{5}\frac{1}{7}}, \text{ siquidem}$$

hæc quantitas æquat (cum $\sqrt{5}\frac{1}{7} = 6\sqrt{\frac{1}{7}}$)

$$\frac{60 - 60\sqrt{\frac{1}{7}} + 132\sqrt{\frac{1}{7}} - \frac{132}{7}}{6 - 6\sqrt{\frac{1}{7}}}$$

$$= \frac{(10 + 22\sqrt{\frac{1}{7}})(6 - 6\sqrt{\frac{1}{7}})}{6 - 6\sqrt{\frac{1}{7}}}$$

& sic de ceteris.



tiam vel rectangulum. (z) Ponamus ergo summam duorum mediorum esse s , & rectangulum r ; & erit summa extremorum $a - s$, & rectangulum r ; propter proportionalitatem. Jam ut ex his eruantur quatuor illi numeri, pone x primum & y secundum; eritque $s - y$ tertius; & $a - s - x$ quartus; & rectangulum sub mediis $sy - yy = r$, indeque medii $y = \frac{1}{2}s + \sqrt{\left(\frac{1}{4}ss - r\right)}$ & $s - y = \frac{1}{2}s - \sqrt{\left(\frac{1}{4}ss - r\right)}$: (a) Item rectangulum sub extremis $ax - sx - xx = r$, indeque extremi

$$x = \frac{a - s}{2} + \sqrt{\left(\frac{ss - 2as + aa}{4} - r\right)}.$$

&

$$a - s - x = \frac{a - s}{2} - \sqrt{\left(\frac{ss - 2as + aa}{4} - r\right)}.$$

Summa quadratorum ex hisce quatuor numeris est $2ss - 2as + aa - 4r$ quæ est $= b$. Ergo $r = \frac{1}{2}ss - \frac{1}{2}as + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}b$, quo substituto pro r prodeunt quatuor numeri ut sequitur.

$$\text{Duo medii} \begin{cases} \left\{ \frac{1}{2}s + \sqrt{\left(\frac{1}{4}b - \frac{1}{4}ss + \frac{1}{2}as - \frac{1}{4}aa\right)} \right. \\ \left. \left\{ \frac{1}{2}s - \sqrt{\left(\frac{1}{4}b - \frac{1}{4}ss + \frac{1}{2}as - \frac{1}{4}aa\right)} \right. \end{cases}$$

$$\text{Duo extremi} \begin{cases} \left\{ \frac{a - s}{2} + \sqrt{\left(\frac{1}{4}b - \frac{1}{4}ss\right)} \right. \\ \left. \left\{ \frac{a - s}{2} - \sqrt{\left(\frac{1}{4}b - \frac{1}{4}ss\right)} \right. \end{cases}$$

Restat tamen etiamnum inquirendus valor ipsius s . Quare ad abbreviandos terminos pro numeris hisce substitue.

(z) Pone quæsitos numeros x ; y ; z ; u . Lege problematis dant $x + y + z + u = a$; $x^2 + y^2 + z^2 + u^2 = b$; $x : y :: y : z$, vel $xz = y^2$; $y : z :: z : u$, aut $zy = z^2$; demum $x : y :: z : u$, unde $ux = zy$. Finge nunc $yz = r = ux$; & $y + z = s$; utique $x = s - y$; & $x + s + u = a$; Quare summa extremorum $x + u = a - s$; & $u = a - s - x$; sed $r = zy = sy - y^2$; ergo $y^2 = sy - r$; & $y = \frac{s}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{s^2}{4} - r\right)}$;

$$\text{ac } z = s - y = s - \frac{s}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{s^2}{4} - r\right)} = \frac{s}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{s^2}{4} - r\right)}.$$

$$\text{(a) Item } r = ux = ax - sx - xx = x^2, \text{ qua de causa } x = \frac{a - s}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a^2 - 2as + s^2}{4} - r\right)}. \text{ & } u = \frac{a - s}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{a^2 - 2as + s^2}{4} - r\right)}.$$

$$\frac{1}{2} s + p = \frac{a-s}{2} + q$$

&

$$\frac{1}{2} s - p = \frac{a-s}{2} - q$$

Et pone rectangulum sub secundo & quarto æquale quadrato tertii, siquidem hæc problematis conditio nondum impleatur, eritque $\frac{as - ss}{4}$

$$-\frac{1}{2} qs + \frac{pa - ps}{2} - pq = \frac{1}{4} ss - ps + pp. (b).$$

Pone etiam rectangulum sub primo & tertio æquale quadrato secundi, & erit $\frac{as - ss}{4} + \frac{1}{2} qs - \frac{pa + ps}{2} - pq = \frac{1}{4} ss + ps + pp$. Harum æquationum priorem aufer e posteriori & restabit $qs - pa + ps = 2ps$, seu $qs = pa + ps$. Restitue jam $\sqrt{\left(\frac{1}{4}b - \frac{1}{4}ss + \frac{1}{2}as - \frac{1}{4}aa\right)}$ in locum p , & $\sqrt{\left(\frac{1}{4}b - \frac{1}{4}ss\right)}$ in locum q , & habebitur $s\sqrt{\left(\frac{1}{4}b - \frac{1}{4}ss\right)} = (a+s)\sqrt{\left(\frac{1}{4}b - \frac{1}{4}ss + \frac{1}{2}as - \frac{1}{4}aa\right)}$. Et quadrando $ss = -\frac{b}{a}s + \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}b$, seu $s = -\frac{b}{2a} + \sqrt{\left(\frac{bb}{4aa} + \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}b\right)}$, quo invento dantur quatuor numeri quæsti e superioribus.

PROB. XVI.

XX. Si pensio annua librarum a , per quinque annos proxime sequentes solvenda, ematur parata pecunia c , queritur quanti æstimanda sit usura centum librarum per annum.

Pone x usuram usuræ pecuniæ x in anno, hoc est quod pecunia i post annum solvenda valet x paratæ pecuniæ (c); & per analogiam pecu-

(b) Siquidera $y = \frac{s}{2} + p$; $z = \frac{s}{4} - p$;
 $x = \frac{a-s}{2} + q$; $u = \frac{a-s}{2} - q$; & $xy = z^2$,
 unde per substitutionem &c.

venit me tibi daturum pro quinque millibus, Ex. gr. quatuor mille septingentas = c ; sed tantum vis centum libras; quæritur, quid, primo anno finito, mihi acceptum referre debeas pro centum his; citius, quam jus erat, solutis; liquet habiturum te pro accepto aliquid amplius, quam centum; & hoc aliquid amplius debet esse proportionale ei pecuniæ, quam e tota a demeres, si eam integram nunc reciperes.

(c) Hoc problema explicatur fingo me per quinque annos tibi soluturum quotannis (puta mille libras = a); Si totam hanc pecuniam initio primi anni velles accipere, inter nos con-

pecunia x post annum solvenda valebit ax paratæ pecuniæ, post duos annos axx (d), post tres ax^3 , post quatuor ax^4 , & post quinque ax^5 . Adde jam hos quinque terminos & erit $ax^5 + ax^4 + ax^3 + axx + ax = c$, seu $x^5 + x^4 + x^3 + xx + x = \frac{c}{a}$, æquatio quinque dimensionum, cujus ope cum x per \dagger regulas post docendas inventum fuerit, pone $x.1 :: 100 y$. Et erit y — 100 usura usuræ centum librarum per annum. (e)

Atque has in quæstionibus, ubi solæ quantitatum proportionem absque positionibus linearum considerandæ veniunt, instantias dedisse sufficiat: pergamus jam ad problematum geometricorum solutiones.

S E C T I O Q U A R T A .

C A P U T P R I M U M .

Quomodo Quæstiones Geometricæ ad æquationem redigantur.

I. **Q**uæstiones *Geometricæ* eadem facilitate iisdemque legibus ad æquationes nonnunquam redigi possunt, ac quæ de abstractis quantitativibus proponuntur. Ut si recta AB in extrema & media proportionem secunda sit in C , hoc est ita ut BE quadratum maximæ partis sit TAB. I.
Fig. 53

Si scrire possemus quid una libra post annum solvenda valeat paratæ pecuniæ; omnia nosceremus dicentes si x paratæ pecuniæ valet unum post annum, centum pecuniæ pariter paratæ quid post idem tempus valebunt? Valor autem ipsius x sic reperitur; si 1 post annum valet nunc x , quid valebit a ? Resp. ax quæ exponit præsentem pecuniam pro a post annum.

(d) Cum autem a quotannis solvenda sit, soluta nunc ax pro primo anno, solvere debebo a post duos annos, quam si præstare vellem initio secundi anni dare deberem ax , sed volo hanc solvere initio primi; ergo $1. x :: ax. ax^2$ pro secundi anni pensione nunc solvenda; quod ratiocinium dabit pecuniam præsentem pro tertio anno $= ax^3$ &c.; ergo pecunia nunc danda, ut liberer a tota quinquenni pensione, $= ax^5 + ax^4 + ax^3 + ax^2 + ax = c$ ex pacto convento.

parum diversum, a *Clar. LEIBNITIO* propositum in *Actis Lips.* anni 1683, mensè Octob. & ibidem solum ab eo, ratione paulum a notata, diversa.

Si annuæ usura centum librarum data sint (puta, vicecima) quid nunc solvendum est pro certa pecunia qua præstari solum deberet post annum?

Sit $100 = a$, usuræ centum librarum $= b$, pecunia post annum numeranda $= c$, quæ autem nunc exhiberi debet $= y$, & usuræ post annum hujus summæ y , sint $= x$. Erit $a. b :: y. x$, & $a + b. b :: y + x. x$, sed quod nunc solvere debes, & ejus annuæ usuræ simul æquant pecuniam post annum dandam,

ergo $x + y = c$, & $a + b. b :: c. x = \frac{bc}{a + b}$,
quare $y = c - x = \frac{ac}{a + b}$.

\dagger Nempe inveniendo figuras primas radices per constructionem quamvis mechanicam & reliquas per methodum Vietæ.

(e) Libet ob rei utilitatem subdere problema *Tom. I.*

æquale rectangulo BD sub tota & minore parte contento: posito $AB = a$ & $BC = x$ erit $AC = a - x$, & $xx = a$ in $a - x$; (a) æquatio quæ per reductionem dat (b) $x = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa}$.

II. Sed in rebus geometricis, quæ frequentius occurrunt a variis linearum positionibus & relationibus complexis ita dependere solent, ut egeant ulteriori inventione & artificio, quo ad algebraicos terminos deduci possint. Et licet in hujusmodi casibus difficile sit aliquid præscribere, & cujusque ingenium sibi debeat esse operandi norma; conabor tamen discentibus viam præsternere. Sciendum est itaque quod quæstiones circa easdem lineas definito quolibet modo sibi invicem relatas, possint varie proponi, ponendo alias atque alias quærendas esse ex aliis datis. Sed de quibuscunque tamen datis vel quæsitis instituitur quæstio, solutio ejus eadem plane methodo ex analysicos serie perficietur, nulla omnino circumstantia variata præter fictas linearum species sive nomina, quibus data a quæsitis solemus distinguere. (c) Quemadmodum si quæstio sit de isoscele CBD in circulum inscripto, cujus latera BC, BD, & basis CD cum diametro circuli AB conferenda sunt; ea vel proponi potest de investigatione *diametri* ex datis lateribus & basi, vel de investigatione *basis* ex datis lateribus & diametro, vel denique de investigatione *laterum* ex datis basi & diametro. Sed utcunque proponitur, redigetur ad æquationem per eandem seriem analysicos. Nempe, si quærat *diameter*, pono $AB = x$, $CD = a$, & BC vel $BD = b$. Tum (ducta AC,) propter similia triangula ABC & CBE est $AB \cdot BC :: BC \cdot BE$, sive $x \cdot b :: b \cdot BE$. Quare $BE = \frac{bb}{x}$. Est & $CE =$

$\frac{1}{2}CD$ sive $\frac{1}{2}a$: & propter angulum CEB rectum, $CEq + BEq = BCq$,

hoc est $\frac{1}{4}aa + \frac{b^4}{xx} = bb$. Quæ æquatio per reductionem dabit quæsitum x . (e)

III.

(a) Nam per problematis legem, quadratum ex BC æquat rectangulum ex BA in AC. Vide EUCL. II. II., & 30. VI.

(b) Vide Sect. II. Art. IX. & X.

(c) Etenim algebraica problematis solutio fit per æquationem, æque ac solutio problematis arithmetici, id est, in hoc solutionum genere quæritur quomodo varæ quantitates invicem æquales fiant, quod æque bene fit, ut patet, quærendo quo pacto datæ æquantur quæsitis, aut quæsitæ datis.

(d) Ratiocinium, quo hoc problema solvitur in tribus his casibus est unicum, nempe (per EUCL. 8. VI.) $AB \cdot BC :: CB \cdot BE$, & (ob EUCL. 47. I.) $CEq + BEq = BCq$; & ex hac

unica synthesi deducuntur æquationes tres, pro tribus casibus, quæ symbolis tantum differunt; ut videre potes hoc, & sequenti articulo.

(e) Reductio fit primum, ductendo cuncta in xx , unde $\frac{aaxx}{4} + b^4 = bbxx$, & rursus in 4, ne ulla manet quantitas fracta, & exit $aaxx + 4b^4 = 4bbxx$ 2°. Conjiciendo in eadem partes terminos omnes, ubi est xx , quod dat $4b^4 = 4bbxx - aaxx$; tum omnia dividendo per $4bb - aa$, unde conficitur $\frac{4b^4}{4bb - aa} = xx$; demum extrahendo radicem quadratam, ex quo fit $x = \sqrt{\frac{4bb}{4bb - aa}}$.

III. Sin quærat *basis*, pono $AB = c$, $CD = x$ & BC vel $BD = b$. Tum (ducta AC) propter similia triangula ABC & CBE est $AB.BC :: BC.BE$, five $c.b :: b.BE$. Quare $BE = \frac{bb}{c}$. Est & $CE = \frac{1}{2} CD$ five

$\frac{1}{2} x$, & propter angulum CEB rectum $CEq + BEq = BCq$ hoc est $\frac{1}{4} xx + \frac{b^4}{cc} = bb$; æquatio quæ per reductionem dabit quæsitum x . (f)

IV. Atque ita si *latus* BC vel BD quærat, pono $AB = c$, $CD = a$, & BC vel $BD = x$. Et (AC ut ante ducta) propter similia triangula ABC & CBE est $AB.BC :: BC.BE$, five $c.x :: x.BE$. Quare $BE = \frac{xx}{c}$.

Est & $CE = \frac{1}{2} CD$ five $\frac{1}{2} a$, & propter angulum CEB rectum est $CEq + EBq = BCq$, hoc est $\frac{1}{4} aa + \frac{x^4}{cc} = xx$; æquatio quæ per reductionem dabit quæsitum x . (g)

V. Vides itaque quod in unoquoque casu calculus quo pervenitur ad æquationem, per omnia similis fit, & eandem æquationem pariat, excepto tantum quod lineas aliis literis designavi prout data vel quæsitæ ponuntur. Ex diversis quidem datis & quæsitis oritur diversitas in reductione æquationis inventæ. Nam æquationis $\frac{1}{4} aa + \frac{b^4}{xx} = bb$ alia est reductio ut obti-

neatur

(f) Est enim (cunctis ductis in 4) $xx + \frac{4a^4}{cc} = 4bb$, vel $xx = 4bb - \frac{4b^4}{cc}$, vel $xx = \frac{4bbcc - 4b^4}{cc}$, & $x = \sqrt{\left(\frac{4bbcc - 4b^4}{cc}\right)}$

$= \frac{2b}{c} \sqrt{(cc - bb)}$ (Sect. I. art. LXXI.). Hæc autem æquatio facile per substitutionem ex superiori deducitur; Nam vocavimus c re-ctum, quam ibi x , & x quam ibi a ; atque ideo, has pro illis notis substituendo, prior æquatio fit $xx + 4\frac{b^4}{cc} = 4bb$, secunda ip-sissima.

(g) Siquidem, cunctis in cc ductis, est $\frac{1}{4} aacc + x^4 = ccxx$, & $x^4 = ccxx - \frac{1}{4} aacc$, ac $xx = \frac{cc + \sqrt{\left(\frac{cc^2 - aacc}{4}\right)}}{2} = \frac{cc + c}{2}$ $\sqrt{(cc - aa)}$, & $x = \sqrt{\left(\frac{cc + c}{2}\right) \sqrt{(cc - aa)}}$

Sed & hæc æquatio ex duabus superioribus elicitur substituendo in priori c pro x , & x pro b , & in secunda a pro x , & x pro b . Quid si problemata generalius proponerentur tanquam theorematum investiganda, & quantitates exponerentur græcis litteris, quibus nullam distinctionis inter datas, & quæsitas, ideam subnectere consuevimus? Proponamus, ex gr. hoc problema sit. *Quæritur relatio quæ est inter latus, basim trianguli isoscelis, & diametrum circuli circumscripti.*

Sit $AB = \alpha$, $BC = \beta$, $CD = \gamma$, & per superius ratiocinium est $BE = \frac{\beta\beta}{\alpha}$, & $CE = \frac{\gamma}{2}$,

quare $\beta\beta (BCq) = \frac{\gamma\gamma}{4} + \frac{\beta^4}{\alpha\alpha} (CEq + EBq)$

In hac generalissima æquatione substitue x pro α , si quæras diametrum; pro γ si basim; si demum latus pro β ; & reperies superiores æquationes, digito tangens veritatem superioris asserti.

neatur $x = \sqrt{\frac{2bb}{4bb - aa}}$ valor de AB, & æquationis $\frac{1}{4}xx + \frac{b^4}{cc} = bb$

alia reductio ut obtineatur $x = \frac{2b}{c} \sqrt{cc - bb}$ valor de CD; & æquatio-

nis $\frac{1}{4}aa + \frac{x^4}{cc} = xx$ reductio longe alia ut obtineatur $x = \sqrt{(\frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}c)}$

$\sqrt{cc - aa}$) valor de BC vel BD: (perinde ut hæc $\frac{1}{4}aa + \frac{b^4}{cc} = bb$, ad

eliciendum c , a , vel b diversis modis reduci debet:) (b) sed in harum æquationum inventionem nulla fuit diversitas. Et hinc est quod jubent ut nullum inter datas & quæsitas quantitates habeatur discrimen. Nam cum eadem computatio cuique casui datorum & quæsitum competat, convenit ut sine discrimine concipiatur & conferantur quo rectius judicetur de modis computandi: vel potius convenit ut fingas quæstionem de ejusmodi datis & quæsitis propositam esse per quas arbitreris te posse ad æquationem facillime pervenire.

VI. (*i*) *Proposito igitur aliquo problemate, quantitates quas involvit confer, & nullo inter datas & quæsitas habito discrimine, perpende quomodo aliæ ex aliis dependeant ut cognoscas quænam si assumantur, synthetice gradiendo, dabunt ceteras.* Ad quod faciendum non opus est ut prima fronte de modo cogites quo aliæ ex aliis per calculum algebraicum deduci possint, sed sufficit animadversio generalis quod possint directo nexu quomodocunque deduci. Verbi gratia; si quæstio sit de circuli diametro AD tribusque lineis AB, BC, & CD in semicirculo inscriptis, & ex reliquis datis quæretur BC; primo intuitu manifestum est diametrum AD determinare semicirculum, dein lineas AB & CD per inscriptionem determinare puncta B & C atque adeo quæsitum BC idque nexu maxime directo; & quo pacto tamen BC ex his datis per analysin eruatur non ita manifestum est. Hoc idem quoque de AB vel CD, si ex reliquis datis quærerentur, intelligendum est. Quod si AD ex datis AB, BC, & CD quæreretur, æque patet id non fieri posse synthetice; siquidem punctorum A ac D distantia dependet ex angulis B & C, & illi anguli ex circulo cui datæ lineæ sunt inscribendæ, & ille circulus non datur ignota AD diametro. Rei igitur natura postulat ut AD non synthetice sed ex ejus assumptione quæretur ut ad data fiat regressus. (*k*)

TAB. I.
Fig. 7.

(*h*) Hic Auctori æquatio $\frac{aa}{4} + \frac{b^4}{cc} = bb$ ca-

dem præstat, ac nobis æquatio $\frac{yy}{4} + \frac{b^4}{cc} = bb$
= bb .

(*i*) Antequam problema ad æquationem deducendum aggredimur, prænosendum est unde ratiocinium incipiemus, ne temere perferenciosa & in via loca agamur, & deinde quæ-

VII.
nam recta quæsitæ simbolo sit distinguenda. Probe enim scire debemus quod quæri debeat, & plures sæpe sunt lineæ, quæ, si magnitudine &c. darentur, problema solverent. In hoc labyrintho filus est regula sequens Auctoris.

(*k*) Huic regulæ adde has.

1. Si tales plures adsint ex iis eligi debet ea, cujus valores sunt pauciores. Æquatio enim inferioris gradus hinc exsurget.

VII. Cum varios ordines, quibus termini quæstionis sic evolvi possint, perpexeris, e syntheticis quoslibet adhibe, assumendo lineas tanquam datas, a quibus ad alias facillimus videtur progressus & ad ipsas vicissim difficillimus. Nam computatio, ut per varia media possit incedere, tamen ab istis lineis initium sumet; ac promptius perficietur fingendo quæstionem ejusmodi esse ac de istis datis & quæsito aliquo ab istis facillime proditur institueretur, quam de quæstione, prout revera proponitur, cogitando. Sic in exemplo jam allato si ex reliquis datis quæritur AD; cum id synthetice fieri non posse percipiam, sed ab ipso tamen, si modo daretur, discursum ad alia directo nexu incedere, assumo AD tanquam datum & abinde computationem ab assumptis ad ceteras quantitates eo more promovendo quo linearum relationes dirigunt, æquatio tandem inter duos ejusdem alicujus quantitatis valores semper obtinebitur, sive ex valoribus unus sit litera sub initio operis quantitati pro nomine imposta, & alter per computationem inventus, sive uterque per computationem diversimode institutam inveniatur.

TAB. I.
Fig. 7.

VIII.

2. Si vero plures sint, quarum valores numero sint æquales, ea sumenda, qua plures habet æquales magnitudine.

3. Facilius enim solvuntur æquationes, in quibus aliqui valores æquales sunt, ut infra videbis; & præterea minus anceps est problematis solutio, & æquatio simplicior. Nam si æquatio duarum dimensionum duos æquales valores habeat, ea erit aut non affecta, aut binomii quadratum; quarum radix facilius invenitur, quam æquationis quadraticæ affectæ, & æquatio ipsa certe simplicior est.

4. Ad regulas has servandas plurimum conducit pendere utrum quæsitæ positio varia possit esse; tunc enim duo habentur valores, si ea duos locos occupare potest; tres, si tres locos; &c. Ex. gr. in problemate artic. I, quia unum circulum possumus dato triangulo circumscribere, una est diametri magnitudo, id est, x habere nequit duos valores inæquales; & quia una ex legibus æquatione expressis est, quod hæc diameter ad datam chordam normalis est, hæc diameter ad triangulum relata unam habet positionem, sed cum idem triangulum ad contrarias partes verti possit, ut *Bed*, & nullo pacto liceat æquatione determinare utrum priorem, vel secundum situm obtineat, idcirco x duos valores habere debet, sed æquales, quorum alter negativus, alter positivus; & hoc revera indicat æquatio

$$xx = \frac{4b^4}{4bb - aa}, \text{ nam extracta radice habetur } x = \sqrt{\frac{4b^4}{4bb - aa}}$$

Si vero quæretur basis (art. III. hujus): accurate loquendo, basis dimidiata quæritur; nam, ea data, datur tota, tunc autem $\frac{x}{2}$ (EC) habet duos valores æquales; sed alterum positivum, alterum negativum, quod innuitur ab æquatione $\frac{xx}{4} = \frac{bbcc - 4d}{cc}$; nam $\frac{x}{2} = \pm \frac{b}{c} \sqrt{cc - bb}$.

Si demum petatur latus, eodem pacto quæritur CB, ac BD, quare jam duos valores æquales habere debet, sed & (juncta AD) est etiam CAD triangulum isoscele eidem circulo ACBD inscriptum, quare x debet habere quatuor valores, quorum bini sunt æquales, quod reipsa docet æquatio inventa pro hac hypothese.

Ita pariter in hoc problemate de circuli diametro, & tribus rectis inscriptis; si inscriptæ sint ut in figura, habebitur unus valor diametri, alter si CB sit ubi nunc est BA, & hæc ubi illa, alter si BC veniat in CD, & hæc in BC, quare x habebit tres saltem valores.

5. Cum vero plures habentur quantitates, quales describuntur in No. 2. hujus, valores inæquales arte aliqua revocandi sunt ad æqualitatem: aut nova quæsitæ introducenda in problemate, ita ut hæc inventa dent reliquas.

Hujus regulæ explicatio, exempla, & usus infra non raro occurrent, & jam supra occurrerunt in prob. I. XIII. &c.

TAB. A.
Fig. 6.

VIII. Ceterum ubi terminos quæstionis sic in genere comparaveris, plus artis & inventionis in eo requiritur ut advertas particulares istos nexus sive linearum relationes quæ computationi accommodantur. Nam quæ laxius perpendiculari videbantur immediate & relatione proxima connecti, cum illam relationem algebraice designare volumus, circuitum plerumque quoad constructiones schematum de novo molendas & computationem per gradus promovendam exigunt, quemadmodum de BC ex AD, AB, & CD colligendo constare potest. Per ejusmodi enim propositiones vel enunciationes solummodo gradiendum est quæ aptæ sunt ut terminis algebraicis designentur, quales præsertim ab Axiom. 19, Prop. 4. lib. 6, & Prop. 47. lib. 1. Elem. proveniunt.

IX. *Imprimis* itaque promovetur calculus per additionem vel subtractionem linearum, eo ut ex valoribus partium obtineatur valor totius, vel ex valoribus totius & unius partis obtineatur valor alterius.

X. *Secundo* promovetur ex linearum proportionalitate: ponimus enim (ut supra) factum a mediis terminis divisum per alterutrum extremorum esse valorem alterius. Vel, quod perinde est, si valores omnium quatuor proportionalium prius habeantur, ponimus æqualitatem inter factos extremorum & factos mediorum. Linearum vero proportionalitas ex triangulorum similitudine maxime se prodit, quæ cum ex æqualitate angulorum dignoscatur, in iis comparandis Analytista debet esse perspicax, atque adeo non ignorabit Prop. 5, 13, 16, 29, & 32, lib. 1. Prop. 4, 5, 6, 7, & 8, lib. 6. Et Prop. 20, 21, 22, 27 ac 31. lib. 3. Elementorum. Quibus etiam referri potest Prop. 3. lib. 6, ubi ex proportionalitate linearum colligitur angulorum æqualitas & contra. Atque idem aliquando præstant. Prop. 35, & 36. lib. 3.

XI. *Tertio* promovetur per additionem vel subtractionem quadratorum. In triangulis namque rectangulis addimus quadrata minorum laterum ut obtineatur quadratum maximi, vel a quadrato maximi lateris subducimus quadratum unius e minoribus ut obtineatur quadratum alterius.

XII. Atque his paucis fundamentis (si adnumeretur Prop. 1. lib. 6. Elem. cum de superficiebus agitur, ut & aliquæ propositiones ex lib. 11. & 12. desumptæ cum agitur de solidis,) tota ars analytica quoad Geometriam rectilineam innititur. Quin etiam ad solas linearum ex partibus compositiones & similitudines triangulorum possunt omnes problematum difficultates reduci; adeo ut non opus sit alia theoremata adhibere: quippe quæ omnia in hæc duo resolvi possunt, & proinde solutiones etiam quæ ex istis depromuntur. Inque hujus rei instantiam subjunxi problema de perpendicularo in basem obliqui anguli trianguli demittendo sine adjumento Prop. 47. lib. 1. solutum. Etsi vero juvet simplicissima principia a quibus problematum solutiones dependent non ignorasse, & istis solis adhibitis posse quæ-

quælibet solvere : expeditionis tamen gratia convenit ut non solum Prop. 47. lib. I. Elem., cujus usus est frequentissimus; sed & alia etiam *theoremata* nonnunquam adbeantur.

XIII. Quemadmodum si, perpendicularo in basem obliquanguli trianguli demisso, de segmentis basis ad calculum promovendum agatur; ex usu erit scire, quod differentia quadratorum e lateribus æquetur duplo rectangulo sub basi & distantia perpendiculari a medio basis. (1)

XIV. Si trianguli alicujus verticalis angulus bifecetur, computationi non solum inserviet quod basis fecetur in ratione laterum (m), sed etiam quod differentia factorum a lateribus & a segmentis basis æquetur quadrato lineæ bifecantis angulum. (n)

XV.

(1) Hanc propositionem demonstrat PAPPUS Coll. Math. lib. IV. Prob. 120. Et COMMANDINUS in suo commentario ad PAPP. Collet. Mathem. lib. IV. Prop. 7. Tamen cum non ubique proster, eam addere libet.

Sit Triangulum quodvis ABC; perpendicularis demissa a vertice B anguli ABC in subiectam basim AC sit AD; & basis AC bisecta sit in E. Centro B, radio BA, laterum miram describatur circulus occurrens basi AC in F, & lateri BC in G. Quoniam major pars CD æquat semisummam una cum semidifferentia totius, & est CE semisumma; erit ED semidifferentia. Sed CF est differentia inter partes GD, majorem & DA, vel DF minorem; ergo CF est dupla ipsius DE; & rectangulum sub AC; DE æquale bis rectangulo ACF.

Nunc produc latus CB donec rursus circulo occurrat in H. Rectangulum HCG æquale est rectangulo ACF (36. III. Elem.) & est rectangulum HCG differentia quadratorum CB & BG vel BA (6. II. Elem.) Ergo &c.

(m) EUCLIDES 3. VI. hanc propositionem demonstrat quando interior est angulus bifecatus. Vera tamen est etiam quando externus angulus bifecatur, & eodem pacto ostenditur.

(n) 12. Si trianguli cujusvis ABC angulus quilibet (vel interior ACB, vel exterior BCE) bifecetur recta CD occurrente basi AB in D, erit differentia inter rectangulum contentum a lateribus AC, CB angulum bifecatum comprehendentibus, & illud quod continetur a basibus segmentis AD, DB æqualis quadrato ex CD, recta angulum bipariente.

Fiat super AD in puncto D angulus ADH æqualis angulo ACD, & produca ut LH do-

nec lateri AC (producto quatenus opus est) occurrat in H. Angulus AHD æquat angulum ADC (Eucl. 32. I.); adeoque similia sunt triangula ADC, AHD, (Eucl. 4. VI.).

Si nunc bifariam dividitur angulus interior; anguli AHD, DHC, simul sumpti æquantur duobus rectis æqualibus ipsis ADC, CDB simul sumptis (Eucl. 13. I.); demptis ergo æqualibus AHD, ADC, restat DHC angulo CDB par; sed & angulus HCD ipsi DCB est par, ergo angulus HDC æqualis est angulo DBC (Eucl. 32. I.); & similia sunt triangula DHC, CBD; quocirca BC est ad CD ut CD ad CH (Eucl. 4. VI.); & rectangulum sub BC; CH æquale quadrato ex CD (Eucl. 16. VI.); Atqui propter similia triangula CDA, DHA, est CA ad AD, ut AD ad AH, verum ut CA ad AD, ita CB ad BD (Eucl. 3. VI.); est ideo AD ad AH, ut CB ad BD, atque rectangulum sub AD; BD æquale rectangulo sub AH; CB (Eucl. 16. VI.); quapropter addendo æqualibus æqualia, rectangula sub BC; AH, & sub BC; CH utraque simul (id est rectangulum sub BC; CA (Eucl. 1. II.)) æqualia quadrato ex CD una cum rectangulo sub AD; DB; atque utrinque demto rectangulo sub AD; DB, differentia rectangulorum &c.

Si autem bifecetur angulus exterior; angulus AHD æquat angulum ADC, & ex hypothese angulus HCD æquat angulum DCB; quam ob rem angulus CDH æquat angulum CBD, & similia sunt triangula BDC, DHC; est itaque HC ad CD, ut CD ad CB, aut rectangulum sub BC; CH æquale est quadrato ex CD. Atqui ob similia triangula ADC; AHD, est AC ad AD, ut AD ad AH; est etiam AC ad AD ut CB ad BD, (vide supra); ergo AD ad AH est ut BC ad BD, & re-

ctan-

XV. Si de figuris in circulo inscriptis res est, theorema non raro subveniet quod inscripti cujuslibet quadrilateri factus a diagonis æquetur summae factorum a lateribus oppositis. (o)







XVI. Et hujusmodi plura inter exercendum observet Analysta, & in penum forte reservet; sed parcius utatur si pari facilitate aut non multo difficilius possit solutionem e simplicioribus computandi principiis extrinere. Quamobrem ad tria primo proposita tanquam notiora, simpliciora, magis generalia, pauca, & omnibus tamen sufficientia, animum præsertim advertat, & omnes difficultates ad ea præ ceteris reducere conetur.


XVII. Sed ut hujusmodi theorematum ad solvenda problemata accommodari possint, *schemata* plerumque sunt ultra *construenda*, idque sæpissime producendo aliquas ex lineis donec fecerint alias, aut sint assignatæ longitudinis; vel ab insigniori quolibet puncto ducendo lineas aliis parallelas aut perpendiculares, vel insigniora puncta conjungendo, ut & aliter nonnumquam construendo, prout exigunt status problematis, & theorematum quæ ad ejus solutionem adhibentur. Quemadmodum si duæ non concurrentes lineæ datos angulos cum tertia quadam efficiant, producimus forte ut concurrentes constituantur triangulum cujus anguli & proinde laterum rationes dantur. Vel si quilibet angulus detur, aut sit alicui æqualis, in triangulum sæpe complemus specie datum, aut alicui simile, idque vel producendo aliquas ex lineis in schemate vel subtensam aliter ducendo. Si triangulum sit obliquangulum, in duo rectangula sæpe resolvimus, demittendo perpendiculum. Si de figuris multilateris agatur, resolvimus in triangula, ducendo lineas diagonales: & sic in ceteris; ad hanc metam semper collimando ut *schemata in triangula vel data, vel similia, vel rectangula resolvatur*. Sic, in exemplo proposito, duco diagonium BD, ut trapezium ABCD in duo triangula, ABD rectangulum, & BDC obliquangu-TAB. I.
Fig. 8. lum resolvatur. Deinde resolvo triangulum obliquangulum in duo rectangula demittendo perpendiculum a quolibet ejus angulo B, C, vel D in latus oppositum: quemadmodum a B in CD productum ad E ut huic perpendiculo BE occurrat. Interea vero cum anguli BAD & BCD duos rectos (per 22. III. Elem.) perinde ac BCE & BCD constituant; percipio angulos BAD & BCE æquales esse, adeoque triangula BCE ac DAB similia. Atque ita video computationem (assumendo AD, AB & BC tanquam si CD quæreretur) ad hunc modum institui posse, videlicet AD & AB (propter triangulum AB rectangulum) dant BD: AD, AB, BD & BC (prop-

ctangulum sub AD; DB æquale rectangulo sub AH; BC, aut rectangulis sub AC; CB, & sub CH; CB simul (Eucl. 1. II.); quare æqualia ex æqualibus auferendo, rectangulum sub AC; CB æquat excessum rectanguli sub AD; DB super quadratum ex DC; addito communi quadrato ex CD, rectangulum sub

AC; CB & quadratum ex CD simul, æquantur rectangulo sub AD; DB & ablato hinc inde rectangulo sub AC; CE, quadratum rectæ bifecantur angulum &c.

(o) Cujus Theorematis obvia est demonstratio.





propter similia triangula ABD & CEB) dant BE & CE. BD, BE (propter triangulum BED rectangulum) dant ED; & ED — EC dat CD. Unde obtinebitur æquatio inter valorem de CD sic inventum & literam pro ea susceptam. Possumus etiam (& maximam partem satius est quam opus in serie continuata nimis profequi), a diversis principiis computationem incipere, aut saltem diversis modis ad eandem quamlibet conclusionem promovere, ut duo tandem obtineantur ejusdem cujusvis quantitatis valores qui æquales ponantur. Sic AD, AB, & BC dant BD, BE, & CE ut prius; deinde CD + CE dat ED; ac denique BD & ED (propter triangulum rectangulum BED) dant BE. Potest etiam computatio hac lege optime institui ut valores quantitatum investigentur quibus alia quæpiam relatio cognita intercedit; & illa deinde relatio æquationem dabit. Sic cum relatio inter lineas BD, DC, BC & CE ex Prop. 12. lib. 2. Elem. constet; nempe quod sit $BDq - BCq - CDq = 2CD.CE$; quæro BDq ex assumptis AD & AB; ac CE ex assumptis AD, AB, & BC. Et assumendo denique CD facio $BDq - BCq - CDq = 2CD.CE$. Ad hos modos & hujusmodi consiliis ductus, de serie analyseos deque schemate propter eam construendo semper debes una prospicere.

XVIII. Ex his, credo, manifestum est quid sibi velint Geometræ cum jubent putes factum esse quod quæris. Nullo enim inter cognitæ & incognitæ quantitates habito discrimine, quaslibet ad ineundum calculum assumere potes quasi omnes ex prævia solutione fuissent notæ, & non amplius de solutione problematis, sed de probatione solutionis ageretur. Sic in primo ex tribus jam descriptis computandi modis, etsi forte AD revera quærat, fingo tamen CD quærendum esse, quasi vellem probare an valor ejus ab AD derivatus quadraret cum ejus quantitate prius cognita. Sic etiam in duobus posterioribus modis pro meta non propono quantitatem aliquam quærendam esse, sed æquationem e relationibus linearum utcunque eruendam: & in ejus rei gratiam assumo omnes AD, AB, BC, & CD tanquam notas, perinde ac si (quæstione prius soluta) de tentamine jam ageretur an conditionibus ejus hæc probe satisfaciant, quadrando cum quibuslibet æquationibus quas linearum relationes produnt. Opus quidem hac ratione & consiliis prima fronte aggressus sum, sed cum ad æquationem devenit, sententiam muto, & quantitatem desideratam per istius æquationis reductionem & solutionem quæro. Sic denique plures quantitates tanquam cognitæ sæpenumero assumimus quam in statu quæstionis exprimuntur. Hujusque rei insignem in 55^o sequentium problematum instantiam videre est, ubi $a, b, \& c$ in æquatione $aa + bx + cxx = yy$, pro determinatione Sectionis conicæ assumpsi, ut & alias lineas r, s, t, v de quibus problema, prout proponitur, nihil innuit. Nam quaslibet quantitates assumere licet quarum ope possibile sit ad æquationes pervenire; hoc solum cavendo ut ex illis tot æquationes obtineri possint quot assumptæ sunt quantitates revera incognitæ.

XIX. Postquam de computandi methodo constat & ornatur schema, quantitibus quæ computationem ingredientur (hoc est ex quibus assumptis aliarum valores derivandi sunt, donec tandem ad æquationem perveniatur) nomina impone, delegendo quæ problematis omnes conditiones involvunt, & operi præ ceteris accommodatæ videntur, & conclusionem (quantum possis conjicere) simpliciore reddent, sed non plures tamen quam proposito sufficiunt, Itaque pro quantitibus, quæ ex aliarum vocabulis facile deduci possint, propria vocabula vix tribuas. Sic ex tota linea & ejus partibus, ex tribus lateribus trianguli rectanguli, & ex tribus vel quatuor proportionalibus unum aliquod, minimum, sine nomine permittere solemus, eo quod valor ejus e reliquorum nominibus facile derivari possit. Quem admodum in exemplo jam allato, si dicam $AD = x$ & $AB = a$, ipsum BD nulla litera designo, quod sit tertium latus trianguli rectanguli ABD & proinde valeat $\sqrt{xx - aa}$. Dein, si dicam $BC = b$, cum triangula DAB & BCE sint similia, & inde lineæ $AD . AB :: BC . CE$ proportionales, quarum tribus AD , AB , & BC imposita sunt nomina, ea propter quartam CE sine nomine permitto, & ejus vice valorem $\frac{ab}{x}$ ex hac proportionalitate detectum usurpo. Atque ita si DC vocetur e , ipsi DE nomen non assigno, quod ex partibus ejus DC & CE , sive e & $\frac{ab}{x}$, valor $e + \frac{ab}{x}$ prodeat.

TAB. I.
Fig. 8.

XX. Ceterum dum de his moneo, problema ad æquationem pene redactum est. Nam, postquam literæ pro speciebus principalium linearum præscriptæ sunt, nihil aliud agendum restat quam ut ex istis speciebus valores aliarum linearum juxta methodum præconceptam eruantur, donec modo quovis proviso in æquationem coeant. Et in hoc casu nihil restare video nisi ut per triangula rectangula BCE & BDE dupliciter eliciam BE . Nempe est

$$BCq - CEq \text{ (sive } bb - \frac{aabb}{xx} \text{)} = BEq$$

ut &

$$BDq - DEq \text{ (sive } xx - aa - cc - \frac{zabc}{x} - \frac{aabb}{xx} \text{)} = BEq.$$

Et hinc (utrobique deleto $\frac{aabb}{xx}$) æquationem habebō

$$bb = xx - aa - cc - \frac{zabc}{x}.$$

Quæ reducta fit

$$x^3 = + aa + bbx + zabc.$$

XXI. Cum vero de solutione problematis hujus plures modos, et si non multum dissimiles, in præcedentibus recensuerim, quorum iste de Prop. 12. Lib. 2. Elem. desumptus sit ceteris quodammodo concinnior; eundem placeat etiam subjungere. Sit itaque $AD = x$, $AB = a$, $BC = b$, & $CD = c$, eritque $BDq = xx - aa$, & $CE = \frac{ab}{x}$ ut prius. Hisce dein speciebus in theorema $BDq - BCq - CDq = 2CD.CE$ substitutis orietur $xx - aa - bb - cc = \frac{2abc}{x}$; & facta reductione

$$x^3 = +aa + bbx + 2abc. \text{ Ut ante.}$$

Sed ut pateat quanta sit in solutionum inventionem varietas, & proinde quod in eas incidere prudenti Geometræ non sit admodum difficile, visum fuit plures adhuc modos hoc idem perficiendi docere. Atque quidem ducto diagono BD si vice perpendiculari BE a puncto B in latus DC supra demissi, demittatur perpendicularum a puncto D in latus BC vel a puncto C in latus BD , quo obliquangulum triangulum BCD in duo rectangula utcunque resolvatur, iisdem serme, quas jam descripsi methodis, ad æquationem pervenire licet. Sunt & alii modi ab istis satis differentes.

XXII. Quemadmodum si diagonii duo AC & BD ducantur, dabitur TAB. I.
FIG. 9. BD ex assumptis AD & AB ; ut & AC ex assumptis AD & CD , deinde per notum theorema de figuris quadrilateris in circulo inscriptis, nempe quod sit $AD \cdot BC + AB \cdot CD = AC \cdot BD$ obtinebitur æquatio. Stantibus itaque linearum AD , AB , BC , CD vocabulis x , a , b , c ; erit $BD = \sqrt{xx - aa}$ & $AC = \sqrt{xx - cc}$ per 47. 1. Elem. Et his linearum speciebus in theorema jam recensitum substitutis, exhibit

$$xb + ac = \sqrt{xx - cc} \cdot \sqrt{xx - aa}.$$

Cujus æquationis partibus denique quadratis & reductis obtinebitur iterum

$$x^3 = +aa + bbx + 2abc.$$

XXIII. Ceterum ut pateat etiam quo pacto solutiones ex isto theoremate petite possint inde ad solas triangulorum similitudines redigi, erigatur BH ipsi BC perpendicularis & occurrens AC in H , & fient triangula BCH , BDA similia, propter angulos ad B rectos, & ad C ac D (per 21. 3. Elem.) æquales; ut & triangula BCD , BHA similia, propter æquales angulos tum ad B (ut pateat demendo communem angulum DBH a duobus rectis,) tum ad D ac A (per 21. 3. Elem.) Videre est itaque quod

quod ex proportionalitate BD . AD :: BC . HC detur HC; ut & AH ex proportionalitate BD . CD :: AB . AH.* Unde cum sit AH + HC = AC, habebitur æquatio. Stantibus ergo præfatis linearum vocabulis x, a, b, c, nec non ipsarum AC & BD valoribus $\sqrt{xx - cc}$ & $\sqrt{xx - aa}$;

prima proportionalitas dabit $HC = \frac{bx}{\sqrt{xx - aa}}$, & secunda dabit $AH = \frac{ac}{\sqrt{xx - aa}}$. Unde propter AH + HC = AC erit $\frac{bx + ac}{\sqrt{xx - aa}} = \sqrt{xx - cc}$; æquatio quæ (multiplicando per $\sqrt{xx - aa}$ & quadrando) reducetur ad formam in præcedentibus sæpius descriptam.

Tab. I.
Fig. 10.

XXIV. Adhæc ut magis pateat quanta sit solvendi copia; producantur BC & AD donec convenient in F, & fient triangula ABF & CDF similia, quippe quorum angulus ad F communis est, & anguli ABF & CDF (dum complent angulum CDA ad duos rectos per 13. 1. & 22. 3. Elem.) æquales. Quamobrem si præter quatuor terminos de quibus instituitur quæstio, daretur AF, proportio AB . AF :: CD . CF daret CF. Item AF — AD daret DF, & proportio CD . DF :: AB . BF daret BF; unde (cum sit BF — CF = BC) emergeret æquatio. Sed cum duæ quantitates incognitæ AD ac DF tanquam datæ assumantur, restat alia æquatio invenienda. Demitto ergo BG in AF ad rectos angulos, & proportio AD . AB :: AB . AG dabit AG; quo habito, theorema e 13. 2. Elem. petiitum, nempe quod sit BFg + 2FAG = ABg + AFg, dabit æquationem alteram. Stantibus ergo a, b, c, x ut prius, & dicto AF = y: erit (insistendo velligiis theoriæ jam excogitatæ) $\frac{cy}{a} = CF$. $y - x = DF$. $\frac{(y-x)a}{c} = BF$.

Indeque $\frac{(y-x)a}{c} - \frac{yc}{a} = b$, æquatio prima. Erit etiam $\frac{aa}{x} = AG$,

adeoque $\frac{aayy - 2aaxy + aaxx}{cc} + \frac{2aay}{x} = aa + yy$, æquatio secunda.

Quæ duæ per reductionem dabunt æquationem desideratam. Nempe valor ipsius y per æquationem priorem inventus est $\frac{abc + aax}{aa - cc}$, qui in secundam substitutus, dabit æquationem ex qua recte disposita fiet

$$x^3 = +aa + bbx + 2abc, \text{ ut ante } (p).$$

* Fac æquales angulos ABC; HBC; ex his proportionibus elice rectangula æqualia, & habebis demonstratum ipsum theorema de quadrilateris &c.

(p) Nam æquatio $\frac{aayy - 2aaxy + aaxx}{cc} + \frac{2aay}{x} = aa + yy$ multiplicata per cc, &

XXV.
per x, dat $aayyx - 2aaxxy + aax^2 + 2aacyy = aaccx + ccyxx$; & omnibus membris in eandem partem collatis, ut, summa fiat = 0; ac dispositis juxta dimensionem y, habemus $yyaax - yyccx - 2aaxxy + 2aacyy + aax^2 - aaccx = 0$, id est $yy(aax - ccx) - y(2aax - 2aac) + aax^2 - aaccx = 0$; & substituendo pro yy, & — y valores

XXV. Atque ita si AB ac DC producantur donec sibi mutuo occurrant, solutio haud aliter se habebit, nisi forte futura sit paulo facilior. Quare aliud hujus rei specimen e fonte multum dissimili peritum potius subjungam, quærendo nempe aream quadrilateri propositi, idque dupliciter. Duceo igitur diagonium BD ut in duo triangula quadrilaterum resolvatur. Dein usurpatis linearum vocabulis x, a, b, c , ut ante, invenio $BD = \sqrt{xx - aa}$ indeque $\frac{1}{2} a\sqrt{xx - aa}$ ($= \frac{1}{2} AB \cdot BD$) aream trianguli ABD. Porro demisso BE perpendiculariter in CD, erit (propter similia triangula ABD, BCE) $AD \cdot BD : BC, BE$, & proinde $BE = \frac{b}{x} \sqrt{xx - aa}$. Quare etiam $\frac{bc}{2x} \sqrt{xx - aa}$ ($= \frac{1}{2} CD \cdot BE$) erit area trianguli BCD. Hasce jam areas addendo orietur $(\frac{ax + bc}{2x}) \sqrt{xx - aa}$ area totius quadrilateri. Non secus dicendo diagonium AC & quærendo areas triangulorum ACD & ACB, easque addendo, rursus obtinebitur area quadrilateri $(\frac{cx + ba}{2x}) \sqrt{xx - cc}$. Quare ponendo hasce areas æquales & utrasque multiplicando per $2x$, habebitur $(ax + bc) \sqrt{xx - aa} = (cx + ba) \sqrt{xx - cc}$, æquatio, quæ quadrando ac dividendo per $aax - ccx$, redigetur ad formam sæpius inventam

$$x^3 = \frac{+aa}{+bbx + 2abc} + cc$$

XXVI. Ex his constare potest quanta sit solvendi copia & obiter quod alii modi sint aliis multo concinniores. Quapropter si in primas de solutione problematis alicujus cogitationes modus computationi male accommodatus incidit, relationes linearum iterum evolvendæ sunt donec modum, quam poteris, idoneum & elegantem machinatus fueris. Nam, quæ leviori curæ se offerunt, laborem satis molestum plerumque parient si ad opus adhibeantur. Sic in problemate de quo agitur, nil difficilius foret in sequentem modum, quam in aliquem e præcedentibus incidere. Demissis nempe BP & CS ad AD normalibus, ut & CT ad BP, figura resolvetur in triangula rectangula. Et videre est quod AD & AB dant AP; AD & CD dant SD: AD — AP — SD dat PS vel TC, & BP — TP dat

Tab. I.
Fig. II.

$$\frac{aabbcc + 2a^2bcx + a^4xx}{(aa - cc)(aa - cc)}, \text{ \& } \frac{abc - aax}{aa - cc},$$

$$\text{erit } \frac{aabbccx + 2a^2bcxx + a^4x^2 - 2a^2bcxx}{aa - cc} = \frac{abc - aax}{aa - cc}$$

$$\frac{-2a^4x^2 + 2a^2bc^2 + 2a^4cx}{aa - cc} + aax^2 - aacx = 0;$$

& deletis delendis, ac sublata fractione, $aabbccx - a^4x^2 + 2a^2bc^2 + 2a^4cx + a^4x^2 - aacx^2 - a^4cx + aac^2x = 0$; rursus deletis delendis, cunctis per aac divisus, ac transposito $-x^2$, erit Auctoris æquatio.

dat BT. Denique BT ac TC dant BC, unde obtinebitur æquatio. Si quis autem hoc modo computationem aggressus fuerit, is in terminos algebraicos profusiores quam sunt ulli præcedentium incidet & ad finalem æquationem ægrius reducibiles. (q)

Et

(q) Rationes libet subducere ob singularem observationem, cui viam faciunt. Sit, ut prius, AD = x; AB = a; BC = b; CD = c.

$$\text{Erit, DA (x). AB (a) :: AB (a). AP} = \frac{aa}{x};$$

$$\& \text{AD (x). DC (c). DC (c). DS} = \frac{cc}{x}$$

per Eucl. 8. VI. si enim iungerentur BD, & CA, triangula ABD, ACD essent rectangula.

Igitur

$$\text{PS} = \text{DA} - \text{AP} - \text{SD} = x - \frac{aa - cc}{x}$$

$$= \frac{xx - aa - cc}{x} = \text{TC.}$$

Nunc

$$\text{BP} = \sqrt{\text{BA}^2 - \text{AP}^2} = \sqrt{aa - \frac{a^4}{xx}}$$

Et

$$\text{CS} = \sqrt{\text{CD}^2 - \text{DS}^2} = \sqrt{cc - \frac{c^4}{xx}} = \text{TP.}$$

Quare

$$\text{BT} = \text{BP} - \text{PT} = \sqrt{aa - \frac{a^4}{xx}} - \sqrt{cc - \frac{c^4}{xx}}$$

Erit autem

$$\text{BC} = \text{CT} + \text{TB}^2$$

Ergo

$$bb = \frac{x^4 - 2aaxx - 2ccxx + a^4 + 2aacc + c^4}{xx}$$

$$+ aa - \frac{a^4}{xx}$$

$$= 2\sqrt{aacc - \frac{aa^4 - cc^4}{xx} + \frac{c^4}{x^2}} + cc - \frac{c^4}{xx}$$

atque, omnibus ductis in xx ac deletis delendis, & quadrando

$$4aaccx^4 - 4aa^4cx - 4a^4c^2x + 4a^4c^4 =$$

$$+ 6aacc$$

$$- 2aa + 2aabb - 4a^4cc$$

$$- 2ccx^6 + a^4x^4 - 4aa^4x^2 + 4a^4c^4$$

$$+ 2bbc$$

$$+ b^4$$

ac, deletis delendis & cunctis per xx divisis,

$$\begin{array}{r} + a^4 \\ + b^4 \\ x^6 - 2bbx^4 + 2aabbx^2 - 4aabbcc = 0 \\ - 2cc \end{array}$$

quæ æquatio divisa per

$$\begin{array}{r} - a^2 \\ x^4 - b^2x^2 + 2abc = 0, \text{ dat } x^4 - b^2x^2 - 2abc = 0 \\ - c^2 \end{array}$$

ut ante

Sed, cur hæc analysis dat æquationem sex dimensionum, & quid sibi vult ille divisor trium dimensionum? Dicam

Super diametro AD quaesita potest ex tribus datis rectis describi aliud quadrilateri genus ADCBA, in quo si teneatur æquatio Art. XX. hujus, omnia, quæ ibi invenimus, se huic quadrilatero aptare comperiemus præter perpendicularem BE, quæ in Fig. 8. Tab. 1. extra quadrilaterum cadere debet, quia angulus BCD, insitens arcui semicirculorum superanti arcu AB, est obtusus, & perpendicularis cadere debet intra crura anguli acuti. Sed in hac nostra Figura, anguli BCD, BDC, insitentes arcui minori quam semicirculus est, sunt acuti, & perpendicularis BE intra quadrilaterum cadere debet. Hinc sequitur quod recta DE, quæ

apud Auctorem æquat $c + \frac{ab}{x}$, apud nos sit

$c - \frac{ab}{x}$, & rectangulum ab habere debeat

apud Auctorem & apud nos contraria signa. Hoc rectangulum invenitur in ultimo termino, & est negativum apud Newtonum, ergo nobis debet esse positivum, ut in diviso est.

Idem accidit in solutione Art. XXI. hujus. Ibi reperit Auctor $\text{DB}^2 - \text{BC}^2 - \text{CD}^2 = 2\text{DC} \cdot \text{CE}$, quia scilicet angulus DCB illi obtusus est; nos autem reperiemus $\text{DB}^2 - \text{BC}^2 - \text{CD}^2 = -2\text{DC} \cdot \text{CE}$, quia nobis angulus DCB est acutus.

Pariter in solutione Art. XXII; quia rectæ AB, CD, sunt Auctori latera quadrilateri; in-

Fig. 8.

vc-

Et hæc de solutione problematum in rectilinea Geometria; nisi forte operæ pretium fuerit annotasse præterea quod, cum anguli, sive positiones linearum per angulos expressæ, statum quæstiones ingrediuntur, angulorum vice debent adhiberi lineæ aut linearum proportionones, tales nempe quæ

venit ille $bx + ac = \sqrt{xx - cc} \sqrt{xx - aa}$; & quia rectæ AB, CD sunt nobis diagonales, habebimus, non, $AD \cdot BC + AB \cdot CD = AC \cdot BD$, ut NEWTONUS, sed $AD \cdot BC + AC \cdot BD = AB \cdot CD$, aut $bx + \sqrt{xx - cc} \sqrt{xx - aa} = ac$ vel $\sqrt{(2^2 - 4axx - c^2x^2 + 1acc)}$ $= ac - bx$, quas quantitates si quadræ, in hac postrema invenies — $2abex$, quod rectangulum NEWTONO erat + $2abex$, & hinc eadem conficiuntur quæ supra.

Eodem pacto, solutio Art. XXIII nostri quadrilatero accommodata, habebit perpendicularem BH occurrentem ipsi AC extra quadrilaterum, qui occurrit intra quadrilaterum fieri debet in hypothesisi Auctoris. Cum enim in ejus figura, sit angulus ACB acutus, & rectæ AB, AC convenient, debent anguli ABC, BCA esse minores duobus rectis, (Eucl. 32 I.) Ergo, fortius, angulus rectus HBC, & idem acutus BCA duobus rectis erunt minores, & ideo rectæ BH, CA intra quadrilaterum concurrent, (Eucl. Ax. 11.) At in nostra figura, angulus ACB est obtusus, qui cum recto, (quem faceres ducendo ad CB perpendicularem ad punctum B) superaret duos rectos. Quapropter rectæ concurrent extra quadrilaterum. Idcirco erit $AH - HC = AC$

$$= \frac{ac - bx}{\sqrt{xx - aa}}$$

recta quæ NEWTONO erat

$AH + HC = AC = \frac{ac + bx}{\sqrt{xx - aa}}$; unde constat quod, si æquationem formes & partes quadras, invenies — $2abex$ rectangulum, quod Auctor invenit + $2abex$. Sunt autem, nobis etiam, similia Triangula CBH, DBA; Nam quia angulus HCD est rectus, & anguli HCB, BHC æquant rectum, dempto communi HCB, erit BCD (vel æqualis BAD) æqualis CHB, & præterea anguli CBH, ABD sunt recti, ergo &c. Similia quoque sunt Triangula ABH, BCD; nam, præter angulos HAB, CBD æquales, æquales habent etiam angulos ABH, CBD; quorum quique constat ex recto & ex communi CBA.

Sed in solutione Art. XXIV; rectæ BC, AD possunt convenire ad partes punctorum B, D.

Tunc $BC = CF - FB = \frac{cy}{a} - \frac{ay + ax}{c}$

$= b$ unde fit $\frac{a^2x - abc}{a^2 - c^2} = y$; cujus valor

erat in hypothesisi Newtoniana $\frac{ax + abc}{aa - cc}$; unde signum ipsius abc debet esse nobis contrarium signo, quod habet in æquatione Auctoris.

Si vero rectæ BC, AD convenient ad partes punctorum A, C; valor ipsius y idem nobis erit ac NEWTONO, sed rectangulum FAG nobis erit negativum, quia angulus FAB est obtusus, & ideo (Eucl. 12. II.) $BF^2 = FA^2 + AB^2 + 2FAG$; aut $BF^2 - 2FAG = FA^2 + AB^2$; sed $2FAG = \frac{2a^2y}{x}$

$$= \frac{2aa(abc + aux)}{x \quad aa - cc}$$

& rursus signum ipsius abc in una hypothesisi contrarium erit signo ejusdem quantitatibus in altera.

Demum solutio Art. XXV. paulo difficilius, ut videtur, potest aptari nostræ hypothesisi, idcirco libet eam diligentius prosequi.

Et primo quidem, cum in figura Auctoris, anguli BCD, CBA sint obtusi, perpendiculares a verticibus B, C actæ in opposita latera DC, AB, debent cadere extra quadrilaterum. Sed in figura nostrâ, quia idem anguli BCD, CBA sunt acuti, ut & oppositi BDC, BAC, perpendiculares actæ a verticibus B & C in opposita latera CD, BA debent cadere intra quadrilaterum.

Præterea, in Auctoris figura, triangula ABD, DCB simul sumpta quadrilaterum conficiunt, ut & triangula ACD, CBA. In nostra vero eadem triangula ABD, DCB simul sumpta quadrilaterum AIBCDIA superant bis triangulo BID; & triangula CAD, CBA simul sumpta quadrilaterum superant bis triangulo CIA, & ideo illorum summa non æquat summam horum. Si autem ex triangulo ABD auferatur triangulum CBD, supererit differentia triangulorum AID, CIB; & si ex triangulo ACD auferatur triangulum CBA, supererit differentia eorumdem triangulorum AID, CIB, quæ differentia sunt æquales. Igitur poni debet

$$(ax - bc) \sqrt{xx - aa} = (cx - ab) \sqrt{xx - cc}$$

unde, (quadrando, delendo contraria, & dividendo per x) fiet.

$$\frac{a^2}{c^2} x^4 - \frac{a^2}{c^2} x^2 - \frac{a^2bc}{c^2} x + \frac{2a^2bc}{c^2} = 0$$

quæ

TAB. B. Fig. 2.

TAB. I. Fig. 9.

TAB. B. Fig. 2.

TAB. B. Fig. 4.

TAB. I. Fig. 10.

TAB. B. Fig. 5.

TAB. B. Fig. 3.

quæ ab angulis datis possunt per calculum trigonometricum derivari, aut a quibus inventis anguli quæsitæ per eundem calculum procedunt; hoc est quæ se mutuo determinant: cujus rei plures instantias videre est in sequentibus.

XXVII. Quod ad Geometriam circa lineas curvas attinet, illæ designari solent vel describendo eas per motum localem rectarum, vel adhibendo æquationes indefinite exprimentes relationem rectarum certa aliqua lege dispositarum & ad curvas desinentium. Idem fecerunt Veteres per sectiones solidorum, sed minus commode. Computations vero, quæ curvas primo modo descriptas respiciunt, haud secus quam in præcedentibus peraguntur. Quemadmodum si AKC sit curva linea descripta per K verticale punctum normæ AKφ, cujus unum crus AK per punctum A positione datum libere dilabitur, dum alterum Kφ datæ longitudinis super rectam AD positione datam promovetur, & quærat punctum C in quo recta quævis CD positione data hanc curvam secabit, ducō rectas ACF, quæ normam in positione quæsitæ referant, & relatione linearum (sine aliquo dati & quæsitæ discrimine aut respectu ad curvam) considerata, percipio dependentiam ceterarum a CF & quamlibet harum quatuor BC, BF, AF & AC syntheticam esse, quarum duas itaque, ut CF = a & CB = x, assumo, & inde computum ordiēdo statim lucratus sum BF = √(aa — xx)

& AB = $\frac{xx}{\sqrt{(aa - xx)}}$ propter angulum rectum CBF, lineasque BF. BC :: BC. AB continue proportionales. Porro, ex data positione CD, datur AD, quam itaque dico b; datur etiam ratio BC ad BD, quam pono d ad e, & fit BD = $\frac{ex}{d}$, & AB = $b - \frac{ex}{d}$. Est ergo $b - \frac{ex}{d} = \frac{xx}{\sqrt{(aa - xx)}}$, æquatio quæ (quadrando partes & multiplicando per aa — xx &c.) reductur ad hanc formam.

quæ divisa per a² — c² dat

$$\begin{array}{r} - a^2 \\ x^2 - \frac{c^2}{x} + 2abc = 0. \\ - b^2 \end{array}$$

in qua rursus signum facti 2abc nobis contrarium illo est, quod NEWTONUS invenit. Constat igitur, quod harum solutionum nulla potest nostræ hypothefi aptari, quin mutationem subeat, ex qua signum ipsius 2abc ex negativo fit positivum.







TAB. B. Fig. 6.

Sed ultima hæc solutio Art. XXVI. utriusque hypothefi aptatur hæc unica mutatione quod SP æquat non, ut in Auctore, AD — AP — SD, sed AP + SD — AD. Nam AP + DS = AS + 2SP + PD, & AD = AS + SP + PD, ergo, auferendo hanc ex illa, AP + DS — AD = SP = $\frac{a^2 + c^2 - x^2}{x}$, quæ

si quadretur dabit quadratum superius, nam quantitatum oppositarum eadem sunt quadrata.

Cum igitur reliqua resistent, & hæc ratio quadratum a quantitate mutata oriundum idem relinquat, patet eandem prorsus futuram æquationem hinc exurgentem, quæ ideo ambas hypothefes debet complecti.

15. Ceterum, hæc ultima æquatio, cum ad unam hypothefim non sit coarctata, perfectior est censenda: & quando docetur æquationum idem problema solventium perfectissimam esse simplicissimam, intelligendum est hoc præceptum de iis, quæ omnes hypothefes, seu, ut vocant, casus problematis complectuntur.



$$x^4 = \frac{2bdex^3 - bdd \quad xx - 2aabdex + aabdd}{dd + ee}$$

unde demum e datis a, b, d & c erui debet x per regulas post tradendas, & intervallo isto x sive BC acta ipsi AD parallela recta secabit CD in quæsito puncto C.

XXVIII. Quod si, non descriptiones geometricæ, sed æquationes pro curvis lineis designandis adhibeantur, computationes eo pacto faciliores & breviores evadent, in quantum ejusmodi æquationes ipsis lucro cedunt. Quemadmodum, si datæ ellipseo ACE intersectio C cum recta CD po-^{TAB. I.} sitione data quæratur; pro ellipsi designanda sumo notam aliquam æquatio-^{Fig. 13.}

nem ei propriam, ut $rx - \frac{r}{q}xx = yy$, ubi x indefinite ponitur pro quolibet axis parte Ab vel AB & y pro perpendicularo bc vel BC ad curvam terminato; r vero & q dantur ex data specie ellipsis. Cum itaque CD positione detur, dabitur & AD, quam dic a ; & erit BD $a - x$: dabitur etiam angulus ADC, & inde ratio BD ad BC, quam dic i ad e , & erit BC (y) = $ea - ex$, cujus quadratum

$$ecea - 2eex + eexx \text{ æquabitur } rx - \frac{r}{q}xx.$$

indeque per reductionem oriatur,

$$exx = \frac{2eex + rx - aae}{e + \frac{r}{q}}, \text{ seu } x = \frac{ace + \frac{1}{2}r \pm eV(ar + \frac{r^2}{4e} - \frac{aar}{q})}{e + \frac{r}{q}}$$

Quin etiam, etsi curva per descriptionem geometricam vel per sectionem solidi designetur, potest tamen inde æquatio obtineri quæ naturam curvæ definit, adeoque huc omnes problematum, quæ circa eam proponuntur, difficultates reduci.

Sic in exemplo priori si AB dicatur x & BC y , tertia proportionalis BF erit $\frac{yy}{x}$, cujus quadratum una cum quadrato BC æquatur CFq, hoc

est $\frac{y^4}{xx} + yy = aa$; sive $y^4 + xxyy = aaxx$. Estque hæc æquatio qua curvæ AKC unumquodque punctum C unicuique basis longitudini AB congruens (adeoque ipsa curva) definitur, & e qua proinde solutiones problematum, quæ de hac curva proponuntur, petere liceat.

Ad eundem fere modum cum curva non datur specie sed determinanda

proponitur, possis pro arbitrio æquationem fingere quæ naturam ejus generaliter contineat; & hanc pro ea designanda, tanquam si daretur, assumere ut ex ejus assumptione quomodocunque perveniatur ad æquationes ex quibus assumpta tandem determinentur: cujus rei exempla habes in nonnullis sequentium problematum, quæ in pleniorum illustrationem hujus doctrinæ & exercitium discipulorum congesti, quæque jam pergo tradere. (r)

CAPUT

(r) Hactenus quidem de problematis ad æquationem revocandis. Nunc pauca dicenda sunt de æquationum constructionibus.

16. Probe observandum est dari aliqua problemata, in quibus de lineis & figuris quidem agitur; sed algebraica unius expressio respectu alterius quæritur; & aliqua in quibus ratio aliquid geometrice efficiendi investigatur.

17. Prioribus omnino satisfactum est inventa expressione quæ poscebatur.

18. In aliis autem etiam requiritur effectio geometrica, seu constructio.

19. Per problematis constructionem intelligitur inventio puncti, aut lineæ quæsitæ, problemati respondentis, aut illud solvensis.

20. Quod sic fit in problematis unius aut duarum dimensionum. Invento quæsitæ valore, invenienda sunt rectæ, quæ respondent datis quantitatibus simplicibus, quarum aggregatum, aut differentia æquivalent quæsitæ. Hæ rectæ, per additionem aut subtractionem, quæque per proprium signum, omnes jungendæ sunt, & sic problema est constructum.

21. Omnis fractio ($\frac{ac}{b}$) indicat inventionem quartæ proportionalis post tres datas, quarum prima est denominator, secunda unus ex factoribus numeratoris, tertia vero alter, quod fit per Eucl. 11. VI.

22. Cum vero numerator habet plus quam duas dimensiones, & denominator plus quam unam, hæc operatio repetenda est; sic recta $\frac{abcef}{gblm}$ invenitur per has analogias $g. a : b, n = \frac{ab}{g}$ (Eucl. 15. VI.), quare $\frac{abcef}{gblm}$ fit $\frac{cefn}{blm}$, & deinde $b. c : e. p = \frac{ce}{b}$ unde habetur $\frac{cefn}{blm} = \frac{fnp}{lm}$, & rursus $l. f : n. q = \frac{fn}{l}$, ac $\frac{fnp}{lm} = \frac{pq}{m}$, & de-

nique $m. p : q. r = \frac{pq}{m} =$ data fractio $\frac{abcef}{gblm}$.

23. Omnis radix quadrata indicat lineam quæsitam esse mediam proportionalem inter duos factores quantitatis sub signo positæ, & hæc media reperitur per Eucl. 12. VI. Sic $\sqrt{3aa}$ invenitur quærendo mediam inter $3a$, & a , ac $\sqrt{\frac{3bc}{4}}$ est media inter $\frac{3b}{2}$ & $\frac{c}{2}$ aut $3b$, & $\frac{c}{4}$, aut $\frac{3b}{4}$, & c , aut b , & $\frac{3c}{4}$ & c.

24. Si vero quantitas sub signo sit complexa, hæc in lineis exhiberi potest per similem mediæ inventionem, quando quantitas sub signo tota per eandem dividitur, aut semper per hypothenusam, aut latus trianguli rectanguli. Per hypothenusam inquam, ubi quantitas complexa est aggregatum ex simplicibus, ubi vero est differentia, per latus. Hoc pacto $\sqrt{a^2 + ac}$ exhiberi potest, aut quærendo mediam inter a , & $b + c$, nam hujus mediæ quadratum æquabit rectangulum ex illis (Eucl. 16. VI.), aut inventiendo mediam inter $a; b$ & $a; c$, & his lineis efficiendo angulum rectum, nam hujus trianguli hypothenusa erit radix quæsitæ, ut facile deducitur ex Eucl. 47. I.

Haud aliter $\sqrt{aa - bb}$ invenitur quærendo mediam inter $a + b$, & $a - b$, aut latus trianguli rectanguli, cujus hypothenusa a sit radix quadrati positivi aa , & latus unum sit b radix quadrati negativi $-bb$, quod efficitur descripto semi-circulo ACB super diametrum AB = a , & ei inscripta recta BC = b Fig. 7. (Eucl. 1. IV.) ab altera diametri extremitate B, & juncta AC, quæ est radix quæsitæ, (Eucl. 47. I.) & sic de ceteris.

25. His recte intellectis. Quantitates ex his compositæ facile reperientur: sic $\frac{a}{b} \sqrt{ff - gg}$ obtinebitur inventa recta = $\sqrt{ff - gg}$ (No. 24. hujus) quam dico w , & postea recta = $\frac{aw}{b}$.

Et hæc quidem sunt regulæ generales; at non raro

C A P U T S E C U N D U M.

P R O B. I.

Data recta terminata BC, a cujus extremitatibus duæ rectæ BA, CA, ducuntur in datis angulis ABC, ACB: invenire AD altitudinem concursus A supra datam BC. (a)

XXVIII. Sit $BC = a$, & $AD = y$; & cum angulus ABD detur, dabitur (ex tabula sinuum & tangentium) ratio inter lineas AD & BD quam pone ut d ad e . Est ergo $d. e. :: AD (y) BD$. Quare $BD = \frac{ey}{d}$. Similiter propter datum angulum ACD dabitur ratio inter AD ac DC quam pone ut d ad f & erit $DC = \frac{fy}{d}$. At $BD + DC = BC$, hoc est $\frac{ey}{d} + \frac{fy}{d} = a$. Quæ reducta multiplicando utramque partem æquationis per d , ac dividendo per $e + f$ evadit $y = \frac{ad}{e+f}$.

Tab. I. Fig. 14.

P R O B.

raro peculiaris quædam ratio ministrat simpliciores reclarum inventiones & problematum constructiones, cui rei experientia magis & ingenium, quam regulæ, conducunt.

Nam vires omnes in id intendendæ sunt, ut propositum, quam simplicius fieri possit, obtineatur.

Sic, ubi expressio algebraica solum quaritur, quo simplicior illa est, eo melior: ubi vero ad constructionem progrediendum est, æquatio pluris faciendæ non est illa, quæ simplicioribus & paucioribus terminis constat, sed illa, quæ faciliorem constructionem habet; atque hæc longe est illi præferenda, ubi simul & æquationis simplicitatem & constructionis facilitatem nancisci non possumus.

(a) In hoc problemate queritur ratio exprimentæ quasitam per literas aut per numeros, nam punctum concursus geometricæ datur. Summa enim angulorum trianguli datur; & dantur anguli ABC, ACB seorsim; ergo & eorum summa (3. dat.) quare & angulus BAC (4. dat.); igitur anguli anguli dantur in triangulo ABC,

& ideo triangulum specie datur (40. dat.); sed recta BC datur magnitudine, triangulum ABC datur etiam magnitudine (52. dat.); quapropter & ejus latera AB, AC magnitudine dantur, atque ideo punctum A (25. dat.). &c.

Hoc problema sic potest trigonometricè enunciari.

Dato latere trianguli, & angulis supra illud constitutis, queritur distantia puncti A a recta BC.

Si centro A, radio AD describatur circulus; erit BC tangens; quare BD tangens anguli BAD, qui datur, quia est dati complementum ad rectum. Item DC est tangens anguli dati: & BC summa tangentium eorum angulorum ad radium DA; & tabulæ, datis angulis, dant tangentes; ergo, si ambo anguli dati sunt acuti, ut summa cotangentium angulorum datorum, ad radium, ita data recta ad distantiam quasitam.

Si vero alter est obtusus; ut excessus, quo cotangens minoris ex his angulis superat cotangentem majoris, ad radium, ita data recta ad distantiam quasitam.

PROB. II.

Cujuslibet trianguli ABC datis lateribus AB , AC , & basi BC , quam perpendicularum AD ab angulo verticali secat in D : invenire segmenta BD ac DC . (a)

TAB. I. XXIX. **S**it $AB = a$, $AC = b$, $BC = c$, & $BD = x$, eritque $DC = c - x$. Jam cum $ABq - BDq (aa - xx) = ADq$,

&c

$$ACq - DCq (bb - cc + 2cx - xx) = ADq:$$

$$\text{Erit } aa - xx = bb - cc + 2cx - xx; \text{ quæ per reductionem fit}$$

$$\frac{aa - bb + cc}{2c} = x.$$

Ceterum ut pateat omnes omnium problematum difficultates per solam linearum proportionalitatem sine adminiculo Prop. 47. primi Elementorum, licet non absque circuitu, enodari posse; placuit sequentem hujus solutionem ex abundanti subungere. A puncto D in latus AB demitte DE normalem, &stantibus jam positis linearum nominibus, erit $AB \cdot BD :: BD \cdot BE$.

$BE. a. x :: x. \frac{xx}{a}$. Et $BA - BE (a - \frac{xx}{a}) = EA$. Nec non $EA. AD :: AD. AB$ adeoque $EA. AB (aa - xx) = ADq$. Et sic ratiocinando circa triangulum ACD invenietur iterum $ADq = bb - cc + 2cx$. (b) Unde obtinebitur ut ante $x = \frac{aa - bb + cc}{2}$.

PROB.

(a) Hic rursus potius expressio algebraica, quam res ipsa quæri videtur.

Nam segmenta BD , & DC dantur: siquidem ob data tria latera, datur specie triangulum ABC (39. *datorum*); dantur igitur anguli ad B , & C (*dat. def.*); item anguli ad D , utpote recti dantur; ergo & anguli DAB in triangulo BAD , & DAC in triangulo CAD ; dantur itaque specie hæc tria (40. *dat.*). Datur etiam illius latus BA ; hujus latus AC , ideo quoque magnitudine illa eadem triangula (52. *dat.*). Dantur ergo latera BD , DC (*dat. 55.*).

(b) Ducta siquidem normali DF , erit (Eucl. TAB. 8. VI.) $AC (b). CD (c-x) :: CD (c-x). CF$ Fig. 8

$$CF = \frac{cc - 2cx + xx}{b}; \text{ Itaque } AC - CF$$

$$= b - \frac{cc + 2cx - xx}{b} = AF. \text{ Est autem}$$

$$AP. AD :: AD. AC; \text{ unde colligitur, ductis}$$

$$\text{invicem mediis \& extremis, } AD^2 = AF.AC$$

$$= bb - cc + 2cx - xx = aa - xx. \& \text{ deletis æqualibus, ac transponendo, } 2cx$$

$$= aa - bb + cc.$$

Ceterum hoc problema solutum pro quovis Triangulo rectilineo vide infra Prob. XII.

PROB. III

Trianguli rectanguli ABC perimetro & area datis invenire hypotensam BC.

XXX. **E**sto perimeter a ; area bb , $BC = x$, & $AC = y$; Eritque AB TAB. II, Fig. 1.
 $\sqrt{xx - yy}$; unde rursus perimeter $(BC + AC + AB)$ est $x + y + \sqrt{xx - yy}$, & area $(\frac{1}{2} AC \cdot AB)$ est $\frac{1}{2} y \sqrt{xx - yy}$. Adeo:
 que $x + y + \sqrt{xx - yy} = a$, & $\frac{1}{2} y \sqrt{xx - yy} = bb$.

Harum æquationum posterior dat $\sqrt{xx - yy} = \frac{2bb}{y}$ quare scribo $\frac{2bb}{y}$
 pro $\sqrt{xx - yy}$ in æquatione priori, ut asymmetria tollatur; & prodit
 $x + y + \frac{2bb}{y} = a$, sive multiplicando per y & ordinando, $yy = ay - xy - 2bb$.
 Porro ex partibus æquationis prioris aufero $x + y$ & restat $\sqrt{xx - yy}$
 $= a - x - y$, cujus partes quadrando, ut asymmetria rursus tollatur,
 prodit

$$xx - yy = aa - 2ax - 2ay + xx + 2xy + yy,$$

quæ in ordinem redacta & per 2 divisa fit $yy = ay - xy + ax - \frac{1}{2} aa$.

Denique ponendo æqualitatem inter duos valores ipsius yy , habeo

$$ay - xy - 2bb = ay - xy + ax - \frac{1}{2} aa,$$

quæ reducta fit $\frac{1}{2} a - \frac{2bb}{a} = x$.

Idem aliter.

Esto $\frac{1}{2}$ perimeter $= a$, area $= bb$, & $BC = x$ eritque $AC + AB$
 $= 2a - x$, Jam cum sit xx (BCq) $= ACq + ABq$, & $4bb = 2AC \cdot AB$
 $=$ erit $xx + 4bb = ACq + ABq + 2AC \cdot AB =$ quadrato ex $AC + AB$
 $=$ quadrato ex $2a - x = 4aa - 4ax + xx$. (c) Hoc est $xx + 4bb = 4aa$

(c) Sit $BC = x$, $AC = y$, $AB = z$. Erit $xx + 4bb = 4aa - 4ax + xx$, & quadrando $zz + 2zy + yy = 4aa - 4ax + xx$; ponendo nunc pro $2zy$,
 $= AC + AB = 2a - x$. Est, $xx = yy$ & $zz + yy$, respectivos valores $4bb$, & xx ,
 $+ 2z$ (Eucl. 47. I), & $\frac{zy}{2} = bb$ area, aut emergit $4bb + xx = 4aa - 4ax + xx$; &
 $xy = 2bb$, vel $2zy = 4bb$ sed $x + y$; demum $x = a - \frac{bb}{a}$.

$$= 4aa - 4ax + xx; \text{ quæ reducta fit } a - \frac{bb}{a} = x. (e)$$

PROB.

(e) Cetera investigaturus pono $\frac{aa - bb}{a} = a - \frac{bb}{a} + a + \frac{bb}{a} = 2a$ rectæ datæ. Di-
 $= 2f$; observo, quod ex hypothesi, est $2a$
 $= x + y + 2f$, atque ideo $2a - 2f = x + y$;
 hanc quantitatem facio $= 2c$. Nunc fingo
 $z = y = 2u$; erit itaque $x = c + u$, & y
 $= c - u$. Verum quia $xy = 2bb = cc$
 $= uu$, est $uu = cc - 2bb$, unde $u =$
 $\sqrt{cc - 2bb}$; hinc $z = c + \sqrt{cc - 2bb}$, adeo-
 que $y = c - \sqrt{cc - 2bb}$.

CONSTRUCTIO.

TAB. B. Sit DE data perimeter. Hanc biseca in F,
 Fig. 9. & erit DF = FE = a. Sit quadratum LMNO
 10. areæ datæ æquale; & quia basis $x = a$

$= \frac{bb}{a}$, aut $a - x = \frac{bb}{a}$; ipsum $\frac{bb}{a}$, quod
 si ex a dematur, dabit basim, determino, ele-
 vando ex F normalem FK = LM = b, jung-
 gendo DK, & ex K ducendo KG ipsi KD
 normalem. Erit enim (Eucl. 8. VI.) DF (a).
 FK (b) :: FK (b). FG = $\frac{bb}{a}$: hinc patet GE
 esse basem quaesitam.

Veniamus ad latera. Basim jam inventam
 diximus = 2f, & 2c = 2a - 2f; erit ideo
 DG = 2c, hanc biseca in I, & duc quadrati
 diagonalem LN = $\sqrt{2bb}$ (Eucl. 47. I.). Si
 hæc minor non est quam IG tunc problema
 esse impossibile; nam $\sqrt{cc - 2bb}$ est latus
 trianguli rectanguli, cujus hypotenusa = c;
 latus alterum = $\sqrt{2bb} = LN$; hypotenusa
 vero est maximum trianguli rectanguli latus
 (Eucl. 19. I.). Sit igitur LN minor quam
 IG, & super IG diametrum describatur semi-
 circulus IYG, & ex puncto G ei inscribatur
 chorda GY ipsi LN par, & junctæ IY æqua-
 lis in DG abscindatur IQ. Erit DQ majus
 latus; QG vero, minus.

Nam, ex his tribus lineis fac triangulum
 BCA, ita ut GE (Fig. 10.) = BC (Fig. 9.)
 $= a - \frac{bb}{a}$, DQ (Fig. 10.) = AC (Fig. 9.)
 $= c + \sqrt{cc - 2bb}$, & QG (Fig. 10.)
 $= AB$ (Fig. 9.) = $c - \sqrt{cc - 2bb}$.
 Quapropter perimeter æquat $a - \frac{bb}{a} + 2c$
 $=$ (ob $2c = 2a - 2f$ & $2f = a - \frac{bb}{a}$)

co nunc hoc triangulum esse rectangulum, &
 ejus aream æqualem bb.

Est enim $AC^2 = 2cc + 2c \sqrt{cc - 2bb}$
 $= 2bb$, & $AB^2 = 2cc - 2c \sqrt{cc - 2bb}$
 $= 2bb$, quare $AC^2 + AB^2 = 4cc - 4bb$
 $=$ (quia $2c = a + \frac{bb}{a}$) $aa + 2bb + \frac{b^4}{aa}$
 $= 4bb = aa - 2bb + \frac{b^4}{aa} = BC^2$. Est
 igitur triangulum ABC rectangulum in A, &
 est BC ejus hypotenusa (Eucl. 48. I.). Quod
 erat unum.

Jam quia angulus ad A est rectus, erit dupla
 area trianguli æqualis rectangulo ex AB in AC
 (Eucl. 41. I.) = $(c - \sqrt{cc - 2bb})$
 $(c + \sqrt{cc - 2bb}) = cc - cc + 2bb = 2bb$,
 & ejus area = bb. Quod erat alterum.

Data basi facile perpendicularum determinatur.
 Est enim rectangulum sub basi & perpendicu-
 lo æquale quadrato ex LN; aut data basis
 ad datam LN, ut eadem ad perpendicularum
 quod, per Eucl. 11. VI. invenietur.

Datis autem basi & perpendiculo, descri-
 betur triangulum, ut videbis infra No. 14. lu-
 jus.

Sed posterior solutio brevius exponi potest
 analysis geometrica.

Sit AB data perimeter, & quadratum CDEF Ta-
 Fig. data area. Puta factum, & triangulum AGH
 sit illud quod petitur. Jam datur, per hyp.,
 rectangulum sub AG; GH, æquale bis dato
 quadrato CDEF (41. I. Eucl.). Sed quadrat-
 um ex AH æquale est quadrato ex HG &
 quadrato ex GA simul (47. I. Eucl.); ergo
 addendo utrinque bis rectangulum sub AG; GH,
 quadratum ex AH una cum bis rectangulo sub
 AG; GH, æquat quadratum ex HG, una
 cum quadrato ex GA, & bis rectangulo sub
 AG; GH, id est quadratum ex HB (41. I. Eucl.),
 quia ponitur HB æqualis HG & GA simul.
 Quare bis datum rectangulum sub AG; GH
 æquat excessum quadrati ex HB supra quadra-
 tum ex HA; id est (ponendo HI æqualem HA)
 rectangulum sub AB & BI, (6. II. Eucl.)
 quod ideo datur (Eucl. def. 1. Dat.). Datur
 autem AB per hypothesi; ergo & BI (Eucl. 47.
 Dat.). Et datur punctum B; quare & pun-
 ctum I (Eucl. 27. Dat.). Ergo datur AI
 (Eucl. 4. Dat.); igitur & AH. (Eucl. 7. Dat.)

P R O B. I V.

Dato trianguli rectanguli perimetro & perpendicularo, invenire triangulum. (f)

XXXI. **T**rianguli ABC sit C rectus angulus & CD perpendicularum in-^{TAB. II.} de ad basem AB demissum. Detur $AB + BC + AC = a$, ^{Fig. 10.} & $CD = b$. Pone basem $AB = x$, & erit laterum summa $a - x$. Pone laterum differentiam y , & erit majus latus $AC = \frac{a - x + y}{2}$; minus BC $= \frac{a - x - y}{2}$. (g)

Jam ex natura trianguli (b) rectanguli est $ACq + BCq = ABq$, hoc est $\frac{aa - 2ax + xx + yy}{2} = xx$. Est & $AB. AC :: BC. DC$, adeoque AB.

DC,

atque HB. Datur autem rectangulum sub AG; GH (per hyp.), & utraque simul AG; GH, vel HB: quare datur tum AG, tum GH (Eucl. 85. Dat.).

Componetur autem sic. Recta CD producatur in K donec sit DK æqualis DC, & quadrato ex CK æquale rectangulum applicetur ipsi AB (ex 43. I. Eucl.), & sit BI altitudo applicationis. Bifecetur AI in H (per 10. I. Eucl.). Producta FE donec ipsi KL occurrat in N, spatia CKNF rectangulum æquale & deficiens quadrato applicetur ad datam HB; (per 28. VI. Eucl.), & sit BO altitudo applicationis; erit AH hypothenusa, HO latus unum, & O alterum petiti trianguli; e quibus describatur triangulum AHG per Eucl. 22. I.

Jam illius perimeter æquat datam rectam; & cum rectangulum sub AB, BI æquet quadratum CKLM per constr. & excessum quadrati ex HB supra quadratum ex AH, vel HI (6. II. Eucl.), erit quadratum CKLM, id est bis rectangulum sub HO; OB (per constr.) una cum quadrato ex AH æquale quadrato ex HB, id est quadratis ex HO; OB; & bis rectangulo sub HO; OB, (4. II. Eucl.), manebit ergo quadratum ex AH æquale quadratis ex HO; & ex OB; id est ex HG, & ex GA; quare triangulum AGH est rectangulum in G (48. I. Eucl.); & quia rectangulum sub AG & GH est duplum quadrati CDEF (per constr.) & areæ trianguli AGH (41. I. Eucl.); area trianguli æquat dat. m quadratum.

Determinatio deducitur ex 27. VI. Eucl. Hoc autem problema generalius & facilius solum vide infra Probl. VIII.

(f) Hoc problema sic generale reddi potest. Datis Trianguli cujusvis perimetro, angulo uno ACE, & perpendicularo CD demisso ab angulo du-

10, investigare triangulum.

(g) Positis quæ hæcenus scripsit NEWTON-^{TAB. C.} nus, ab altero ignotorum angulorum A de-^{Fig. 2.} mitte in oppositum latus CB perpendicularem AE. Ad extremum datæ perimetri FG punctum F constitue angulum GFH parem dato ACB, & ex altero puncto G demitte in indefinitam FH ad rectos angulos rectam GI.

Triangulum GFI datum erit specie & magnitudine, ut jam ostendimus.

Sit $FI = g$, & $IG = f$.

Quoniam Triangulum ACE simile est ipsi GFI; erit $GF (a). FI (g) :: AC (\frac{a-x+y}{2})$.

$$CE = \frac{ag - gx + gy}{2a}$$

(b) Jam ex natura Trianguli oxygonii est $BA^2 = AC^2 + CB^2 - 2BC.CE$; hoc est $xx = \frac{aa - 2ax + 2ay + xx - 2xy + yy}{4}$

$$+ aa - 2ax - 2ay + xx + 2xy + yy -$$

$$\frac{4}{4}$$

$$\frac{aa + agx - agy + agx - gxx + gxy}{2a}$$

$$+ agy - gxy + gyy$$

$$\frac{2a}{2a}$$

nempe, demtis fractionibus,

$$4axx = 2a^2 - 4aax + 2axx + 2ayy -$$

$$2aag + 4agx - 2gxx + 2gyy;$$

scu, æquatione ordinata.

$$+ a \quad xx \quad + 2aa \quad x \quad + aag \quad = \quad yy^2$$

$$\frac{+ g \quad xx \quad + 2ag \quad x \quad + a^2}{4 + g}$$

DC, (i) hoc est $bx = \frac{aa - 2ax + xx - yy}{4}$. Per priorem æquationem est $yy = xx + 2ax - aa$. Per posteriorem $yy = xx - 2ax + aa - 4bx$. Adeoque (k) $xx + 2ax - aa = xx - 2ax + aa - 4bx$. Et per reductionem $4ax + 4bx = 2aa$; five $x = \frac{aa}{2a + 2b}$.

Geome-

(i) Triangula CDB, AEB, habentia angulum B communiem, similia sunt. Igitur BC

$(\frac{a-x-y}{2})$. CD (b) :: BA (x). AE

$= \frac{2bx}{a-x-y}$. Sed, quia FG (a). GI (f) ::

CA $(\frac{a-x+y}{2})$. AE; est AE $= \frac{af-fx+fy}{2a}$;

igitur $\frac{af-fx+fy}{2a} = \frac{2bx}{a-x-y}$; qua-

propter, sublatis fractionibus,

$aa - af - fx + fy - af + fx - fxy - afy$

$+ fxy - fyy = 4abx$;

&

$xx = \frac{4abx}{2af} + aaf = yy$.

(k) Adeoque $\frac{axx + gxx + 2ax - 2agx}{a+g}$

$= \frac{fxx - 2afx - abx + 2af}{f}$;

&, sublatis fractionibus $afxx + gxxx +$

$2aafx - 2afgx + aafg - a'f = afxx +$

$gfxx - 2aafx - 2afgx - 4abx - 4abgx + a'f$

$+ aafg$; seu, deletis delendis & ordinata

æquatione, $4aafx + 4aabx + 4abgx = 2a'f$

& $x = \frac{aaf}{2af + 2ab + 2bg}$.

Si vero angulus ABC fieret obtusus, g evaderet

quantitas negativa, & foret

$x = \frac{aaf}{2af + 2ab - 2bg}$.

Si denique angulus C esset rectus, fieret

$g = 0$, & $f = a$; unde $x = \frac{aa}{2a + 2b}$.

CONSTRUCTIO GEOMETRICA.

Ex GF abscinde FK $= b$; & ex K duc KL ipsi GI parallelam. Cum sit GF (a). FI

(g) :: KF (b). FL, erit FL $= \frac{bg}{a}$. Produc

GI in M, ita ut IM æquet FK; & erit GM $= f + b$.

Nunc, quando angulus datus est acutus, iterum produc GM in N, ita ut MN æquet

FL. Habebis GN $= f + b + \frac{bg}{a}$. Bisceta GF

in O junge NO cui per I duc parallelam IP; erit GP

baſis quaerita. Est enim NG $(f + b + \frac{bg}{a})$. GO $(\frac{a}{2})$:: IG (f). GP

$= \frac{aa'}{2af + 2ab + 2bg} = x$.

Sed quando datus angulus est obtusus, ex GM deme MN, & cetera fac ut supra.

Demum, quando rectus est angulus datus, quare quartam post $a + b$; $\frac{a}{2}$; a.

Inventa basi facile describitur triangulum; cujus perpendicularum datur cum angulo basi opposito.

Super basi AB describe per Eucl. 33. III. arcum dati anguli capacem AECD; ad alteram baseos extremitatem A educ ad rectos angulos dato trianguli perpendicularum parem AE, & per E age basi parallelam ED circulo occurrentem in punctis D & d, & junge AD, CB: dico factum.

Triangulum hoc habet angulum petitum & perpendicularum datum, ex constructione; illud vero habere etiam datam perimetrum facile probabis retro legens vestigia analyſeos.

DETERMINATIO.

Quoniam vero oportet ut parallela ED circulo occurrat: occurrere autem potest vel in duobus punctis, vel in uno, vel nusquam; atque quando in uno occurrit, tangens est; sit ea tangens in C. Æquales erunt anguli alteri GCA, CAB; sed æquales quoque sunt anguli GCA, ABC (Eucl. 32. III). Ergo æqua-

Geometrice sic. In omni triangulo rectangulo, ut est summa perimetri & perpendiculari ad perimetrum, ita dimidium perimetri ad basem.

Aufer $2x$ de a , & restabit $\frac{ab}{a+b}$ excessus laterum super basem. Unde rursus.

Ut

les sunt anguli CAB, ABC, & triangulum ACB est isosceles.

Nunc produc BC donec perpendiculari AG occurrat in F. Angulus LCB æqualis est angulo CAB; & angulus GCA æqualis angulo ABC (Eucl. 32. III.), æquales autem sunt anguli ABC; CBA ex ostensis, & anguli LCB; GCF (Eucl. 15. I.) ergo & anguli ACG; GCF ut & rectæ AC, CF, quare recta BF æquat rectas BC, CA. Igitur circulus centro C, radio CF descriptus transibit per puncta A, & B.

Jam produc BD donec circulo FEAB occurrat in E; & junge EA. Angulus AEB æquat angulum AFB (Eucl. 21. III.) & angulus exterior ADB æquat angulum exteriorem ACB eadem de causa. Ergo angulus EAD æquat angulum AED, recta ED rectam DA, & recta BE inflexam BDA. Sed est BF major quam BE (Eucl. 25. III.) ergo rectæ BC; CA majores sunt ipsis BD; DA.

Igitur, si dimidiata summa laterum superet latus trianguli isosceles super datam basim in dato segmento inscripti, problema est impossibile; si æquet, problema est constructum; si ab eo superetur, problema est possibile, & constructur ut supra.

Brevius analysi geometrica. Sit AB data perimenter; C datus angulus; DE datum perpendicularum. Pura factum; & trianguli AGF angulus F æquet datum C; perpendicularis FH datam rectam DE, & perimenter AGFA, rectam datam AB. Ergo GB æquabit latera GF; FA, simul; & quadratum ex GB erit æquale quadrato ex GF & FA (lateribus angulum datum constituentibus) tanquam ex una recta. Quare, si ponatur IG æqualis GA, rectangulum ABI erit excessus quadrati ex GB (vel ex GF; FA tanquam ex una recta) supra quadratum ex AG (Eucl. 6. II.): datur ergo ratio rectanguli ABI ad triangulum AFG (67. Dat.); id est ad dimidiatum rectangulum sub AG; FH (Eucl. 47. I.); & ratio dimidiati rectanguli

sub AG; FH ad rectangulum sub AI; FH (duplum rectanguli sub AG; FH (Eucl. 1. VI.) atque ideo quadruplum rectanguli dimidiati sub AG; FH). Ergo datur ratio rectanguli ABI ad rectangulum sub AI; FH (8. Dat.). Datur autem datatum AB; FH ratio (1. Dat.); datur igitur & BI ad IA ratio (68. Dat.). Sed harum summa AB datur; quare & utraque (7. Dat.). Ergo & AG. (7. Dat.)

Inventa autem AG, cum detur ratio rectanguli sub AF; FG ad datum rectangulum sub AG; FH (66. Dat.), dabitur rectangulum sub AF; FG (2. Dat.). Datur autem illarum summa GB; quare & utraque (7. Dat.)

Componetur autem sic. Produc anguli dati C crus alterum CK ad arbitrium in K, ut fiat angulus dato deinceps; pone CL æqualem, CK; junge KL; post CK; KL quare per Eucl. 11. VI. tertiam proportionalem LM. A puncto L in subjectam KC age per Eucl. 12. I. perpendicularem LN. Post datas DE; AB; LN quare per Eucl. 12. VI. quartam LO, ejus duplam pone LP, & per 10. VI. Eucl. a puncto B feci rectam BA in I ut MP secta est in L. Bifeca AI in G, erit AG basis trianguli quaesiti. Post datas NL; LC; AG quare quartam proportionalem GQ. Tandem ad datam GB applica per 28. VI. Eucl., datum rectangulum sub GQ; DE, deficiens quadrato, & sit BR altitudo applicationis; erit BR latus unum; RG latus alterum trianguli quaesiti; quod describes per 22. I. Eucl.

Produc enim trianguli descripti latus alterum AF in S donec FS æquet FG; & a puncto A in FG demitte perpendicularem AT, & FH ex F perpendicularem in AG

Jam per constructionem perimenter trianguli AGF æquat datam rectam AB. Nunc autem fecimus AB ad DE ut LO ad LN; & BI ad IA ut ML ad bis OL, vel BI ad AG ut ML ad OL; ergo, per compositionem rationum, rectangulum ABI (excessus quadrati ex AF; FG tanquam ex una recta vel ex GB supra

supra

In omni triangulo rectangulo, ut summa perimetri & perpendiculari ad perimetrum, ita perpendicularum ad excessum laterum super basem.

PROB. V. (1)

Datis trianguli rectanguli basi AB, & summa perpendiculari & laterum CA+CB+CD, invenire triangulum.

Tab. II. XXXII. **E**sto $CA + CB + CD = a$, $AB = b$, $CD = x$, & erit
Fig. 10. $AC + CB = a - x$. Pone $AC - CB = y$, & erit
 $AC =$

supra quadratum ex GA ad rectangulum sub DE; AG, ut ML ad LN; est autem rectangulum sub DE; AG ad rectangulum sub GQ; DE, vel ad æquale rectangulum sub AF; FG, ut NL ad LC (per constr.) ergo ex æquo ordinate, rectangulum ABI ad rectangulum sub AF; FG, ut ML ad LC, ut quadratum ex KL ad quadratum ex LC (Eucl. cor. 2. prop. 20. VI.); & est ABI rectangulum ad rectangulum sub AF; FG ut quadratum ex GS ad quadratum ex FS (ex 67. Dat.). Est ergo quadratum ex KL ad quadratum ex LC ut quadratum ex GS ad quadratum ex SF, & ipsæ rectæ KL; LC; GS; SF proportionales sunt (Eucl. 22. VI.); & triangula isosceles LCK; GFS similia sunt (Eucl. 5. VI.); angulus LCK est æqualis angulo GFS; ideo reliquis GFA æqualis est dato angulo C. Quod erit unum.

Nunc ob similia triangula rectangula FAT; CLN, est TA ad AF ut NL ad LC ut rectangulum sub TA; FG ad rectangulum sub AF; FG (1. VI. Eucl.) ut AG ad GQ (per constr.) ut rectangulum sub AG; DE ad rectangulum sub GQ; DE, vel ad ei æquale rectangulum sub AF; FG; ergo rectangulum sub TA; GF (duplum triangulum AFG (Eucl. 41. I.) & ideo æquale rectangulo sub AG; FH) æquat rectangulum sub AG; DE, & ipsa FH ipsam DE. Quod erat alterum.

Determinatio pro lateribus deducitur ex 27. VI. Eucl.

Ubi vero triangulum AFG est rectangulum, ABI rectangulum æquale est bis rectangulo sub AF; FG, id est bis rectangulo sub AG; FH, vel rectangulo sub AI; FH; datur autem ratio AB ad FH, ergo & ratio BI ad IA & Compositio est manifesta, AB est ad FH ut AI ad IB (Eucl. 16. VI.)

Cum sit perimenter ad perpendicularum, ut dupla basis ad reliquam perimetrum, erit summa perimetri & perpendiculari ad perimetrum ut perimenter ad duplam basem; & bisecando duos ultimos terminos, inveniemus primum theorema *Newtonianum*.

Quoniam summa perpendiculari & perimetri ad perimetrum ut est perimenter ad duplam basem; erit per 19. V. Eucl. summa perpendiculari & perimetri ad perimetrum ut perpendicularum ad perimetrum dupla basi multatam. Sed perimenter æquat basim & latera simul sumpta, ergo perimenter multata duplo basios est æqualis excessui laterum supra basim. Quod est secundum *Newtoni* theorema.

(1) *Sequens problema, cum sit quadraticum, admonet, ut jam tradam harum problematum constructionem.*

34. Horum problematum æquationes, ut dictum est, his continentur formulis (Art. IX. & X. Sect. II.)

$$\begin{aligned} 1^{\circ}. & \quad xx - ax - bc = 0. \\ 2^{\circ}. & \quad xx + ax - bc = 0. \\ 3^{\circ}. & \quad xx - ax + bc = 0. \\ 4^{\circ}. & \quad xx + ax + bc = 0. \end{aligned}$$

Jam 1^o, $x = \frac{a}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{aa}{4} + bc\right)}$; ubi $\sqrt{\left(\frac{aa}{4} + bc\right)}$ est major quam $\frac{a}{2}$, quia $\frac{aa}{4} + bc$ est major $\frac{aa}{4}$; ergo si radix sit positiva, positivus erit valor x , sin vero, negativus; quod etiam liquet in secunda formula, $x = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{aa}{4} + bc\right)}$, sed tertia dat $x = \frac{a}{2} \pm$

$\sqrt{\frac{aa}{4} - bc}$, hic $\sqrt{\frac{aa}{4} - bc}$ minor est

quam $\frac{a}{2}$; habebit ergo x duos valores positivos. Quarta autem est $x = -\frac{a}{2} \pm$

$\sqrt{\frac{aa}{4} - bc}$, & x habet duos valores negativos.

Hæ formulæ construi possunt per 28 & 29. VI. EUCL. Sed has constructiones addere libet.

35. In duabus primis formulis semper possibilis est valor ipsius x : in duabus ultimis autem is esse potest impossibilis, quod accidit ubi bc major $\frac{aa}{4}$, nam tunc $\sqrt{\frac{aa}{4} - bc}$ est imaginaria.

Prima & secunda resolvuntur in hanc $xx \pm ax = bc$, unde sequens analogia $b.x :: x \pm a.c$. quo posito.

Describatur quivis circulus, cujus diameter non minor sit quam a , nec quam $b - c$ (posito b majore quam c), ex cuius puncto quovis A inscribantur chordæ $AD = b - c$, $AB = a$, & producta AD in F , ut $DF = c$, describatur per F circulus priori concentricus, cui donec occurrant in punctis E, H, G ; producantur chordæ AB, AD .

Jam si ex communi centro C demittatur CL perpendicularis in AD , erit $EL = LF$, & $AL = LD$ (EUCL. 3. III.) quare $AE = FD = c$, & eadem de causa $AG = BH$.

Sed $AF = FD + AD = c + b - c = b$, & $AH = AB + BH = AB + AG = a + AG$, & (EUCL. 3. III.) est $AF.AE = AG.AH$, id est $bc = (a + AG)AG = (a + x)x$, (in formula $xx + ax = bc$); ergo $a + AG, x :: a + x, AG$, & componendo $a + AG + x, x :: a + x + AG, AG$, & alternando $a + AG + x, a + x + AG :: x, AG$; sed duo primi termini sunt æquales, ergo & $x = AG$.

36. Ast ubi $bc = xx - ax$, est $(a + AG)AG = (x - a)x$, & $a + AG, x :: a :: x, AG$, & componendo $AG + x, x :: a :: x + AG, AG$, vel alternando $AG + x, x + AG :: x - a, AG$, quare $x - a = AG$, & $x = a + AG = AH$.

37. Si $b = c$, aut ultimus formulæ terminus, quadratum, tunc $AD = 0$, & duobus punctis A, D , coincidentibus, describi deberet circulus rectam EF , in A tangens radio non minori quam $\frac{a}{2}$, & cetera ut supra.

Sed tunc est etiam alia constructio simplicior.

Nam sit circuli ABA radius $= \frac{a}{2}$, tangens TAB. D. Fig. 2.

$AE = b$ & ex E ducatur $EMCN$ per centrum, erit $NM = a$, & (EUCL. 3. III. 13. VI.) $NE (a + ME).AE :: AE.EM$; quare $AE^2 (bb) = (a + ME)ME = xx + ax$; unde $a + ME, x :: a + x, ME$; & insilendo superioris ratiocinii vestigii, invenitur $ME = x$, & ubi $xx - ax = bb$, $x = NE$ valor positivus.

38. Nunc dico in prima formula negativum esse $AH = -x$.

Tunc enim $xx + ax$ fiet $= -x(-a - x)$, unde oriretur analogia $a + AG, -x :: -a - x, AG$; sed $a + AG = AH + AG = H - a$ ergo $AH, -x :: -a - x, AH - a$, & alternando $AH, -a - x :: -x, AH - a$, & componendo $AH - a - x, a - x, a - x :: -x + AH - a, AH - a$, & rursus alternando $AH - a - x, x + AH - a :: -a - x, AH - a$; sed duo primi termini sunt æquales; ergo $-a - x = AH - a$, & $-x = AH$, quæ recta est ideo valor negativus ipsius ignotæ.

39. Sed in secunda formula $xx - ax = -x(-x + a)$; tunc ergo $a + AG, -x + a :: -x, AG$, & alternando $a + AG, -x :: -x + a, AG$; & componendo $a + AG - x, x :: -x + a + AG, AG$; ergo tunc $AG = -x$.

40. Veniamus ad duas ultimas formulas $xx - ax + bc = 0$, & $xx + ax + bc = 0$, ergo $bc = -xx \pm ax$, unde nascitur analogia $b, \pm a - x :: x, c$.

Describatur circulus ABD cujus diameter TAB. D. non superetur nec ab a , neque $a + b + c$, & ex Fig. 3. quovis peripheriæ puncto A inscribantur chordæ $AB = a$, $AD = b + c$, tunc sumta $DF = c$, eodem centro C , & radio CF describatur circulus $FEGH$. Hic aut incidat chordam AB in duobus punctis, aut in uno, aut nusquam.

Secet eam in duobus punctis G, H ; dico $AG, & AH$ esse duos valores positivos ipsius x . Nam, ut supra monstratum est, $AE = FD$, unde $AF = AD - DF = b$, & $AG = HB$, quare $AH = AB - BH = a - BH$. Sed $AF.AE (bc) = AH.AG = (a - BH)BH = -xx \pm ax$, ergo (si sumatur $ax - xx) a - BH, x :: a - x, BH$, & dividendo $a - BH, x :: a - x - BH, BH$, atque ideo $x = BH = AG$.

41. Rursus quia $BH = AG = AB - AH = a - AH$, est $AH, x :: a - x, a - AH$, & alternando $AH, a - x :: x, a - AH$, & X_2 di

$AC = \frac{a-x+y}{2}$, & $CB = \frac{a-x-y}{2}$. (m) Est autem $ACq + CBq$
 $= ABq$, hoc est $\frac{aa - 2ax + xx + yy}{2} = bb$. Est & $AC \cdot CB = AB \cdot CD$,
 hoc est $\frac{aa - 2ax + xx - yy}{4} = bx$. (n) Quibus comparatis fit (o) $2bb$

dividendo $AH = a + x$, $a - x$; $x - a$
 $+ AH = a$ AH ; ergo $a - x = a - AH$,
 & $-x = AH$, ac $x = -AH$.

42. Si vero fit $-ax - xx$, dico esse AH ,
 & AG duos valores negativos ipsius x . Nam
 erit $a - BH = x$; $x = +a + x$. BH , & *al-*
ternando $a - BH = +a + x$; $x = -x$. BH ,
 & *dividendo* $-BH = x$. $+a + x$; $-x$
 $-BH = BH$; ergo $+a + x = +BH$, &
 $-x = -BH + a = AH$. Item $BH = AG$
 $= a - AH$, ergo $+AH = x$; $x = +a + x$.
 $a - AH$, & *dividendo* $+x + AH = x$;
 $AH + x = a - AH$, quam ob rem $-x = a$
 $-AH = AB = AH = BH = AG$.

43. Si circulus $EFHG$ secat rectam AB in
 uno puncto æquales fient duo valores ipsius x .

44. Si vero nusquam eam secat, problema
 est impossibile.

TAB. C. (m) Si vero angulus ACB esset non rectus,
 sed datus, a vertice alterius angulorum non
 datorum CAB demitte in latus oppositum CB
 ad rectos angulos rectam AE . Triangulum
 ACE datum erit specie, & dabitur ratio la-
 terum AC , CE , EA ; ut jam demonstravi-
 mus.

Sit igitur $a : g :: AC \left(\frac{a-x+y}{2} \right) : CE$, &
 $CE = \frac{ag - gx + gy}{2a}$. Est autem $AC^2 + BC^2$
 $= AB^2 + 2BC \cdot CE$; hoc est
 $\frac{aa - 2ax + 2ay + xx - 2xy + yy + aa - 2ax - 2ay + xx + 2xy + yy}{4}$
 $= bb + \frac{aag - agx + agy + gxx - gxy - agx - agy + gxy - gyy}{2a}$;
 nempe deletis delendis,
 $\frac{aa - 2ax + xx + yy}{2}$

$= bb + \frac{aag - 2agx + gxx - gyy}{2a}$,

& sublati fractionibus

$a^2 - 2aax + axx + ayy = 2abb$
 $+ aag - 2agx + gxx - gyy$;

unde eruitur

$yy = \frac{-axx + gxx + 2aax - 2agx}{a+g}$
 $= \frac{a^2 + 2ab^2 + a^2g}{a+g}$.

(n) Est & Triangulum BCD simile Trian-
 gulo BAE , quapropter $BC \left(\frac{a-x-y}{2} \right) =$

$CD (x) :: BA (b) : AE$; quocirca $AE =$
 $\frac{2bx}{a-x-y}$; sed ob datam rationem CA

ad AE , sit $a : f :: CA \left(\frac{a-x+y}{2a} \right) : AE$,

& erit $AE = \frac{af - fx + fy}{2a}$.

Igitur $\frac{2bx}{a-x-y} = \frac{af - fx + fy}{2a}$.

aut sublati fractionibus,

$4abx = aaf - afx + afy - afx$
 $+ fxx - fxy - afy + fxy - fyy$.

seu, deletis delendis,

$4abx = aaf - 2afx + fxx - fyy$; aut

$yy = \frac{fxx - 2afx - 4abx + aaf}{f}$.

(o) Quibus comparatis fit

$\frac{-axx + gxx + 2aax - 2agx}{a+g}$

$= \frac{a^2 + 2abb + aag}{a+g}$

$\frac{fxx - 2afx - 4abx + aaf}{f}$;

seu sublati fractionibus, deletis delendis, or-
 dinando, & cuncta dividendo per $2af$,

$$xx = 2ax + \frac{2abx + 2bgx}{f} - aa + bb;$$

$$\text{hinc } x = a + \frac{ab + bg}{f} - \sqrt{\left(aa + \frac{2aa + 2abg}{f} + \frac{aabb + 2abbg + bb^2}{ff} - aa + bb \right)}$$

quæ quantitas radicalis, deletis contrariis, & cuncta redigendo ad eandem denominationem, fit

$$\sqrt{\left(\frac{2aabf + 2abgf + aabb + 2abbg}{ff} + \frac{bb^2g + bbff}{ff} \right)}$$

sed $gg + ff = aa$; ergo ea evadit

$$\sqrt{\left(\frac{2aabf + 2abgf + 2aabb + 2abbg}{ff} \right)}$$

Si angulus ACB esset obtusus, mutando signum ipsius g , habermus

$$x = a + \frac{ab - bg}{f} + \sqrt{\left(\frac{2aabf - 2abgf + 2aabb - 2abbg}{ff} \right)}$$

Si vero angulus ACB esset rectus, tunc $g = 0$, & $f = a$; quapropter $x = a + b = \sqrt{2ab + 2bb}$. Profrus ut NEWTONUS.

Sed, antequam ad constructionem transimus, cur hic perpendicularis duos habet valores, & quis eligendus est?

Responsum ad questionem secundam facile est. Perpendicularis minor est uno latere, fortius tota perimetro aucta ipsa perpendiculari $(a + b)$ quare ab ipsa $a + b$ demi debet $\sqrt{2ab + 2bb}$ ut habeatur petita perpendicularis; cujus valor erit positivus, ut esse debet, quia $a + b = \sqrt{2ab + 2bb} :: \sqrt{2ab + 2bb} = 2b$; sed, cum a major sit quam b , est $a + b$ major quam $2b$, ergo etiam quam $\sqrt{2ab + 2bb}$; ob naturam proportionis continuæ. Hoc verum esse in æquatione nostra, quanquam magis composita, sponte pater, quoniam quantitas radicalis est radix ex quadrato quantitatis extra signum, minuto quantitate positiva $aa - bb$.

Difficilius videtur respondere quæstioni primæ, præsertim cum x , exprimens hic perpendicularum, duos valores diversos habere non possit, & eisdem valor secundus major sit quam tota perimeter aucta perpendicularo, nedum solo perpendicularo.

Sed, animadvertendum est, quod si data

rum alterutra a aut b , ita posset exponere aliquid aliud quam quod exponere posuimus, ut salva maneret relatio inter x perpendicularum, b basim, & a indicantem aliquid a summa laterum & perpendiculari diversum, valor ipsius x unici duobus diversis modis posset exprimi.

Hoc ajo nunc accidere. Et revera, sit non $CD + CA + CB = a$, sed $CD - CA - CB = a$; erit $CD - a = x - a = CD + CB$; quapropter $AC = \frac{x - a + y}{2}$; $CB = \frac{x - a - y}{2}$.

His positis lege vestigia rationum superius expositi, & invenies eandem æquationem finalem.

Tunc autem a est quantitas negativa, siquidem $DC + CA$ certe superat CD ; pro ea pone $-c$ & æquatio pro angulo recto fiet $x = -c + b \pm \sqrt{-2bc + 2bb}$; ubi patet quod perpendicularum debet esse $-c + b + \sqrt{-2bc + 2bb}$, & quod problema esset impossibile si c esset major quam b .

CONSTRUCTIO GEOMETRICA.

Sit $GF = a$; $FI = g$; $IG = f$; produc GF in K ita ut sit $FK = IF$, eritque GK = $a + g$. Ex IG absconde GL = b ; biseca IG in N & junge NK, cui parallelam per L duc

LM; eritque $NG = \left(\frac{f}{2}\right)$. GK $(a + g) :: LG$

$$(b). GM = \frac{2ab + 2bg}{f}$$

Item produc GF in O, ut sit $OF = FG$, & in P ut sit $PG = GM$, & erit $OP = 2a + \frac{2ab + 2bg}{f}$. Quovis centro describe

quemvis circulum transeuntem per P & O, cui a puncto P inscribe chordam $PQ = 2a = GO$; hanc biseca in R, & absconde RS = b , demum priore centro describe circulum transeuntem per S, qui occurret rectæ PO in T & V, & rectæ PQ iterum in Z. Dico rectam $PT = x$.

Nam est $PS = a - b$; & $PZ = a + b$. Sed $TP \cdot PV = ZP \cdot PS$; ergo $PT = \frac{2ab + 2bg}{f} - PT = aa - bb$; sed erat $x(2a + \frac{2ab + 2bg}{f} - x) = aa - bb$ ergo &c.

Hæc quidem pro angulo acuto, sed pro obtuso ex GF absconde $Fk = g$ ut sit $Gk = g - b$, & cetera perage ut supra.

Quando angulus est reus, brevior & fa- TAB. D. cilior est constructio. Sit $AD = 2a + 2b$. Fig. 3.

Quovis centro C describe circulum transeuntem per A & D, & in eo inscribe rectam AB = $2a$,

— $aa + 2ax - xx = yy = aa - 2ax + xx = 4bx$. Et per reductionem $xx = 2ax + 2bx - aa + bb$, & $x = a + b - \sqrt{2ab + 2bb}$.

Geometrice sic. In omni triangulo rectangulo de summa perimetri & perpendiculari aufer mediam proportionalem inter eandem summam & duplura basis, & restabit perpendicularum. (*p*)

Idem aliter.

Sit $CA + CB + CD = a$, $AB = b$, & $AC = x$, & erit $BC = \sqrt{bb - xx}$, $CD = \frac{x\sqrt{bb - xx}}{b}$. (*q*) Et $x + CB + CD = a$,

sive $CB + CD = a - x$, atque adeo $\frac{b+x}{b}\sqrt{bb - xx} = a - x$. (*r*)

Et quadratis partibus atque multiplicatis per bb , fiet

$$-x^4 - 2bx^3 + 2b^2x + b^4 = aabb - 2abbx + b^2xx.$$

Qua æquatione per transpositionem partium ad hunc modum ordinata

$$x^4 + 2bx^3 + 2ab^2xx + 2abb^2x + 2ab^3 = aabb + b^4$$

$2bb$

$= 2a$, eam biseca in R, & absconde RG $= b$, deinde eodem centro C, radio CG describe circumlocum occurrentem AD in E & F & AB rursum in H; erit AE $= x$ quaesita. Quod demonstrabis ut supra.

& data erit summa laterum FH: sed datur tota EF ex hypothesi, ergo & reliqua EH, id est perpendicularum.

Componetur autem sic.

Pro angulo recto aliter & brevius, analysis geometrica.

Quære mediam inter aggregatum ex perimetro, & perpendicularo; ac duplam basim; erit hæc perimeter, quam deme ex aggregato perimetri & perpendiculari, restabit perpendicularum, data autem basi, & normali facile describitur triangulum rectangulum.

Ex hac solutione fuit *Newtonianum* theoremata.

(*q*) Est enim $AB(b)$, $AC(x) :: BC(\sqrt{bb - xx}) :: CD$ (Eucl. 8. VI.).

(*r*) Item quia $AB(b)$, $AC(x) :: BC(\sqrt{bb - xx}) :: CD$, erit *invertendo & componendo* $x + b.b :: DC + CB.\sqrt{bb - xx}$; ergo $DC + CB(a - x) = \frac{(x + b)(\sqrt{bb - xx})}{b}$,

TAB. D.
Fig. 5.

(*p*) Sit quaesitum triangulum rectangulum ACB, ejus basis data AB, recta EF æqualis summæ laterum AC, CB, & perpendiculari CD, huic adde in directum FG æqualem basi, erit EG summa perimetri & perpendiculari, pone EH æqualem perpendicularo, & GH erit erit perimeter, sed EG est ad GH, ut dimidia GH ad GF (*supra* Prob. IV.) sive *invertendo & alternando* GF ad GH, ut dimidia GH ad EG, ergo (Eucl. 3. V.) dupla GF ad GH, ut GH ad EG; atqui data est datarum extremarum ratio, (1. *datior*.) ergo datur ratio primæ ad secundam, (2. *datior*.) quare secunda, (id est perimeter) magnitudine datur (2. *datior*.); ex qua deme datam basim GF,

$$+ \frac{2bb}{2ab} xx + \frac{4b^3}{4abb} x + \frac{2b^4}{2ab^3} (s),$$

& extracta radice, orietur

$$xx + bx + bb + ab = (x + b) \sqrt{2ab + 2bb}.$$

Et extracta iterum radice (r)

$$x = -\frac{1}{2}b + \sqrt{\left(\frac{1}{2}bb + \frac{1}{2}ab\right) \pm \sqrt{b\sqrt{\left(\frac{1}{2}bb + \frac{1}{2}ab\right) - \frac{1}{4}bb - \frac{1}{2}ab}}).$$

Constructio Geometrica.

Cape igitur AB = $\frac{1}{2}b$, BC = $\frac{1}{2}a$, CD = $\frac{1}{2}AB$, AE mediam proportionalem inter b & AC, & EF hinc inde mediam proportionalem inter b & DE, & erunt BF, BF duo latera trianguli. (u)

TAF. II.
Fig. 2.

PROB.

(s) Etenim hæc dat
 $xx^4 + 2bx^3 + bbxx - aabb = + 2b^3 x;$

& (utrinque additis

$$+ \frac{2bb}{2ab} xx + \frac{2b^3}{2abb} x + \frac{2ab^2}{2b^4}$$

$$x^4 + 2bx^3 + \frac{3bb}{2ab} xx + \frac{2b^3}{2abb} x + \frac{2ab^2}{2b^4}$$

$$= + \frac{2bb}{2ab} xx + \frac{4b^3}{4abb} x + \frac{2b^4}{2ab^3}$$

Regulæ, quibus inveniri possint quantitates in similibus casibus addendæ, tradentur infra.

(r) Licet hæc possint iisdem symbolis servatis explicare, tamen præstat simpliciores litteras adhibere. Fac ergo $2ab + 2bb = cc$, aut

$$ab + bb = \frac{cc}{2}, \text{ \& } \sqrt{2ab + 2bb} = c; \text{ unde}$$

$$\text{de superior æquatio fiet } xx + bx + \frac{cc}{2} = cx$$

$$+ bc, \text{ sive } xx = cx - bx + bc - \frac{cc}{2}, \text{ \&}$$

$$x = \frac{c-b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{cc - 2bc + bb}{4} + bc - \frac{cc}{4}\right)}$$

$$= \frac{c-b}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{bb + 2bc - cc}, \text{ \& restitutus}$$

$$\text{prioribus notis } x = -\frac{1}{2}b + \frac{1}{2} \sqrt{2ab}$$

$$+ 2bb) \pm \frac{1}{2} \sqrt{(-2ab + 2b\sqrt{2ab + 2bb})$$

$$- bb) = -\frac{1}{2}b + \sqrt{\left(\frac{1}{2}bb + \frac{1}{2}ab\right) \pm$$

$$\sqrt{b\sqrt{\left(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb\right) - \frac{1}{4}bb - \frac{1}{2}ab}}).$$

Ubi nota quod, quia duo latera trianguli semper tertio majora sunt, erunt a fortiori duo latera & normalis simul tertio majora, id est, a major quam b; quare rectangulum ab majus quam bb; & 2ab + 2bb, quam 4bb (= 2bb + 2bb), & idcirco cc majus quam 4bb; aut $\frac{c}{2}$ quam b; vel $\frac{cc}{2}$, quam bc; est ergo

bc — $\frac{cc}{2}$ quantitas negativa; hanc pone =

— ff; at est positiva c — b, quam fac

= 2g, & fiet xx = 2gx — ff, vel xx — 2gx

+ ff = 0; tertia formula No. 34, hujus, in qua x duos habet valores positivos.

(u) Quamvis hoc problema jam construxerimus, tamen explicanda est Auctoris constructio.

$$AB = \frac{b}{2}, BC = \frac{a}{2}; \text{ ergo } AC = \frac{a+b}{2};$$

$$AE \text{ (cum sit media inter } b, \text{ \& } AC = \frac{a+b}{2})$$

$$\text{erit } \sqrt{\left(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb\right)}, \text{ \& } BD (= BC - CD)$$

$$= \frac{1}{2}a - \frac{1}{4}b, \text{ ac } AD (= AC - CD)$$

PROB. VI.

Datis in triangulo rectangulo ABC summa laterum AC + BC, & perpendicularo CD invenire triangulum.

TAB. II.
Fig. 10.

XXXIII. **S**it $AC + BC = a$, $CD = b$, $AC = x$, & erit $BC = a - x$, $(x) AB = \sqrt{(aa - 2ax + 2xx)}$. Est & $CD.AC :: BC.AB.(y)$ Ergo rursus $AB = \frac{ax - xx}{b}$. Quare $ax - xx =$

$= \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}a - \frac{1}{4}b = \frac{1}{4}b + \frac{1}{2}a$: sed quia b est minor quam a , erit (additis utrobique æqualibus) $2b$ minor, quam $a + b$; & b , quam $\frac{a+b}{2}$; AE est igitur major quam b ,

& minor quam $\frac{a+b}{2}$; cadet ideo punctum E inter A, & C. Verum, aut cadet inter A & D, aut inter D & C. Primo, cadat inter A & D; erit hoc casu AE minor quam AD, id est, $\sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb)}$ minor quam $\frac{1}{2}a +$

$\frac{1}{4}b$, vel $b\sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb)}$ minor quam $\frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb$; adeoque $b\sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb)} - \frac{1}{2}ab -$

$\frac{1}{4}bb$ est quantitas negativa, cujus radix imaginaria, & problema impossibile. Cadat ergo punctum E inter D & C: erit tunc DE (= AE - AD) = $\sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb)}$

$- \frac{1}{2}a - \frac{1}{4}b$; quocirca EF (media inter

b & DE) = $\pm \sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb) -$

$\frac{1}{2}ab - \frac{1}{4}bb)}$; BF (= AE \pm EF - AB)

erit ideo = $\sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb)} - (b\sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb)} - \frac{1}{2}ab - \frac{1}{4}bb) - \frac{1}{2}b$.

DETERMINATIO.

Quia vero, ut problema sit possibile, oportet ut $\sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb)}$ minor non sit quam $\frac{1}{2}a + \frac{1}{4}b$; videamus quo casu sint æquales.

Si igitur $\sqrt{(\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb)} = \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}b$;

erit $\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb = \frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}ab + \frac{1}{16}bb$; vel (auferendo fractiones, & delendo æqualia)

$4ab + 7bb = 4aa$; & $b + \frac{7bb}{4a} = a$, vel $\frac{7bb}{4a} = a - b$. Summa laterum & perpen-

diculi (a) secetur in septem partes pares, & quærat tercia post quatuor ex his septimis, & hypothenusam; si hæc minor non est quam excessus summæ laterum, & perpendiculari supra basim, problema est possibile, & constructur ut supra.

Sed in hac ultima hypothesi triangulum quæsitum est isoscele, ut patet.

(x) Sed si angulus ACB rectus non esset, TAB. pone $d.g :: AC(x).CE = \frac{gx}{d}$ & $d.f ::$ Fig.

CA (x). AE = $\frac{fx}{d}$.

Eritque $AB^2 = AC^2 + CB^2 - 2BCE = 2xx + aa - 2ax - \frac{2a^2x + 2gxx}{d}$.

(y) Item DC (b). CB (a-x) :: EA ($\frac{fx}{d}$).

AB = $\frac{afx - fxx}{bd}$

cujus valoris quadratum æquatur primo, id est

$$\frac{aoffxx - 2affx^3 + ffx^4}{b^2d^2}$$

$$= 2xx + aa - 2ax - \frac{2agx + 2gxx}{d}$$

igitur (sublatis fractionibus atque ordinatis terminis)

$$\begin{aligned} &= b\sqrt{(aa - 2ax + 2xx)} \text{ \& partibus quadratis \& ordinatis, } x^4 - 2ax^3 \\ &+ \frac{aa}{2bb} xx + 2abbx - aabb = 0. \text{ Adde ad utramque partem } aabb + b^4, \end{aligned}$$

\& fiet

$$x^4 - 2ax^3 + \frac{aa}{2bb} xx + 2abbx + b^4 = aabb + b^4.$$

Et extracta utrobique radice $xx - ax - bb = \sqrt{b\sqrt{(aa + bb)}}$

\& radice iterum extracta

$$x = \frac{1}{4} a \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2} aa + bb - b\sqrt{(aa + bb)}\right)} \text{ (z).}$$

Con-

$$\begin{aligned} x^4 - 2ax^3 - \frac{2b^2d^2}{\frac{ff}{2b^2dg} x^2} + \frac{2abdd}{\frac{ff}{2abbdg} x} - \frac{aabbdd}{\frac{ff}{ff}} = 0 \end{aligned}$$

adde hinc inde

$$\frac{aabbdd}{ff} + \frac{b^4d^4}{f^4} + \frac{2b^4d^2g}{f^4} + \frac{b^4ddgg}{f^4}$$

\& invenies

$$\begin{aligned} x^4 - 2ax^3 - \frac{2b^2d^2}{\frac{ff}{2b^2dg} x^2} + \frac{2ab^2d^2}{\frac{ff}{f^2}} + \frac{b^4d^4}{\frac{f^4}{2b^4d^2g}} + \frac{b^4ddgg}{\frac{f^4}{f^4}} \\ = \frac{2b^4d^2g}{\frac{f^4}{f^4}} + \frac{b^4d^4}{\frac{f^4}{f^4}} + \frac{a^2b^2d^2}{\frac{ff}{f^4}} \end{aligned}$$

\& extracta radice

$$xx - ax - \frac{b^2d^2 - f^2dg}{ff} = \pm \frac{bd}{ff} \text{ in}$$

aut, posito $b = f$, vel sit triangulum simile ipsi AEC, quod specie datur, fiat super datum perpendiculari b tamquam dato angulo oppositum,

$$\begin{aligned} xx - ax - d^2 - dg = \pm \\ \frac{d}{b} \sqrt{(aabb + bb(d + g)^2)}. \end{aligned}$$

Sed $xx - ax - dd - dg$ est quantitas negativa; nam x est latus alterum; \& aggregatum amborum, quare a major est quam x , \& ax quam xx , \& fortius $ax + dd + dg$ superat xx . Ergo radix negative sumenda est; \& transponendo fiet.

$$d\sqrt{(aa + (d + g)^2)} - d(d + g) = x(a - x).$$

Tom. I.

CONSTRUCTIO.

(z) Same $GI \parallel b$; ei ad perpendicularum erigatur Tab. D: ge $IF = g$; erit juncta $FG = d$. Produc IF Fig. 6. quidem in K , ut FK æquet FG , \& fit $IK = d + g$, atque IG in L , ut sit $IL = a$; erit juncta $KL = \sqrt{(aa + (d + g)^2)}$. Nunc per F age super LK ad rectos angulos FM . Triangula LKI , FKM habentia angulos ad M \& I rectos, \& ad K communem, similia erunt (Eucl. 4. VI.) Quare $LK (\sqrt{(aa + (d + g)^2)})$, $KI (d + g) :: FK (d)$, \& $KM \cdot \sqrt{(aa + (d + g)^2)} = d(d + g)$. Fiet igitur ultima æquatio, positis lineis pro symbolis, $LK (FK - KM) = ax - xx$. Produc igitur MK in N ut sit $MN = FK$, \& fiet $LK \cdot KN = ax - xx$. Per tria puncta N , I , L descri-

Y

be

TAB. II.
Fig. 3.

Cape AB = BC = $\frac{1}{2}a$. Ad C erige perpendicularum CD = b . Produc
DC ad E ut fit DE = DA. Et inter CD & CE cape medium propor-
tionale CF. Centroque F, radio BC descriptus circulus GH secet rectam
BC in G & H, & erunt BG & BH latera duo trianguli.

Idem aliter.

TAB. II.
Fig. 10.

Sit AC + BC = a , AC - BC = γ , AB = x , ac DC = b .

& erit

be circulum (Eucl. 4. IV.) & per K concen-
tricum KPQ, rectæ LI concurrentem in P,
& Q, erunt LQ, LP duo valores positivi in-
cognitæ x (No. 34. hujus).

DETERMINATIO.

Quoniam autem ad constructionem requiri-
tur ut recta LI circulo KPQR occurrat, &
ultima rectarum occurrentium est tangens, quæ
a circulo concentrico bifecat, patet triangulum
isosceles esse ultimum possibilem in hypo-
thesi proposita. Nunc dico quod

Rectangulum sub PL, LQ minus est quadrato
ex dimidiata IL.

Bifecetur IL in A; erit rectangulum sub PL;
LQ una cum quadrato AQ æquale quadrato
ex AL (Eucl. 6. II.); atque ideo rectangu-
lum sub PL; QL minus quadrato ex AL.

Si ergo ab L ad circulum RQPK ducatur
tangens LS, ea erit minor quam LA; & est
media inter KL; LR (Eucl. 36. III. & 17.
VI.)

Est autem KL . LR = $d\sqrt{aa + (d + g)^2}$
— $dd - dg$, quod debet esse minus $\frac{aa}{4}$; ergo

$d\sqrt{aa + (d + g)^2}$ minus $\frac{aa}{4} + dd + dg$; &

$aadd + d^4 + 2d^2g + dgg$ minus $\frac{a^4}{16} +$

$\frac{aadd + aadd}{2} + d^4 + 2d^2g + dgg$; & $16aadd$

minus $a^4 + 8aadd + 8aaddg$, vel $8dd$ minus

$aa + 8dg$ aut $2dd - 2dg$ minus $\frac{aa}{4}$.

Igitur, proposito problemate, describe trian-
gulum GIF ut supra, e GF abscinde FT æqua-
lem FI; quære mediam inter GT & bis GF; si
hæc minor est quam LA, problema construes
ut supra; si æqualis, triangulum quæsitum est
isosceles; si major, problema est impossibile.

OBSERVATIO.








Hæc ita se habent ubi datus angulus est acu-
tus, neque aliter ubi est obtusus, nam in nul-
la æquationum supra inventarum habetur ali-
qua potestas impar ipsius f aut b , qui dati an-
guli sinus est; ideo nullius termini signum mu-
tari debet; & in ultima

$$d\sqrt{aa + (d + g)^2} - \frac{d(d + g)}{x(a - x)} =$$

quantitas radicalis debet necessario esse positiva,
quia $x(a - x)$ est quantitas positiva, ut vidi-
mus; quare & ejus valor debet esse positivus;
esset autem negativus, si quantitas radicalis ef-
fet negativa.

Sed, quando datus angulus rectus est, tunc
GF cadit in GI, quapropter IF = $g = 0$;
& FG = GL, aut $d = b$; atque ideo æquatio
finalis fit $d\sqrt{aa + bb} - bb = x(a - x)$ ut
Auctor invenit. Tunc etiam triangulum LKI
figuræ 6. fit LLK figuræ 7. & LK =
 $\sqrt{aa + bb}$; tunc igitur sufficit sumere KO
= KI, & LK bifecta in T, centro T radio
TO describere semicirculum occurrentem re-
ctæ LI in P & Q. Nam circulus centro T
radio TK descriptus transfret per I (Eucl. 3.
III.) unde probaretur, ut No. 34. hujus, LQ
= PI &c.

Sed, cum x indicare non possit nisi duo tri-
anguli latera, jure quæri potest cur prodeat
æquatio quatuor dimensionum? Id accidit quia
 a potest exprimeri tum laterum summam, ut
hactenus supposuimus; tum eorum differentiam;
ut patet ponendo AC latus majus = x ,
& BC latus minus = $x - a$; unde eadem
probit æquatio. Nos eam determinavimus
ut esset laterum summa, dum posuimus a ma-
jorem quam x . Effet autem differentia si fo-
ret minor quam x ; & tunc $xx - ax$ foret
positiva, & radix positive sumenda esset. Hinc
melius quæstio esset basis quæ quadruplicem
valorem habere non potest; quod facit New-
tonus in secunda solutione.



& erit

$$\frac{a+y}{2} = AC, \frac{a-y}{2} = BC, \frac{aa+yy}{2} = ACq + BCq = ABq = xx.$$

$$\frac{aa-yy}{4b} = \frac{AC \cdot BC}{DC} = AB = x. \text{ Ergo}$$

$2xx - aa = yy = aa - 4bx$, & $xx = aa - 2bx$, & extracta radice $x = -b + \sqrt{bb + aa}$. Unde in superiori constructione est CE hypotenusa trianguli quaesiti. Data autem basi & perpendicularo tam in hoc quam in superiore problemate, triangulum sic expedite construitur. Fac paralelogrammum CG ^{Tab. II. Fig. 4.} cuius latus CE erit basis trianguli, latus alterum CF perpendicularum. Et super CE describe semicirculum secantem latus oppositum FG in H. Age CH, EH, & erit CHE triangulum quaesitum.

P R O B. V I I.

In triangulo reſtanguſo, datis ſumma laterum, & ſumma perpendiculari & baſis invenire triangulum.

XXXIV. Sit laterum AC & BC ſumma a , baſis AB & perpendiculari ^{Tab. II. Fig. 10.} CD ſumma b , latus AC $= x$, baſis AB $= y$, & erit BC $= a - x$, CD $= b - y$, $aa - 2ax + 2xx = ACq + BCq = ABq = yy$, $ax - xx = AC \cdot CD = by - yy = by - aa + 2ax - 2xx$, & $by = aa - ax + xx$. Hujus quadratum $a^4 - 2a^3x + 3a^2xx - 2ax^3 + x^4$, pone æquale yy in bb , hoc eſt æquale $aabb - 2abbx + 2bbxx$.

Et ordinata æquatione fiet

$$x^4 - 2ax^3 + 3aa - 2a^3 \frac{xx}{2bb} + 2abbx - aabb = 0.$$

Ad utramque partem æquationis adde $b^4 - aabb$, & fiet

$$x^4 - 2ax^3 + 3aa - 2a^3 \frac{xx}{2bb} + 2abbx + b^4 - aabb = b^4 - aabb.$$

Et extracta utrobique radice

$$xx - ax + aa - bb = b\sqrt{bb - aa}.$$

& radice iterum extracta

$$x = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{bb - \frac{3}{4}aa - b\sqrt{bb - aa}} \quad (a)$$

(a) Si vero datus angulus reſtus non eſſet, ſic problema ſolvi poteſt.

Pone ſummam AC + BC $= 2a$; differen- tiam AC - BC $= 2y$; erit AC $= a + y$;

CB $= a - y$. Pariter ſit AB + CD $= 2b$; AB - DC $= 2z$; erit AB $= b + z$; DC $= b - z$.

Con.

Item

Constructio Geometrica.

Cape R mediam proportionalem inter $b + a$ & $b - a$, & S mediam

Item fac
 $d, g :: AC (a + y). CE = \frac{ag + gy}{d}$

&

$d, b :: CA (a + y). AE = \frac{ab + by}{d}$

His positis, quoniam est (Eucl. 12. II.)

$AB^2 = AC^2 + CB^2 = 2BC.CE$

erit

$bb + 2bz + zz = 2aa + 2yy - \frac{2ag + 2gy^2}{d}$

est autem quoque

$CD.AB = CB.AE = \text{bis triangulo } ABC,$

aut $bb - zz = \frac{a^2b - by^2}{d}$

ergo, addendo æqualia æqualibus,

$2bb + 2bz = 2aa + 2yy - \frac{2ag + 2gy^2}{d}$

ergo, reducendo ad eundem denominatorem &c.

$z = \frac{yy(2d + 2g - b) + aa}{2bd}$
 $(2d - 2g + b) - 2bbd$

& ex æquatione superiore invenitur

$zz = b \left(\frac{bd - aa + yy}{d} \right)$

Ergo, ponendo $2d + 2g - b = m; 2d - 2g + b = n$; erit, his valoribus substitutis, & transponendo

$z = \frac{nym + aan - 2bbd}{2bd}$

aut

$\frac{2bdz - aan + 2bbd}{m} = yy$

&

$\frac{dzz - bbd + aab}{b} = yy$ quare

pro-
 $\frac{dzz - bbd + aab}{b} = \frac{2bdz - aan + 2bbd}{m}$

aut
 $zz = \frac{2bbdz - aabn + 2b^2d^2 + bbdm - aabm}{dm}$

CONSTRUCTIO.

Cape $GI = b$; ei ad I erige perpendicularem $IF = g$; juncta FG erit $= d$. Eam pro-

Fig. $Fig.$
 duc in K ut sit $GK = 4GF = 4d$; qua bisecta in L , fac $LM = 2g - b$; qua cadet inter L & G . si b superat $2g$; secus autem inter L & K . Eritque $GM = 2d + 2g - b = m$; & $KM = 2d - 2g + b = n$. Age nunc per M . perpendicularem $MO = GI = b$; & super junctam GO ad rectos angulos educ OP; Quoniam est $GM.MO :: OM.MP$.

(Eucl. 4. & 8. VI.) erit $MP = \frac{b^2}{m}$. Fict ergo æquatio proposita.

$zz = 2MP. z + bb - \frac{aab}{dm}(m+n) + 2MP.d$

Et autem $m + n = 4d$; quare terminus $-\frac{aab}{dm}(m+n) = -\frac{4aab}{m}$. Produc MO

in Q ut sit $MQ = 2a$. Junge GQ , & ei ad rectos angulos educ QR , erit $MR = \frac{4aa}{m}$, & æquatio proposita evadet

$zz - 2MP.z = bb - b.MR + d.2MP.$

Unde eruitur $b.z :: z - 2MP.b - MR$

$+ 2MP. \frac{d}{b}$, si $2MP$ superat MR , quod accidit ubi b superat $2a$, vel MO ipsam MQ .

Si vero, ut in figura nostra, MO superatur ab MQ ; æquationis signa mutanda sunt, & fiet

$b.MR - d.2MP - bb = 2MP.z - zz.$

Tunc cape $PS = PM \frac{d}{b}$, eritque $SR = MR -$

$2MP. \frac{d}{b}$; & cetera fac ut in No. 34. hujus.

DETERMINATIO pro angulo recto.

Patet quod problema tunc fit possibile, cum bb minor est quam $\frac{3}{4}aa + b\sqrt{bb - aa}$; ubi vero hæ duæ quantitates æquantur, triangulum peutum fit isosceles. Æquantur autem, ubi

proportionalem inter R & $b - R$, & T mediam proportionalem inter $\frac{1}{2}a + S$ & $\frac{1}{2}a - S$, & erunt $\frac{1}{2}a + T$ & $\frac{1}{2}a - T$, latera trianguli.(b)

PROB. VIII.

Trianguli cujuscunque ABC, datis area, perimetro, & uno angulorum A, cetera determinare. TAB. II. Fig. 5.

XXXV. **E**sto perimter = a , & area = bb , & ab ignotorum angulorum alterutro C ad latus oppositum AB demitte perpendicularum CD; (c) & propter angulum A datum, erit AC ad CD in data ratione, puta d ad e . Dic ergo AC = x & erit CD = $\frac{ex}{d}$, per quam divide duplam aream, & prodibit $\frac{2bbd}{ex}$ = AB. Adde AD (nempe $\sqrt{ACq - CDq}$) sive $\frac{x}{d}\sqrt{dd - ee}$ (d) & emerget BD = $\frac{2bbd}{ex} + \frac{x}{d}\sqrt{dd - ee}$; cujus quadrato adde CDq & orietur $\frac{4b^4dd}{eexx} + xx + \frac{4bb}{e}\sqrt{dd - ee}$ = BCq. Adhæc a perimetrò aufer AC & AB, & restabit $a - x - \frac{2bbd}{ex}$ = BC, cujus quadratum $aa - 2ax + xx - \frac{4abbd}{ex} + \frac{4bbd}{e} + \frac{4b^4dd}{eexx}$ pone x -quale quadrato prius invento; &, neglectis æquipollentibus, erit $\frac{4bb}{e}\sqrt{dd}$

ubi $4bb - 3aa = 4b\sqrt{bb - aa}$; id est, quadrando, ubi $16b^4 - 24aabb + 9a^4 = 16b^4 - 16aabb$, vel cum $\frac{aa}{4} = \frac{2bb}{9}$: Igitur, proposito problemate, quære mediam inter duos, & unum trientem baseos & perpendiculari simul; & si hæc media major est quam dimidium datæ summx laterum, problema est impossibile; si æqualis, bifeca summam laterum, triangulum erit isosceles; si minor, construe ut supra.

(b) Tamen brevis sic res expediri poterat

EFGH, erunt BG, BF latera quæsitæ.

(c) Cum angulus BAC (quem hic ponimus obtusum) detur ex hypothesi, datur etiam angulus ei deinceps CAD, sed & angulus ad D rectus datur; datur igitur etiam angulus ACD; ergo si in figura nostra super quavis recta data EF, fiat ad E quidem angulus FEG ipsi DAC æqualis, & ad F angulus rectus (quod fieri potest per primam datorum def.), & compleatur triangulum EFG, erunt æquiangula triangula EFG, & ADC simili (Eucl. 4. VI.), & specie data (40. dat.); quin & latera ipsius EFG dantur, datur ergo ratio laterum ipsius ADC. TAB. E. Fig. 3.

(d) Dic enim EG = d , GF = e , & habebis EF = $\sqrt{dd - ee}$; ac AC ad CD ut EG ad GF.

TAB. E. Fig. 2. Sit AB = b , describe semicirculum ADB, cui ex B inscribe BD = a , est juncta AD = $\sqrt{bb - aa}$. Fiat AE = AD, centro C, radio CE describatur semicirculus

$V(dd - ee) = aa - 2ax - \frac{4abbd}{ex} + \frac{4bbd}{e}$. Et hæc, assumendo $4af$
 pro datis terminis $aa + \frac{4bbd}{e} - \frac{4bb}{e} V(dd - ee)$, & reducendo, evadit
 $xx = 2fx - \frac{2bbd}{e}$, five $x = f \pm V(ff - \frac{2bbd}{e})$.

Eadem æquatio prodiit etiam quærendo crus AB; nam crura AB & AC
 similiter se habent ad omnes conditiones problematis. Quare si AC po-
 natur $f - V(ff - \frac{2bbd}{e})$ erit AB $= f + V(ff - \frac{2bbd}{e})$, & vicissim;
 atque horum summa $2f$ subducta de perimetro relinquit tertium latus
 BC $= a - 2f$. (e)

PROB.

CONSTRUCTIO.

(e) Hanc fatis perplexam constructionem sic
 perago.

Priorem æquationem $4 \frac{bb}{e} V(dd - ee) = aa$
 $- 2ax - 4 \frac{abbd}{ex} + 4 \frac{bbd}{e}$, ducio in ex , &
 habeo $4bbx V(dd - ee) = aax - 2aexx$
 $- 4abbd + 4bbdx$; ut xx liberetur a multipli-
 cantibus, omnia divido per $2ae$ inventurus
 $2 \frac{bbx}{ae} V(dd - ee) = \frac{ax}{2} - 2 \frac{bbd}{e} + 2 \frac{bbdx}{ac} - xx$,

& transponendo $\frac{2bbd}{e} = \frac{ax}{2} + 2 \frac{bbdx}{ac} - 2 \frac{bbx}{ae}$
 $V(dd - ee) = xx$, unde oritur hæc ana-
 logia $2 \frac{bb}{e} \cdot x :: \frac{a}{2} + 2 \frac{bbd}{ae} - 2 \frac{bb}{ae} V(dd - ee)$
 $= x$. d . Jam linea quæ per $V(dd - ee)$
 designatur, inventa est, ea enim est ip-
 sa EF, ergo EF $= V(dd - ee)$ dico

$= c$, & perplexa quantitas $2 \frac{bbd}{ae} - 2 \frac{bb}{ae}$
 $V(dd - ee)$, fit $\frac{2bbd - 2bbc}{ae}$, quæ rursus
 resolvitur in hanc analogiam $\frac{a}{2} \cdot \frac{bb}{e} :: d - c$

ad quartam, quæ est ipsissima quantitas
 $\frac{2bbd - 2bbc}{ae}$, ut patet invicem ducendo me-
 dia, & ea dividendo per extremum $\frac{a}{2}$. Igi-
 tur centro E radio EF, describo arcum FH,
 occurrentem EG in H puncto; est GH $=$
 $d - c$. In GF, & in GH (productis si opus
 est) sumo ex G, hinc inde GL $=$ GM $=$ b,

jungo FM, cui parallelam duco LN, tum
 est (EUCL. 4. VI.) FG (e). GM (b) :: LG
 (b). GN $= \frac{bb}{e}$, cui æqualem capio NP.

Nunc fit GK $= \frac{a}{2}$, jungatur HK, & tran-
 feat per puncta K, H, N, circulus ipsi GL
 occurrens in Q & erit KG ($\frac{a}{2}$). GH ($d - c$)::

GN ($\frac{bb}{e}$). GQ $= \frac{2bbd - 2bbc}{ae}$, est ergo
 KQ $= \frac{a}{2} + \frac{2bbd - 2bbc}{ae}$.

Cetera ut in No. 34. hujus.

DETERMINATIO.

Fit autem impossibile hoc problema, ubi $2 \frac{bbd}{e}$

est major quam ff ; & si $2 \frac{bbd}{e} = ff$, triangu-
 lum petiturum est isosceles.

Si angulus datus esset rectus, tunc d fieret
 $= c$, & $dd - ee = 0$; atque ideo superior
 æquatio fieret $xx = \frac{ax}{2} + 2 \frac{bbx}{a} - 2bb$.

Sin acutus, normalis cadet inter puncta A
 & B; quare BD tunc esset ($=$ BA $-$ AD)
 $= 2 \frac{bd}{ex} - \frac{x}{a} V(dd - ee)$, & in æquatio-
 ne mutandum esset signum ipsius $4 \frac{bb}{e} V(dd$
 $- ee)$.

Sed problema VIII. multo facilius solvitur TAB.
analysisi geometrica. Data perimeter fit AB, da- Fig. 4
 tus

TAB. E.
 Fig. 3.

PROB. IX.

Datis altitudine, basi, & summa laterum invenire triangulum.

XXXVI. **S**it altitudo $CD = a$, basis AB dimidium $= b$, laterum $sc-$ Tab. II.
 misumma $= c$, & semidifferentia $= z$; critque majus la- Fig. 5.
 tus,

tus angulus C , & data area $DEFG$. Puta factum, & triangulum AHI sit quod petitur, & ejus angulus H æqualis dato C . Pone IK æqualem basi AI ; rectangulum ABK erit excessus quadrati ex lateribus AH ; HI tanquam ex una recta, vel ex IB , supra quadratum ex AI vel ex IK (Eucl. 6. II.) Datur ergo ratio ABK rectanguli ad triangulum AHI (67. Dat.); id est ad quadratum $DEFG$ datum per hyp. Ergo datur rectangulum ABK (2. Dat.). Sed datur AB ; quare & BK , ad datam rectam AB applicando spatium æquale dato rectangulo ABK . Igitur datur KA (4. Dat.) & AI (5. Dat.).

Jam datur ratio rectanguli sub AH ; HI ad triangulum AHI ; id est ad datum quadratum $DEFG$; quare datur rectangulum sub AH , HI (2. Dat.). Sed datur summa AH ; HI ; æqualis IB ; ergo, applicando ad datam IB spatium æquale dato rectangulo sub AH ; HI , & deficienti quadrato, dabitur BL , altitudo applicationis, & LI . (48. Dat.).

Componetur autem sic. Ex anguli, qui dato deinceps est, cruribus abscinde æquales partes MC ; CN ; junge NM ; centro N intervallo NM descriptum concipe circulum ipsi MC productæ occurrent in O ; & ex M in subjectam NC duc perpendicularem MP . Dati quadrati $DEFG$ age diagonalem DF ; & pone ut PM ad MO sic DF quadratum ad QR quadratum. Ad datam AB applica spatium æquale quadrato ex QR , & sit BK altitudo applicationis. Biseca AK in I , erit AI basis trianguli quaesiti.

Iterum pone ut PM ad MC sic DF quadratum ad ST quadratum, ad datam IB applica spatium æquale quadrato ex ST & deficienti quadrato, & sit BL altitudo applicationis; erit BL latus unum, LI latus alterum quaesiti trianguli.

Sit illud AHI , & AH sit æqualis IL ; HI æqualis LB . Jam hujus trianguli perimeter æquat datam rectam AB . Produca AH in U ut HU æquet HI , & junge IU .

Ductam intellige NO . Triangula isoscelesia NCM per constr.; & MNO , ob radios MN ;

NO æquales, communem habent angulum CMN , æqualem tum angulo MNC tum angulo MON : quare angulus ONM æqualis est angulo NCM : & est OM ad MN ut MN ad MC vel NC atque OM ad MC ut quadratum ex MN ad quadratum ex NC .

Jam est rectangulum ABK , vel æquale quadratum ex QR , ad rectangulum sub AH ; HI , vel ad æquale quadratum ex ST , ut quadratum ex IU ad quadratum ex UH (ex 67. Dat.); & per constr., est quadratum ex QR ad quadratum ex DF ut OM ad MP , & quadratum ex DF ad quadratum ST ut PM ad MC ; ergo ex æquo ordinate, quadratum ex QR ad quadratum ex ST ut OM ad MC , ut quadratum ex NM ad quadratum ex NC , ut quadratum ex IU ad quadratum ex UH ; quare & ipsæ rectæ NM ; NC ; IU ; UH , proportionales sunt; triangula isoscelesia NCM ; IHU similia; angulus IHU æqualis angulo NCM , & reliquis IHA æqualis reliquo MCP . Quod erat unum.

Nunc ex A ductam puta in HI perpendicularem AX ; triangula CMP : HAX similia sunt, & HA ad AX (vel rectangulum sub HA ; HI ad rectangulum sub AX ; HI ; id est ad duplum rectangulum AHI) ut CM ad MP , ut quadratum ex ST ad quadratum ex DF per constr.; sed, per constr., quadratum ex ST æquale est rectangulo sub HA ; HI ; ergo duplum triangulum AHI æquale est quadrato ex DF ; & triangulum illud quadrato ex DE . Quod erat alterum.

Determinatio pro basi & pro lateribus deducitur ex 27. VI. Eucl.

45. Diximus ponendum ut recta ad rectam ita quadratum ad quadratum, quod fieri potest quaerendo mediam proportionalem inter datas rectas, & deinde quartam proportionalem post primam datarum, mediam, & latus dati quadrati: vel etiam sic.

Sint duæ datæ rectæ AB ; BC ; ex AC diametro describere semicirculum, cui in D occurrat perpendicularis excitata a puncto B super AC ; junge AD ; DC , erit angulus ADC rectus (31. III. Eucl.). Ex DA abscinde DE æquale

Tab. E. Fig. 5.

tus, puta $BC = c + z$, & minus $AC = c - z$. Subduc CDq de BCq & ΔCq , & exibat hinc $BD = \sqrt{(cc + 2cz + zz - aa)}$, & inde $AD = \sqrt{(cc - 2cz + zz - aa)}$. Subduc etiam AB de BD & exibat iterum $AD = \sqrt{(cc + 2cz + zz - aa)} - zb$. Quadratis jam valoribus AD & ordinatis terminis, orietur $bb + cz = b\sqrt{(cc + 2cz + zz - aa)}$. Rursusque quadrando & redigendo in ordinem obtinebitur $cczz - bbzz = bbcc - bbaa - b^4$. Et $z = bb\sqrt{(1 - \frac{aa}{cc - bb})}$. Unde dantur latera (f).

P R O B. X.

Datis basi AB, summa laterum AC + BC, & angulo verticali C, determinare latera.

Tab. 2.
Fig. 6.

XXXVII. **S**It basis = a , semisumma laterum = b , & semidifferentia = x , eritque majus latus $BC = b + x$ & minus $AC = b - x$. Ab alterutro ignotorum angulorum A ad latus oppositum BC demitte perpendicularum AD ; & propter angulum C datum dabitur ratio AC ad CD puta d ad e , & proinde erit $CD = \frac{eb - ex}{d}$. Est etiam per

13. II. Elementorum $\frac{ACq - ABq + BCq}{2BC}$ hoc est $\frac{2bb + 2xx - aa}{2b + 2x} = CD$; ideoque habetur æquatio inter valores CD . Et hæc reducta fit $x = \sqrt{\frac{daa + 2ebb - 2dbb}{2d + 2e}}$. Unde dantur latera. (g).

Si

æqualem lateri quadrati dati, per E age EF ipsi AC parallelam & perpendiculari BD occurrentem in G , erit ut AB ad BC sic quadratum ex ED ad quadratum ex DF .

Est enim CA ad AD ut DA ad AB (cor. 8. VI. EUCL.) & rectangulum sub CA ; AB æquale quadrato ex AD (17. VI. EUCL.). Eodem pacto demonstrabitur rectangulum sub CA ; CB æquale quadrato ex CD ; ergo rectangulum sub CA ; AB : ad rectangulum sub CA ; CB , id est AB ad BC (1. VI. EUCL.), ut quadratum ex AD ad quadratum ex CD , ut quadratum ex ED ad quadratum ex DF .

C O N S T R U C T I O.

(f) Æquatio $cczz - bbzz = bbcc - b^4 - aab$ resolvitur in hanc analogiam $cc - bb :: aab :: bb.zx$, aut $\sqrt{(cc - bb)}$. $\sqrt{(cc - bb - aa)} :: b.z$. (EUCL. 21. VI.). Ipsas autem $\sqrt{(cc - bb)}$ & $\sqrt{(cc - bb - aa)}$ determinare docuimus (No. 13. &c. hujus);

quibus inventis z reperietur per (EUCL. 17. VI.) Ceterum geometricam hujus analysim videbis infra Prob. XXI.

D E T E R M I N A T I O.

Fit autem impossibile problema cum cc separatur ab $aa + bb$; & cum $aa + bb = cc$, tunc $z = 0$, & triangulum fit isosceles. Sed, quando $cc = aa + bb$, etiam $cc - bb = aa$, & $c + b . z :: a . c - b$. Quærat ergo, problemate proposito, media inter aggregatum ex laterum semisumma, & dimidiata basi, atque eorum differentiam. Si hæc æquat datum perpendicularum, summa laterum est biscauda & triangulum isosceles construendum, si major est, laterum differentia, ut supra, detegenda est, si minor, problema est impossibile.

(g) Hæc æquatio resolvitur in analogiam $d + e . \frac{aad}{zbb} - d + e :: bb . xx$, & $\frac{aad}{zbb}$ dat $bb . aa ::$

 $\frac{d}{z}$

AB. E. $\frac{d}{2}$ ad quartam $\equiv \frac{aad}{2bb}$. Fac ergo ex AD
 3. 5. $\equiv b$, & DC $\equiv a$ angulum rectum ADC, jun-
 ge AC, super partem ex D demitte normalem
 DB; tunc AD². DC² :: AB. BC, ergo post
 AB, BC, & $\frac{d}{2}$ inveniatur quarta $\equiv \frac{aad}{2bb}$,
 quam dic $\equiv f$, & erit $d + e. e - d + f :: bb.xx$;
 AB. E. super basim MO $\equiv ze + f$, describe semicir-
 g. 6. culum MKO, sume MN $\equiv d + e$, erit NO
 $\equiv ze + f - e - d \equiv e - d + f$, quare
 junctarum MK, KO, quadrata erunt ut MN
 ad NO, ut bb ad xx , igitur superest ut facias,
 MK.KO :: b ad quartam $\equiv x$.

ANALYSIS GEOMETRICA.

Quia summa laterum, & basis dantur, earum ratio datur (1. dat.); sed & angulus verticalis datur, ergo triangulum est datum specie (45. dat.); & ob datam basim, etiam magnitudinem (52. dat.); quare ejus latera AC, & BC, data erunt (55. dat.).

Componitur autem sic

AB. E. Sit FG data recta æqualis duobus lateribus
 g. 7. trianguli quæsti, ad alteram ejus extremitatem G fac angulum FGH æqualem dati dimidio, deinde centro F, & data basi, tanquam radio describe arcum circuli qui occurrat ipsi GH in duobus punctis H, h, fac in H, aut h angulum GHL, aut Ghl æqualem dato FGH, occurratque recta HL, sive hl ipsi FG in L, aut l; dico triangulum FHL, aut Fhl satisfacere problemati. Nam quia triangulum HLG, est isosceles (Eucl. 6. l.) erit angulus FLH, duplex anguli FGH, (Eucl. 32. l.) aut dato æqualis, quod erat unum.

Item FL, LH simul æquales FG rectæ datæ, quod erat alterum.

DETERMINATIO.

Quia vero ad compositionem requiritur, ut circulus, centro F, & data basi tanquam radio descriptus, occurrat ipsi GH positione datæ, & quia si bis occurrat, duo sunt triangula satisfaciencia; si semel, unum; lustrandum est utrum angulus verticalis in hoc secundo casu, sit omnium minimus, an maximus.

Ergo ex puncto G demittatur tangens GM ad arcum circuli Hb, tunc unum erit triangulum FMN problemati satisfaciens; sed angulus FGM est angulo FGH major, ergo & FNM est major ipsi FLH, aut Flh. Tunc

vero triangulum FMN, est isosceles; nam ob triangulum FMG rectangulum, anguli MFG, & FGM, aut NMG, æquantur angulo FMG (32. l.) cuapropter residuus MFG æquat residuum FMN; quare determinatur utrum possibile sit problema, nec ne, biseca rectam datam, & ex ea fac super datam basim triangulum isosceles, si trianguli hujus angulus verticalis datum æquat, jam problema solum est; si dato major est, problema est possibile, & construes ut supra; si vero minor; problema est impossibile.

Alia Compositio.

Super data basi AB describatur segmentum circuli capax dimidii anguli dati; cui circulo ab altera basios extremitate A inscribatur chorda AE par datorum laterum summae, jungatur BE, & fiat angulus EBC ipsi AEB æqualis; dico peractum, ut patet. T AB. E.
Fig. 8.

Quia vero ad compositionem requiritur, ut data laterum summa dato circulo possit inscribi, & hoc fieri nequit, ubi ea major est dati circuli diametro; si par, una inscriptio fieri potest; ceteroquin, duæ: videndum est quid accidat cum data laterum summa datam diametrum æquat; ea sit erge AGF, rectus igitur est angulus B; & eum æquant anguli FAB, & AFB, vel (per constructionem) FBG, simul; æquales igitur sunt anguli GAB, GBA; & est triangulum AGB isosceles, & G circuli centrum. Cum autem data summa (AE) diametro minor est, angulus ABE major est recto ABF; quare, demptis æqualibus, angulus CBA major est angulo (GBA vel) GAB, & fortius, angulo CAB; est ergo latus CA majus latere CB; & ideo, si recta AE bifecetur in H; punctum H cadere debet inter puncta A, & C; quapropter angulus AHB exterior, major est interiore ACB.

Sed ubi problema est impossibile, quia data recta AM diametro major est, statim apparet quod angulus AFB dati dimidius, exterior, major est angulo interiore AMB; quare datae AGB major est duplo ipsius AMB, id est, ejus qui fieret supra datam basim a recta AM bisecta; unde redit superior determinatio.

Ceterum patet, quod summa laterum debet esse basi major.

Si, reliquis stantibus, daretur laterum differentia, problema construeretur ut hoc, nisi quod angulus AEB deberet esse major angulo EBA, quia laterum differentia minor est quam basis; quare linea BC faciens angulum EBC æqualem ipsi AEB, caderet infra basim, &c.

PROB.

Si anguli ad basin quærentur, conclusio foret concinnior; utpote ducatur EC datum angulum bifecans & basi occurrens in E; & erit AB. AC + BC (:: AE.AC) :: sinus anguli ACE. sinum anguli AEC. Et ab angulo AEC ejusque complemento BEC si subducatur dimidium anguli C relinquentur anguli ABC & BAC.

P R O B. X I.

Datis trianguli lateribus invenire angulos. (b)

TAB. II.
Fig. 7.

XXXVIII. **D**entur latera AB = a. AC = b. BC = c, quæratu-
r angulus A. Demisso ad AB perpendiculari CD quod an-
gulo isti opponitur, erit imprimis

$$bb - cc = ACq - BCq = ADq - BDq \quad (i) = \\ (AD + BD) (AD - BD) =$$

$$AB (2AD - AB) \quad (k) = 2AD \cdot a - aa.$$

Adeoque $\frac{1}{2} a + \frac{bb - cc}{2a} = AD$, (l) Unde prodit hocce *primum Theorem.*

I.

Ut AB, ad AC + BC, ita AC — BC, ad quartam proportionalem
N. $\frac{AB + N}{2} = AD$. Ut AC ad AD, ita radius ad cosinum anguli A.

Adhæc

$$DCq = ACq - ADq = \frac{2aabb + 2aaec + 2bbcc - a^4 - b^4 - c^4}{4aa} = \\ (a + b + c) (a + b - c) (a - b + c) (-a + b + c)$$

Un-

(b) Hoc problema Geometram practicam spectat. Theoreticus enim illud jam solutum habet, siquidem, datis trianguli lateribus dantur anguli (39. & def. 3. datorum). Sed cum tabule tangentium, &c. tantum dato sinu alicujus anguli indicent arcum, qui angulum illum metitur, sinus vero cum cæteris trianguli lateribus efficiat triangulum rectangulum, & fieri possit ut aliquis, terra aut maris tractum dimetiens, cognoscat tria latera trianguli obliquanguli; ideo clarissimus Auctor docet qua ratione triangulum obliquangulum, cujus dantur latera, ad triangula rectangula revocemus. Hoc ipsum appellatur triangulorum obliquangulorum resolutio.

(i) Nam AC² = CD² + DA², & BC² = BD² + DC², ergo AC² — CB² = DA² +

$$CD^2 - BD^2 - DC^2 = DA^2 - BD^2.$$

(k) Siquidem AD + DB = AB; Quod est unum.

Hinc fluit quod AD = AB — BD, & AD — DB = AB — 2BD, quæ quantitas (ubi 2BD superat AB) est negativa & æqualis 2BD — AB nam earundem quantitatum semper eadem est differentia. Quod est alterum.

(l) Sed AB = a, ergo $bb - cc = a(2AD - a) = 2AD \cdot a - aa$, & $aa + bb - cc = 2AD \cdot a$, & $AD = \frac{a}{2} + \frac{bb - cc}{2a}$.

Vide problema II. hujus, ubi jam segmenta baseos invenimus.

Unde multiplicatis numeratoris & denominatoris radicibus per b , confiatur hocce *Theorema secundum*.

I I.

Ut $2ab$ ad medium proportionale inter $(a+b+c)$ $(a+b-c)$ & $(a-b+c)$ $(-a+b+c)$ ita radius ad sinum anguli A. (m)

Insuper in AB Cape $AE = AC$, & age CE, & erit angulus ECD æqualis dimidio anguli A. (n)

Aufer AD de AE, & restabit $DE =$

$$b - \frac{1}{2} a - \frac{bb+cc}{2a} = \frac{cc-aa+2ab-bb}{2a} = \frac{(c+a-b)(c-a+b)}{2a}$$

Unde

$$DE \cdot r = \frac{(c+a-b)(c+a-b)(c-a+b)(c-a+b)}{4aa}$$

Et hinc confit *Theorema tertium quartumque, videlicet*.

I I I.

Ut $2ab$ ad $(c+a-b)$ $(c-a+b)$ (ita AC ad DE) ita radius ad sinum versum anguli A. (o)

I V.

Et, ut medium proportionale inter $a+b+c$, & $a+b-c$ ad medium proportionale inter $c+a-b$, & $c-a+b$ (ita CD ad DE) ita radius ad tangentem dimidii anguli A, vel dimidii cotagens ad radium. (p)

Præ-

(m) Quia $DC = \sqrt{\frac{(a+l+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+l+c)}{2a}}$,

& R medium proportionale inter $(a+l+c)$ $(a+b-c)$, & $(a-b+c)$ $(-a+l+c)$

$= \sqrt{\frac{(a+l+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+l+c)}{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+l+c)}}$, ergo $DC = \frac{R}{2a} = \frac{bR}{2ab}$;

sed (posita AC = radio) DC est sinus anguli A; ergo $2ab \cdot R :: b$ (radius). DC (sinus).

(n) Ob angulos rectos ad D, anguli ACD; DAC simul æquant una angulos ECD & DEC, (vel, ob CA, AE æquales,) ECA, aut ECD, & DCA; quare, demptis æqualibus, angulus DAC æquat bis ipsum ECD.

(o) Nam $DE = \frac{(c+a-b)(c-a+b)}{2a}$

$$= \frac{(c+a-b)(c-a+b)b}{2ab}$$

quapropter $2ab \cdot (c+a-b)(c-a+b) :: b \cdot DE$.

(p) Etenim $DC = \frac{(a+l+c)(a+b-c)}{4aa}$

$$\frac{(a-a+l+c)(-a+b+c)}{4aa}$$

&c

$$DE = \frac{(a-b+c)(a-b+c)}{4aa}$$

$$\frac{(-a+b+c)(-a+b+c)}{4aa}$$

ergo

$$CD^2 \cdot DE^2 :: \frac{(a+b+c)(a+b+c)}{4aa}$$

Z 2

(r—

$$\text{Præterea est } CEq = CDq + DEq = \\ \frac{zabb + bcc - baa - b^3}{a} = \frac{b}{a} (c + a - b) (c - a + b).$$

Unde Theorema quintum & sextum.

V.

Ut medium proportionale inter za & zb ad medium proportionale inter $c + a - b$, & $c - a + b$, vel ut 1 ad medium proportionale inter $\frac{c + a - b}{za}$ & $\frac{c - a + b}{zb}$, (q) (ita AC ad $\frac{1}{2}CE$, vel CE ad DE) (r) ita radius ad finum dimidii anguli A.

V I.

Et ut medium proportionale inter za & zb ad medium proportionale inter $a + b + c$, & $a + b - c$ (ita CE ad CD) (s) ita radius ad cosinum dimidii anguli A.

Si præter angulos desideretur etiam area trianguli, duc CDq in $\frac{1}{2}ABq$, & radix, videlicet

$$\frac{(a - b + c) (-a + b + c)}{4aa} \text{ ad} \\ \frac{(a - b + c) (a - b + c) (-a + b + c)}{4aa} \\ \frac{(-a + b + c)}{4aa} :: \\ \text{(cunctis divis per } \frac{(a - b + c) (-a + b + c)}{4aa} \text{),} \\ \frac{(a + b + c) (a + b - c)}{(-a + b + c)} \cdot \frac{4aa}{(a - b + c)}$$

igitur

$$CD. DE :: \sqrt{(a + b + c) (a + b - c)} \\ \sqrt{(a - b + c) (-a + b + c)}.$$

$$(q) \text{ Est enim } AC^2. CE^2 :: b^2 \cdot \frac{b}{a} (c + a - b) \\ (-a + b + c) :: b^2 \cdot \frac{b}{a} (c + a - b)$$

$$\text{(cunctis divis per } \frac{b}{a} ab \text{.)}$$

$$(a - b + c) (-a + b + c), \\ \&c$$

$$AC, CE :: \sqrt{ab} \cdot \sqrt{(a - b + c)}$$

$$(-a + b + c) :: 2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{(a - b + c)} \\ (-a + b + c),$$

$$\& \text{alternando, } AC. 2\sqrt{ab} \sqrt{4ab} :: CE.$$

$$2\sqrt{(a - b + c) (-a + b + c)} :: \frac{CE}{2}.$$

$$\sqrt{(a - b + c) (-a + b + c)}.$$

$$(r) \text{ Nam ob angulos, rectos, ad D, \& EAC;} \\ CED \text{ æquales. } AC. \frac{CE}{2} :: CE. ED.$$

$$(s) \text{ Siquidem } EC^2. CD^2 :: \frac{b}{a} (c + a - b) \\ (c - a + b).$$

$$\frac{(a + b + c) (a + b - c) (a - b + c) (b - a + c)}{a} ::$$

$$\text{(cunctis divis per } \frac{4aa}{(c + a - b) (c - a + b)} b \text{.)}$$

$$\frac{(a + b + c) (a + b - c)}{4a} :: 4ab, (a + b + c)$$

$$(a + b - c), \& EC. CD :: \sqrt{4ab} \cdot \\ \sqrt{(a + b + c) (a + b - c)}.$$

$\frac{1}{4} \sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)}$, erit area illa quaesita.

P R O B. X I I.

Trianguli cujusvis rectilinei datis lateribus & basi, invenire segmenta basis, perpendicularum, aream, & angulos. (t)

XXXIX. **T**rianguli ABC dentur latera AC, BC, & basis AB. Biseca AB in I & in ea utrinque producta cape AF & AE aequalia les AC, atque BG & BH aequales BC. Junge CE, CF; & a C ad basem demitte perpendicularum CD. Et erit

$$ACq - BCq = ADq + CDq - CDq - BDq = ADq - BDq = (AD + BD)(AD - BD) = AB \cdot 2DI. (u)$$

Ergo

$$\frac{ACq - BCq}{2AB} = DI. \text{ Et } 2AB \cdot AC + BC :: AC - BC \cdot DI.$$

Quod est Theorema pro determinandis segmentis basis. (x)

De IE, hoc est de AC — $\frac{1}{2}$ AB aufer DI, & restabit

$$DE = \frac{BCq - ACq + 2AC \cdot AB - ABq}{2AB} (y)$$

hoc est

$$\frac{(BC + AC - AB)(BC - AC + AB)}{2AB}, \text{ five } = \frac{HE \cdot EG}{2AB}. (z)$$

Aufer

(t) Segmenta basis inventa sunt Probl II.& XI. Perpendicularum Probl. XI. ante Theor. II. Area Probl. XI. post Theor. VI., & anguli per totum Probl. XI.: uno verbo hoc problema idem est ac superius diversimode solutum.

(u) Nam AD = AI + ID = BI + ID = BD + ID + ID, ergo AD — DB = 2ID.

Hoc autem est theorema, quod Auctor noster attulit Art. XIII., & quod nos ibi demonstravimus.

(x) Idemque, ac I. superioris problematis.

(y) Nam DE = AC — $\frac{1}{2}$ AB — (DI vel —)

$(\frac{AC^2 - BC^2}{2AB})$, omnesque terminos ad eundem

denominatorem reducendo,

$$AC \cdot 2AB - \frac{1}{2}AB \cdot 2AB - AC^2 + BC^2$$

$$DE = \frac{\quad}{2AB} = BC^2. \&c.$$

Idem repertum fuit Probl. XI. ante Theor. III.

(z) Nam BC + CA = BH + AE = BE + EH + AH + HE;

sed

$$BE + EH + HA = BA;$$

$$\text{ergo } BC + CA = BA + HE;$$

&c

$$BC + CA - AB = HE.$$

Aufer DE de FE five 2AC, & restabit

$$FD = \frac{CAq + 2AC \cdot AB + ABq - BCq}{2AB}$$

hoc est

$$\frac{(AC + AB + BC)(AC + AB - BC)}{2AB}, \text{ five } = \frac{FG \cdot FH}{2AB}.$$

Et, cum sit CD medium proportionale inter DE ac DF, CE medium proportionale inter DE & EF, ac CF medium proportionale inter DF & EF: (a) erit

$$CD = \sqrt{\left(\frac{FG \cdot EH \cdot HE \cdot EG}{2AB}\right)}, (b) CE = \sqrt{\left(\frac{AC \cdot HE \cdot EG}{AB}\right)}, (c)$$

&

$$CF = \sqrt{\left(\frac{AC \cdot FG \cdot FH}{AB}\right)}$$

Duc CD in $\frac{1}{2} AB$ & habebitur area = $\frac{1}{4} \sqrt{(FG \cdot FH \cdot HE \cdot EG)}$. (d) Pro angulo vero A determinando prodeunt Theoremata multiplicia, videlicet.

1. $2AB \cdot AC : HE \cdot EG$ ($:: AC \cdot DE$) $::$ radius ad finum versum anguli A.
2. $2AB \cdot AC$ ad $FG \cdot FH$ ($:: AC$ ad FD) $::$ radius ad cosinum versum A.
3. $2AB \cdot AC$ ad $\sqrt{(FG \cdot FH \cdot HE \cdot EG)}$ ($:: AC$ ad CD) $::$ radius ad finum A.
4. $\sqrt{(FG \cdot FH)}$ ad $\sqrt{(HE \cdot EG)}$ ($:: CF$ ad CE) $::$ radius ad tangentem $\frac{1}{2} A$.
5. $\sqrt{(HE \cdot EG)}$ ad $\sqrt{(FG \cdot FH)}$ ($:: CE$ ad FC) $::$ radius ad cotangentem $\frac{1}{2} A$.

6.

Rursus

$$BC - CA = BG - AE, \& AB = AE + EB;$$

ergo

$$BC - CA + AB = BG - AE + AE + EB = EG.$$

(a) Ob æquales rectas EA, AC, AF; semicirculus centro A radio AF descriptus transibit per C, & E; unde angulus FCE rectus est (EVL. 31. III.)

(b) Jam idem invenimus Probl. XI. ante

Theor. III.

(c) Ut Probl. XI. ante Theor. V.

(d) Eodem profus pacto Probl. XI. post Theor. VI.

Ceterum sequentia Theoremata coincidunt.

	{ I. cum III. }	
hujus	{ III. II. }	} Probl. XI.
	{ IV. & V. IV. }	
	{ VI. V. }	
	{ VII. VI. }	

6. $2\sqrt{(AB \cdot AC)}$ ad $\sqrt{(FG \cdot FH)}$ ($:: FE$ ad FC) $::$ radius ad sinum $\frac{1}{2} A$.

7. $2\sqrt{(AB \cdot AC)}$ ad $\sqrt{(FG \cdot FH)}$ ($:: FE$ ad FC) $::$ radius ad cosinum $\frac{1}{2} A$.

PROB. XIII.

Datum angulum CBD recta data CD subtendere; ita ut si a termino istius recte D ad punctum A in recta CB producta datum agatur AD , fuerit angulus ADC æqualis angulo ABD . (e)

XL. **D**icatur $CD = a$, $AB = b$, $BD = x$, & erit $BD \cdot BA :: (f)$ TAB. II. Fig. 9.
 $CD \cdot DA = \frac{ab}{x}$.

Demitte perpendicularum DE , erit

$$BE = \frac{BDq - ADq + BAq}{2BA} (g) = \frac{xx - \frac{aabb}{xx} + bb}{2b}$$

Ob datum angulum DBA pone $BD \cdot BE :: b \cdot e$, & habebitur iterum

$BE = \frac{ex}{b}$, ergo $xx - \frac{aabb}{xx} + bb = 2ex$. Et $x^4 - 2ex^2 + bbxx - aabb = 0$. (h)

(e) Hoc problema tres habet casus, aut enim angulus CBD est rectus, aut acutus, aut obtusus. Cum vero ex unius casus solutione facile deducantur alii, animadverto, quod si angulus CBD esset obtusus, normalis DE demissa ex D caderet extra angulum, si acutus, intra, quare, si primo casu valor ipsius BE positivus fuisset assumptus, in secundo negativus esset; & vice versa. Si vero angulus CBD positus esset rectus, valor BE nullus esset; quia DE caderet super ipsam DB ; sed posito aliquo valore ipsius DE facile regredi possumus ad casum, in quo ea nihilo æqualis est; at ea posita nihilo æqualis nullo modo præbet valorem ejusdem, ubi fit quanta; præstat ergo fingere angulum CBD obtusum, aut acutum. Sit obtusus.

(f) Quia, scilicet, triangula BAD , DAC habent angulum communem ad A , & angulos DBA , ADC æquales, ex problematis lege.

(g) Nam, ex hypothesi, angulus CBD est obtusus; igitur $AE = EB - BA$, & $AE^2 =$

PROB.
 $EB^2 - 2AB \cdot BE + BA^2 = AD^2 - DE^2$, ob triangulum rectangulum DAE ; sed triangulum rectangulum DBE dat $DE^2 = DB^2 - BE^2$, ergo $EB^2 - 2AB \cdot BE + BA^2 = AD^2 - DB^2 + BE^2$, & deletis delendis, ac transponendo $BE = 0$.

(h) Si vero esset rectus, patet quod punctum E caderet in B , &

$$BE = 0 = \frac{xx - \frac{aabb}{xx} + bb}{2b}$$

$$= \frac{x^4 - aabx + bbxx}{2b}$$

quam ob rem

$$x^4 = \frac{bbxx + aabb}{2}$$

& $xx = \frac{bb}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{bb}{4} + aabb\right)}$

unde

$$\sqrt{\left(\frac{bb}{4} + aa\right)} = \frac{b}{2} \cdot x :: x \cdot b$$

Quod etiam sic inveniri poterat.

PROB. XIV.

Invenire triangulum ABC , cujus tria latera AB , AC , BC , & perpendicularum DC , sunt in arithmetica progressionē.

TAB. II.
Fig. 10.

XLI.

Dico $AC = a$, $BC = x$, & erunt $DC = 2x - a$, & $AB = 2a - x$. (i) Erunt etiam
 $AD (= \sqrt{ABq - DCq}) = \sqrt{4ax - 4xx}$

&

$$BD (= \sqrt{BCq - DCq}) = \sqrt{4ax - 3xx - aa}.$$

Atque adeo rursus

$$AB = \sqrt{4ax - 4xx} + \sqrt{4ax - 3xx - aa}.$$

Quare

$$2a - x = \sqrt{4ax - 4xx} + \sqrt{4ax - 3xx - aa},$$

sive

$$2a - x - \sqrt{4ax - 4xx} = \sqrt{4ax - 3xx - aa}.$$

Et partibus quadratis

Jam $DA = \frac{ab}{x}$, sed AB (i). BD (x) ::

BD (x). $BC = \frac{xx}{b}$; atque ideo $CA =$

$$\frac{xx + bb}{b}, \text{ \& } CA^2 = \frac{x^4 + 2bbxx + b^4}{bb} =$$

$CD^2 + DA^2 = aa + \frac{aabb}{xx}$, & sublati fractionibus, $x^6 + 2bbx^4 + b^4xx = aabbbx + aabb^4$, & cunctis divisi per $xx + bb$, $x^4 + bbxx = aabb$.

CONSTRUCTIO.

TAB. F.
Fig. 1.

Quæsitæ vero sic facile determinatur. Sit $AB = a$, BC ipsi normalis $= \frac{b}{2}$, & erit

$AC = \sqrt{\frac{bb}{4} + aa}$. Sumatur $EC = CF = CB$,

& diametro AF describatur semicirculus AGF , ex E elevetur normalis EG , erit hæc quantitas quæsitæ, ut patet. Jungantur nunc AG , CF , erit triangulum AGF rectangulum, &

angulus ad G æqualis angulo dato ad E , dico rectam AG æquare datam AB .


Nam FA ad AG est ut GA ad AE (Eucl. 8. VI.). Quadratum igitur ex AG æquatur rectangulo FAE (Eucl. 16. VI.) id est quadrato ex AB (Eucl. 36. III.) igitur AG æqualis est AB rectæ datæ.

Si vero angulus datus esset acutus, tunc $AE = EB + BA$, $AE^2 = EB^2 + 2EB.BA + BA^2 = DA^2 - DE^2$, & $DE^2 = DB^2 - BE^2$; quare $EB^2 + 2EB.BA + BA^2 = DA^2 - DB^2 + BE^2$, & $2EB.BA = DA^2 - DB^2 - BA^2$, ac $EB = \frac{DA^2 - DB^2 - BA^2}{2AB}$

$$= \frac{aabb}{xx} - \frac{xx - bb}{2b}.$$

Reliqua vero ut supra.

(i) Sit AB terminus maximus, & primus; AC secundus, tertius BC ; quartus vero DC , tunc si AC (a) est arithmetice ad BC (x), ut BC (x) ad CD , erit $CD = 2x - a$, & si BC (x) est arithmetice ad AC (a), ut AC (a) ad AB , erit $AB = 2a - x$.



$$4aa - 3xx - (4a + 2x)V(4ax - 4xx) = 4ax - 3xx - aa,$$

= five

$$5aa - 4ax = (4a + 2x)V(4ax - 4xx)$$

Et partibus iterum quadratis ac terminis rite dispositis

$$16x^4 - 80ax^3 + 144a^2xx - 104a^3x + 25a^4 = 0$$

Hanc æquationem divide per $2x - a$, & oriatur

$$8x^3 - 36axx + 54aax - 25a^3 = 0,$$

æquatio cujus resolutione dabitur x ex assumpto utcunque a . Habitis a & x constitue triangulum cujus latera erunt $2a - x$, a , & x ; & perpendicularum in latus $2a - x$ demissum erit $2x - a$.

Si posuiffem differentiam laterum trianguli esse d , & perpendicularum esse x ; opus evassisset aliquanto concinnius, procedente tandem æquatione $x^3 = 24ddx + 48d^3$. (k)

P R O B. X V.

Invenire triangulum ABC cujus tria latera AB, AC, BC, & perpendicularum CD, sunt in geometrica progressionē.

TAB. II.
Fig. 10.

XLII. **D**ic AC = x , & BC = a ; & erit AB = $\frac{xx}{a}$. Et CD = $\frac{aa}{x}$.

Est &

$$AD (= V(ACq - CDq)) = V(xx - \frac{a^4}{xx})$$

&

$$BD (= V(BCq - DCq)) = V(aa - \frac{a^4}{xx})$$

adeoque

$$\frac{xx}{a} (= AB) = V(xx - \frac{a^4}{xx}) + V(aa - \frac{a^4}{xx}),$$

five

(†) En calculum. Cum CD primus progressionis arithmeticae terminus sit = x ; terminorum autem differentia d ; erit BC = $x + d$, CA = $x + 2d$; AB = $x + 3d$; sed propter angulum ADC rectum; AD = $V(AC^2 - CD^2)$ = $V(4dx + 4dd)$, & BD = $V(BC^2 - DC^2)$ = $V(2dx + dd)$,

ergo AD + DB, five tota AB, vel

$x + 3d = V(4dx + 4dd) + V(2dx + dd)$;
nempe $x + 3d - V(4dx + 4dd) = V(2dx + dd)$;
 $V(2dx + dd)$, & partibus quadratis, æquatione ad simpliciores terminos reducta, $2dx + dd$, ac $(2x - 6d)V(4dx + 4dd)$ in contra-

rias respective partes translatis

$$xx + 8dx + 12dd = (2x + 6d)V(4dx + 4dd)$$

& rursum quadratis partibus

$$x^4 + 16dx^3 + 88ddx^2 + 192d^2x + 144d^4 = 240d^2x + 112ddxx + 16dx^3 + 144d^4,$$

cunctisque terminis primi membri præter x^4 in secundum coniectis, & deletis delendis $x^4 = 24ddxx + 48d^2x$, & tota æquatione per x divisa $x^3 = 24ddx + 48d^2$.

Constructio problematum, quorum æquationes secundum gradum superant, invenietur ad hujus operis finem.

A 3

$$\frac{xx}{a} - V(aa - \frac{a^4}{xx}) = V(xx - \frac{a^4}{xx}).$$

Et partibus æquationis quadratis,

$$\frac{x^4}{aa} - \frac{2xx}{a} V(aa - \frac{a^4}{xx}) + aa - \frac{a^4}{xx} = xx - \frac{a^4}{xx},$$

hoc est

$$x^4 - aaxx + a^4 = 2aax V(xx - aa). (I)$$

Et partibus iterum quadratis

$$x^8 - 2aax^6 + 3a^2x^4 - 2a^6xx + a^8 = 4a^4x^4 - 4a^6xx.$$

Hoc est

$$x^8 - 2aax^6 - a^4x^4 + 2a^6xx + a^8 = 0.$$

Divide hanc æquationem per $x^4 - aaxx - a^4$, & oriatur $x^4 - aaxx - a^4$. Quare est $x = aaxx + a^4$. Et extracta radice $xx = \frac{1}{2}aa + V\frac{5}{4}a^4$,

sive $x = a V(\frac{1}{2} + V\frac{5}{4}) (m)$. Cape ergo a , sive BC, cujusvis longitudinis, & fac BC.AC :: AC.AB :: 1. $V(\frac{1}{2} + V\frac{5}{4})$; trianguli ABC ex his lateribus constituti perpendicularum DC erit ad latus BC in eadem ratione. (n)

Idem

(I) Nam $\frac{x^4}{aa} - \frac{2xx}{a} V(aa - \frac{a^4}{xx}) + aa - \frac{a^4}{xx} = aa V\frac{5}{4}$, ergo $xx = \frac{aa}{2} + aa V\frac{5}{4}$, scilicet $\frac{a^4}{xx} = xx - \frac{a^4}{xx}$, deleto hinc inde $\frac{a^4}{xx}$, & $x = V(\frac{aa}{2} + aa V\frac{5}{4})$, & denuo quantitativis per aa multiplicatis dat $x^4 - aaxx$ sub signo per aa divisus, & divisoris hujus $V(aa - \frac{a^4}{xx}) + a^4 = aaxx$, & $aaxx$, ac radice extra signum posita $x = a V(\frac{1}{2} + 2aax V(aa - \frac{a^4}{xx}))$ in contrariam respective $V\frac{5}{4}$.

partem translatis sit $x^4 - aaxx + a^4 = 2aax V(aa - \frac{a^4}{xx})$. Si vero xx sub signo ponatur, habebimus $2a V(aaxx - a^4xx)$, & quantitas radicalis divisa per $aaxx$ dat $xx - aa$, unde (divisoris $aaxx$ radice extracta, & ante signum posita, & multiplicata cum $2a$ quæ jam erat extra signum, quotiente vero $xx - aa$ sub signo posito) educitur $2aax V(xx - aa)$.

(n) Aut sic, sit AB = a , BC ei normalis = $\frac{a}{2}$, erit AC = $V(aa + \frac{aa}{4}) = V\frac{5}{4}aa$, in Fig. 2. qua utrinque, producta sumatur DA = AB, EC = CB, diametro DE describatur semicirculus DGE, & in A elevetur normalis AG, ea erit x quæ sita.

Nam EA ($\frac{a}{2} + V\frac{5}{4}aa$). AG :: GA. AD

(m) Jam enim $xx = \frac{aa}{2} + V\frac{5}{4}aa$; sed (a) & $\frac{aa}{2} + a V\frac{5}{4}aa = AG^2 = xx$. Sunt ergo DA, AG, AE tria latera trianguli.

Idem aliter.

Cum sit $AB.AC :: BC.DC$ dico angulum ACB rectum esse. Nam, si TAB. II. Fig. 11. negas, age CE constituentem angulum ECB rectum. Sunt ergo triangula BCE , DBC similia per 8. VI. Elem. adeoque $EB.EC :: BC.DC$, hoc est $EB.EC :: AB.AC$. Age AF perpendicularem CE & propter parallelas AF , BC , erit $EB.EC :: AE.FE :: AB.FC$. (o) Ergo per 9 V. Elem. est $AC = FC$, hoc est hypotenusa trianguli rectanguli æqualis lateri contra 19. I. Elem. Non est ergo angulus ECB rectus, & proinde ipsum ACB rectum esse oportet. (p) Est itaque $ACq + BCq = ABq$, Sed est $ACq = AB.BC$, ergo $AB.BC + BCq = ABq$, & extracta radice $AB = \frac{1}{2}BC + \sqrt{\frac{1}{4}BCq}$. Quamobrem cape $BC.AB :: 1. \frac{1 + \sqrt{1}}{2}$, & AC mediam proportionalem inter BC & AB , & triangulo ex his lateribus constituto, erunt $AB.AC.BC.DC$ continue proportionales.

PROB. XVI.

Super data basi AB triangulum ABC constituere, cujus vertex C erit ad rectam EC positione datam; basis autem medium existet arithmeticum inter latera.

XLIII. **B**asis AB bifecetur in F , & producatur donec recta EC positione TAB. II. Fig. 12. data occurrat in E , & ad ipsam demittatur perpendicularis CD ; distansque $AB = a$, $FE = b$, & $BC = AB = x$, erit $BC = a + x$, $AC = a - x$. Et per 13. II. Elem.

$$BD \left(= \frac{BCq - ACq + ABq}{2AB} \right) = 2x + \frac{1}{2}a.$$

Adco-

(o) Nam per (Eucl. 12. V.) $EB.EC :: BE + EA.CE + EF$, id est $:: BA.CF :: BA.AC$ per superius ostensa.

(p) Quod etiam sic, & fortasse brevius demonstrari potest.

Quia BA est ad AC , ut BC ad CD ex lege problematis, erit rectangulum ACB æquale rectangulo ex BA , in DC , id est duplæ areæ trianguli, quod si AC non est normalis, sit AG , ergo dupla trianguli area æquatur rectangulo ex CB in AG , id est, ACB , ergo AC hypotenusa erit æqualis lateri AG , quod est absurdum.

His positis facillime nullo calculo problema solvitur.

Nam est ex lege problematis BA ad AC , ut AC est ad CB , & BA ad AC ut CA ad AD

(Eucl. cor. 8. VI.), ergo AD æquat CB (Eucl. 9. V.); rursus AB ad BC ut CB ad BD , ergo AB ad AD , ut AD ad DB . Quare, cum hic nihil detur, sed tantum petatur continua laterum proportio; sume AB ad libitum, eam seca in mediam & extremam rationem in D , ubi erige normalem indefinitam DC , describe femicirculum ACB , junges AC , CB erit ABC triangulum quaesitum.

Jam autem est rectangulum, & per constructionem AB ad AD ut AD ad DB . Sed AB ad BC ut CB ad DB (Eucl. cor. 8. VI.); ergo BC æquat AD . Rursus BA ad AC ut CA ad AD , (Eucl. cor. 8. VI.) vel ad æqualem CB ; & ob similia triangula CAD , BCD est CA ad AD vel ad æqualem BC , ut BC ad CD ; ergo BA ad AC , ut AC ad CB ut BC ad CD .

Adeoque $FD = 2x$, (q) $DE = b + 2x$, & $CD (= \sqrt{CBq - BDq}) = \sqrt{\left(\frac{3}{4}aa - 3xx\right)}$. Sed propter datas positiones rectarum CE & AB , datur angulus CED ; adeoque & ratio DE ad CD ; quæ si ponatur d ad e dabit analogiam $d.e :: b + 2x . \sqrt{\left(\frac{3}{4}aa - 3xx\right)}$. Unde, multiplicatis extremis & mediis in se, oritur æquatio $eb + 2ex = d\sqrt{\left(\frac{3}{4}aa - 3xx\right)}$, cu-

jus partibus quadratis & rite dispositis, fit $xx = \frac{\frac{3}{4}ddaa - eebb - 4ecbx}{4ec + 3dd}$

Et radice extracta $x = \frac{-2ceb + d\sqrt{(3eeaa - 3eebb + \frac{9}{4}ddaa)}}{4ec + 3dd}$.

Dato autem x , datur $BC = a + x$ & $AC = a - x$. (r)

PROB.

(q) Scilicet, quia BD (majus segmentum) æquat aggregatum ex summæ ac differentiæ dimidio; ponatur ergo differentiæ dimidium $= z$, & erit $\frac{1}{2}a + z = \frac{1}{2}a + 2x$; ac $z = 2x$. Sed $BD = BF + FD$ & est $BF = \frac{1}{2}a$; ergo $BD = 2x$.

CONSTRUCTIO.

Tab. F. Fig. 4. (r) Si ponas $e = b$; æquatio Auctoris, transponendo $-4ecbx$, fiet

$$xx + \frac{4b^2x}{4bb + 3dd} = \frac{3aadd - 4b^4}{4(4bb + 3dd)}$$

Quare, cape $GI = b$; ad I fac angulum rectum, & ad G angulum æqualem ipsi ECD (Fig. 12.); erit $IH = d$. Nam ut CD ad DE , vel ut b ad d ita GI ad IH ; & est $GI = b$; ergo $IH = d$. Quapropter $GH^2 = bb + dd$; aut $3GH^2 = 3bb + 3dd$. Igitur superior æquatio abit in

$$xx + \frac{4b^2x}{bb + 3GH^2} = \frac{3aadd - 4b^4}{4(bb + 3GH^2)}$$

Super GH ad rectos angulos eleva HK ipsi GI productæ occurrentem in K ; eritque GI ,

vel b . $GK = GH^2$. Pariter cape $IL = a$, & age LM paralelam ipsi GH ; quoniam est $GI (b) . IL (a) :: HI (d) . IM$, erit $b . IM = ad$, & $bb . IM^2 = aadd$, quæ posita in præcedentem æquationem, & fractionibus reductis ad simpliciores terminos, illam mutant in

$$xx + \frac{4bbx}{b + 3KG} = \frac{b(3IM^2 - 4bb)}{4(b + 3KG)}$$

Jam, per (Eucl. II. VI.) quære tertiam N post $b + 3KG$, & b ; erit $N = \frac{bb}{b + 3KG}$; quare fiet æquatio construenda

$$xx + 4Nx = \frac{3MI^2 . N}{4b} - bN.$$

Rursus quære quartam post $4b$; MI ; & $3MI$ per (Eucl. 17. VI.); quæ sit O ; denique habebis

$$xx + 4Nx = N(O - b)$$

quam facile construes per Lemma (Nº. 36. hujus).

Duas has ultimas proportionales in figura non determinavi, ne illa nimis se extenderet.

PROB. XVII.

Datis parallelogrammi cujuscunque lateribus AB, BD, DC & AC, & una linea diagonali BC, invenire alteram diagonalem AD.

XLIV. Sit E concursus diagonalium, & ad diagonalem BC demitte normalem AF (f), & per 13. II. Elementorum, erit TAB. II.
Fig. 13.

$$\frac{ACq - ABq + BCq}{2BC} = CF,$$

atque etiam

$$\frac{ACq - AEq + ECq}{2EC} = CF.$$

Quare cum sit $EC = \frac{1}{2}BC$, (f) & $AE = \frac{1}{2}AD$, erit

$$\frac{ACq - ABq + BCq}{2CB} = \frac{ACq - \frac{1}{4}ADq + \frac{1}{4}BCq}{BC}$$

& facta reductione,

$$AD = \sqrt{2ACq + 2ABq - BCq}. (u)$$

Unde obiter in quolibet parallelogrammo, summa quadratorum laterum æquatur summæ quadratorum diagonalium. (x)

PBOB.

(f) Aut angulus ABC est acutus, aut obtusus.

10 Sit acutus. Perpendicularis AF cadet intra triangulum, & locus erit ratiocinio Auris.

(4) 46. In omni parallelogrammo ABDC, diagonales AD, CB se mutuo bisecant.

Triangula CED, AEB. habentia angulos ad verticem CED, AEB, & alternos CDA, DAB, æquales, sunt æquiangula. Sed & bases CD, AB habent æquales; (EUCL. 34. I.) ergo sunt æqualia, & æquantur latera CE; EB ac DE; EA (EUCL. 26. I.) Quare &c.

(u) Si vero angulus ACB esset obtusus, perpendicularis AF caderet extra parallelogrammum, & per (EUCL. 12. II.) foret

$$\frac{BA^2 - AC^2 - BC^2}{2BC} = CF = \frac{AE^2 - FC^2 - CA^2}{2EC}$$

aut, ponendo $\frac{BC}{2}$ pro CE, & $\frac{AD}{2}$ pro AE;

$$\frac{BA^2 - AC^2 - BC^2}{2} = \frac{1}{4}AD^2 - \frac{1}{4}BC^2 - CA^2,$$

&, sublatis fractionibus, deletis delendis, ac radice extracta

$$\sqrt{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2} = AD.$$

(x) 47. In parallelogrammo ABDC, summa quadratorum ex lateribus AB, BD, DC, CA, æquat summam quadratorum ex diagonalibus AD, BC.

Ubi parallelogrammum est rectangulum, res nimis est facilis. Sit ergo obliquangulum.

PROB. XVIII.

Datis Trapezii ABCD angulis, perimetro, & area, determinare latera.

TAB. II.
Fig. 14.

XLV. **L**atera duo quælibet (y) AB ac DC produc donec concurrant in E, sitque AB = x & BC = y & propter angulos omnes datos dantur rationes BC ad CE & BE; quas pone d ad e & f (z), & erit CE = $\frac{ey}{d}$, & BE = $\frac{fy}{d}$, adeoque AE = $x + \frac{fy}{d}$. Dantur etiam rationes AE ad AD ac DE; quas pone g & h ad d (a); & erit AD = $\frac{dx + fy}{g}$ & ED = $\frac{dx + fy}{h}$, adeoque CD = $\frac{dx + fy}{h} - \frac{ey}{d}$, & summa omnium laterum $x + y + \frac{dx + fy}{g} + \frac{dx + fy}{h} - \frac{ey}{d}$; quæ, cum detur, esto a , & abbrevientur etiam termini scribendo $\frac{p}{r}$ pro dato $1 + \frac{d}{g} + \frac{d}{h} - \frac{e}{d}$, (b) & $\frac{q}{r}$ pro dato $1 + \frac{f}{g} + \frac{f}{h} - \frac{e}{d}$ (c), habebitur x -

TAB. F.
Fig. 5.6.7.

Anguli BAC, ACD simul æquales duos rectos (Eucl. 27. 1.). Si ergo alter est acutus, alter erit obtusus. Obtusus sit angulus ACD; quare perpendicularis ducta ex A in oppositam rectam DC cadet extra parallelogrammum, & erit quadratum DA par quadratis AC, CD una cum bis rectangulo DCH (Eucl. 12. II.). Nunc ex C due in subjectam AB, (si opus est, productam) perpendicularem CG. Erit quadratum BC una cum bis rectangulo BAG æquale quadratis CA, AB; (Eucl. 13. II. sed æquales sunt rectæ AB; CD; & AG, CH (Eucl. 34. I.), quare & rectangula BAG, DCH; igitur, addendo æqualia æqualibus, quadrata ex DA, BC una cum bis rectangulo BAG æquant quadrata BA, AC bis, una cum bis rectangulo DCH, quibus rectangulis hinc inde demptis. &c.

(y) Non parallela.

TAB. F.
Fig. 8.

(z) Sume quamvis FG super quam construe triangulum FGH simile ipsi CEB, quod erit datam specie, & magnitudine, ut jam probavimus, dic FH = d , FG = e , GH = f , & habebis CE = $\frac{ey}{d}$ &c.

(a) Fac angulum HFK æqualem angulo

quadrato, aut DEA, & angulum FHK præter ipsi EAD, eritque triangulum FHK simile LDA, & datum specie, ac magnitudine &c. & dic FK = g , & KH = h .

(b) Quære quartam proportionalem post KH (h), HF (d) & FK (g) quam dic a & habebis $1 + \frac{d}{g} + \frac{d}{h} = \frac{gh + dh + dg}{gh}$ (reducendo ad eundem denominatorem) quod esse debet = $\frac{p}{r}$; ergo $gh \cdot gh + dh + dg :: r \cdot p$
 $:: g \cdot g + d + \frac{dg}{h} = g + d + a$; dic ergo $g = r$, & erit aggregatum ipsarum $g + d + a = p$.

(c) Reduc ad eandem denominationem

$1 + \frac{f}{g} + \frac{f}{h} - \frac{e}{d}$,
 erit $\frac{dgh + dfb + dfg - egh}{dgh} = \frac{q}{r}$;
 quare $r \cdot q :: dgh \cdot dgh + dfb + dfg - egh ::$
 $g \cdot g + f + \frac{fg}{h} - \frac{eg}{d}$. Quære igitur quartas post h, f, g , & d, e, g , dic illam = β , hanc = γ ; & erit $r \cdot q :: g \cdot g + f + \beta - \gamma$.

quatio $\frac{px + qy}{r} = a.$

Adhæc propter datos omnes angulos datur ratio BCq ad triangulum BCE (*d*), quæ pone *m* ad *n* (*e*) & erit triangulum BCE = $\frac{n}{m} yy$ (*f*). Datur etiam ratio AEq ad triangulum ADE, quæ pone *m* ad *d* (*g*); & erit triangulum ADE = $\frac{ddxx + 2dfxy + fffy}{dm}$. Quare cum area AC, quæ est horum triangulorum differentia, detur, esto *bb* & erit $\frac{ddxx + 2dfxy + fffy - dnyy}{dm} = bb.$ Atque ita habentur duæ æqua-

tiones ex quarum reductione omnia determinantur. Nempe superior æquatio dat $\frac{ra - qy}{p} = x$; scribendo $\frac{ra - qy}{p}$ pro *x* in inferiori, provenit $\frac{drara - 2dgray + dqgyy}{ppm} + \frac{2afry - 2fgyy + fffy - dnyy}{pm} = bb$

(*b*). Et abbreviatis terminis scribendo *s* pro dato $\frac{dqg}{pp} - \frac{2fg}{p} + \frac{ff}{d} - n$, & *st* pro dato $+\frac{adqr}{pp} - \frac{afr}{p}$, ac *stv* pro dato $bbm - \frac{drara}{pp}$, oritur $yy = 2ty + tv$ seu $y = t + \sqrt{(st + tv)}$.

PROB.

(*d*) Jam enim triangulum GHF, specie & magnitudine datum, simile est triangulo EBC, quare HF quadratum, est ad triangulum GHF, ut BC quadratum, est ad triangulum EBC (Eucl. 18. VI.); Atqui datur prima ratio (49. dat.) ergo &c.

(*e*) Hanc autem lineis exprimes ducendo ex G in HF normalem GL; est enim GHF triangulum æquale dimidiato rectangulo ex GL in FH; ergo quadratum ex FH, est ad (triangulum GFH id est) dimidium rectangulum ex GL in FH, ut FH ad dimidiam GL (Eucl. 1. VI.).

Dic igitur GL = 2λ, & esse debet d. λ :: m. n. quod facile reperies.

(*f*) Nobis autem est triangulum BCE = $\frac{nyy}{d}$.

(*g*) Item ex H demitte in KF normalem

HM, & invenies quadratum ex AE ad triangulum ADE, ut KP ad dimidiam HM; dic HM = 2κ, eritque juxta nos triangulum ADE = $\frac{κκx}{d} + 2\frac{κxy}{d} + \frac{κffy}{d}$, & eorum differentia = $\frac{ddxx + 2κdfxy + κffy - ddnyy}{d} = bb.$

Si vero vis invenire Auctoris expressionem, esse debet m. d :: d. κ; quare ex data κ, & d facile invenies tertiam; item d. λ :: m. n. & ex datis d, λ, m, dabitur n.

(*b*) Nostra æquatio (substituendo pro *x*, $\frac{ra - qy}{p}$; & pro *xx*, $\frac{drara - 2dgray + dqgyy}{pp}$) fit $\frac{aarrx - 2agrxy + qgxyy}{dpp} + \frac{2afxy - 2fgyy + fffy - dnyy}{dp} = bb$

PROB. XIX.

Piscinam ABCD perambulatorio ABCDEFGH data area, & ejusdem ubique latitudinis circumdare.

TAB. II.
Fig. 15.

XLVI. **E**sto perambulatorii latitudo x & ejus area aa . Et a punctis A, B, C, D, ad lineas EF, FG, GH & HE demissis perpendicularibus AK, BL, BM, CN, CO, DP, DQ, AI, perambulatorium dividetur in quatuor trapezia IK, LM, NO, PQ & in quatuor parallelogramma AL, BN, CP, DI, latitudinis x , & ejusdem longitudinis cum lateribus dati trapezii. Sit ergo summa laterum $(AB + BC + CD + DA) = b$, & erit summa parallelogrammorum $= bx$.

Porro ductis AE, BF, CG, DH; cum sit AI = AK erit angulus AEI = angulo AEK = $\frac{1}{2}$ IEK sive $\frac{1}{2}$ DAB. (i) Datur ergo angulus

AEI & proinde ratio ipsius AI ad IE, quæ pone d ad e , & erit $IE = \frac{ex}{d}$,

Hanc duc in $\frac{1}{2}$ AI sive $\frac{1}{2}x$ & fiet area trianguli AEI = $\frac{exx}{2d}$. Sed, propter æquales angulos & latera, triangula AEI & AEK sunt æqualia, adeoque trapezium IK (= 2 triangulo AEI) = $\frac{exx}{d}$. Simili modo ponendo

BL. LF :: $d.f$, & CN. NG :: $d.g$, & DP. PH :: $d.b$, (nam illæ etiam rationes dantur ex datis angulis B, C, ac D) habebitur trapezium LM = $\frac{fxx}{d}$, NO = $\frac{gxx}{d}$, & PQ = $\frac{bxx}{d}$. Quamobrem $\frac{exx}{d} + \frac{fxx}{d} + \frac{gxx}{d} + \frac{bxx}{d}$ (sive $\frac{pxx}{d}$, scribendo p pro $e + f + g + b$), erit æquale trapezii quatuor

IK + LM + NO + PQ; (k) & proinde $\frac{pxx}{d} + bx$, æquabitur toti perambulatorio aa . Quæ æquatio dividendo omnes terminos per $\frac{p}{d}$ & extrahendo radicem ejus, evadet $x = \frac{-db + \sqrt{bbdd + 4aapd}}{2p}$. Latitudine perambulatorii sic inventa facile est ipsum describere. (l)

PROB.

(i) Nam concipiatur circulus descriptus diametro AE, hic transibit per I & K (Eucl. 31. III. & 27. 1.) & quia rectæ KA, AI sunt æquales per hypothesin arcus, quorum chordæ sunt KA, AI, sunt æquales (Eucl. 28. III.) igitur & anguli AEK. AEI. (Eucl. 27. III.)

(k) Et, si piscina esset polygona, eodem

pacto invenirentur tot trapezia, quot debent, & p exprimeret aggregatum ex omnibus, quot quod sunt, datis quantitibus, per quas xx multiplicatur; & b omnes illas, in quibus x ducitur.

(l) Constructionem omitto, quia nihil habet observatione dignum, quod deinceps faciam.

No.

P R O B. XX.

A dato puncto C rectam lineam CF ducere quæ cum aliis duabus positione datis rectis AE & AF triangulum datæ magnitudinis AEF comprehendet.

XLVII. **A**ge CD parallelam AE, & CB ac EG perpendiculares in AF, TAB. III. Fig. 1.
 sitque AD = a, CB = b, AF = x, & trianguli AEF area cc, & propter proportionales DF . AF (:: DC. AE) :: CB, EG, hoc est
 $a + x . x :: b . \frac{bx}{a + x}$, erit $\frac{bx}{a + x} = EG$. Hanc duc in $\frac{1}{2}AF$, & emerget $\frac{bxx}{2a + 2x}$ quantitas areae AEF quæ proinde æquatur cc. Atque adeo,

æquatione ordinata, est $xx = \frac{2ccx + 2cca}{b}$ seu $x = \frac{cc + \sqrt{c^4 + 2ccab}}{b}$. (m)

Nihil secus recta per datum punctum ducitur quæ triangulum, (n) vel tra-

Notabo tamen ponendum esse $x = \frac{db + \sqrt{bbdd + 4aapd}}{2p}$ non $x = \frac{db - \sqrt{bbdd + 4aapd}}{2p}$, quia perambulatorium debet piscinam circumdare, non ab ea circumdari. Patet autem, quod, si in prima hypothesi, x habeat valorem positivum, ut supponit problematis solutio, in secunda negativum debet habere, quia tendit ad contrarias partes. Præterea, in prima hypothesi deambulatorii ambitus major est, quam in secunda, & ideo minor debet esse ipsius x longitudo quod mire congruit cum æquatione; nam in prima

$2bca$, & $xx + \frac{2ccx}{a} = 2bcc$. TAB. F. Fig. 10.

hypothese, quantitas $\frac{db}{2p}$, quæ est negativa, minuit quantitatem radicalem positivam; in secunda auget eandem negativam.

Si vero punctum datum C esset intra angulum EAF, tunc punctum D caderet inter A, & F puncta. Quare DF = x - a, unde $cc = \frac{bxx}{2x - 2a}$, & $\frac{2ccx - 2acc}{b} = xx$, quam æquationem facile construes.

(m) Ex A ducatur AH ipsi BC parallela & æqualis e, sit AL = $\frac{BC}{2} = \frac{b}{2}$; junctæ LH ducatur normalis HM; erit $cc = \frac{b}{2} . AM$, quam pono = f; quare $2cc = bf$, & æquatio vertetur in hanc $xx - fx = af$.

Tandem si punctum C esset in ipso crure AE, tunc EG data = b, & $\frac{bx}{2} = cc$, ac $2\frac{cc}{b} = x$. TAB. F. Fig. 11.

Ceterum si posuisssem GE = x, idem fuisset processus; nam x . AF = 2cc, & AF = $2\frac{cc}{x}$, unde DF $(a + 2\frac{cc}{x}) . FA (2\frac{cc}{x}) :: CB (b)$. GE (x), & $ax + 2cc = 2\frac{b^2cc}{x}$, vel $axx + 2ccx =$

(n) Nam sit datum triangulum AEF, & esse debeat data dati trianguli area ad aream quæ sita trianguli ut m ad n, ergo area quæ sita trianguli debeat æquare factum ex dato triangulo in $\frac{n}{m}$, quare area trianguli quæ sita dabitur, & problema recidet in præcedens.

Notandum tamen fieri posse ut recta CG, efficiens cum datis EA, AF triangulum datæ magnitudinis, secet rectam AF productam in G, & tunc quidem esset triangulum LAG ad datum EAF in imperata ratione, ipsum autem triangulum EAF non secuissemus, ut juvabamur, siquidem trapezium AFHL non habet ad triangulum EAF rationem petitam; tunc quaerenda est ratio ipsius EAF ad residuum EAF — LEH, sic EAF . LAFH :: m . n, & divid. EAF — LAFH . EAF :: m — n . m, & quaerenda recta efficiens cum datis AE, EF triangulum habens ad datum datam rationem $\frac{m}{n} = \frac{n}{m}$.

Notandum tamen fieri posse ut recta CG, efficiens cum datis EA, AF triangulum datæ magnitudinis, secet rectam AF productam in G, & tunc quidem esset triangulum LAG ad datum EAF in imperata ratione, ipsum autem triangulum EAF non secuissemus, ut juvabamur, siquidem trapezium AFHL non habet ad triangulum EAF rationem petitam; tunc quaerenda est ratio ipsius EAF ad residuum EAF — LEH, sic EAF . LAFH :: m . n, & divid. EAF — LAFH . EAF :: m — n . m, & quaerenda recta efficiens cum datis AE, EF triangulum habens ad datum datam rationem $\frac{m}{n} = \frac{n}{m}$.

Tom. I.

Bb

trapezium quodvis in data ratione secabit. (o)

PROB. XXI.

Punctum C in data recta linea DF determinare, a quo ad alia duo positione data puncta A & B ductæ rectæ AC & BC datam habeant differentiam. (p)

TAB. III. XLVIII.
Fig. 2.

A datis punctis ad datam rectam demitte perpendiculares AD & BF, & dic $AD = a$, $BF = b$, $DF = c$, $DC = x$, & erit $AC = \sqrt{aa + xx}$, $FC = x - c$, & $BC = \sqrt{bb + xx - 2cx + cc}$. Si jam data harum differentia d , existente AC majori quam BC erit

$$\sqrt{aa + xx} - d = \sqrt{bb + xx - 2cx + cc}.$$

& quadratis partibus

$$aa + xx + dd - 2d\sqrt{aa + xx} = bb + xx - 2cx + cc.$$

Fac-

TAB. G.
Fig. 2.

(o) Sit datum trapezium ABCD, & datum punctum E, per quod transiens recta secare debeat trapezium, ita, ut totum sit ad partem ut recta RS ad ST. Duo quævis trapezii latera, quæ parallela non sint, DA; CB, producantur, donec in H coeant, & recta EGF putetur secare trapezium in data ratione.

Quia datur trapezium specie, & magnitudine, dantur anguli DAB, & CBA, ideoque etiam anguli HAB, ABH, BHA, & triangulum ABH specie datur (40. dat.) ut & magnitudine ob datam rectam AB (52. dat.), datur ergo ratio trapezii ABCD ad triangulum ABH; At datur ratio trapezii ABCD ad trapezium ABFG, datur itaque ratio trianguli ABH ad trapezium ABFG (8. dator.), & ipsius AHB ad GFH. (3. dator.)

Ita autem componetur.

Sit datum triangulum AHB ad datum trapezium ABCD, ut recta VS ad SR; erit igitur triangulum DHC ad triangulum AHB, ut RV ad VS, & recta ducta per E secetur triangulum DHC, ita ut totum sit ad triangulum GFH, ut RV ad VT. Dico trapezium ABCD esse ad trapezium ABFG in imperata ratione RS ad ST.

Est enim ex constructione triangulum GHF ad triangulum DHC ut TV ad VR; sed DHC est ad AHB ut RV ad VS, ergo ex æquo GHF ad AHB ut TV ad VS; & divid. ABFG

ad AHB, ut TS ad SV; atqui AHB ad ABCD, ut VS ad SR; igitur ex æquo ABFG, ad ABCD ut TS ad SR. &c. Q. E. F.

Quin & rectilineum quodecunque ABCEFGH ^{TAB. G.} dividi potest in data ratione, recta transeunte ^{Fig. 3.} per datum punctum L per methodum superiori simillimam.

Secundum enim sit datum rectilineum, ut totum sit ad partem ut recta RS ad ST.

Per L ducatur quævis recta LMG a dato rectilineo abscindens trapezium AHGM, & quia rectæ LG, AM, HG positione dantur, dantur puncta M, G, ac rectæ AM, MG & MH datæ sunt magnitudine, dantur ideo magnitudine triangula MAH, HGM, sive trapezium AHGM (30, 47, & 52. dat.) datur ergo ratio ipsius AHGM ad totum ABCEFGH, sit hæc ut VS ad SR; sed totum ad partem debet esse ut RS ad ST, ergo AHGM debet esse ad partem quæsitam ut VS ad ST, & problema recidit in præcedens.

Quod si trianguli AGF pars GRT ^{TAB. G.} caderet ^{Fig. 4.} extra rectilineum, notandum est quod dantur areæ AGF, ARTF, atque ideo residua GRT; dividendum ergo restat per punctum E in latere TH rectilineum TDCH, vel ARTHB in data ratione sui ipsius ad triangulum GRT.

(p) Forte scribendum in hujus Probl. XXI. enunciatione, *Punctum C in recta linea positione data DF determinare, a quo ad alia duo data puncta &c.*

Factaque reductione & abbreviandi causa pro datis

$aa + dd - bb - cc$ scripto zee , emerget $ee + ex = d \sqrt{aa + xx}$.
 Iterumque quadratis partibus $e^2 + zeeex + ccxx = ddaa + ddx$.

Et æquatione reducta $xx = \frac{zeeex + e^2 - aadd}{dd - cc}$, seu

$$x = \frac{eee + \sqrt{e^4 dd - aad^2 + aaddec}}{dd - cc}. (g)$$

Haud secus problema resolvitur si linearum AC & BC summa, (r) vel quadratorum summa (s) aut differentia, (t) vel proportio, (u) vel rectangulum, (x) vel angulus ab ipsis comprehensus, (y) detur; vel etiam si vice rectæ DC,

(g) Proponetur infra (Probl. XLV.) investiganda ratio describendi per duo data puncta circulum; qui circulum alium positione, & magnitudine datum contingat. Problema nostrum cum illo idem esse dico.

Sint enim data puncta A, B; recta, qua debent differre, M; & recta positione data sit ND.

Puta factum & rectæ AC, CB sint eæ quæ requiruntur.

Centro A radio AL æquali datæ M describe circulum LPQ, qui datur magnitudine & positione (def. 6. dat.) Centro C radio CB describe alterum circulum BEL qui priorem tanget in L, quia ex hypothesi BC & CL æquantur. Ex B demitte in subjectam ND; normalem BD, quæ positione ac magnitudine quoque datur (30, 25, & 26. dat.) hanc produce donec circulo BLE occurrat in E, & erit ED æqualis ipsi DB ac data positione atque magnitudine, itaque datur punctum E. Restat igitur describendus circulus per data duo puncta, B, E, qui circulum PLQ tangat, quod perficietur problemate XLV.

Si vero junctâ AB ipsi DC parallela esset, tunc data perpendicularis AD foret altitudo trianguli ACB, cujus datur basis AB-ob data puncta A, B; igitur si proponeretur describendum triangulum, datis ejus altitudine, basi, & laterum differentia, hoc problema (quod fere idem est, ac IX. hujus) esset casus hujus problematis XXI.

(r) Hæc etiam problematis casus recidit in problema XLV.

Sint enim rursus data puncta A, & B summa rectarum quæratarum data M.

Puta factum, & quæritæ rectæ sint AC, CB.

Ex alterutro ex datis punctis A, radio AL æquali datæ M describe circulum PLQ qui positione, ac magnitudine datur. Centro autem C, radio CB describe circulum BEL qui

priorem contingat in L, ex B demitte in subjectam ND, normalem BD, quam produce donec occurrat circulo BEL in E, erit datum punctum E, quare describendus est circulus per duo data puncta B, E qui alium positione, & magnitudine datum contingat.

Si junctâ AB esset ipsi CD parallela, tunc data normalis BD esset altitudo trianguli ACB cujus datur basis, igitur problema IX. hujus casus est.

(s) Si daretur quadratorum summa, (ceteris, ut supra, stantibus) ea sit $= aa$; ac erit $2xx - 2cx = aa - aa - bb - cc$; fac $aa - aa - bb - cc = 2\beta\beta$, & habebis $xx - cx = \beta\beta$.

(t) Sit quadratorum differentia $= aa$; & ceteris, ut supra, stantibus, erit $2cx = aa - aa + bb + cc$, pone $aa - aa + bb + cc = 2ee$, & invenies $cx = ee$.

(u) Detur 1^o. Rectarum AC, CB ratio, & sit AC $\sqrt{aa + xx}$. CB $\sqrt{bb + xx - 2cx + cc}$:: g. h., igitur $h \sqrt{aa + xx} = g \sqrt{bb + xx - 2cx + cc}$, & quadrando $aabb + hhxx = bbgg + ggxx - 2cggx + cegg$.

2^o. Quadratorum ex AC, CB ratio, & sit AC² $(aa + xx)$. CB² $(bb + xx - 2cx + cc)$:: gg. hh., invenietur, ductis invicem mediis & extremis, æquatio superior.

(x) Si daretur rectangulum AC. CB $= dd$, exsurget æquatio quatuor dimensionum nempe (ceteris, ut supra).

$$\begin{array}{r} + aa \\ x^4 - 2cx^3 + bbxx - 2acx + aabb \\ + cc \\ \hline = dd \end{array}$$

(y) Rectæ AC, CB ductæ ex datis punctis A, B in rectam positione datam NC conti-
 Fig. 8. B b 2 n-

TAB. G. Fig. 5.

TAB. G. Fig. 6.

TAB. G. Fig. 7.

DC, circumferentia circuli, (z) aut alia quævis curva linea adhibeatur, modo calculus (in hoc ultimo præsertim casu) referatur ad lineam conjungentem puncta A & B.

PROB.

neant angulum ACB æqualem dato QRS, & per puncta A, B, C traheatur circulus ABCN, jungatur AB quæ magnitudine ac positione datur, & fiat ad datum punctum B angulus ABD æqualis dato QRS, aut ACB, recta DB positione datur (29. dat.) & tangit circumferentiam in B (per convers. EUCL. 32. III). Excietur BE indefinita ipsi BD ad rectos angulos, quæ positione datur. Biseccetur AB in F, & per F ducatur FE perpendicularis ipsi AB, producatur FE donec ipsi in E occurrat, E punctum datur, eique circuli centrum.

Constructur autem sic. Junctâ AB biseccetur in F, unde elevetur normalis indefinita FE. Fiat angulus ABD æqualis dato QRS & ducatur BE indefinita normalis ipsi BD. centro E, ubi rectæ FE, EB, conveniunt describatur per A aut B circulus, datæ rectæ NC occurrens in duobus punctis N, C. Jungantur AC, CB, aut AN; NB. Dico factum: res liquido patet.

D E T E R M I N A T I O .

Quia vero ad compositionem requiritur ut circulus rectæ positione datæ occurrat, id fiet in unico puncto, quando recta positione data est circuli tangens. Quærendum quando hoc evenit.

Producatur BD donec ipsi NC occurrat in G, & ex G ducatur GH circumulum ABCN tangens in H. Erit igitur HG æqualis GB quæ major est quam CG, & minor quam GN (EUCL. 8. III.) Sumatur ergo GL ipsi GH æqualis, cadet punctum L intra circumulum: quo circa angulus ALB major est angulo ACB. Nam producta BM donec circulo occurrat in M & junctâ AM, erit angulus exterior ALB major interiore & opposito AMB aut ACB.

Sic ergo determinabitur problema.

Fiat angulus ABD dato par, & BD producatur donec ipsi NC occurrat in G. Sumatur GL æqualis GB, & jungantur AL, LB, si angulus ALB dato par est, problema jam est solutum; si dato major, problema est possibile, si vero minor impossibile.

jus peripheriam ducendæ sint ex datis punctis A, B, rectæ AC, CB quarum data sit differentia d. jungantur A, B & ex G centro circuli demittatur in AB normalis GM, & per G ducatur diameter LF ipsi MB parallela & per C agatur LCH ipsi MG parallela.

$$\text{Fiant } AM = a, ML = x, MB = r,$$

$$MG = b, EG = r.$$

$$\text{Jam ex natura circuli } CH^2 = FH.HF = rr - xx$$

$$\text{Erit ergo } LC = b - \sqrt{rr - xx},$$

$$\& CA = \sqrt{aa - 2ax + bb -$$

$$2b\sqrt{rr - xx} + rr}$$

&

$$CB = \sqrt{cc - 2cx + bb - 2b\sqrt{rr - xx} + rr} \pm$$

Posita CA majore quam CB,

$$\sqrt{aa - 2ax + bb - 2b\sqrt{rr - xx} + rr} -$$

$$d = \sqrt{cc - 2cx + bb - 2b\sqrt{rr - xx} + rr},$$

quadratisque partibus

$$aa - 2ax + bb - 2b\sqrt{rr - xx} + rr -$$

$$2d\sqrt{aa - 2ax + bb - 2b\sqrt{rr - xx} + rr} -$$

$$+ dd = cc - 2cx + bb - 2b\sqrt{rr - xx} + rr;$$

& transponendo

$$aa + dd - cc + 2cx - 2ax = 2d\sqrt{aa -$$

$$2ax + bb - 2b\sqrt{rr - xx} + rr}.$$

Fiat, brevitatis causa,

$$aa + dd - cc = 2ff, \& 2c - 2a = 2e;$$

exit denum

$$ex - ff = d\sqrt{aa - 2ax + bb -$$

$$2b\sqrt{rr - xx} + rr};$$

denouoque quadrando

$$eexx + 2effx + f^2 = aadd - 2addx + bbdd -$$

$$2bdd\sqrt{rr - xx} + ddr$$
 (& rursus transponendo, & pro aadd + bbdd + ddr -

$$f^2 scribendo 2eeg, & 2ehh pro 2eff + 2add)$$

$$bdd\sqrt{rr - xx} = eeg - ehx - eexx;$$

& quadrando

$$bbd^2rr - bbd^2xx = e^2g^2 - 2e^2ghhx -$$

$$2e^2gxx + eeh^2xx + 2e^2hhx^2 + e^2xx^2.$$

Ad hujus autem exemplum facile invenitur æquatio pro similibus problematis.

TAB. G. (z) Si autem daretur circulus CDEF ad cu-
Fig. 9.

P R O B . X X I I .

Datis positione tribus rectis AD, AE, BF quartam DF ducere, ^{TAB. III. Fig. 3.}
 cujus partes DE, EF prioribus intercepta, datarum erunt
 longitudinum.

XLIX. Ad BF demitte perpendicularem EG, ut & obliquam EC pa-
 rallelam AD, & rectis tribus positione datis concurrentibus in A, B, & H, dic AB = a, BH = b, AH = c, ED = d,
 EF = e, HE = x. Jam propter similia triangula ABH, ECH, est AH.
 AB :: HE . EC = $\frac{ax}{c}$, & AH . HB :: HE . CH = $\frac{bx}{c}$. Adde HB, &
 fit CB = $\frac{bx + bc}{c}$. Insuper propter similia triangula FEC, FDB, est

ED . CB :: EF . CF = $\frac{ebx + ebc}{dc}$. Denique per 12 & 13. II. Elem. est (a)

$\frac{ECg - EFg}{2FC} + \frac{1}{2}FC (= CG) = \frac{HEg - ECg}{2CH} - \frac{1}{2}CH$, hoc est

$$\frac{aaxx - ce}{2cbx + 2ebc} + \frac{ebx + ebc}{2dc} = \frac{xx - aaxx}{2bx} - \frac{bx}{2c}$$

Sive

$$\frac{aadx - eedc}{ebx + ebc} + \frac{ebx}{d} + \frac{ebc}{d} = \frac{cx - aax - bxx}{b}$$

Hic, abbreviandi causa, pro $\frac{cx - aax - bxx}{b}$, scribe m, & erit

$$\frac{aadx - eedc}{ebx + ebc} + \frac{ebc}{d} = mx, \text{ ac terminis multiplicatis per } x + c, \text{ fiet}$$

aadxx

(a) Nam propter 13. propos. Lib. II. EUCL. EF² = EC² + FC² - 2FC . CG; Idcirco 2FC . CG = EC² - EF² + FC², nempe CG = $\frac{EC^2 - EF^2 + FC^2}{2FC}$; sed FC² = 2FC . $\frac{1}{2}FC$, igitur CG = $\frac{EC^2 - EF^2}{2FC} + \frac{1}{2}FC$. At per 12. prop. Lib. II. EUCL. EH² = CE²

+ CH² + 2CG . CH, scilicet EH² - CE² - CH² = 2CG . CH, id est (cum CH² = 2CH . $\frac{1}{2}CH$) $\frac{EH^2 - CE^2}{2CH} - \frac{1}{2}CH = CG$; ergo $\frac{EC^2 - EF^2}{2FC} + \frac{1}{2}FC = \frac{EH^2 - CE^2}{2CH} = \frac{1}{2}CH$. &c.

$\frac{aadxx - eedcc}{eb} + \frac{ebcx}{d} + \frac{ebcc}{d} = mxx + mcx$. Iterum pro $\frac{aad}{eb} = m$,
 scribe p , pro $mc = \frac{ebc}{d}$ scribe $2pq$, & pro $\frac{ebcc}{d} + \frac{eedcc}{eb}$ scribe pr , &
 evadet $xx = 2qx + rr$, & $x = q \pm \sqrt{qq + rr}$. Invento x five HE,
 age EC parallelam AB, & cape FC. BC :: $e.d$, & acta FED conditio-
 nibus quæstionis satisfaciât.

PROB. XXIII.

TAB. III. *Punctum Z determinare a quo ad quatuor positione datas rectas li-*
 Fig. 4. *neas FA, EB, FC, GD, si alie quatuor lineæ ZA, ZB, ZC,*
& ZD in datis angulis ducantur, duarum e ductis ZA & ZB
rectangulum & aliarum duarum ZC & ZD summa detur.

L. **E** Lineis elige aliquam positione datam FA ut & positione non datam
 ZA quæ ad illam ducitur, ex quarum longitudinibus punctum Z
 determinetur, & cæteras positione datas lineas produc donec his, si opus
 est etiam productis, occurrant, ut vides. Distisque EA = x , & AZ = y ,
 propter angulos trianguli AEH datos dabitur ratio AE ad AH quam po-
 pone p ad q , & erit AH = $\frac{qx}{p}$. Adde AZ, fitque ZH = $y + \frac{qx}{p}$. Et
 inde cum propter datos angulos trianguli HZB, detur ratio HZ ad BZ si
 ea ponatur n ad p habebitur ZB = $\frac{py + qx}{n}$.

Præterea si data EF dicatur a , erit AF = $a - x$, indeque, si pro-
 pter datos angulos trianguli AFI, statuatur AF ad AI in ratione p ad r ,
 evadet AI = $\frac{ra - rx}{p}$. Hanc aufer ab AZ & restabit IZ = $y -$
 $\frac{ra + rx}{p}$. Et propter datos angulos trianguli ICZ, si ponatur IZ ad ZC
 in ratione m ad p , evadet ZC = $\frac{py - ra + rx}{m}$.

Ad eundem modum si ponatur EG = b ; AG . AK :: $l:s$ & ZK . ZD ::
 $p.l$. obtinebitur ZD = $\frac{sb - sx - ly}{p}$.

Jam ex statu quæstionis si duarum ZC & ZD summa $\frac{py - ra + rx}{m} +$
 $\frac{sb - sx - ly}{p}$ ponatur æqualis dato alicui f ; & aliarum duarum rectan-
 gu-

gulum $\frac{pyy + qxy}{n}$ æquale gg , habebuntur duæ æquationes pro determinandis x & y . Per posteriorem sit $x = \frac{ngg - pyy}{qy}$, & hunc ipsius x valorem scribendo pro eo in priori æquatione, evadet

$$\frac{py - ra}{m} + \frac{rngg - rpyy}{mqy} + \frac{sb - ly}{p} - \frac{snng + spyy}{pqy} = f.$$

Et reducendo

$$yy = \frac{apqy - bmqy + fmpq + ggmns - ggnpr}{ppq - ppr - mlq + mps}. \quad (b)$$

Et abbreviandi causa scripto zb pro $\frac{apq - bmq + fmpq}{ppq - ppr - mlq + mps}$, & kk pro $\frac{ggmns - ggnpr}{ppq - ppr - mlq + mps}$ fiet $yy = zby + kk$, sive $y = b \pm \sqrt{bb + kk}$.

Cujus æquationis ope cum y innotescit, æquatio $\frac{ngg - pyy}{qy} = x$, dabit x .

Quod sufficit ad determinandum punctum z .

Ad eundem fere modum punctum determinatur a quo ad plures vel pauciores positione datas rectas totidem aliæ rectæ ducantur ea lege ut aliquarum summa vel differentia vel contentum detur, aut æquetur ceterarum summæ vel differentiæ vel contento, vel ut alias quaslibet habeant assignatas conditiones.

P R O B. X X I V.

Angulum rectum EAF data recta EF subtendere, qua transibit per datum punctum C , a lineis rectum angulum comprehendibus æquidistans. TAB. III. Fig. 5.

LI. Quadratum $ABCD$ compleatur, & linea EF bifecetur in G . Tum dic CB vel CD esse a , EG vel FG esse b , & CG esse

(b) Est enim (omnibus terminis, in quibus y non apparet, in contrariam partem translatis, & æquatione ad simpliciore expressiorem reducta, delendo quicquid denominatoribus, ac numeratoribus commune est) $\frac{py}{mq} - \frac{ly}{p} + \frac{sy}{q} = \frac{ar}{m} - \frac{bs}{p} + f + \frac{ggns}{pqy}$, cunctisque per mqy multiplicatis, $pyy -$

$\frac{mqlyy}{p} + msyy = arqy - \frac{bmlyy}{p} + fmgy + \frac{mgens}{p} - ggnr$, rursusque omnibus in p ductis $ppqyy - ppryy - mqlyy + pmsyy = apqy - bmlgy + pfmgay + mgens - ggnpr$; & omnibus per $ppq - ppr - mlq + mps$ divisus emerget $yy = \&c.$

esse x ; eritque $CE = \kappa - b$, & $CF = x + b$. Dein cum

$$CFq - BCq = BFq, \text{ erit } BF = \sqrt{xx + 2bx + bb - aa}.$$

Denique propter similia triangula CDE, FBC, est $CE \cdot CD :: CF \cdot BF$, sive $x - b, a :: x + b \cdot \sqrt{xx + 2bx + bb - aa}$.

Unde

$$ax + ab = (x - b) \sqrt{xx + 2bx + bb - aa}.$$

Cujus æquationis utraque parte quadrata, & prodeuntibus terminis in ordinem redactis, prodit

$$x^4 = \frac{+ 2aa}{+ 2bb} xx - \frac{+ 2aabb}{b^2}.$$

Et extracta radice sicut fit in æquationibus quadraticis, prodit

$$xx = aa + bb + \sqrt{a^4 + 4aabb}.$$

Adeoque

$$x = \sqrt{aa + bb + \sqrt{a^4 + 4aabb}}.$$

CG sic inventa dat CE vel CF, quæ determinando punctum E vel F problemati satisfacit. (c)

Idem aliter.

Sit $CE = x$, $CD = a$, & $EF = b$, eritque $CF = x + b$ & $BF = \sqrt{xx + 2bx + bb - aa}$. Et proinde cum sit $CE \cdot CD :: CF \cdot BF$, sive $x : a :: x + b \cdot \sqrt{xx + 2bx + bb - aa}$, erit $ax + ab = x \sqrt{xx + 2bx + bb - aa}$. Hujus æquationis partibus quadratis, & terminis in ordinem redactis prodibit

$$x^4 + 2bx^3 - \frac{bb}{2aa} xx - 2aabb - aabb = 0,$$

æquatio biquadratica, cujus radicis investigatio difficilior est quam in priori casu. Sic autem investigari potest. Pone

x^4

TAB. I.
Fig. I.

(c) Sit $CL = b$, erit ducta $LD = \sqrt{aa + bb}$.
Fiat $CM = 2b$. Erit $DM = \sqrt{aa + 4bb}$,
cui par sumatur DN , & CN diametro descri-
batur semicirculus secans rectam DO in O .
Erit $DO^2 = a \sqrt{aa + 4bb} = \sqrt{a^4 + 4aabb}$.
Ad LD engatur in D normalis $DP = DO$.

Recta $LP = \sqrt{LD^2 + DP^2} = \sqrt{aa + bb + 4aa + 4aabb}$, cui æqualis capiatur LQ .
Centro C radio CQ describatur arcus secans
rectam BA in F , ducaturque recta CF . Erit
 $EF = 2b = 2CL$.

$$x^2 + 2bx + \frac{bb}{2aa} xx - 2aabx + a^2 = aabb + a^2,$$

& extracta utrobique radice

$$xx + bx - aa = + a \sqrt{aa + bb}. (d)$$

Ex his occasionem nactus sum tradendi regulam de electione terminorum ad incundum calculum.

Scilicet, cum duorum terminorum talis obvenit affinitas sive similitudo relationis ad ceteros terminos quæstionis, ut oporteret æquationes per omnia similes ex utrovis adhibito produci, aut ambos, si simul adhiberentur, easdem in æquatione finali dimensiones & eandem omnino formam [signis forte + & — exceptis] habituros esse; [id quod facile prospicitur;] tunc neutrum adhibere convenit, sed eorum vice tertium quemvis eligere qui similem utrique relationem gerit, puta semisummam vel semidifferentiam, vel medium proportionale forsan, aut quamvis aliam quantitatem utrique indifferenter & sine compare relatum.

Sic in præcedente problemate cum viderim lineam EF pariter ad utramque AB & AD referri [quod patebit si ducas itidem EF in angulo BAH,] atque adeo nulla ratione suaderi possem cur ED potius quam BF, vel AE potius, quam AF vel CE forius quam CF pro quærenda quantitate adhiberentur; vice punctorum E & F unde hæc ambiguitas proficiscitur, sumpsi [in solutione priori] intermedium G quod parem relationem ad utramque linearum AE & AD observat. Deinde ab hoc G non demisi perpendiculum ad AF pro quærenda quantitate, quia potui eadem ratione demisisse ad AD. Et eapropter in neutrum CB vel CD demisi, sed institui CG quærendum esse, quod nullum admittit compar; & sic æquationem biquadraticam obtinui sine terminis imparibus.

Potui etiam [animadverso quod punctum G jaceat in peripheria circuli centro A, radio EG descripti] demisisse GK perpendiculum in diagonalem AC, & quævisisse AK vel CK, (quippe quæ similem etiam utrinque AB & AD relationem gerunt;) atque ita in æquationem quadraticam $yy =$ —

$$\frac{1}{2}cy + \frac{1}{2}bb \text{ incidissem posito } AK = y, AC = c, \text{ \& } EG = b. (e) \text{ Et}$$

AK

Constructio secunda solutionis;

(d) Radicis investigatio quidem difficilior, ac constructio multo simplicior.

Sit $CL = b$; erit $DL = \sqrt{aa + bb}$; LD bisectetur in M. Circulus centro M, radio ML, descriptus transibit per C. Sumatur $DN = DC = a$; & centro M, radio MN describatur circulus NOPQ. Erit $PL = DN = a$, $LQ = CO$, quæ, ut patet, ipsius x verus est valor.

Quod exemplum docet, non semper id quod algebraice simplicius est, esse quoque

Tom. I.

geometricæ simplicius. Algebraica simplicitas constat facilitate inveniendæ æquationis, & terminorum paucitate: geometrica vero paucitate linearum ducendarum, earum simplicitate, ac facilitate exurgit.

(e) Quod sic acutissimus s'GRAVESANDE reperit.

Ceteris, ut supra, pone $CE = z$, $ED = x$. TAB. I. Erit $AE = a - x$. Habes, ob triangulum Fig. 3. rectangulum ADC, $ee = 2aa$; ob triangulum rectangulum CDE, $zz = aa + xx$, ob similia triangula FEA, CDE, $az = xz = 2bx$,

Cc

az

TAB. I.
Fig. 2.

AK sic invento erigendum fuisset perpendiculum KG præfato circulo occurrens in G, per quod CF transfret.

Ad

$az = 2bx + xz$, $\frac{az}{2b+x} = x$; ob triangulum obtusiangulum CAG, GC² $(bb + 2bz + zz)$ $= AG^2 + AC^2 + 2AC \cdot AK (bx + xz + zcy)$, vel $2bz + zz = ee + 2cy$. Pone in $zz = aa + xx$ valorem ipsius $xx = \frac{aa-zz}{4b + 2b + z}$ desumptum ex secunda æquatione, & habebis (sublati fractionibus)

$$z^4 + 4bz^3 + 4bbz^2 = 2aaz + 2abz + 4abb.$$

At $z^4 + 4bz^3 + 4bbz^2 = (2bz + zz)^2 = (ee + 2cy)^2$, ergo (pro $2aa$ posito ee)

$$eez + 2cebz + 2cbb = ee + 4e^2y + 4e^2yy;$$

& dividendo per ee , $z + 2bz + 2bb = ee + 4ey + 4yy$; sed $z + 2bz = ee + 2ey$, igitur $2bb + ee + 2ey = ee + 4ey + 4yy$; deletis delendis, omnibusque per 4 divisib. $\frac{bb}{2} = \frac{ey}{2} + yy$,

ac $y = \frac{e}{4} \pm \sqrt{\frac{ee}{16} + \frac{bb}{2}}$, quæ ita construi potest.

CONSTRUCTIO.

Centro A, radio b describitur circulus LGPRQ. Sumatur arcus QR $=$ RP. Ducatur AQ. Jungatur LR secans AQ in M. Triangulum LMA erit rectangulum in M & isosceles, siquidem angulus PAR aut RAQ est femirectus, atque ideo QAL, ut & angulus ALM ad peripheriam, qui insitit quadranti; LM est ideo $=$ MA, LM² $=$ AM² $=$ 2AM² $=$ bb , & AM² $=$ $\frac{bb}{2}$. Abscindatur

nunc AS $=$ $\frac{AC}{4}$. Erit MS $=$ $\sqrt{\frac{ee}{16} + \frac{bb}{2}}$.

Centro S, radio SM, describitur arcus secans CP in K, ex quo ducatur KG ipsi MA parallela donec occurrat circulo LPRQ in G, ducatur CG, & erit EF $=$ $2b$.

TAB. I. Brevius autem, analysi geometrica.

Fig. 4. Sit M recta magnitudine data, & ABCD datum quadratum.

Puta factum; sitque EF datæ M par. Ex F demitte ipsi FC ad angulos rectos FL occurrentem CD productæ in L. Ex eodem F eleva normalem FH. Angulus HFL est ideo

FCL par (EucL. 8. VI.), atque FH æqualis CD, quapropter CE, & FL æquantur. Fac AK æqualem datæ M, aut EF. Duc EL, DK, hæc positione ac magnitudine datur (26. dat.). Sunt autem quadrata ex ED, DL, simul, æqualia (quadrato ex EL, aut quadratis ex EF, FL, simul, seu) quadratis ex FE, EC, aut ex FE, CD, DE. Quadratum ergo ex DL æquat quadrata ex FE, CD, id est ex AD, AK, quæ quadrato ex DK æquantur. Datur igitur DL positione, ac magnitudine; quare & CL, & ejus dimidia PL. Si nunc a dato puncto P in rectam positione datam AB agatur PF æqualis ipsi PL, dabitur etiam PF positione (31. dat.), datur ergo punctum F (27. dat.).

Componetur autem sic

In BA producta fac AK datæ M æqualem. Junge DK, qua, tanquam radio, & centro D describere arcum secantem CD productam, in L. Bilinea CL in P, quo centro, & radio PL describere semicirculum secantem rectam BK in F. Age CF. Dico FE æqualem AK.

Sunt enim quadrata ex KA, AD simul, æqualia quadrato (ex KD, seu per constructionem) ex DL. Adde hinc inde quadratum ex DE; & quadrata ex KA, AD, DE simul æquabunt quadrata (ex LD, & ex DE, id est ex EL, seu) ex EF, FL; sed ob angulum HFL æqualem angulo FCL, & lateri FH æquale lateri CD, est FL ipsi EC par. Quadrata igitur ex KA, AD, DE simul æquant quadrata (ex FE, EC, sive) ex FE, ED, DC simul. Aufer utrimque quadratum ex DE, & æqualia quadrata ex AD, DC, & restabit quadratum ex KA æquale quadrato ex FE, aut, quod idem est, AK æqualis FE. Q. E. F.

Alia solutio qua locum habet etiam ubi datus angulus rectus non est, aut ubi quadrilaterum ABCD est rhombus. TAB. I Fig. 5.

Sit quadrilaterum æquilaterum ABCD datum specie, positione, & magnitudine; & ab unius anguli vertice C ducenda sit recta CF lateri BA occurrens in F, ita ut pars EF æquet rectam magnitudine datam M.

Puta factum; & quia quadrilaterum ABCD datur specie, dantur ejus anguli (dat. def. 3), quapropter datur etiam angulus DAF (4. dat.); Duc diagonalem CA, & erit quadrilaterum divisum in triangula specie data (47. dat.), datur ideo angulus CAD, ergo etiam angulus

CAF;

Ad hanc regulam animum advertens, in Prob. 9. & 10. ubi trianguli latera germana BC & AC determinanda erant, quasi potius semidifferentiam quam alterutrum eorum. Sed regulæ hujus utilitas ex vigesimo octavo problemate magis elucefcet.

PROB. XXV.

Ad circulum centro C radio CD descriptum ducere tangentem DB, ^{TAB. III.}
cujus pars PB, inter rectas positione datas AP, AB sita, ^{Fig. 6.}
sit data longitudinis.

LII. **A** Centro C ad alterutram rectarum positione datarum puta AB demitte normalem CE, eamque produc donec tangenti DB occurrat in H. Ad eandem AB demitte etiam normalem PG; & distis EA = a, EC = b, CD = c, BP = d, & PG = x, propter similia triangula PGB, CDH erit GB ($\sqrt{dd - xx}$). PB :: CD . CH = $\frac{cd}{\sqrt{dd - xx}}$. Adde EC; & fiet EH = $b + \frac{cd}{\sqrt{dd - xx}}$. Porro est PG . GB :: EH . EB = $\frac{b}{x} \sqrt{dd - xx} + \frac{cd}{x}$. Adhæc propter angulum

CAF; huic parem fac angulum CEK. Jam triangula CAF, CEK communem habent angulum ACF, & æquales angulos CAF, CEK; sunt itaque similia, & angulus AFC æquat angulum CKE; unde ut FC ad CA sic KC ad CE, adeoque est rectangulum FCE æquale rectangulo KAC; quam ob rem circulus transiens per puncta E, A, K transibit etiam per F: (quod facile probatur per EUCL. 36. & 37. III.) æquales igitur sunt anguli FEK, & (FAK, vel) BAC: Junge FK, & rursus sequantur anguli FKE, & (FAE, vel, ob parallelas AD, BC) ABC; ergo similia sunt triangula ABC, FEK, & est AC ad AB, ut FE ad EK; sed magnitudine dantur BA, EF per hypothefin, & AC ob data puncta A & C, datur ergo magnitudine EK (20. dat.). Item, quia æquilaterum est quadrilaterum ABCD est angulus (BAC, vel) KAF æqualis angulo (ACB, vel) CAD; addito igitur communi EAF, est angulus KAE æqualis (FAC, aut) KEC; sed angulus CKE communis est triangulis CKE, EKA, sunt itaque similia: inde CK ad KE ut KE ad KA, & rectangulum CKA æquatur quadrato ex KE; sed datur hoc quadratum, & recta CA, ergo etiam AK (59. dat.); quocirca datur punctum K, & (ob KE magnitudine, & AD positione, datas) etiam punctum E (31. & 27. dat.).

COMPOSITIO.

Cape R quartam proportionalem post datas AC, AB, M; hujus quartæ quadrato æquale rectangulum applica data CA ut excedat quadrato (EUCL. 29. VI.): sitque applicationis altitudo AK; centro A, radio R describe arcum ipsi AD occurrentem in E: junge CE, quam produc donec BA productæ occurrat in F. Dico EF datæ M esse parem.

Nam, quia ex constructione rectangulum CKA æquat quadrato ex KE, erit CK ad KE ut KE ad KA, & lineæ proportionales sunt circa eundem angulum CKE; igitur similia sunt triangula CKE, EKA (EUCL. 6. VI.); est igitur angulus CEK æqualis angulo (KAE, aut) propter KAF æqualem BAC, vel) CAD, & (FAE communem) FAC, ergo triangula CKE, CFA habentia angulum communem KCF, sunt similia, & angulus CKE æquat angulum CFA, quapropter FC ad CA est ut CK ad CE, & rectangulum FCE æquat rectangulum KCA, igitur circulus transiens per puncta E, A, K transibit etiam per F; sunt ergo æquales anguli FEK, & (KAF, vel) BAC, ut & (ducta FK) FKE ac (EAF, vel) CBA; quocirca CA ad AB est ut FE ad EK; sed ut CA ad AB ita est (per constructionem) M ad EK, æquantur itaque M & FE. Q. E. F.

lum PAG datum, datur ratio PG ad AG, qua posita e ad f , erit $AG = \frac{fx}{e}$.

Adde EA & BG, & habebitur denno $EB = a + \frac{fx}{e} + \sqrt{dd - xx}$.

Est itaque

$$\frac{cd}{x} + \frac{b}{x} \sqrt{dd - xx} = a + \frac{fx}{e} + \sqrt{dd - xx},$$

& per transpositionem terminorum

$$a + \frac{fx}{e} - \frac{cd}{x} = \frac{b - x}{x} \sqrt{dd - xx}.$$

Et partibus æquationis quadratis,

$$aa + \frac{2afx}{e} - \frac{2acd}{x} + \frac{ffxx}{ee} - \frac{2cdf}{e} + \frac{ccdd}{xx} =$$

$$\frac{bbdd}{xx} - bb - \frac{2bdd}{x} + 2bx + dd - xx.$$

Et per debitam reductionem

$$\begin{array}{r} + aace \\ + 2aef \ x^3 \\ - 2bee \\ \hline + aace \\ + bbee \ xx \\ - ddee \\ - 2cdef \\ \hline + 2bddee \ x \\ + 2acdee \\ - 2cdee \\ \hline + ccddee \\ - bbdd \\ \hline ee + ff \ (f). \end{array} = 0$$

PROB.

(f) Pleniorẽ hujus æquationis constructionem invenies infra; sed docenda videtur ratio inveniendi casus, in quibus æquatio biquadratica descendit ad quadraticam; ut hoc fiat, secundus, & quartus terminus simul abesse debent: secundus autem abesset in hac hypothese si $af = be$, & tunc æquatio in hanc mutaretur

$$\begin{array}{r} + aace \\ + bbee \ xx \\ - ddee \ xx \\ - 2cdef \\ \hline + 2bddee \ x \\ + 2acdee \ x \\ - bbdd \\ \hline ee + ff \end{array} = 0;$$

quartus vero evanesceret si $bd = ac$, & tunc

$$\begin{array}{r} + aace \\ + bbee \ xx \\ - ddee \ xx \\ - 2cdef \\ \hline + ccddee \\ - bbdd \\ \hline ee + ff \end{array} = 0;$$

Tunc autem GP . PA :: AE . EC :: CD . PB;
aut $a . b :: e . f :: d . c$.

P R O B. X X V I.

Invenire punctum *D* a quo tres rectae *DA*, *DB*, *DC* ad totidem TAB. III.
 alias positione datas rectas *AE*, *BF*, *CF* perpendiculariter Fig. 7.
 demissae, datam inter se rationem obtineant.

LIII. **E** rectis positione datis producat una, puta *BF*, ut & ejus perpendicularis *BD* donec reliquis *AE* & *CF* occurrant, *BF* quidem in *E* & *F*; *BD* autem in *H* & *G*. Jam sit $EB = x$ & $EF = a$; eritque $BF = a - x$. (*g*) Cum autem propter datam positionem rectorum *EF*, *EA*, & *FC*, anguli *E* & *F*, a seoque rationes laterum triangulorum *EBH* & *FBG* dentur; sit *EB* ad *BH* ut *d* ad *e*; & erit

$$BH = \frac{ex}{d} (b) \text{ \& } EH (= \sqrt{EBq + BHq}) =$$

$\sqrt{xx + \frac{eexx}{dd}}$, hoc est $= \frac{x}{d} \sqrt{dd + ee}$. (*i*) Sit etiam *BF* ad *BG* ut

d ad *f*; & erit $BG = \frac{fa - fx}{d} (k)$ & $FG (= \sqrt{BFq + BGq}) = \sqrt{(aa - 2ax + xx + \frac{ffaa - 2ffax + ffx}{dd})}$, hoc est $= \frac{a - x}{d} \sqrt{dd + ff}$. (*l*)

Præterea dicatur *BD* = *y*, & erit $HD = \frac{ex}{d} - y$, & $GD = \frac{fa - fx}{d} - y$; adeoque cum sit *AD*.*HD* (:: *EB*.*EH*) :: *d*. $\sqrt{dd + ee}$, & *DC*.*GD* (:: *BF*.*FG*) :: *d*. $\sqrt{dd + ff}$, erit $AD = \frac{ex - dy}{\sqrt{dd + ee}}$, & $DC =$

$\frac{fa - fx - dy}{\sqrt{dd + ff}}$. (*m*) Denique ob datas rationes linearum *BD*, *AD*, *DC*, sit *BD*, AD

TAB. I. (*g*) Problema hoc simul explicare, & viam constructioni sternere conabimur.

Fig. 6. Positis, quæ in Auctore; erige *FM*, *EL* normales ad *EF*. Produca *EH*, *FG*, donec normalibus occurrant in *M* & *L*. Dic *FM* = *b*, *EL* = *e*, *EM* = $\sqrt{aa + bb}$ = *m*, *FL* = $\sqrt{aa + ee}$ = *n*.

(*b*) Est *EB* ad *BH*, ut *EF* ad *FM*; sed quia Auctor facit *EB* ad *BH*, ut *d* ad *e*, erit $a.b :: d.e$, & $BH = \frac{ex}{d} = \frac{bx}{a}$. Quia vero *d*, & *e* arbitrarie longitudinis sumi possunt, (dummodo sint inter se ut *EF* ad *FM*) pone *d* = *a*; erit $e = b$, & $\sqrt{dd + ee} = \sqrt{aa + bb} = m$.

(*i*) Id est $EH = \frac{mx}{a}$.

(*k*) Rursus *EB* ad *BG* est, ut *FE* ad *EL*; ut *d* ad *f*. Quia vero posuimus *d* = *a*; erit $f = e$, & $BG = \frac{af - fx}{d} = \frac{ac - cx}{a} = c - \frac{cx}{a}$; $\sqrt{dd + ff} = \sqrt{aa + ee} = n$.

(*l*) Scilicet $FG = \frac{an - nx}{a} = n - \frac{nx}{a}$.

(*m*) Id est $AD = \frac{bx - ay}{n}$, & $DC = \frac{ac - cx - ay}{n}$.

AD :: $\sqrt{dd+ee}$. $b-d$, (n) & erit $\frac{by-dy}{\sqrt{dd+ee}}$ (= AD) = $\frac{ex-dy}{\sqrt{dd+ee}}$,
 five $by = ex$. (o) Sit etiam BD . DC :: $\sqrt{dd+ff}$. $k-d$ (p) & erit
 $\frac{ky-dy}{\sqrt{dd+ff}}$ (= DC) = $\frac{fa-fx-dy}{\sqrt{dd+ff}}$, five $ky = fa-fx$. (q) Est ita-
 que $\frac{ex}{b}$ (= y) = $\frac{fa-fx}{k}$; & per reductionem $\frac{fba}{ek+fb} = x$. (r) Qua-
 re cape EB . EF :: $b \cdot \frac{ek}{f} + b$, dein BD . EB :: $e \cdot b$, & habebitur pun-
 ctum quaesitum D.

PROB. XXVII.

TAB. III.
 Fig. 8. *Invenire punctum D, a quo tres rectae DA, DB, DC ad data tria puncta A, B, C, ductae, datam inter se rationem obtineant.*

LIV. **E** Datis tribus punctis junge duo quavis, puta A & C; & a ter-
 tio B ad lineam conjungentem AC demitte perpendicularum
 BE, ut & perpendicularum DF a puncto quaesito D; distisque AE = a, AC
 = b, EB = c, AF = x, & FD = y, erit ADq = xx + yy. FC = b - x.
 CDq (= FCq + FDq) = bb - 2bx + xx + yy. EF = x - a, ac
 BDq (= EFq + (EB + FD) quadratum) (s) = xx - 2ax + aa + cc +
 2cy + yy. Jam cum sit AD ac CD in data ratione, sit illa ratio d ad e; &
 erit CD = $\frac{e}{d} \sqrt{xx+yy}$. Cum etiam sit AD ad BD in data ratione,
 sit ista ratio d ad f, & erit BD = $\frac{f}{d} \sqrt{xx+yy}$. Adeoque est $\frac{eex+ecyy}{dd}$
 (= CDq) = bb - 2bx + xx + yy, & $\frac{fxx+ffyy}{dd}$ (= BDq) = xx -
 2ax

(n) Sit ME ad FN ut esse debet BD ad DA,
 & dic EN = b, erit EN = b - a, vel
 b - d.

(o) Nempe by = bx.

(p) Sit rursus LE ad FO, ut esse debet BD
 ad DC. Dic EO = k, & FO erit k - a,
 vel k - d.

(q) Seu juxta nos ky = ac - cx.

(r) Nostri symbolis x = $\frac{ach}{bk+cb}$. Restat

igitur faciendum EB . EF :: $b \cdot \frac{bk}{c} + b$, seu

EB . EF - EB (BF) :: $b \cdot \frac{bk}{c}$, id est quere
 quartam NP post LE, EO, MF, & seca da-
 tam EF in B ut secta est EP in N, erit EB = x.
 Cetera facile inveniuntur.

(s) Nam si DF producatur, & per B ducatur
 BH ipsi EF parallela; patet FH = EB, TAB. I.
 & BH = EF, aique BD = BH² (five EF²) Fig. 7.
 + DH² (five (DE + EB)²).

$2ax + aa + cc + 2cy + yy.$ (t) In quibus si abbreviandi causa, pro $\frac{dd - ee}{d}$ scribatur p , & q pro $\frac{dd - ff}{d}$, (v) emerget

$$bb - 2bx + \frac{p}{d} xx + \frac{p}{d} yy = 0,$$

&

$$aa + cc - 2ax + 2cy + \frac{q}{d} xx + \frac{q}{d} yy = 0.$$

Per priorem est $\frac{2bqx - bbq}{p} = \frac{q}{d} xx + \frac{q}{d} yy.$ (x) Quare in posteriori pro $\frac{q}{d} xx + \frac{q}{d} yy$ scribe $\frac{2bqx - bbq}{p}$ & oriatur $\frac{2bqx - bbq}{p} + aa + cc - 2ax + 2cy = 0.$ Iterum, abbreviandi causa, scribe m pro $a - \frac{bq}{p}$, & $2cn$ pro $\frac{bbq}{p} - aa - cc$, & erit $2mx + 2cn = 2cy$; terminisque per $2c$ divisus $\frac{mx}{c} + n = y.$ Quamobrem in æquatione $bb - 2bx + \frac{b}{d} xx + \frac{p}{d} yy = 0$, pro yy scribe quadratum de $\frac{mx}{c} + n$, & habebitur

$$bb - 2bx + \frac{p}{d} xx + \frac{pmm}{dcc} xx + \frac{2pmm}{dc} x + \frac{pnn}{d} = 0.$$

Ubi denuo si, abbreviandi causa $\frac{b}{r}$ scribatur pro $\frac{p}{d} + \frac{pmm}{dcc}$, (y) $\frac{sb}{r}$ pro $b -$

(t) In prima æquatione duc omnia in dd , & habebis

$eexx + eeyy = bbdd - 2bdxx + ddx + ddy,$
& tranponendo, ac rursus dividendo per dd ,
erit

$$bb - 2bx + \left(\frac{dd - ee}{dd}\right) xx + \left(\frac{dd - ee}{dd}\right) yy = 0.$$

Idem fac in secunda.

(v) Sume ad libitum aliquam rectam, quam dic $= d$, hanc fac ad aliam ut debet esse AD ad DC, hanc secundam dic $= e$. Rursus sit d ad aliam ut esse debet AD ad DB, hancque tertiam dic $= f$. Fac nunc $d . d + e :: d - e$ ad quartam $= p$; & $d . d + f :: d - f$ ad quartam $= q$.

(x) Transpone $bb - 2bx$ in priori æquatione, sic inventurus $\frac{p}{d} xx + \frac{p}{d} yy = 2bx - bb.$

Duc omnia in q , & divide per p , & obtinebis $\frac{q}{d} xx + \frac{q}{d} yy = \frac{2bqx - bbq}{p}.$

(y) Ceteris, ut supra, stantibus, sit $EG = m.$ $GB^2 = cc + mm$; sed ducta EK normali $GB^2 . BE^2 (= SB . BK) :: GB . BK.$ Fiat ergo $p . b :: d . (e)$, & $GB . BK :: e . (r)$, ea æquabit $\frac{ecc}{cc + mm} = \frac{bdcc}{pcc + pmm}$, quare $r(pcc + pmm) = bdcc$, & $\frac{p}{d} + \frac{pmm}{dcc} = \frac{b}{r}.$

$$b - \frac{pmz}{dc}, (z)$$

&c

$$\frac{tbb}{r} \text{ pro } bb + \frac{pmz}{d}, (a) \text{ habebitur } xx = 2sx - tb.$$

Et extracta radice $x = s \pm \sqrt{ss - tb}$. Invenio x æquatio $\frac{mx}{c} + n = y$, dabit y ; & ex datis x & y , hoc est AF & FD determinatur punctum quaesitum D.

(z) Rursum quia $\frac{sb}{r}$ debet æquare $\frac{bdc - pmz}{dc}$,
 $\& \frac{sb}{r} = \frac{sb(pcc + pmz)}{bdcc}$, erit $s \left(\frac{pcc + pmz}{c} \right)$
 $= bdc - pmz = epc - pmz$, & $s(cc + mm)$
 $= ecc - mnc$. Faciendum est ergo $cc + mm$
 (BG^2) . $ec - mn :: c$. (s).

(a) Item quia $\frac{tbb}{r} = bb + \frac{pmz}{d}$, erit $t = r +$
 $\frac{prnz}{bbd} = r + \frac{rnn}{cb} = \frac{ccnn}{b(cc + mm)} + r$. Fac
 itaque $cc + mm$. $cc :: \frac{nn}{b}$. (a), cui adjice r .

De locis Geometricis.

1. Natura lineæ rectæ optime percipitur ex prorsus eadem omnium partium positione, quomodocunque partes illæ considerentur. Natura curvarum luculentissime intelligeretur ex diversâ partium positione, & una curva ab aliis distingueretur varietatibus occurrentibus in hac diversâ partium positione. Sic linea circularis ea est quæ habet partes eodem modo positas, si a centro spectentur; quod non accidit in aliis curvis: & hæc ipsa diversitas in partium positione, dicitur curvædo. Cum autem difficilior sit curvædinis determinatio, aliam viam inveniunt Geometræ, & linearum naturam definiunt per relationem rectarum certo modo ductarum.

2. Rectæ, quarum relatio exponit lineæ alicujus ABC naturam, sic determinari solent. Sumuntur duæ rectæ BD; DE, concurrentes in puncto D, quarum altera BD rectæ FG positione datæ parallelæ est, altera DE rectæ GH

pariter positione datæ parallelæ est. Hæc rectæ hinc terminantur a puncto D ubi concurrunt, inde vel utraq; a linea cujus naturam exponunt, vel altera DB a linea in B; altera ED a puncto quodam determinato E. Et hæc rectæ ED; dicuntur *coordinatæ*.

3. Plerumque ea recta, quæ incipit a dato puncto E, datur positione; & tunc illius partes ED; Ed &c, dicuntur *abscissæ*; & rectæ parallelæ BD; bd &c, vocantur *ordinatæ*, vel *applicatæ*.

4. Sed arbitraria est hæc distinctio. Agatur enim per datum punctum E recta indefinita EI ipsi FG parallelæ, & per aliquod lineæ definiendæ punctum B recta BK ipsi ED parallelæ, & rectæ EI occurrunt in K; cum æquales sint BD; KE, ut & ED; KB (Eucl. 34. l.) lineæ ABC natura æque definitur rectis EK; KB, ac rectis ED; DB. Si lineæ ABC natura definitur rectis LK; KB, erit EK abscissa, KB ordinata; contra ED abscissa & DB ordinata, si linea determinetur rectis ED; DB.

5. Semper autem datum punctum E dicitur *vertex* vel *origo*. Hæc non omittenda censui, quanquam ponam cognitas præcipuas lineæ rectæ & sectionum conicarum proprietates.

6. Relatio inter coordinatas definitur vel ex problematis legibus, vel ex cognita lineæ natura. Exempla primi generis attulit NEWTONUS Sc. G. IV. Nis. XXVII. & XXVIII; & multa afferet infra. Secundi generis hæc sint.

7. Si ABC est linea recta positione data, TAB. K recta abscissarum AE pariter positione data, Fig. 2. & cum ea datum angulum constituent ordina-

TAB. K.
Fig. 1.

tæ BD, datur ratio AD ad DB. (Eucl. Dat. 40., & def. 3; & 2. VI.) Et si data sit ratio AD ad DB, recta AE positione data, & datum punctum A, tanget punctum B rectam positione data. Si enim assumatur AF datæ magnitudinis, ab F sub dato angulo ducatur FG, ponatur AF ad FG in data ratione, & agatur AG recta, ea transibit per B. Complicantur parellogramina AFGH; ADBI; hæc sunt æquiangulara ob æquales angulos AFG; ADB; & habent proportionalia latera AF; FG; AB; BD, ergo sunt circa eandem diagonalem (Eucl. 26. VI.)

15. Si linea ABC est hyperbola circa diame- TAB. K.
tros, ejus diameter transversa Pp = d; para- Fig. 5.
meter ad eam pertinens = π, erit pD = d+x,
& æquatio ad hyperbolam hæc invenietur
 $xx + dx - \frac{d^2 y}{\pi} = 0.$

16. Si linea ABC est hyperbola inter asym- TAB. K.
totos, quarum alteri parallela est ordinata DB, Fig. 6.
ejus diameter secunda = x, erit xy - xx = 0,
æquatio ad hæc hyperbolam.

17. Recentiores distinguunt locos ex æqua-
tionum dimensionibus, & vocant locum pri-
mi gradus, cum ejus æquatio est unius di-
mensionis, id est locum ad rectam; locum se-
cundi gradus cujus æquatio est duarum dimen-
sionum, id est ad sectiones conicas, quibus cir-
culus est annumerandus; locum tertii gradus,
cujus æquatio est trium dimensionum, & sic
de reliquis, quorum exempla nonnulla occur-
rent infra.

18. Æquationem autem vocant unius di-
mensionis, cum neque indeterminatarum aut
coordinatarum potelates, neque facta ex illis
continet. Hujusmodi est æquatio ad rectam.
Æquationem dicunt duarum dimensionum cum
habet aut alterius saltem coordinatæ quadra-
tum, ut æquatio ad parabolam, aut utriusque
coordinatæ quadratum, ut æquatio ad ellipsem
& ad hyperbolam circa diametros, aut factum
ex coordinatis, ut æquatio ad hyperbolam in-
tra asymptotos. Uno verbo numerus dimen-
sionum definitur a maximo aggregato indicium
indeterminatarum, quæ constituunt unum ter-
minum simplicem æquationis.

19. Quivis locus complectitur puncta nu-
mero infinita; e singulis punctis loci duci pos-
sunt ordinatæ, quæ determinant totidem ab-
scissas; ergo quilibet locus complectitur infi-
nitum coordinatarum numerum; quæ cum ex-
ponantur æquatione indeterminata, intelligen-
dus mirum in modum consentire naturam lo-
corum cum natura æquationum indetermina-
tarum.

20. Ubi vero lineæ natura definita est, ea
referri potest ad ordinatas a prioribus diversas.
Mutari enim potest I. verticis positio. II. po-
sitio ordinatarum. III. positio verticis & ordi-
natarum simul. IV. positio abscissæ. V. positio
verticis & abscissæ. VI. positio tum ordina-
tarum tum abscissarum. VII. positio tum ordi-
natarum, tum abscissarum, tum verticis.

TAB. K.
Fig. 3. 8. Iisdem positis sit ABC parabola, AE dia-
meter ordinatarum BD, & A vertex, erit rec-
tángulum sub parametro & abscissa AD æqua-
le quadrato ordinatæ DB; & si vertice A, dia-
metro ÆE, & parametro pertinente ad dia-
metrum ÆE describatur parabola, & sit rectan-
gulum sub parametro & abscissa æquale qua-
drato ordinatæ, alterum extremum B ordina-
tæ tangent hæc parabolam.

9. Hæc facile accommodantur ad ellipsem,
& ad hyperbolam tum circa diametros, tum in-
tra asymptotos.

10. Lineæ quæ transeunt per extrema ordi-
natarum, appellantur loci. Veteres dixerunt
locos planos quicunque sunt lineæ rectæ & cir-
culi; locos solidos sectiones conicas, & locos
lineares alias curvas superiores. De locis planis
scripsit APOLLONIUS libros duos, quos
deperditos optime restituit Robertus SIMSON.

11. Ex mente recentiorum algebra utentium,
abscissæ AD dicantur x; ordinatæ DB y;

TAB. K.
Fig. 2. 12. Ubi linea ABC est recta, data ratio sit
 $d. \pi$; erit $d. \pi :: x. y$; & $x = \frac{d y}{\pi}$, vel $x -$
 $\frac{d y}{\pi} = 0$, æquatio ad rectam.

TAB. K.
Fig. 3. 13. Quando linea ABC est parabola, & π
est parameter pertinens ad diametrum ÆE, erit
 $\pi x = yy$, vel $\pi x - yy = 0$, æquatio ad pa-
rabolam.

TAB. K.
Fig. 4. 14. Si linea ABC est ellipsis, ejus diameter
Pp = d, & parameter pertinens ad dia-
metrum Pp, = π, erit Dp = d-x; & dx-xx.
 $yy :: d. \pi$; atque $dx-xx = \frac{d y y}{\pi}$, vel $xx -$
 $dx + \frac{d y y}{\pi} = 0$, æquatio ad ellipsem.

TAB. K.
Fig. 7.

27. In sequentibus ponam lineæ ABC naturam primo, ut in numeris 11—16, definitam esse rectis PD; DB, quarum altera PD incipit a dato puncto P, altera DB rectæ ST positione datæ & transeunt per P, parallela est; ita ut ex recta RPQ desumantur abscissæ x, quæ positivæ sunt a P versus Q, & negativæ a P versus R; & ordinatæ DB vel PG ex ST, quæ positive procedunt a P versus S, & negative a P versus T.

22. I. Mutetur vertex, qui ponatur in O vel N, & fingatur NP = PO = a.

Statim dicatur ND = u = NP + PD = a + x; & u - a = x.

Jam dicatur OD = u = DP - PO = x - a; & u + a = x.

Quare in omni æquatione locali, in qua mutatur vertex, poni debet u = a pro x, reliquis manentibus; quæ substitutio si fiat in æquationibus supra inventis fiet

$$23. u = a - \frac{\partial y}{\pi} = 0, \text{ æquatio ad rectam.}$$

24. $\pi u = a\pi - yy = 0, \text{ æquatio ad parabolam.}$

$$25. uu = \frac{2ay + aa}{\partial a} + \frac{\partial yy}{\pi} = 0, \text{ æquatio ad ellipsum.}$$

$$26. uu = \frac{2au + aa}{\partial u} - \frac{\partial yy}{\pi} = 0, \text{ æquatio ad hyperbolam circa diametros.}$$

27. $uy = ay - xx = 0, \text{ æquatio ad hyperbolam inter asymptotos.}$

Sed quoniam tum ellipsis tum hyperbola circa diametros, habent centrum, quod bisecat diametrum, si origo abscissarum transferatur in ipso centro, erit a = $\frac{\partial}{2}$ = PO = Op.

TAB. K.
Fig. 4.

28. Erit igitur in ellipsi PD = PO — OD = a - u, & Dp = pO + OD = a + u, & ideo aa - uu . yy :: 2a . π ; & aa - uu = $\frac{2ayy}{\pi}$, aut uu - aa + $\frac{2ayy}{\pi}$ = 0 æquatio ad ellipsum, quando origo abscissarum est in ipso centro.

TAB. K.
Fig. 5.

29. In hyperbola erit PD = DO — OP = u - a & Dp = DO + Op = u + a; & uu - aa . yy :: 2a . π ; uu - aa = $\frac{2ayy}{\pi}$,

aut uu - aa - $\frac{2ayy}{\pi}$ = 0, æquatio ad hyperbolam circa diametros, quando origo abscissarum est in centro.

30. Æquationes N^o. 28. & 29, quia carent secundo termino, censendæ sunt simpliciores æquationibus N^o. 25 & 26.

31. II. Mutetur positio ordinarum, & curva quæ referebatur ad coordinatas PD; DB, referatur ad coordinatas PE; EB, quarum altera PE = u, abscinditur ab eadem recta RQ, & originem ducit ab eodem puncto P, ac prior PD; altera BE quam ponet = z, constituit cum ea datum angulum. Age per P rectam indefinitam LM quæ faciat angulum LPR dato æqualem, & quæ ideo positione dabitur. Dantur ergo omnes anguli circa punctum P. Dantur quoque omnes anguli in triangulo BDE; quare & ratio laterum DB; BE; ED. Quam determinaturus, abscinde a PT datam PL, quam dic = β ; per I age IK parallelam ipsi RQ, & dic IK = γ ; & KP = a.

TAB. K.
Fig. 8.

Ob parallelas IK; RP, æquales sunt anguli IKP; RPL ad easdem partes partes oppositi; sed RPL angulus factus est æqualis angulo BED; ergo æquales sunt anguli IKP; DEB. Eodem pacto demonstrantur æquales anguli KIP; EDB. Quare æquiangula sunt triangula IPK; DEB: & IP (β). PK (*) :: DB (γ).

$$\text{BE (z), \& } \gamma = \frac{\beta z}{a}.$$

Item IP (β). IK (γ) :: BD ($\gamma = \frac{\beta z}{a}$). DE;

est ergo DE = $\frac{\gamma z}{a}$, & PE = u = PD +

$$\text{DE} = x + \frac{\gamma z}{a}, \text{ \& } u - \frac{\gamma z}{a} = x, \text{ ubi punctum E cadit extra puncta P \& D, ut in figura; sed } u + \frac{\gamma z}{a} = x, \text{ ubi punctum E cadit}$$

intra puncta P; D. Ergo in æquationibus N^o. 12. 13. 14. 15. 16.

$$\text{pro } \gamma \quad \text{ponamus } \frac{\beta z}{a}$$

& pro x ambigue u = $\frac{\gamma z}{a}$, fiet

$$32. u = \frac{\gamma z}{a} - \frac{\beta \partial z}{\pi} = 0, \text{ æquatio ad rectam.}$$

33. $\pi u \pm \frac{\pi yz}{s} - \frac{\beta\beta z z}{\pi} = 0$, æquatio ad parabolam.

$$34. \pi u \pm \frac{2\gamma yz}{s} + \frac{\gamma y z z}{\pi} - \delta u \pm \frac{\delta y z}{s} = 0,$$

æquatio ad ellipſim.

$$35. \pi u \pm \frac{2\gamma yz}{s} - \frac{\delta\beta\beta z z}{\pi} + \delta u \pm \frac{\delta y z}{s} = 0,$$

æquatio ad hyperbolam circa diametros.

36. $\frac{\beta u z}{s} \pm \frac{\beta\gamma z z}{\pi} - \pi x = 0$, æquatio ad hyperbolam intra aſymptotos.

37. III. Si præterea origo transferretur in O aut N.

pro y poni deberet $\frac{\beta z}{s}$
& pro x $u \pm \frac{\gamma z}{s} \pm \pi$.

in æquationibus primo inventis, unde evaderet

38. $u \pm \frac{\gamma z}{s} - \frac{\beta\delta z}{\pi} \pm u = 0$, æquatio ad rectam.

39. $\pi u \pm \frac{\pi yz}{s} \pm \pi\pi - \frac{\beta\beta z z}{\pi} = 0$, æquatio ad parabolam.

$$40. \pi u \pm \frac{2\gamma yz}{s} + \frac{\gamma y z z}{\pi} \pm 2\pi u + \frac{2\pi\gamma z z}{s} + \pi u$$

$$= 0, \text{ æquatio ad ellipſim.}$$

$$41. \pi u \pm \frac{2\gamma yz}{s} - \frac{\delta\beta\beta z z}{\pi} + \delta u \pm \frac{\delta y z}{s} = \pi\delta$$

$$= 0, \text{ æquatio ad hyperbolam circa diametros.}$$

42. $\frac{\beta u z}{s} \pm \frac{\beta\gamma z z}{\pi} \pm \frac{\alpha\beta z}{s} - \pi x = 0$,

æquatio ad hyperbolam intra aſymptotos.

43. IV. Mutetur poſitio abſciſſæ, & curva TAB. K. quæ referebatur ad PD (x); DB (y), referatur ad PH (u); BH (z). Quia dantur anguli DPH; PHD, per hypotheſim, datur ratio PD ad DH, & PH ad HD. Sit $\beta, \zeta :: PD(x)$.

DH = $\frac{\zeta x}{\beta}$; & $\gamma, \zeta :: PH(u)$. HD($\frac{\zeta x}{\beta}$); erit $\zeta u = \frac{\zeta y x}{\beta}$; & $\frac{\beta u}{\gamma} = x$. Eſt autem BH =

BD + DH = $y + \frac{\zeta u}{\gamma}$, ubi recta XPY cadit intra angulum QPT, & ubi ea cadit intra angulum QPS eſt BH = $y - \frac{\zeta u}{\gamma}$. Quare z = $y \mp \frac{\zeta u}{\gamma}$. Igitur in æquationibus Nm. 12. 13. 14. 15. 16.

pro x ponamus $\frac{\beta u}{\gamma}$
& pro y $z \pm \frac{\zeta u}{\gamma}$
& fiet

44. $\frac{\beta u}{\gamma} - \frac{\delta z}{\pi} \pm \frac{\delta y z}{\pi\gamma} = 0$, æquatio ad rectam.

45. $\frac{\pi\beta u}{\gamma} - z z \pm \frac{2\zeta u z}{\gamma} - \frac{\zeta^2 u u}{\gamma\gamma} = 0$,
vel, liberando uu a coefficiente, & transponendo.

$$uu \pm \frac{2\gamma u z}{\zeta} + \frac{\gamma y z z - \pi\beta y u}{\zeta^2} = 0,$$

æquatio ad parabolam.

46. $\frac{\beta\beta u u}{\gamma\gamma} - \frac{\delta\beta u}{\gamma} + \frac{\delta z z}{\pi} \pm \frac{2\delta\zeta u z}{\pi\gamma} + \frac{\delta\zeta^2 u u}{\pi\gamma\gamma} = 0$,

vel, liberando uu a coefficientibus,

$$uu = \frac{2\delta\gamma\zeta u z - \delta\gamma y z z - \delta\gamma\beta u u}{\pi\beta\beta + \delta\zeta^2} = 0,$$

æquatio ad ellipſim.

47. $\frac{\beta\beta u u}{\gamma\gamma} + \frac{\delta\beta u}{\gamma} - \frac{\delta z z}{\pi} \pm \frac{2\delta\gamma u u}{\pi\gamma} - \frac{\delta\zeta^2 u u}{\pi\gamma\gamma} = 0$

vel, liberando uu a coefficientibus,

$$uu = \frac{2\delta\gamma\zeta u z - \delta\gamma y z z + \delta\beta\gamma u u}{\pi\beta\beta - \delta\zeta^2} = 0,$$

æquatio ad hyperbolam circa diametros.

$$48. \frac{\beta u z}{\gamma} \pm \frac{\beta \zeta u u}{\gamma \gamma} - x x = 0,$$

æquatio ad hyperbolam intra asymptotos.

49. V. Mutetur præterea positio originis, quæ transferatur in O, aut N.

$$\text{pro } x \text{ ponere debemus } \frac{\beta u}{\gamma} \pm a$$

$$\& \text{ pro } y \quad z = \frac{\zeta y}{\gamma}$$

in æquationibus Nm. 12. 13. 14. 15. 16. & fiet

$$50. \frac{\beta a}{\gamma} - \frac{\delta c}{\pi} \pm \frac{\delta \zeta u}{\pi \gamma} \mp a = 0, \text{ æquatio ad rectam.}$$

$$51. \frac{\pi \beta u}{\gamma} \mp \pi \tau - z z \pm \frac{z \zeta u z}{\gamma} - \frac{\zeta \zeta u u}{\gamma \gamma} = 0,$$

vel liberando $u u$ a coefficiente, & transponendo,

$$u u \mp \frac{z \zeta u z}{\zeta} + \frac{\gamma \gamma z z - \pi \gamma \beta u \mp \pi \gamma \gamma}{\zeta \zeta} = 0,$$

æquatio ad parabolam.

$$52. \frac{\beta \beta u u}{\gamma \gamma} - \frac{\beta \delta u}{\gamma} \mp \pi d + \frac{\delta z z}{\pi} = \frac{z \delta \zeta u z}{\pi \gamma} +$$

$$\frac{\delta \zeta \zeta u u}{\pi \gamma \gamma} = 0,$$

vel, liberando $u u$ a coefficientibus,

$$u u \mp \frac{z \delta \zeta u z + \delta \gamma \gamma z z}{\pi \beta \gamma + \delta \zeta \zeta} =$$

$$\pi \frac{(2 \alpha \beta \pi \gamma \mp \beta \delta \pi \gamma) + \pi \gamma \gamma (u u \mp \pi d)}{\pi \beta \gamma + \delta \zeta \zeta} = 0,$$

æquatio ad ellipsum.

$$53. u u \frac{+ 2 \delta \gamma \zeta u z - \delta \gamma \gamma z z}{= \beta \beta - \delta \zeta \zeta} =$$

$$u \frac{(2 \alpha \beta \pi \gamma \mp \beta \delta \pi \gamma) + \pi \gamma \gamma (u u \mp \pi d)}{\pi \beta \gamma - \delta \zeta \zeta} = 0,$$

æquatio ad hyperbolam circa diametros, faciliè inveniendâ ad modum superioris.

$$54. \frac{\beta u z}{\gamma} = a z = \frac{\beta \zeta u u}{\gamma \gamma} + \frac{\pi \beta u}{\gamma} - x x = 0,$$

æquatio ad hyperbolam intra asymptotos.

55. VI. Nunc mutetur positio utriusque coordinatæ, & linea ABC, quæ referrebat ad coordinatas PD (x); DB (y), referatur ad PE (u); EB (z), quarum altera PE abscinditur a rectâ XZ, positione datâ, altera BE rectæ LPM positione datâ parallela est.

Abscindatur, ut No. 31, PI = β , agatur IK parallela ipsi RQ & occurrens rectæ LM in K, & rectæ XZ in Y; & ponatur IK = γ ; KP = ϵ ; KY = ζ ; YP = λ .

Triangula IPK; DBU ostendentur similia ut No. 31, & hinc inveniatur BU = $\frac{\epsilon y}{\beta}$, &

$$DU = \frac{\gamma y}{\beta}; \& \text{ PU} = \text{PD} \pm \text{DU} = x \pm \frac{\gamma y}{\beta}.$$

Sed, ob parallelas MP; EB, anguli alteri KPY; PEB sunt æquales, ut & anguli KYP; EPU alteri inter parallelas KI; PQ; ergo est KY (ζ).YP (λ) :: UP ($\frac{\beta x \pm \gamma y}{\beta}$).PE (a); & $\beta \zeta u = \beta \lambda x \pm \gamma \lambda y$.

$$\text{Item YK } (\zeta). \text{KP } (\epsilon) :: \text{PU } (\frac{\beta x \pm \gamma y}{\beta}). \text{UE} =$$

$$\frac{\beta \lambda x \pm \gamma \lambda y}{\beta \zeta}; \& \text{ BE} = \text{BU} \pm \text{UE} =$$

$$\frac{\zeta \epsilon y \pm \beta \epsilon x \mp \gamma \epsilon y}{\beta \zeta} = z,$$

Æquatio $\beta \zeta u = \beta \lambda x \pm \gamma \lambda y$, dat

$$\frac{\beta \zeta u}{\beta \lambda} = x.$$

$$\text{Æquatio } \pm \beta \epsilon x \mp \gamma \epsilon y + \zeta \epsilon y = \beta \zeta z, \text{ dat } x = \pm \frac{\beta \zeta z \mp \gamma \epsilon y}{\beta \epsilon}; \text{ quare } \frac{\beta \zeta u \mp \gamma \lambda y}{\lambda} =$$

$$\frac{\beta \zeta z \pm \gamma \epsilon y \pm \zeta \epsilon y}{\epsilon}; \text{ unde } \beta \zeta u \mp \gamma \lambda y =$$

$$\beta \lambda \zeta z \mp \gamma \epsilon y \pm \zeta \epsilon y; \& \text{ deleto commune } \gamma \epsilon y, \text{ manet } \beta \zeta u = \beta \lambda \zeta z \pm \zeta \epsilon y, \text{ unde } y =$$

$$\frac{\beta \lambda \zeta z \pm \beta \epsilon \zeta u}{\zeta \epsilon \lambda} = \frac{\beta \lambda z \pm \beta \epsilon u}{\epsilon \lambda}.$$

Hic valor positus in $x = \frac{\zeta u}{\lambda} \mp \frac{\gamma y}{\beta}$, dat $x =$

$$\frac{\zeta u}{\lambda} \pm \frac{\beta \gamma \lambda z \pm \beta \epsilon \gamma u}{\beta \epsilon \lambda} = \frac{\zeta u}{\lambda} \mp \frac{\gamma \lambda z \pm \epsilon \gamma u}{\epsilon \lambda} =$$

$u \left(\frac{\zeta \pm \gamma}{\lambda} \right) \pm \frac{\gamma \zeta}{i}$, & ponendo KY \pm IK

$=$ IY $=$ $\zeta \pm \gamma = n$, fiet $\frac{ny}{\lambda} \pm \frac{\gamma \zeta}{i} = x$.

Quapropter in æquationibus sæpius citatis

pro x poni debet $\frac{ny}{\lambda} \pm \frac{\gamma \zeta}{i}$

& pro y $\frac{\beta z}{i} \pm \frac{\beta n}{\lambda}$

Hinc fiet

56. $u \left(\frac{\pi n + \beta \delta}{\pi \lambda} \right) - z \left(\frac{\pi \gamma + \beta \delta}{\pi i} \right) = 0$,

æquatio ad rectam

57. $nu \pm 2nz \frac{\lambda}{i} + zc \frac{\lambda \lambda}{ii} - u \frac{\pi \lambda \eta}{\beta \beta} =$

$z \frac{\pi \lambda \lambda \gamma}{i \beta \beta} = 0$,

æquatio ad parabolam ope solitæ reductionis.

58. $nu \frac{2nz (\pi \pi \lambda \gamma \eta + \delta \delta \beta \beta \lambda) + \pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i}{\pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i} +$

$z \frac{z (\pi \lambda \lambda \gamma \gamma + \delta \delta \beta \beta \lambda) - u \pi \delta i \lambda \eta + z \pi \delta i \lambda \gamma}{\pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i} = 0$,

æquatio ad ellipsum.

59. $nu \frac{2nz (\pi \pi \lambda \gamma \eta + \delta \delta \beta \beta \lambda) + \pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i}{\pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i} +$

$z \frac{z (\pi \lambda \lambda \gamma \gamma - \delta \delta \beta \beta \lambda) + \pi \delta i \lambda \eta + \pi \delta i \lambda \gamma z}{\pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i} = 0$,

æquatio ad hyperbolam circa diametros.

60. $nu \frac{-uz (\pi \pi \lambda \gamma \eta - i \lambda \gamma) + z \lambda \gamma \gamma}{i \eta \pi} =$

$\frac{-\kappa \kappa \lambda \lambda}{\beta \beta} = 0$,

æquatio ad hyperbolam inter asymptotos.

61. VII. Tandem etiam origo mutetur, & ea transferatur in O vel N.

pro x ponendum erit $\frac{ny}{\lambda} \pm \frac{xy}{i} = x$

manente y valore $\frac{\beta z}{i} \pm \frac{\beta n}{\lambda}$

Unde evadet

62. $u \left(\frac{\pi n + \beta \delta}{\pi \lambda} \right) - z \left(\frac{\pi \gamma + \beta \delta}{\pi i} \right) = a = 0$

æquatio ad rectam

63. $nu \pm 2nz \frac{\lambda}{i} + zc \frac{\lambda \lambda}{ii} - u \frac{\pi \lambda \eta}{\beta \beta} =$

$z \frac{\pi \lambda \lambda \gamma}{i \beta \beta} \pm \frac{a \lambda \lambda \pi}{\beta \beta} = 0$

æquatio ad parabolam per solitam reductionem

64. $nu \frac{2nz (\pi \pi \lambda \gamma \eta + \delta \delta \beta \beta \lambda) + \pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i}{\pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i} +$

$z \frac{z (\pi \lambda \lambda \gamma \gamma + \delta \delta \beta \beta \lambda) - u (\pi \pi \delta i \lambda \eta \pi + \delta i \lambda \eta \pi) + \pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i}{\pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i} +$

$z \frac{z (\pi \pi \delta i \lambda \gamma \pi + \delta i \lambda \gamma \pi) + \pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i}{\pi i \eta \pi + \delta \beta \delta i i} +$

$\frac{a \pi \lambda \lambda (a + \delta)}{\eta \eta \pi + \beta \beta \delta} = 0$

æquatio ad ellipsum.

65. $nu \frac{2nz (\pi \pi \lambda \gamma \eta + \delta \delta \beta \beta \lambda) + \pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i}{\pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i} +$

$z \frac{z (\pi \lambda \lambda \gamma \gamma - \delta \delta \beta \beta \lambda) - u (\pi \pi \delta i \lambda \eta \pi - \delta i \lambda \eta \pi) + \pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i}{\pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i} +$

$z \frac{z (\pi \pi \delta i \lambda \gamma \pi + \delta i \lambda \gamma \pi) + \pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i}{\pi i \eta \pi - \delta \beta \delta i i} +$

$\frac{a \pi \lambda \lambda (a - \delta)}{\eta \eta \pi + \beta \beta \delta} = 0$

æquatio ad hyperbolam circa diametros.

66. $nu \frac{-uz (\pi \pi \lambda \gamma \eta - i \lambda \gamma) + z \lambda \gamma \gamma}{i \eta \pi} =$

$\frac{a \lambda \eta}{i} \pm \frac{a \lambda \lambda z}{i \eta} \pm \frac{\kappa \kappa \lambda \lambda}{\beta \beta} = 0$

æquatio ad hyperbolam intra asymptotos.

67. Hinc patet æquationem ad rectam semper esse unius dimensionis.

68. Unius pariter dimensionis esse quantitates, quæ in coordinatarum permutatione ponuntur pro primis coordinatis in æquationibus primariis ad lineam quamvis; a que ideo coordinatarum permutationem gradum æquationis ad lineam non mutare.

69.

69. *Æquationes ad sectiones conicas semper esse duarum dimensionum.*

70. In omni *æquatione ad parabolam terminus altissimus constat duobus factoribus reabilibus & equalibus.* Nam terminus altissimus in Nis. 13. & 24. est $yy = z^2 y.$

In Nis. 33. & 39. est $\frac{\beta\beta z}{\pi\pi} = \frac{\beta z}{\pi} = \frac{\beta z}{\pi}$

In Nis. 45. & 51. est $uz = \frac{2\gamma uz}{\zeta} + \frac{\gamma\gamma z}{\zeta^2} = (u = \frac{\gamma z}{\zeta}) (u = \frac{\gamma z}{\zeta}).$

In Nis. 57 & 63 est $uz = 2uz \frac{\lambda}{\pi} + z \frac{\lambda\lambda}{\pi\pi} = (u = \frac{\lambda z}{\pi}) (u = \frac{\lambda z}{\pi}).$

71. In omni *æquatione ad ellipsim terminus altissimus constat duobus factoribus imaginariis & inæqualibus.* Nam terminus altissimus in N^o. 14 est $xx + \frac{\partial yy}{\pi} = (x + V - \frac{\partial yy}{\pi})(x - V - \frac{\partial yy}{\pi}) = (x + yV - \frac{\partial}{\pi})(x - yV - \frac{\partial}{\pi}).$

In Nis. 25. & 28. est $uz + \frac{\partial yy}{\pi} = (u + yV - \frac{\partial}{\pi})(u - yV - \frac{\partial}{\pi}).$

In Nis. 34. & 40. est $uz = \frac{2\gamma uz}{\pi} + z \frac{(\pi\gamma\gamma + \delta\beta\beta)}{\pi\pi} = (u = \frac{\gamma z}{\pi} + \frac{\beta z}{\pi} V - \frac{\partial}{\pi}) \& (u = \frac{\gamma z}{\pi} - \frac{\beta z}{\pi} V - \frac{\partial}{\pi}).$

Quandoquidem multiplicatio factorum huc usque allatorum restituit ipsos terminos.

In Nis. 46. & 52. est $uz = \frac{2\delta\gamma\zeta uz + \delta\gamma\gamma z}{\pi\beta\beta + \delta\zeta^2}$

cujus factores
 $u + \frac{z(\pi\delta\gamma\zeta + \beta\gamma V - \delta\pi)}{\pi\beta\beta + \delta\zeta^2}$
 $\& u + \frac{z(\pi\delta\gamma\zeta - \beta\gamma V - \delta\pi)}{\pi\beta\beta + \delta\zeta^2}$

Facta enim multiplicatione horum factorum, & deletis delendis, inuenimus

$$uz = \frac{2\delta\gamma\zeta uz}{\pi\beta\beta + \delta\zeta^2} + \frac{\delta\pi\beta\gamma\gamma z + \delta\delta\gamma\gamma\zeta z}{(\pi\beta\beta + \delta\zeta^2)^2}$$

Est autem

$$\frac{\delta\pi\beta\gamma\gamma z + \delta\delta\gamma\gamma\zeta z}{(\pi\beta\beta + \delta\zeta^2)^2} = \frac{\delta\gamma\gamma z (\pi\beta\beta + \delta\zeta^2)}{(\pi\beta\beta + \delta\zeta^2)^3}$$

hoc est

$$\frac{\delta\gamma\gamma z}{\pi\beta\beta + \delta\zeta^2}$$

In Nis. 58. & 64. terminus altissimus est

$$uz = \frac{-2uz (\pi\pi\lambda\gamma\gamma + \delta\beta\beta\lambda) + \pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi}{z (\pi\lambda\gamma\gamma + \delta\beta\beta\lambda) / (\pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi)}$$

qui resoluitur in factores

$$u = \frac{-z (\pi\pi\lambda\gamma\gamma + \delta\beta\beta\lambda) + \pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi}{\pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi} = \frac{\beta\lambda\gamma V (-\pi\delta\pi\pi + 2\pi\delta\pi\gamma - \pi\delta\gamma\gamma)}{\pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi}$$

&c

$$u = \frac{-z (\pi\pi\lambda\gamma\gamma + \delta\beta\beta\lambda) - \pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi}{\pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi} = \frac{\beta\lambda\gamma V (-\pi\delta\pi\pi + 2\pi\delta\pi\gamma - \pi\delta\gamma\gamma)}{\pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi}$$

Facta enim multiplicatione & deletis delendis, manebit

$$uz = \frac{-2uz (\pi\pi\lambda\gamma\gamma + \delta\beta\beta\lambda) + \pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi}{z z (\pi\pi\pi\pi\lambda\gamma\gamma + \delta\beta\beta\pi\lambda\lambda) + (\pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi)^2} = \frac{\pi\delta\pi\pi\beta\beta\pi\lambda\lambda + \pi\delta\beta\beta\pi\lambda\gamma\gamma}{(\pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi)^2}$$

Est autem

$$\pi\pi\pi\pi\lambda\gamma\gamma + \delta\beta\beta\pi\lambda\lambda + \pi\delta\pi\pi\beta\beta\pi\lambda\lambda + \pi\delta\beta\beta\pi\lambda\gamma\gamma$$

Factum ex

$$\pi\lambda\gamma\gamma + \delta\beta\beta\lambda \text{ in } \pi\pi\pi\pi + \delta\beta\beta\pi. \text{ Quare}$$

Quare dividendo numeratorem & denomi-
natorem coefficientis zz , inveniemus ipsum
terminum altissimum ellipsos.

72. In omni aequatione ad *hyperbolam* ter-
minus altissimus constat duobus factoribus *rea-*
libus & inaequalibus. Nam terminus altissimus in
No. 15. est $xx - \frac{\delta\gamma\gamma}{\pi} = (x+y\sqrt{\frac{\delta}{\pi}})(x-y\sqrt{\frac{\delta}{\pi}})$.

In No. 16 est $xy = x \cdot y$.

In Nis. 26. & 29. est $uu - \frac{\delta\gamma\gamma}{\pi} = (u+y\sqrt{\frac{\delta}{\pi}})(u-y\sqrt{\frac{\delta}{\pi}})$.

In No. 27. est $uy = u \cdot y$.

In Nis. 35. & 41. est $uu = \frac{2\gamma\mu z}{\pi} +$

$$\frac{zz(\pi\gamma\gamma - \delta\beta\beta)}{\pi\mu}$$

qui resolvitur in factores

$$u \pm \frac{\gamma z}{\mu} + \frac{\beta z}{\mu} \sqrt{\frac{\delta}{\pi}}, \text{ \& } u \pm \frac{\gamma z}{\mu} - \frac{\beta z}{\mu} \sqrt{\frac{\delta}{\pi}} \text{ vel}$$

$$+ z \left(\pm \gamma + \beta \sqrt{\frac{\delta}{\pi}} \right) \quad + z \left(\pm \gamma - \beta \sqrt{\frac{\delta}{\pi}} \right)$$

$$u \frac{\pm \gamma + \beta \sqrt{\frac{\delta}{\pi}}}{\mu} \quad \& \quad u \frac{\pm \gamma - \beta \sqrt{\frac{\delta}{\pi}}}{\mu}$$

In Nis. 36. & 42. est $\frac{\beta\mu z}{\mu} = \frac{\beta\gamma z z}{\mu} =$

$$\left(u \pm \frac{\gamma z}{\mu} \right) \cdot \frac{\beta z}{\mu}$$

In Nis. 47. & 53 est $uu = \frac{\pm 2\delta\gamma\zeta\mu z - \delta\gamma\gamma z z}{\pi\beta\beta - \delta\zeta\zeta}$

cujus factores

$$\frac{\pm z(\pm\delta\gamma\zeta + \beta\gamma\sqrt{\delta\pi})}{\pi\beta\beta - \delta\zeta\zeta} \quad \&$$

$$\frac{\pm z(\pm\delta\gamma\zeta - \beta\gamma\sqrt{\delta\pi})}{\pi\beta\beta - \delta\zeta\zeta}$$

Siquidem facta multiplicatione, & deletis de-
lendis, superest

$$\frac{\pm 2\delta\gamma\zeta\mu z}{\pi\beta\beta - \delta\zeta\zeta} + \frac{zz(\delta\delta\gamma\gamma\zeta\zeta - \pi\delta\beta\beta\gamma\gamma)}{(\pi\beta\beta - \delta\zeta\zeta)^2}$$

& est

$$\delta\delta\gamma\gamma\zeta\zeta - \pi\delta\beta\beta\gamma\gamma = -\delta\gamma\gamma(-\delta\zeta\zeta + \pi\beta\beta)$$

unde redit factum Num. 47. & 53.

In No. 48.

$$\text{est } \frac{\beta\mu z}{\gamma} = \frac{\beta\zeta\mu u}{\gamma\gamma}$$

cujus factores

$$\frac{\beta u}{\gamma}, \text{ \& } z = \frac{\beta u}{\gamma}$$

In No. 54. est $\frac{\beta\mu z}{\gamma} = \frac{\beta\zeta\mu u}{\gamma\gamma}$ pariter

cujus factores

$$\frac{\beta u}{\gamma}, \text{ \& } z = \frac{\zeta u}{\gamma}$$

In Nis. 59. & 65. est

$$\frac{\mu u - 2\mu z (\pm\pi\lambda\gamma\eta \pm \delta\beta\beta\epsilon\lambda) + zz(\pi\lambda\lambda\gamma\gamma - \delta\beta\beta\lambda\lambda)}{\pi\mu\eta - \delta\beta\beta\mu}$$

cujus factores sunt

$$z \left(\pm\pi\lambda\gamma\eta + \delta\beta\beta\epsilon\lambda + \beta\epsilon\lambda(\eta - \gamma) \right) \sqrt{\pi\delta}$$

$$u - \frac{z(\pm\pi\lambda\gamma\eta + \delta\beta\beta\epsilon\lambda + \beta\epsilon\lambda(\eta - \gamma) \sqrt{\pi\delta})}{\pi\mu\eta - \delta\beta\beta\mu}$$

atque

$$z(\pi\epsilon\lambda\gamma\eta - \delta\beta\beta\epsilon\lambda - \beta\epsilon\lambda(\eta - \gamma)) \sqrt{\pi\delta}$$

$$u - \frac{z(\pi\epsilon\lambda\gamma\eta - \delta\beta\beta\epsilon\lambda - \beta\epsilon\lambda(\eta - \gamma) \sqrt{\pi\delta})}{\pi\mu\eta - \delta\beta\beta\mu}$$

Quod probabitur ut supra, facta multiplica-
tione, deletis delendis, & reducendo coeffi-
cientem fractum ipsius zz , cujus fractionis
denominator erit $(\pi\mu\eta - \delta\beta\beta\mu)^2$.

In No. 60. & 66. est

$$\frac{-\mu z (\pm\pi\lambda\eta \pm \beta\epsilon\lambda\gamma) + zz\beta\lambda\lambda\gamma}{\beta\epsilon\epsilon\eta}$$

vel

$$\frac{\mu z (\mp\lambda\eta \pm \lambda\gamma)}{\epsilon\eta} + \frac{zz\lambda\lambda\gamma}{\epsilon\eta}$$

cujus factores sunt

$$u - \frac{\lambda\gamma z}{\epsilon\eta} \quad \& \quad u - \frac{\lambda z}{\epsilon}$$

73. Æquatio gradus m , in qua indeterminatæ sunt x & y , est completa, quando in ea sunt potestates m ; $m-1$; $m-2$; ... 1, tum ipsius x , tum ipsius y ; omnia facta $x^{m-1}y$; $x^{m-1}y^2$; &c; x^{m-1} ; x^2y^{m-2} &c; & factum ex puris determinatis, ut sponte patet.

74. Ideo æquationes ad rectam & ad sectiones conicas, quas invenimus Nis. 62. 63. 64. 65. & 66. sunt completæ.

75. Datis lineisveniuntur æquationes; hoc est, si rectæ, parabolæ, ellipsoes, & hyperbolæ natura exprimatursæquatione, hæc æquatio erit aliqua ex iis quas assignavimus pro quaque linea. Nunc dico æquationes assignatas pertinere ad lineas quibus eas tribuimus; id est, si hæc æquationes construantur lineis, singulas constitui lineis quas assignavimus. Nam Æquatio unius dimensionis, reducendo quantitates determinatas ad simpliciorum expressionem, revocatur ad formam.

$$\frac{mx}{n} - \frac{py}{q} \pm r = 0.$$

quæ auferendo fractiones, & transponendo, fit

$$mqx \pm nqr = npy.$$

unde educitur analogia $np : mq :: x \pm \frac{nr}{m} : y$.

Datur autem datarum np & mq ratio; ergo & indeterminatarum $x \pm \frac{nr}{m}$ & y ; prior enim quantitas complexa variabilis est ob variabilem x . Sed hæc indeterminatæ sunt unius dimensionis, atque ideo linea recta terminantur; ergo illarum locus est recta.

76. Æquationes indeterminatæ duarum dimensionum revocantur ad formulam completam

$$py + \frac{2mxy}{n} + 2ry + \frac{pxx}{q} + 2sx + ss = 0$$

unde deducitur analogia

$$p,q :: 2ry + 2sx + ss : \frac{qyy}{p} + \frac{2mqxy}{np} + xx$$

Signorum enim rationem nunc non habemus.

Posterioribus terminis hujus proportionis constant singuli duobus factoribus, & datur productorum ratio. Ergo hæc æquatio pertinet ad aliquam e sectionibus conicis.

77. In hac demonstratione subsumimus posse describi lineam rectam & sectiones conicas propositis æquationibus convenientes. Si enim linea descripta essent, demonstranda manerent converte præcipuarum propositionem ad has lineas pertinentium. Nempè

Si recta linea AE positione detur, & in ea puncta A & D; atque ad rectam AE datur punctum D sub dato angulo ducatur DB recta magnitudine data, & per A & B indefinita AC, & per quodvis punctum F in AE agatur FG ipsi DB parallela, & fit ut AD ad DB sic AF ad FG, tanget punctum G rectam AC.

Si rectæ RQ; ST positione data sibi occurrant in P, & recta RP magnitudine detur, describatur autem diametri PQ, per metro RP, & vertice P parabola PAB rectam ST tangens in P, & agatur quavis recta DB ipsi PS parallela, & fuerit quadratum ex BD æquale rectangulo sub parametro RP & abscissa PD, erit punctum B in descripta parabola.

Similia dicantur de reliquis sectionibus conicis.

Hæc autem propositiones facile demonstrantur per deductionem ad absurdum; quo pacto etiam facile demonstratur hæc propositio generalis.

78. Si data sit relatio inter abscissas & ordinatas, & linea transeat per extrema omnium ordinarum, alia linea per eadem extrema transire nequit. Aut enim duæ lineæ prorsus congruent, & tunc duæ non erunt; aut alicubi differant, & tunc eidem abscissæ respondebunt duæ ordinatæ inæquales; quod aut fieri non potest, aut si fieri potest per leges, quibus determinatur relatio inter abscissas & ordinatas, prior linea transibit per extrema ordinarum inæqualium, & sic duæ lineæ congruent.

Non semper quidem ex datis legibus & abscissa, potest determinari ordinata; sed intelligitur semper futurum esse ut hæc detur illis datis. Recte veteres notarunt discrimen inter ea quæ intelliguntur, & quæ dicebantur *ignorata*, & ea quæ effici possunt, quæ dicebantur *parata*, ut & inter ea quæ per se possibilia, sed in potestate nostra non sunt, quæ vocabantur *porista*, & ea quæ fieri non possunt, quæ vocabantur *apora*. Vide *Marini præfationem ad Euclidis DATA*. Hæc observatio mihi viam aperuit ad resoluenda *Euclidis PORISMATA*.

Supereffest igitur ut ostendamus quomodo lineæ datis æquationibus convenientes describi possint. Ubi observandum.

79. Has lineas transire debere per extrema ordinatarum tum positivarum tum negativarum, respondentium abscissis tum positivis tum negativis, ubi rerum natura id patitur: quod melius exempla explicabunt.

80. Signa esse negligenda ubi tantum quaeritur rectarum ratio, nam signa indicant positionem, quae rationem non mutat; sed signorum rationem esse habendam, quando praeter rationem quaeritur positio.

TAB. L. Fig. 5. 81. Positis quae No. 21. abscissa x evanescit quando ordinata cadit in ipsa recta ST; nam positio ordinatae definit magnitudinem abscissae incipientis a puncto P, & in hac hypothese ea magnitudo nulla est.

82. Pariter ordinata y evanescit ubi locus aequationis fecit rectam RQ; nam magnitudo ordinatae definit intervallum puncti in loco a puncto respondente in linea abscissarum QR; quod intervallum nullum est quando locus occurrit rectae QR; tunc ergo magnitudo ordinatae panter nulla est.

De locis ad rectam

83. Aequatio generalis unius dimensionis inventa No. 75., recipit quatuor signorum diversitates.

- 1^o. $x + \frac{nr}{m} - \frac{ny}{m} = 0$
- 2^o. $x - \frac{nr}{m} - \frac{ny}{m} = 0$
- 3^o. $x + \frac{nr}{m} + \frac{ny}{m} = 0$
- 4^o. $x - \frac{nr}{m} + \frac{ny}{m} = 0$

Nam harum, quae addi possent, $\frac{nr}{m} - x + \frac{ny}{m}$, & $\frac{nr}{m} - x - \frac{ny}{m} = 0$,

prima est ipsa secunda mutata per translationem primi membri in secundum, & altera est quarta similem mutationem passa. Hae formulae construuntur eodem pacto, aliquantisper mutata rectarum positione, pro signorum diversitate, & facile praebent simpliciores formulas.

84. Pro prima $x + \frac{nr}{m} - \frac{ny}{m} = 0$, ponit $x = 0$, manet $\frac{nr}{m} - \frac{ny}{m} = 0$, vel $r = y$,

Tom. I.

quare locus occurrit rectae ST in K, ubi TAB. L. PK = r & punctum K sumi debet versus S, Fig. 5.

quia valor y est positivus. Nunc pone $y = 0$, manet $x + \frac{nr}{m} = 0$, vel $x = -\frac{nr}{m}$: ergo locus hujus aequationis occurrit rectae QR in F, ubi PF = $\frac{nr}{m}$ & quidem ab P versus R, quia valor ipsius x negativus est. Invenietur autem punctum F, sumendo PG = m ex TS a puncto P versus S, & PH = n ex RQ ab P versus R, jungendo HG, & ei per K ducendo parallelam KF; est enim PK = r .

Producta igitur indefinite recta KF, ea recta erit locus aequationis positivae. Nam age BD ipsi ST parallelam; quia est GP (m) ad PH (n) ut PK (r) ad PF, est PF = $\frac{nr}{m}$;

quare FD = $\frac{nr}{m} + x$.

Est autem HP (n) ad PG (m), ut FD ($\frac{nr}{m} + x$) ad BD (y); ergo $ny = nr + mx$;

& $x + \frac{nr}{m} - \frac{ny}{m} = 0$.

Hic pars indefinita KC est locus pro ordinatis positivis quae respondent abscissis positivis; pars finita KF est locus pro ordinatis positivis quae respondent abscissis negativis, & pars indefinita FA pro ordinatis negativis quae respondent abscissis pariter negativis.

85. Si aequatio esset $x + \frac{nr}{m} - y = 0$,

posito $y = 0$, maneret $x + \frac{nr}{m} = 0$, ut in No. 84., & eadem rediret constructio, qua inveniretur punctum F.

Sed posito $x = 0$, maneret $\frac{nr}{m} - y = 0$, unde punctum K determinaretur quaerendo quartam proportionalem post m ; n ; & r .

86. Sed proposita aequatione $x + r - y = 0$, puncta F & K invenirentur ponendo PF = PK = r .

87. Secunda formula erat $x - \frac{nr}{m} - \frac{ny}{m} = 0$;

in qua si ponatur $x = 0$, manebit $-\frac{nr}{m} - \frac{ny}{m} = 0$, quare sumi debet PK = r versus T quia va-Fig. 6. lor y est negativus. Sed si ponatur $y = 0$,

manet $x = \frac{nr}{m}$, quare punctum F determinabitur abscindendo PG = m ; PH = n ; & quae

E c

quidem a P versus Q, quia valor ipsius x positivus est, & junctæ GH ducendo parallelam KF.

Adâ igitur per F & K recta indefinita AC; hæc erit locus æquationis propositæ, quod demonstratur ut supra.

Hic pars indefinita FC pertinet ad ordinatas & abscissas positivas; pars finita FK ad ordinatas negativas & ad abscissas positivas; pars indefinita KA ad ordinatas & ad abscissas negativas.

88. Si æquatio esset $x - r - y = 0$, puncta F & K invenirentur ponendo PF ab P versus Q, quia valor ipsius x est positivus, & PK ab P versus T, quia valor ipsius y est negativus, singulas $= r$.

TAB. L. Fig. 7. 89. Si ea esset $x - y = 0$, angulus SPQ bisecandus esset recta AC quia tunc $x = y$.

TAB. L. Fig. 8. 90. Si tandem $x - \frac{ny}{m} = 0$, abscindatur ex P in Q, pars PH $= n$, per H agatur HK parallela ipsi ST & $= m$, & per P & K agatur indefinita AC, ea erit locus æquationis; quia PH (n) ad HK (m), ut PD (x) ad DB

(y) & $x = \frac{ny}{m}$; & pars indefinita PC respondet ordinatis & abscissis positivis, PA ordinatis & abscissis negativis.

Æquationes Num. 89 & 90. oriuntur tum ex prima tum ex secunda formula.

91. Veniamus ad tertiam $x + \frac{nr}{m} + \frac{ny}{m} = 0$:

TAB. L. Fig. 9. positio $y = 0$ rursus erit $x + \frac{nr}{m} = 0$, & PF invenietur ut No. 84.

Sed positio $x = 0$, manet $r = -y$, quare PK $= r$ sumi debet ex P in T.

Indefinita AC erit locus æquationis, & pars indefinita KC spectabit ad abscissas positivas & ordinatas negativas; pars finita KF ad ordinatas & abscissas negativas; & pars indefinita FA ad ordinatas positivas & abscissas negativas.

92. Si æquatio esset $x + r + y$; tunc PF $= PK = r$ sumendæ essent versus R & T, ob negativos valores tum x, tum y.

TAB. L. Fig. 10. 93. Quarta & ultima formula est $x - \frac{nr}{m} + \frac{ny}{m} = 0$, in qua si ponatur $y = 0$, erit $x = \frac{nr}{m}$, & invenietur ut in No. 87; si vero po-

natur $x = 0$, erit $y = r$, & PK $= r$ sumi debebit ex P versus S.

Indeterminata AC acta per F & K puncta, erit locus quæstus; pars indefinita FC serviet abscissis positivis & ordinatis negativis; pars terminata FK ordinatis & abscissis positivis; pars indefinita KA ordinatis positivis & abscissis negativis.

94. Si æquatio esset $x - \frac{nr}{m} + y$; determinaretur punctum F ut No. 93; & punctum K ab P versus S, ob valorem ipsius y positivum, quærendo quartam post m; n; & r.

95. Si ea esset $x - r + y = 0$: sumendæ essent PF $= PK = r$, ad partes Q & S, ob valores ipsarum x & y positivus.

96. Si tandem haberetur $x + \frac{ny}{m} = 0$, sumi deberet vel PH $= +n$; & per F agenda HK $= -m$: vel Ph $= -n$, & per h agenda bk $= +m$, indefinita AC acta per P; K esset locus petitus. TAB. L. Fig. 11

De locis ad sectiones conicas.

97. Æquatio indeterminata Ni. 76. habebat hanc formam

$$yy \dots \frac{2kxy}{1} \dots 2my \dots \frac{nx^2}{p} \dots 2qx \dots rr = 0$$

Ubi puncta sunt pro signis, quæ possunt esse positiva vel negativa in singulis terminis. Ad hanc æquationem pervenimus permutatione ordinarum, & æquationibus simplicissimis ad sectiones conicas. Rursus ex æquatione maxime composita pervenimus ad simplicem apta coordinatarum permutatione. Quænam vero sit hæc apta permutatio, duobus præcipue modis detegitur; quorum primus perficitur per extractionem radicis ut sit in æquationibus quadraticis affectis, tanquam si una esset incognita x vel y, si utriusque quadratum ad sit in æquatione componenda, (quod accidit in nostra maxime composita), vel ejus incognite cujus ad sit quadratum in æquatione proposita, si unicuique sit, quod accedere potest in æquationibus peculiaribus. Nos quaeremus valorem ipsius y. Erit ergo

$$y = \dots \frac{kx}{1} \dots m + \sqrt{(xx + \frac{kk}{1} \dots \frac{n}{p} \dots)}$$

$$x \left\{ \frac{2kxy}{1} \dots 2q \right\} + mm \dots rr$$

Pone

y =

$$y = u + z$$

& quidem

$$a = \dots \frac{kx}{l} \dots m$$

atque

$$x = \sqrt{(xx + \frac{kk}{ll} \dots \frac{nn}{pp} \dots x(2 \frac{km}{l} \dots 2g) + mm \dots rr)}$$

Ut autem penitus intelligantur ea, quæ dicenda sunt, ad mentem revocemus sequentia defumta e conicorum doctrina.

98. Diameter & ordinata comprehendere possunt quemvis angulum vel acutum, vel rectum, vel obtusum.

99. Quapropter, si y exponat ordinatas, quæcunque linea dicta fuerit y, ea erit vera curvæ ordinata; supererit quærenda diameter ad eam pertinens.

100. Diameter ordinatas bifecat, & quævis alia recta eas dividit in duas partes inæquales.

101. Si ergo sit QR curvæ diametri ad quam spectant ordinatæ parallelæ ad rectam ST, quarum una est BE, erit BD = DE; harum valores ex æquatione depromti, erunt æquales, sed alter positivus alter negativus.

102. Si vero eidem ordinatæ BE in H occurrat alia recta XZ diametrum RQ secans in F, inæquales erunt BH; & HE, & earum differentia erit HD.

103. Quare, si curva relata fuerit in æquatione ad coordinatas PH, HB, valor tum rectæ HB, tum rectæ HE continebit partem BD aut DE, cujus valor debet esse duplex, & DH cujus valor est simplex & continetur æquatione ad rectam.

104. Abscindantur ergo more solito x ab XZ, incipiant a puncto P, & positive tendant in Z; sed indeterminatæ y abscondantur ab ST, incipiant a puncto P & positive tendant in S. Æquatio ad rectam

$$u = \dots \frac{kx}{l} \dots m$$

indicabit positionem diametri RQ, & constructur per Num. 84. si sit $u = \frac{kx}{l} + m$; per

Num. 87. si sit $u = \frac{kx}{l} - m$; per Num. 91.

si sit $u = -\frac{kx}{l} - m$; & per Num. 93, si

sit $u = -\frac{kx}{l} + m$. His numeris addenda

sunt corollaria contenta in aliis numeris pertinentibus ad æquationes ad rectam. Hic autem diximus u quod ibi y.

105. Ponamus ergo locum æquationis

$$u = \dots \frac{kx}{l} \dots m$$

esse rectam QR; id est in nostra Figura esse PG = k; PK = l; PI = m; erit BD = DE = z, quæ incipiant a puncto I & positive tendent in S.

Sed ubi curva occurrit diametro, ibi ordinata nulla est. Igitur, ut invenias verticem, pone z = 0; habebis

$$\sqrt{(xx(\frac{+kk}{ll} \dots \frac{n}{p}) \dots 2x(\frac{km}{l} \dots g) + mm \dots rr)} = 0$$

quæ, quadrando, & liberando xx a coefficiente, fiet æquatio quadratica determinata

$$+xx \dots \frac{2klmpx \dots 2llpqx + llmmp \dots llppr}{+p \dots k \dots ll} = 0$$

cujus radix, extracta & constructa ut solet; dabit unum punctum, in quo curva concurrat cum diametro, si in hac radice quantitas radicalis nulla est; aut duo, si adest quantitas radicalis possibilis; aut nullum, si quantitas radicalis est imaginaria.

Sola parabola diametro occurrit in uno puncto, reliquæ in duobus punctis; & præterea hyperbola diametro secundæ non occurrit; quæ recte congruunt cum æquationibus ad has curvas supra inventis No. 97.

106. Nunc tres casus distinguendi sunt.

Primo, ipsius xx coefficientis $+\frac{kk}{ll} \dots \frac{n}{p}$

evanescit.

Secundo, is est negativus;

Tertio, is est positivus.

Coefficiens $+\frac{kk}{ll} \dots \frac{n}{p} = 0$, dat $+\frac{kk}{ll} = \frac{n}{p}$;

Tunc ergo æquatio generalis evadit

$$yy \dots \frac{2kxy}{l} \dots 2my + \frac{kxx}{ll} \dots 2gx \dots rr = 0$$

TAB. M.
Fig. 1.

Hujus æquationis altissimus terminus $yy \pm \frac{2kxy}{l} + \frac{k^2xx}{ll}$ habet duos divifores reales & æquales $y \pm \frac{kx}{l}$; & $y \pm \frac{kx}{l}$; quare ea est ad parabolam.

107. Tunc autem, delendo in quantitate sub signo ipsam $\pm \frac{k^2xx}{ll} - \frac{2kxy}{l} - \frac{2kxy}{l} + mm \dots rr$, quæ nihilo est æqualis, manet

$$z = \sqrt{2x \left(\frac{km}{l} \dots q \right) \pm mm \dots rr}$$

& ubi hæc est nihilo æqualis, id est ubi curva occurrit diametro QR, invenitur

$$x = - \frac{lmm \dots lrr}{2km \dots 2ql}$$

quam abscindes ex recta XZ. a puncto P versus Z, si valor ipsius x positivus est, & versus X, si is est negativus. Sit ex. gr. positivus, & æqualis rectæ lp ; ago per punctum p indefinitam pA ipsi ST parallelam, & diametro QR occurrentem in A; erit A vertex parabolæ, quam ideo tanget in A recta pA .

108. Sed una coordinatarum est $z = BD$; altera est $x = PH$, quæ non concurrent, contra hypothefim. Oportet igitur ut in æquatione ponamus ID (quam dicemus $= t$) pro $PH = x$; quod semper est faciendum, & quod semper sic perficietur.

Quoniam datur triangulum PGK, dic $GK = f$; erit $PK (l)$ ad $KG (f)$ ut $PH (x)$ ad $DI (t)$; quare $x = \frac{lf}{f}$; quo valore ipsius x posito in valore ipsius z , quadrato, fiet

$$zz = 2t \left(\frac{km \dots ql}{f} \right) \pm mm \dots rr$$

& est

$$2t \left(\frac{km \dots ql}{f} \right) \pm mm \dots rr =$$

$$\left(t + \frac{fmm \dots frr}{2km \dots 2ql} \right) \left(\frac{2km \dots 2ql}{f} \right)$$

& quia $PK (l)$ ad $KG (f)$ ut $Pp \left(\frac{lmm \dots lrr}{2km \dots 2ql} \right)$ ad IA ; erit $IA = \frac{fmm \dots frr}{2km \dots 2ql}$; & $zz = AD$

$\left(\frac{2km \dots 2ql}{f} \right)$ quapropter erit $\dots \frac{2km \dots 2ql}{f}$ valor parametri.

Igitur hæc parabola, vertice A, diametro AQ describe parabola, ea erit locus æquationis propositæ, quod facile demonstrabis retro legendo analyticos veltigia ex primaria parabolæ proprietate, *rectangulum sub parametro & abscissa est æquale quadrato ordinatæ*. Nam; servatis nominibus, erit

$$zz = \left(t + \frac{fmm \dots frr}{2km \dots 2ql} \right) \left(\frac{2km \dots 2ql}{f} \right) = 2t \left(\frac{km \dots ql}{f} \right) \pm mm \dots rr$$

Est autem $GK (f)$ ad $KP (l)$ ut $ID (t)$ ad $PH (x)$; quare $\frac{fx}{l} = t$

ergo

$$zz = 2x \left(\frac{km \dots ql}{l} \right) \pm mm \dots rr$$

Pariter est $GP (k)$ ad $PK (l)$ ut $IP (m)$ ad $PF = \frac{lm}{k}$, & $FH = \frac{lm}{k} + x$; atque PK

(l) ad $PG (k)$ ut $FH \left(\frac{lm}{k} + x \right)$ ad $HD = m + \frac{kx}{l}$; & $HB = y = z + m + \frac{kx}{l}$; atque
ideo

$$y - m - \frac{kx}{l} = z$$

&

$$yy - 2my - 2 \frac{kxy}{l} + mm + 2 \frac{kmx}{l} + \frac{k^2xx}{ll} = zz$$

Unde, substituendo pro zz valorem inventum, & delendo æqualia, restituetur æquatio proposita. Nihil enim morari debet signorum diversitas, quæ oritur a positione rectarum Pp ; IA &c.

109. Si valor parametri est negativus, tunc curva se extendit ad partes contrarias; nam mutato valore ipsius t parametri fiet positiva.

Idem etiam detegi potest, quando in curva occurrit rectæ TS , id est ponendo in æquatione $x = p$; manet enim

$$2p \dots 2my \dots rr = 0$$

id

id est

$$y = \dots m \pm \sqrt{+mm \dots rr}$$

si hæc quantitas radicalis est possibilis, sume IL = IM = $\sqrt{mm \dots rr}$, curva occurret rectæ TS in L & M; atque ideo, si ejus vertex est ultra punctum I versus R, ea se extendet versus Q, & versus R si vertex est ultra punctum I versus Q.

Ubi vero quantitas radicalis est impossibilis, tum curva nusquam occurret rectæ TS, & se extendet versus Q, si vertex est ultra punctum I versus Q; secus autem versus R.

II. Secundo Quando coefficientis $\frac{kk}{l} \dots \frac{n}{p}$,

est negativus, hoc fit quia $\frac{n}{p}$ est quantitas negativa & major ipsa $\frac{kk}{l}$. Sed in extractione

radicis quadraticæ ex æquatione proposita, terminus $\frac{nxk}{p}$ translatus fuit in contrarias partes, & sic translatus est negativus; erat ergo positivus æquatione proposita, quæ ideo erat

$$yy \dots \frac{2kxy}{l} \dots 2my + \frac{xxx}{p} \dots 2qx \dots rr = 0$$

Hujus terminus altissimus $yy \pm \frac{2kxy}{l} + \frac{xxx}{p}$ duos habet factores inæquales

$$y \pm \frac{kx}{l} + x\sqrt{\left(\frac{kk}{l} - \frac{n}{p}\right)}$$

&

$$y \pm \frac{kx}{l} - x\sqrt{\left(\frac{kk}{l} - \frac{n}{p}\right)}$$

qui sunt imaginarii, quia ponitur $\frac{kk}{l}$ minor

quam $\frac{n}{p}$. Ergo hæc æquatio pertinet ad ellipsim. Igitur, determinata positione diametri RQ per æquationem $u = \frac{kx}{l} \dots m$, ut No. 105, pone $z = 0$, id est

$$xx \left(+ \frac{kk}{l} - \frac{n}{p} \right) \dots 2x \left(\frac{km}{l} \dots q \right) + mm \dots rr = 0$$

aut, ponendo quantitatem positivam

$$n - \frac{kkp}{l} = d; \text{ atque ideo } \frac{kk}{l} - \frac{n}{p} = -\frac{d}{p};$$

$$\dots m \dots \frac{lq}{k} = g \ \& \ \dots km \dots lq = gk \text{ atque}$$

$$\dots \frac{km}{l} \dots q = \frac{gk}{l}, \ \& \ +mm \dots rr = h^2, \text{ erit}$$

$$-\frac{dxx}{p} \dots \frac{2gkx}{l} \dots hh = 0$$

id est

$$xx = \dots \frac{2gkpx}{dl} \dots \frac{hhp}{d}$$

&

$$x = \dots \frac{gkp}{dl} \pm \sqrt{\left(\frac{gkpp}{dll} \dots \frac{bbp}{d}\right)}$$

Quare abscinde a recta XZ partem Po = $\frac{gkp}{dl}$ ab P versus Z, si hic valor est positivus, ut fecimus in figura, secus vero ab P versus X; & hinc inde a puncto o sume op = on = $\sqrt{\left(\frac{gkpp}{dll} \dots \frac{bbp}{d}\right)}$, & per puncta o; p; n; age ipsi ST parallela oO; pA; nN diametro QR occurrentes in O; A; N; erit O centrum ellipsos, ejus vertices A & N; atque ideo AN diameter.

Jam sit, ut in No. 108., ID = t; erit $x = \frac{lt}{f}$, quo valore substituto in

$$xx = -\frac{dxx}{p} \dots \frac{2gkx}{l} \dots hh$$

fit

$$xx = -\frac{dllt}{fp} \dots \frac{2gkt}{f} \dots hh$$

aut

$$\frac{ffxx}{dl} = \frac{fhhp}{dl} \dots \frac{2fgkpt}{dl} - tt$$

est autem

$$\frac{ffhhp}{dl} \dots \frac{2fgkot}{dl} - tt$$

factum est

$$\frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right) - \frac{fkp}{d}} + z$$

in

$$\frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right) + \frac{fkp}{d}} - z$$

id est rectangulum sub AD; DN; quia invenimus, ut supra IO = $\frac{fkp}{d}$; AO = ON =

$$\frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right)}; \text{ atque ideo AI} =$$

$$\frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right) - \frac{fkp}{d}}; \text{ \& AI + ID} =$$

$$\frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right) - \frac{fkp}{d}} + z, \text{ \& ND} =$$

$$\text{NO + OI} - \text{ID} = \frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right) + \frac{fkp}{d}} - z.$$

Est autem ex æquatione rectangulum sub AD; DN; ad quadratum DB (zz) ut *ff* ad *dll*, & ex ellipse natura debet esse ut quadratum semi-diametri AO ad ad quadratum semi-diametri Oa; ergo $\frac{ff}{ll} \left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right)$ ad quadratum Oa ut *ff* ad *dll*, & quadratum Oa = $\frac{d}{p} \left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right)$

Idem potest reperiri considerando semi-diametrum Oa esse valorem ipsius z in ipso centro, id est quando z = IO = $\frac{fkp}{d}$, quo valore posito in

$$zz = -\frac{dllz}{ff} \dots \frac{zks}{f} \dots bb$$

invenitur

$$zz = -\frac{dllffgkpp}{dillffp} \dots \frac{zksfcp}{dillf} \dots bb =$$

$$-\frac{gkpp}{d} \dots \frac{zkspp}{d} \dots bb = \frac{gkpp}{d} \dots bb,$$

nam si æquatio est

$$zz = -\frac{dllz}{ff} + \frac{zks}{f} \dots kb$$

est

$$\text{IO} = + \frac{fko}{d}$$

&

$$+ \frac{zks}{f} = + \frac{zgskp}{d}$$

si vero æquatio est

$$zz = -\frac{dllz}{ff} - \frac{zks}{f} + bb$$

ultimus enim terminus debet esse positivus, ne valor ordinatæ z sit imaginarius; tunc est

$$\text{IO} = -\frac{fkp}{d}$$

& rursus

$$- \frac{zks}{f} = + \frac{zgskp}{d}$$

Est autem

$$\frac{gkpp}{d} \dots bb = \frac{d}{p} \left(\frac{gkpp}{d} \dots \frac{bbp}{d}\right)$$

Conveniunt ergo duo valores inventi pro quadrato semi-diametri secundæ.

Sed ubi habetur $-\frac{zks}{f}$, est etiam

$$zz = -\frac{dxx}{p} - \frac{zksx}{l} + bb$$

atque ideo, dum ponitur z = o,

$$x = -\frac{gkp}{d} \pm \sqrt{\left(\frac{gkpp}{d} + \frac{bbp}{d}\right)}$$

& est

$$\sqrt{\left(\frac{gkpp}{d} + \frac{bbp}{d}\right)} \text{ major quam } \frac{gkp}{d}$$

quia, ut inveniatur quantitas radicalis, ipsius $\frac{gkp}{d}$ quadrato alia quantitas est addenda, & aggregati querenda radix; ergo op major quam oP, & OA major quam Oa. Tunc autem est

$$\frac{ffbbp - zfskp}{d} - z$$

factum ex

$$\frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{g g k k p p}{d d l l} + \frac{h h p}{d}\right) - \frac{f k p}{d l l}} - s$$

$$\frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{g g k k p p}{d d l l} + \frac{h h p}{d}\right) + \frac{f k p}{d l l}} + s$$

111. Si quantitas radicalis quæ determinat diametrum, esset imaginaria, problema involveret aliquid absurdum; nam ellipsis diametris omnibus occurrit in duobus punctis.

112. Si esset $ff \equiv d l l$, & angulus PIF obliquus, diametri ellipsios fierent æquales, & æquatio evaderet

$$z z = h h \dots \frac{2 g k t}{f} - s s$$

113. Si præterea angulus PIF esset rectus, ellipsis degeneraret in circulum, & esset $l \equiv ff + k k$.

114. Tertio coefficientis $\frac{k k}{l l} \dots \frac{n}{p}$ est positivus, quia vel $\frac{n}{p}$ est quantitas positiva, vel negativa quidem sed minor quam $\frac{k k}{l l}$. Tunc factores inventi No. 110. pro altissimo termino æquationis generalis, sunt inæquales & reales, cum $\sqrt{\left(\frac{k k}{l l} \mp \frac{n}{p}\right)}$ sit realis. Igitur æquatio pertinet ad hyperbolam. Rursus $u = \dots \frac{k x}{l} \dots m$ constructur ut No. 105; & facta substitutione quam fecimus pro ellipsi in valore ipsius z , (observando nunc esse $\frac{k k p}{l l} - n = d$, & quantitatem positivam,) fiet

$$z = \frac{+ d x x}{p} \dots \frac{2 g k x}{l} \dots h h$$

ex qua, ubi $x = 0$, invenietur valor idem quem invenimus in ellipsi pro x , qui idcirco constructur ut supra; & reperto $x = \frac{l t}{f}$, inveniemus in

$$\frac{ff p z z}{d l l} = \frac{ff h h p}{d l l} \dots \frac{2 f g k t}{d l l} + s s$$

& est

$$s s = \frac{2 f g k t \dots ff h h p}{d l l}$$

factum ex

$$s = \frac{f g p}{d l l} + \frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{g g k k p p}{d d l l} - \frac{h h p}{d}\right)}$$

in

$$s = \frac{f g p}{d l l} - \frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{g g k k p p}{d d l l} - \frac{h h p}{d}\right)}$$

id est rectangulum sub AD, DN, ut in elli- TAB. M. pfi, mutato tantum loco ipsius ordinatæ BD, Fig. 3. quæ cadit extra diametrum AN; unde invenietur diameter secunda ut pro ellipsi.

115. Si quantitas radicalis quæ determinat diametrum, esset imaginaria, non ideo problema est reputandum absurdum, quia ea diameter potest esse secunda, cui hyperbola nusquam occurrit; sed æquationis generalis ordinatæ secundum litteram x in hunc modum

$$x x \dots \frac{2 k b x y}{l n} \dots \frac{2 b a x}{n} \dots \frac{p y y}{n} \dots \frac{2 m p y}{n} \dots \frac{p r r}{n} = 0$$

extrahenda esset radix quadratica

$$x = \dots \frac{k p y}{l n} \dots \frac{p y}{n} \pm \sqrt{\left(\frac{+ k k p p y y}{l n n} \dots \frac{p y y}{n}\right)} \dots \frac{2 k p p y y}{l n n} \dots \frac{2 m p y}{n} + \frac{p a a}{n} \dots \frac{p r r}{n}$$

& facta substitutione brevitatis causa, cetera perficientur ut supra. Sed si & radix determinans diametrum hoc pacto, esset imaginaria, tunc problema contineret aliquid absurdum.

Seu potius, si $\frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{g g k k p p}{d d l l} - \frac{h h p}{d}\right)}$ est imaginaria; id est si terminus $\frac{h h p}{d}$ est negativus &

major termino $\frac{g g k k p p}{d d l l}$, sume

$\frac{f}{l} \sqrt{\left(-\frac{g g k k p p}{d d l l} + \frac{h h p}{d}\right)}$ prioris oppositam, & habebis semi-diametrum secundam. Nam ubi AN est diameter transversa est

$\overset{-2}{O D} - \overset{-2}{O N}$ ad DB ut $\overset{-2}{O N}$ ad $\overset{-2}{O a}$; id est, si

TAB. M.
Fig. 3.

femi-diameter ON $= \frac{f}{l} \sqrt{\left(-\frac{gkpp}{ddi} + \frac{bbp}{d}\right)}$,

$$\begin{aligned} \text{OD} - \text{ON} &= \text{OD} + \\ \frac{ffgkpp}{ddi} &- \frac{ffbbp}{di} \end{aligned}$$

unde habebis, si ON est transversa, $-\text{ON}^2$
factum ex

$$\begin{aligned} &+ \frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{gkpp}{ddi} - \frac{bbp}{d}\right)} \\ &\text{in} \\ &- \frac{f}{l} \sqrt{\left(\frac{gkpp}{ddi} - \frac{bbp}{d}\right)} \end{aligned}$$

Sed ubi ON est femi diameter secunda, est
OD + ON ad db ut ON ad Oa; & post
valore femidiametri ON ut supra, erit

$$\begin{aligned} \text{OD} + \text{ON} &= \text{OD} - \\ \frac{ffgkpp}{ddi} &+ \frac{ffbbp}{di}; \text{ unde} \end{aligned}$$

$$\text{ON} = \frac{f}{l} \sqrt{\left(-\frac{gkpp}{ddi} + \frac{bbp}{d}\right)}$$

116. Si $ffpp = ddi$, hyperbola esset aequi-
latera.

117. In omni æquatione si quantitatis sub
signo positæ radix extrahi potest, æquatio
pertinet ad rectas.

Exempla pertinentia ad parabolam, ellip-
sim, circulum, & hyperbolam circa diame-
tros infra invenientur. Paulo fuis explican-
da videtur constructio hyperbolæ intra asymp-
totos.

118. Ubi æquatio nullum continet quadra-
tum indeterminatarum, æquatio ad hyperbolam
referri non potest ad diametros; sed ubi
est saltem alterum quadratum indeterminatæ,
æquatio construi potest tum per diametros
tum per asymptotos.

119. Datis positione asymptotis, & dato
puncto describi potest hyperbola.

TAB. M.
Fig. 4.

120. Ubi æquatio ad hyperbolam intra asymp-
totos est simplicissima $xy - xx = 0$
facile hyperbola describitur, datis positione rec-
tæ XZ, unde abscinduntur x, & QR, cui

parallelæ sumuntur y. Sumatur enim KP = x;
per P agatur PA parallela ipsi RQ, & æqua-
lis ipsi PK; & per A intra asymptotos QKZ
describatur hyperbola.

121. Si pro quadrato datæ x haberetur re-
ctangulum ae, media proportionalis quaeri
posset inter x & ß; sed brevius est abscindere
KP = x vel ß, & per P agere parallelam
ipsi QR & æqualem ipsi ß vel x.

122. Ad hanc formulam simplicissimam re-
vocandæ sunt æquationes ad hyperbolam, &
quidem per divisionem indeterminatarum, quia
in hyperbola ad asymptotos relata, ordinatæ
inter se multiplicantur, dum conficitur illarum
rectangulum, quod est datæ magnitudinis. Igi-
tur quære valorem alterius indeterminatæ di-
visionem continuando quantum fieri potest:
hinc habebis æquationes duas, alteram ad rec-
tæ, ut in aliis sectionibus, No. 106, alteram
ad hyperbolam intra asymptotos, quæ erit
proposita simplicior.

123. Petitur locus æquationis $xy + ay = bc = 0$;
quia hic nullum est incognitarum qua-
dratum, utraq; est vel asymptotus, vel
asymptoto parallela.

Quæramus per divisionem valorem y, erit
 $y = \frac{bc}{x+a}$; & quando $x = 0$, $y = \frac{bc}{a}$, Fig 4
cui parem abscinde PA; hyperbola transibit
per A.

Sit nunc $y = 0$; erit $bc = 0$, quod est ab-
furdum, nunquam enim quantitas finita eva-
nescit, nisi quando cum infinita comparatur.
Ergo hyperbola nunquam occurrit rectæ XZ,
quæ ideo est asymptotus, nam si esset asymp-
toto parallela, secaretur ab hyperbola oppo-
sita, quod ab æquatione hac detegeretur, ea
enim pertinet ad ambas hyperbolas. Sit igitur
y infinita & erit tum xy, tum ay, rec-
tangulum infinitum; ergo $bc = 0$, quan-
doquidem nulla datur proportio inter finitum
& infinitum. Igitur $xy = -ay$, & $x = -a$;
huic parem sume PK, per K age RQ paral-
lelam TS, & intra asymptotos QKZ describe
hyperbolam transeuntem per A, & ejus op-
positam; erit utraq; locus æquationis pro-
positæ. Nempe arcus indefinitus AB locus
verus x & y; AC verus y, falsus x, & hyper-
bola opposita falsus utriusque.

Age enim quamvis BD; erit $BD = y$;
 $KD = x + a$; & KDB rectangulum = xy
+ ay; = bc = KPA rectangulo $\left(\frac{bc}{a} \text{ in } a\right)$.

Facere etiam potuissem $x + a = u$, unde
æqua-

æquatio fiet simplicissima $xy = bc$, quæ dat eandem constructionem.

124. Construenda sit æquatio

$$xy + cx + by - ff = 0,$$

erit transponendo

$$xy + by = ff - cx$$

vel

$$y = \frac{ff - cx}{x + b}$$

Est autem, reipsa dividendo,

$$\frac{-cx}{x + b} = -c + \frac{bc}{x + b}.$$

Fit ergo æquatio proposita

$$y = \frac{ff + bc}{x + b} - c$$

Transfer in alterum membrum omnes terminos, e quibus abest indeterminata y , cujus quadratum non est in æquatione, habebis

$$xy + dy = \frac{bxx}{c} - ax + gg$$

& dividendo,

$$y = \frac{bxx - acx + cgg}{c(x + d)}$$

unde, peragendo divisionem quanti

$$\frac{bxx - acx + cgg}{c} \text{ per } x + d, \text{ obtinebis}$$

$$y = \frac{bx - bd}{c} - a + \frac{bdd + cgg + acd}{c(x + d)}$$

Pone $y = u + z$, more solito, &

$$u = \frac{bx - bd}{c} - a,$$

quæ æquatio est ad rectam facile determinandam, atque

$$z = \frac{bdd + cgg + acd}{c(x + d)}$$

quæ æquatio est ad hyperbolam describendam ut N^o. 123.

Tamen placet ad pleniorum argumenti illustrationem, æquationem construere a primis principiis.

Erat

$$u = \frac{bx - bd}{c} - a$$

ideo, ubi $u = 0$, manet

$$x = \frac{ac + bd}{b}$$

Cape PI = $\frac{ac + bd}{b}$, ex P versus Z ob va-
lorem positivum ipsius x . Sed ubi $x = 0$, est

$$u = -\frac{ac - bd}{c}$$

cui æqualem capies PF versus T ob negativum valorem ipsius u . Age per I & F indefinitam QR, hæc erit locus indeterminatarum u : quandoquidem ducta quavis DE parallela rectæ ST, erit IP ad PF, ut e ad b , sic IE = EP - PI =

FF

TAB. M. Fig. 5. Pone $y = u + z$, & $u = -c$, quæ est æquatio ad rectam facile construenda ponendo PF = c versus T, quia valor ipsius u est negativus, & per F agendo indefinitam LM ipsi XZ parallelam; manebit $x = \frac{bc + ff}{x + b}$, æquatio ad hyperbolam describendam ex N^o 123; ad cuius æquationem refertur, quia potest facile inveniri rectangulum = $bc + ff$.

Sed eadem æquatio facilius construi poterat. Ubi curva occurrit rectæ ST, ibi $x = 0$. Pone in æquatione proposita $x = 0$, manet $by = ff$, & $y = \frac{ff}{b}$, cui parem abscinde PA; curva transibit per A. Pone y infinitam, id est hyperbolæ nunquam occurrere, aut cadere in ipsa asymptoto, reliqui æquationis termini, cx & $-ff$, evanescent, & manebit $xy = -by$, aut $x = -b$. Sume PK = $-b$, per K age indefinitam QR ipsi ST parallelam, erit QR altera asymptotus. Tandem pone x infinitam, erit $xy = -cx$; & $y = -c$; sume PF = $-c$ & per F age LM ipsi XZ parallelam & ipsi RQ occurrentem in I; & per A, asymptotus QI; IM describe hyperbolam.

125. Proponatur æquatio

$$xy + ax - \frac{bxx}{c} + dy - gg = 0$$

TOM. I.

$$x - \frac{ac - bd}{b} \text{ ad ED} = \frac{bx}{c} - a - \frac{bd}{c} = u.$$

Eminebunt ergo z , id est BD, supra rectam RQ, quæ erit altera asymptotus hyperbolæ, quia si esse posset $z = 0$, etiam $xz + dz = \frac{bdd}{c} + gg + ad = 0$, quod est absurdum. Sed ubi z est infinita, evanescentibus quantitibus finitis præ infinitis, manet $x = -d$. Abscinde igitur PK = d versus X, ob negativum ejus valorem, & per K age indefinitam LM parallelam rectæ ST, ea erit altera asymptotus, & parallelæ est, ut jam observavimus, indeterminate ad secundam dimensionem non allurgentis in æquatione.

Cocant rectæ LM; QR in G, erit G centrum.

Sed altera indeterminata z est BD; altera vero, $x + d = KE$, incipit a puncto K & positive procedit versus Z, oportet ergo revocare æquationem ad coordinatas LG; GQ, vel BD; DG. Dic DG = t & pone PI ad IF ut e ad f , ut EK ($x + d$) ad DG (t), erit $x + d = \frac{et}{f}$; & æquatio construenda fiet

$$xz = \frac{(bdd + cgg + acd)f}{cc}$$

& est PI ad IF, ut e ad f , ut PK (d) ad GF = $\frac{df}{c}$, & FP = $a + \frac{bd}{c}$; sume igitur PA = $\frac{gg}{d}$; erit

$$FA = a + \frac{bd}{c} + \frac{gg}{d}$$

&c

$$\text{GF in FA} = \frac{adf}{c} + \frac{bdf}{cc} + \frac{fgg}{c} =$$

$$\frac{(bdd + cgg + acd)f}{cc}$$

Transibit ergo hyperbola per punctum A.

126. Tandem habeatur æquatio

$$xx - \frac{2axy}{b} - \frac{cyy}{d} + fy + gx - bh = 0$$

Quia hic sunt duo indeterminatarum quadrata, quære divisores altissimi termini

$$xx - \frac{2axy}{b} - \frac{cyy}{d},$$

qui esse debent recales & inæquales. Hos invenias

$$x - y \left(\frac{a}{b} + \frac{1}{bd} \sqrt{a^2 d^2 + b^2 dc} \right)$$

&c

$$x - y \left(\frac{a}{b} - \frac{1}{bd} \sqrt{a^2 d^2 + b^2 dc} \right)$$

vel, ponendo $\sqrt{aadd + bbdc} = dm$

$$x - y \left(\frac{a+m}{b} \right)$$

&c

$$x - y \left(\frac{a-m}{b} \right)$$

Finge nunc alterum divisorem, puta,

$$x - \frac{ay + my}{b} = u$$

erit

$$x - \frac{ay - my}{b} = u - \frac{2my}{b}$$

&c

$$x = u + \frac{ay - my}{b}$$

& æquatio proposita, quæ dividendo per divisores termini altissimi, erat

$$x - \frac{ay - my}{b} + \frac{bfy + bgx - bhh}{bx - ay - my} = 0$$

fict

$$u + \frac{bfy + bgx - bhh}{bu - 2my} = 0$$

vel, substituendo pro x valorem inventum

$$u + \frac{ay - my}{b},$$

$$u + \frac{bfy + bgu + agy - gmy - bhh}{bu - 2my} = 0,$$

aut, sublata divisione

$$buv - 2myu + bfy + bgu + agy - gmy - bhh = 0$$

quæ statim est immutanda ut observavimus TAB. M. N.º. 108. Nam sume PF = b ; age per F Fig. 7. rectam FI parallelam rectæ XZ & = $m - a$; & per P & I indefinitam RQ, indeterminatæ u eminebunt ultra rectam RQ versus

fus

fus Z. Duc enim quamlibet ED parallelam ipsi XZ; est PF (b) ad FI (m - a) ut PE (y) ad ED = $\frac{my - ay}{b}$. Ponitur autem EB = Pb = x; ergo BD = x - $\frac{ay}{b}$

$$\frac{my}{b} = u.$$

Hic fecimus m - a quantitatem positivam, quia m est major quam a: nam add + bdc = dmm est major quam aadd;

Sunt igitur in æquatione indeterminata BD (u) & PE (y), & eam revocemus oportet ad coordinatas BD (m) & DP (s). Sit ergo PI = k; est FP (b) ad PI (k) ut EP (y) ad PD (s); quare y = $\frac{bs}{k}$, quo valore substituto in æquatione ultimo inventa, ea fiet, dividendo per b,

$$uu - \frac{2msu + bs + ags - gms}{k} + gu - hb = 0$$

ideo

$$2msu - bs - ags + gms = k(uu + gu - hb)$$

aut, ponendo $\frac{bs + ag - gm}{2m} = n$, si ea positiva est, ut fingimus,

$$su - sn = \frac{k}{2m} (uu + gu - hb)$$

quæ æquatio constructur per Num. 125. Quandoquidem est

$$s = \frac{k}{2m} \left(\frac{uu + gu - hb}{u - n} \right) = \frac{k}{2m} \left(u + g + n + \frac{nn + gn - hb}{u - n} \right)$$

divisionem perficiendo.

Sit nunc s = t + z, & quidem t = $\frac{k}{2m} (u + g + n)$, & z = $\frac{nn + gn - hb}{u - n}$.

Est autem u = 0 ubi locus occurrit rectæ RQ: & tunc t = $\frac{ks + kn}{2m}$, cui æqualem cape PO versus Q ob valorem t positivum. Cum autem sit pars rectæ PQ, est t = 0 in ipso puncto P, & tunc u = -g - n, cui æqualem sume PK versus X ob negativum valorem u. Age per K & O indefinitam LM, ea erit locus ipsarum t.

Quoniam enim fecimus DB = u, age per B rectam Bd ipsi QR parallelam erit KP (g + n)

ad PO $\frac{ks + kn}{2m}$ ut 2m ad k ut Kd = KP + Pd = KP + DB = g + n + u ad d = $\frac{k}{2m} (u + g + n)$.

Eminebunt ergo z ultra rectam LM versus Q, & erit eB = z, si curva ponatur transire per B.

Sume nunc PN = n, & per N age rectam ml parallelam rectæ RQ, & occurrentem rectæ BE in n, & rectæ LM in G, erit Bn = u - n. Curva referetur ad indeterminatas Be; Bn; & revocari debet ad indeterminatas Be; eG = r (hic pono r symbolum indeterminatæ), quod fiet ponendo datam PK ad KO ut 2m ad 2p erit enim PK ad KO ut Bn (u - n) ad Gs (r); & u - n = $\frac{mr}{p}$. Hac substitutione facta, manebit

$$zr = \frac{p}{m} (nn + gn - hb). \text{ Est autem PK ad KO ut } 2m \text{ ad } 2p \text{ ut PN}(n) \text{ ad OG} = \frac{pn}{m}.$$

Sume igitur Oa = n + g - $\frac{hb}{n}$, & intra asymptotos MGm describe hyperbolam per a & ejus oppositam ABC; habebis locum petitum.

Ad modum harum constructionum perficientur reliquæ pro signis & quantitibus datis.

Duas ultimas constructiones asymptotorum adjeci, ut pateret quomodo illas daret divisio. Sed est alia methodus, descripta ab HUGENIO in variis geometricis suis, quæ extant in opere volumine primo, tomo secundo. Hæc autem methodus est hujusmodi.

127. Æquatio generalis ad hyperbolam, per extractionem radicis, fit

$$y = u \pm \sqrt{+\frac{dxx}{p} \dots \frac{2gkx}{l} \dots hb}$$

ut patet ex N^o. 114. posita reductione Ni. 110; ut eam posuimus in N^o. 114. Reperta igitur, ut N^o. 105. positione rectæ RQ, & determinatis

po = $\frac{gky}{dl}$; & op = om = $\sqrt{\frac{gkkypp}{dill} \dots \frac{hbp}{d}}$; T. AB. M. Fig. 3.

occurrat altera asymptotus rectæ ST in M, & rectæ pA productæ in L, erit AL æqualis semidiametro secundæ Oa = $\frac{d}{p} \sqrt{\frac{gkkypp}{dill} \dots \frac{hbp}{d}}$, quæ est ad po ut d ad p. Est autem LA ad IM ut AO ad OI, ut po ad op; quare LA ad IM ut po ad op; & alternando LA ad po (id est d ad p) ut IM ad op = $\frac{gkp}{dl}$; est ergo IM =

$Im = \frac{ek}{l}$; dimidiato coefficienti ipsius x in quantitate radicali: quibus sumptis, erunt ductæ OM; Om asymptoti.

Si vero altera indeterminata x est parallela asymptoto uni, quod cognoscitur ex æquatione proposita, in qua non est quadratum ipsius x , sumi unica IM potest pro altera asymptoto.

Nunc si habetur

$$z = \sqrt{\left(+ \frac{dxx}{p} \dots \frac{2ekx}{l} + hb \right)}$$

pone $x = 0$; manebit $z = h$, cui æqualem sumo II , hyperbola transibit per l ; & si II

TAB. N.
Fig. 2.

(h) est minor quam IM ($\frac{ek}{p}$), ea cadet in angulo MOm ; & in angulo ei deinceps, si II (h) est major quam IM ($\frac{ek}{p}$).

Quando autem est $+hb$ in valore ipsius z est op minor quam op ; nam utramque invenimus ponendo

$$x = 0 = \sqrt{\left(+ \frac{dxx}{p} \dots \frac{2ekx}{l} + hb \right)}$$

unde

$$x = \dots \frac{gkp}{dl} + \sqrt{\left(\frac{gkklpp}{dlli} - \frac{hbpp}{d} \right)}$$

& quantitas sub signo minor est quantitate extra signum. Quare si est $+ \frac{gkp}{dl}$, hyperbola A occurret bis rectæ ST ; & hyperbola BNE ,

TAB. N.
Fig. 3.

si est $-\frac{gkp}{dl}$; ponendo nempe II minorem quam IM ; & quando II est major quam IM , utraque hyperbola opposita occurret rectæ ST .

Sed si $z = \sqrt{-hb}$, posito $x = 0$ tunc est

TAB. N.
Fig. 1.

$op = \sqrt{\left(\frac{gkklpp}{dlli} + \frac{hbpp}{d} \right)}$ major quam op , quare neutra hyperbola occurret rectæ ST , & determinari debet punctum A ut supra. Si tandem esset $z = 0$; curva transiret per punctum I .

Altera methodus innititur eliminatione secundi termini, quam infra docebit Auctor nosse & quam breviter exponam pro æquationibus quadraticis.

128. Æquationem dispone secundum dimensiones alterius indeterminatæ, & hujus altissimam potestatem libera a coefficiente determinato, ut sit æquatio generalis ad sectiones conicas

$$\begin{aligned} & - \frac{2kxy}{l} + \frac{xxx}{p} \\ yy & - 2my + 2qr = 0 \\ & - 2my + rr \end{aligned}$$

Coefficiens termini secundi hic ponitur

$$\frac{2kx}{l} - 2m; \text{cujus dimidium est } - \frac{kx}{l} - m.$$

Pone y æqualem alteri indeterminatæ z , cui junges dimidium coefficientem termini secundi, mutatis signis. Quia posuimus hunc coefficientem negativum, facere debemus

$$y = z + \frac{kx}{l} + m.$$

unde

$$yy = zz + \frac{2kzx}{l} + 2mz +$$

$$\frac{kklxx}{ll} + \frac{2klmx}{l} + mm$$

$$- \frac{2kxy}{l} = - \frac{2kzx}{l} - \frac{2kklxx}{ll} - \frac{2klmx}{l}$$

atque

$$- 2my = - 2mz - \frac{2klmx}{l} - 2mm$$

Quibus in unum collectis, & addito ultimo æquationis propositæ termino, in quo non est y ; habetur

$$zx - \frac{kklxx}{ll} + \frac{xxx}{p} - \frac{2klmx}{l} +$$

$$2qx + rr - mm = 0$$

Æquatio carens termino secundo, quod attinet ad indeterminatam x . Ut idem efficiamus pro indeterminata x , oportet, ex regula, illius terminum altissimum liberare a coefficiente, nisi sit $-\frac{kk}{ll} = \frac{n}{p}$; quod ubi accidit res perfecta est, & manet æquatio ad parabolam.

Quod si non accidat, pone ut jam pro elipsi & hyperbola $\pm \frac{d}{p}$ pro $\frac{n}{p} - \frac{kk}{ll}$, nempe $+$ si fractio $\frac{n}{p} - \frac{kk}{ll}$ est positiva, $-$ si ea est negativa. Item $-\frac{gk}{l}$ pro $-\frac{km}{l} + q$ & hb pro $rr - mm$. Æquatio fiet

$$xz + \frac{dxx}{p} - \frac{2pkx}{l} + hb = 0$$

aut

$$\frac{pxz}{d} + xx - \frac{2gkpx}{dl} + \frac{phb}{d} = 0$$

Fac

$$x = u + \frac{gkp}{dl}$$

erit

$$xx = uu + \frac{2gkpu}{dl} + \frac{g^2k^2pp}{d^2ll}$$

&c

$$- \frac{2gkpx}{dl} = - \frac{2gkpu}{dl} - \frac{2g^2k^2pp}{d^2ll}$$

Quibus in unam summam collectis & additis reliquis æquationis terminis, fit

$$\frac{pxz}{d} + uu - \frac{g^2k^2pp}{d^2ll} + \frac{phb}{d} = 0$$

Prima reductio $y = z + \frac{kx}{l} + m$, dat

TAB. M. Fig 1.2.3. $y - \frac{kx}{l} - m = z$. Cum autem sit $HB = y$,

& $HD = \frac{kx}{l} + m$; patet esse $DB = z$; ut in N^o. 105.

Jam ponamus in

$$xz = \frac{dxx}{p} - \frac{2gkx}{l} + hb$$

fractionem $\frac{lx}{f}$ pro x , restituetur ipsa æquatio inventa methodo priori. Unde patet has duas methodos congruere; quod etiam melius dispiciet qui consideret esse $P\theta = \frac{gkp}{dl}$, ut supra;

atque ideo $IO = \frac{fgkp}{d^2ll}$, & $\frac{fu}{l} + \frac{fgkp}{d^2ll} = t$.

Hanc posteriorem methodum primus, quod sciam, explicavit Joannes de WIRY, in elementis curvarum linearum, quæ leguntur inter opera CARTESII.

Tertia methodus assumit æquationem compositam, & cum singulis hujus terminis comparans terminos singulos æquationis constru-

endæ, deregit quantitatem & positionem restarum. Eam primus pertractavit CRAIGIUS, adhibuerunt HOSPITALIUS, WOLFIUS, & alii multi; qua de causa illam præteribo.

Quarta quaerit ea puncta, quæ determinant sectionem conicam, ponendo singulas indeterminatas = 0; unde habentur pro singulis aut duo puncta, aut unum, aut fortasse nullum. Reliqua puncta deteguntur assignando alteri indeterminatæ valorem maxime commodum, quoties opus est ut tria puncta pro circulo, quatuor pro parabola, quinque pro ellipsi & hyperbola desiniantur.

Satis fufe, nisi fallor, exposita investigatione restarum, quæ determinant sectiones conicas, breviter afferam theorematà, quæ ex hac investigatione conficiuntur, & quibus uti possumus tanquam regulis ad rem facilius perficiendam.

129. Quando æquatio continet saltem quadratum unius indeterminatæ, quam pono esse y abscissam ex TS a puncto P; & ei rectæ parallelas sumi veras ordinatas ad curvam. TAB. M. Fig. 1.2.3.

130. Veræ diametri RQ positio determinabitur construendo dimidiatum secundum terminum æquationis propositæ ordinatæ secundum dimensionem litteræ y . (N^o. 104.)

131. Hoc facto extrahatur radix æquationis: aut sub signo est quadratum alterius indeterminatæ x , aut non est.

132. Si non est, æquatio est ad parabolam, cuius vertex A invenitur, quaerendo Pp terminum proportionalem post coefficientem indeterminatæ x sub signo, & radicem quantitatis omnino cognitæ pariter sub signo; unde invenimus IA quartam post FP, Pp, & FI. (N^o. 107. 108.) TAB. M. Fig. 1.

133. Parameter autem semper est quarta proportionalis post IF; FP, vel GK; KP, & coefficientem indeterminatæ x sub signo. (N^o. 108.)

134. Si adest quadratum indeterminatæ x ; æquatio erit ad ellipsim vel ad hyperbolam, quarum centrum O invenitur sumendo Po quartam post numeratorem, & denominatorem xx sub signo, & dimidiatum coefficientem quem habet secundus terminus quantitatis sub signo ordinatæ secundum dimensionem litteræ x . Hinc habebitur IO quarta post FP; Pθ; FI. (N^o. 110.) TAB. M. Fig. 2.3.

135. Post eundem numeratorem & denominatorem xx sub signo, & terminum omnino cognitum quantitatis sub signo, quaere quar-

tam; E f 3.

PROB. XXVIII.

TAB. III. *Rectam DC datæ longitudinis in datam conicam sectionem DAC*
 Fig. 9. *sic inscribere ut ea per punctum G positione datum transeat.*

Sit AF axis curvæ, & a punctis D, G, & C ad hunc demitte normales DH, GE, & CB. Jam, ad determinandam positionem rectæ DC, puncti D aut C inventio proponi potest; sed cum hæc sint germana, & adeo paria ut ad alterutrum determinandum operatio similis evasura esset, sive quærerem CG, CB, aut AB; sive compararia DG, DH, aut AH; ea propter de tertio aliquo puncto prospicio quod utrumque D & C similiter respectet, & una determinet. Et hujusmodi video esse punctum F.

Jam sit $AE = a$, $EG = b$, $DC = c$, $EF = z$; & præterea cum relatio inter AB & BC habeatur in æquatione quam suppono pro conica sectione determinanda datam esse, sit $AB = x$, & $BC = y$, & erit $FB = x - a + z$. Et propter $GE. EF :: CB. FB$ erit iterum $FB = \frac{yz}{b}$. Ergo $x - a + z = \frac{yz}{b}$.

His ita preparatis tolle x per æquationem quæ curvam designat. Quemadmodum si curva sit parabola per æquationem $rx = yy$ designata, scribe $\frac{yy}{r}$ pro x ; & oriatur $\frac{yy}{r} - a + z = \frac{yz}{b}$. Et extracta radice $y = \frac{rz}{2b} \pm$

$V(\frac{ryz^2}{4bb} + ar - rz)$. Unde patet $V(\frac{ryz^2}{bb} + 4ar - rz)$ esse differentiam gemini valoris y , id est linearum $+BC$ & $-DH$, adeoque (démisso DK in CB normali) valere CK (a). Est autem $FG.GE :: DC.CK$, hoc est

tam; qua auge aut minue quadratum ipsius po ; habebis $op = on$; & hinc semi-diametrum alteram $AO = ON$; quæ erit quarta post FP ; po ; & FI ; & si op determinatur per quantitatem imaginariam, & æquatio est ad hyperbolam, erit AN diameter secunda. (Nº. 110. 115.)

136. Tandem post denominatorem & numeratorem ipsius xx sub signo, & AO quadratum, quære quartam; hæc erit alterius semi-diametri Oa quadratum. (Nº. 110. 115.)

TAB. N. Fig. 1. 2. 3. 137. Sed quando æquatio est ad hyperbolam & eam describere vis intra asymptotos; definitis, ut supra, positione rectæ RQ, & punctis O; o , sume $IM = Im$, æquales singulas dimidiato coefficienti quem habet secundus terminus quantitatis sub signo ordinatæ secundum dimensiones literæ x ; age OM; Om habebis asymptotos. (Nº. 127.)

138. Si terminus cognitus quantitatis sub signo, est positivus; quære mediam inter ejus factores, & huic mediæ æqualem cape ll ; hyperbola transibit per l .

139. Si is est negativus, determina punctum TAB. N. Aut Nº. 107. 110; aut (si op est quantitas imagi- Fig. 1. naria) punctam a ; hyperbola transibit per A.

140. Si is nullus est, hyperbola transibit per I, & erit OI semi-diameter transversa, quæ non potest esse imaginaria, quia po non determinatur per aliquam radicalem.

141. Sed si nullum est quadratum indeterminatarum; utraque coordinata parallela est asymptotis quæ facile determinantur ex Nº. 120. 124.

(a) Hæc quidem subtiliter, sed ut melius percipiamus quam vera sint, dicamus $DH = \mu$. Dum sit $GE (b)$ ad $EF (z)$ ut $DH (\mu)$ ad HF

est $\sqrt{(bb + zz) b} :: c \sqrt{\left(\frac{rzz}{bb} + 4ar - 4rz\right)}$. Ducendoque quadrata extremorum & mediorum in invicem, & facta ordinando orietur

$$z^4 = \frac{4bbrz^3 - 4abbrzz + b^4rz - 4ab^4r}{rr}$$

æqua-

HF = $\frac{uz}{b}$, erit AH = AE - EF - FH = $a - z$ -

$\frac{uz}{b}$. Sed, per parabolæ proprietatem, rectangulum sub parametro (r), & AH æquale est quadrato ipsius DH; ergo

$$ar - rz - \frac{ruz}{b} = uu.$$

* Invenerat Auctor

$$ar - rz + \frac{ruz}{b} = yy$$

Hæ duæ æquationes similes sunt, & sicut prius eadem, si ponas in prima $-y$ pro u , vel in secunda $-u$ pro y , quod facere licet, quia alterutra littera indicat ambigue ordinatas ad parabolam, quæ hic ponuntur tendere ad contrarias partes, atque ideo altera positiva est ubi altera est negativa. Hæc quam recte se habeant melius patebit, si ponamus rectam CD non secare axem: tunc enim punctum F caderet extra parabolam; & erit AH = AE - EF + FH = $a - z + \frac{uz}{b}$; unde

$$-rz + ar + \frac{ruz}{b} = uu$$

& AB = BF - FE + EA = $\frac{zy}{b} + a - z$;

quare

$$+ \frac{rzy}{b} + ar - rz = yy$$

quæ duæ æquationes omnino similes sunt, quia utraq; ordinata est positiva. In prima hypothesi, subducendo

$$ab ar - rz + \frac{ruz}{b}$$

ipsam $ar - rz - \frac{ruz}{b}$

& ab yy quadratum uu , manet

$$\frac{ryz + ruz}{b} = yy - uu,$$

& dividendo per communem diviorem $y + u$

$$\frac{rz}{b} = y - u$$

& est $y - u$ summa rectarum CB = $+y$; & DH = $-u$; quare illarum differentia = $y + u$, erit

$$2\sqrt{\left(\frac{rzz}{4bb} + ar - rz\right)}$$

quod etiam sic, longiore via sed fortasse planiore, inveniri potest. Est

$$\frac{rz}{b} = y - u$$

unde

$$u = y - \frac{rz}{b}$$

&

$$2uy = 2yy - \frac{2rzy}{b}$$

atque

$$uu = yy - \frac{2ryz}{b} + \frac{rzz}{bb}$$

ergo

TAB. N.
Fig. 5.

æquatio quatuor tantum dimensionum, quæ ad octo dimensiones ascendisset si quævissem CG vel CB aut AB. (b)

PROB.

$$CK^2 = (y + u)^2 = yy + 2uy + uu$$

&

erit, substituendo,

$$\frac{d}{e} V(yy + ce) = \frac{yz}{b} + a - z$$

$$4yy - \frac{4rzy}{b} + \frac{rrzz}{bb} = 4ar - 4rz + \frac{rrzz}{bb}$$

unde quadrando,

ponendo pro 4yy valorein $4ar - 4rz + \frac{4ryz}{b}$; deductum ex æquatione Auctoris, & delendo contraria.

$$\frac{ddy + eed}{ee} = \frac{yyz}{bb} + \frac{2yz(a-z)}{b} + (a-z)^2$$

& auferendo fractiones

Sed in altera hypothesi, subducendo

$$bbddy + bbeed = eeyyz + 2beeyz(a-z) + bbee(a-z)^2$$

$$ab \frac{rzy}{b} + ar - rz$$

vel, transponendo & dividendo,

$$\text{quantitatem } \frac{ruz}{b} + ar - rz$$

$$yy = \frac{2brez(a-z) + bbee(a-z)^2 - bbeed}{ee - eez}$$

& ab yy quadratum uu superest

quare

$$\frac{ryz - ruz}{b} = yy - uu$$

$$y = \frac{bee(a-z) \pm \sqrt{bbecz(a-z)^2 + (bbee(a-z)^2)(bbd - eez) - bbeed(bb d - eez)}}{bbd - eez}$$

&

& dividendo per communem divisorem $y - u$

id est

$$\frac{rz}{b} = y + u$$

$$y = \frac{bee(a-z) \pm be \sqrt{eez + bbd - eez}}{bbd - eez}$$

quare est $\frac{rz}{b}$ summa ordinarum CB & DH; unde vel methodo Auctoris vel nostra inventur illarum differentia CK, qualis est apud NEWTONUM.

$$\frac{(a-z)^2 - dd(bb d - eez)}{bbd - eez}$$

quod facit duplam quantitatem sub signo

Ceterum si alia æquatio ad sectiones conicas assumeretur, ut $xx = \pm \frac{ddy}{ee} + dd$; quæ

$$\frac{2bed \sqrt{aabb - bbd - 2abb + bbz + eez}}{bbd - eez}$$

oritur vel ex $dd - xx = \frac{ddy}{ee}$ ad ellipsum,

differentiam gemini valoris y ; unde sequendo vestigia Auctoris, incidemus in æquationem quatuor dimensionum, sed magis compositam.

vel ex $xx - dd = \frac{ddy}{ee}$ ad hyperbolam, eodem pacto res peragi possent. Assumamus

enim $xx = \frac{ddy}{ee} + dd$ ad hyperbolam, erit

$$x = \sqrt{\left(\frac{ddy}{ee} + dd\right)} = \frac{d}{e} V(yy + ce)$$

(b) 142. Æquationes determinatæ secundo gradu altiores constituuntur per aptorum locorum intersectiones; & æquationes quatuor dimensionum componi solent per duas sectiones conicas, quarum altera sumitur ad arbitrium, sed quam commodissima; altera determi-

natur substituentæ in æquatione proposita valorem incognitæ depromptum ex æquatione locali assumta. Rem explicemus exemplo æquationis ab Auctore inventæ.

Quia illius secundum membrum totum ductum est in $\frac{bb}{rr}$, assumo æquationem ad parabolam $\frac{bb}{r} u = 2z$; quare substituendo $\frac{b^2 u u}{rr}$ pro z^2 ; $\frac{bbuz}{r}$ pro z^1 , & $\frac{bbu}{r}$ pro z ; æquatio proposita

$$rrz^2 = 4bbrz^1 - 4abbrz - bbrz + 4b^2rz - 4ab^2r + b^2cc$$

fit

$$b^2 u u = 4b^2 a z - 4ab^2 u - b^2 r u + 4b^2 r z - 4ab^2 r + b^2 cc$$

quæ, dividendo per b^2 , mutatur in

$$u u = 4uz - 4au - ru + 4rz - 4ar + cc$$

Ea est ad hyperbolam, quia termini altissimi $u u - 4uz$, divisores sunt u & $u - 4z$, reales & inæquales. Eam, exercitii gratia, construamus a primis principiis. Est

$$u = 2z - 2a - \frac{r}{2} \pm \sqrt{(4z^2 - 8az - 2rz + 4aa + 2ar + \frac{rr}{4} + 4rz - 4ar + cc)}$$

Quantitas radicis, per reductionem, fit

$$\sqrt{(4z^2 - 8az + 2rz + 4aa - 2ar + \frac{rr}{4} + cc)} = s$$

Sit $s = 2z - 2a - \frac{r}{2}$, quam ut invenias

pone rectam $AI = \frac{r}{4}$, erit $EI = a + \frac{r}{4}$, & per I age indefinitam IL parallelam rectæ EG . Erit IL datæ parabolæ directrix.

Ex IL abscinde $IL = 2EI = 2a + \frac{r}{2}$; per L duc indefinitam Le parallelam ipsi IE ; & rectæ EG occurrentem in e ; & per E ac L puncta age rectam indefinitam EL ; & per ejus punctum quodvis M duc ipsi IL parallelam Mm rectæ eL occurrentem in N , & rectæ EA in m .

Tab. I.

Est EI ad IL ; ut 1 ad 2, ut $Im(x)$ ad $mM = 2z$. Sed $MN = Mm - mN = Mm -$

$IL = 2z - 2a - \frac{r}{2} = s$; & ubi $s = 0$, est $z = a + \frac{r}{4} = IE$; ergo est L punctum origo ipsarum s ; & harum locus est indefinita recta EL ; & recta abscissarum est indefinita LN .

Cum autem sit $u = s + t$; & t ordinata ad curvam, cujus diameter jacet secundum rectam EL , (quæ determinata fuit construendo dimidium secundum terminum æquationis propositæ, secundum Num. 130. de Loc. Geom.) atque $u = s$, quando $t = 0$; ipsæ u supra rectam NL versus M , & indeterminatæ t hinc terminabuntur a recta EL , inde a curva, & in quolibet puncto rectæ EL erit $t = 0$, quod accidit ubi curva fecit rectam EL . Ponamus ergo

$$t = \sqrt{(4z^2 - 8az + 2rz + 4aa - 2ar + \frac{rr}{4} + cc)} = 0$$

tunc erit

$$2z = 2az - \frac{rz}{2} - aa + \frac{ar}{2} - \frac{rr}{16} - \frac{cc}{4}$$

& est

$$-aa + \frac{ar}{2} - \frac{rr}{16} = -(a - \frac{r}{4})^2$$

igitur

$$z = a - \frac{r}{4} \pm \sqrt{(a - \frac{r}{4})^2 - (a - \frac{r}{4})^2 - \frac{cc}{4}}$$

$$= a - \frac{r}{4} \pm \sqrt{-\frac{cc}{4}}$$

quia $(a - \frac{r}{4})^2$ & $-(a - \frac{r}{4})^2$ sese destruant.

Sume igitur $LO = \frac{r}{4}$; erit $Oe =$

$$eL - LO = EI - OL = a + \frac{r}{4} - \frac{r}{2} =$$

$a - \frac{r}{4}$. Est autem 4 (numerator coefficientis z^2 sub signo) ad 1 (denominatorem) ut $4a - r$ (dimidiatus coefficientis secundi termini) ad $a - \frac{r}{4}$, ex N^o. 134. Jam, ubi $t = 0$,

Gg est

est $z = eO = \sqrt{c^2 - \frac{cc}{4}}$; quæ quantitas cum sit imaginaria, indicat curvam rectæ EL nusquam occurrere, vel eam esse secundam hyperbolæ diametrum; ut ex No. 135.

A recta eL hinc inde a puncto O abscinde OQ \equiv Oq $\equiv \frac{c}{2}$; per O; Q; & q puncta age rectas ipsi Es parallelas, & occurrentes rectæ EL in o; R; & r; crit punctum o centrum hyperbolæ, & recta definita Rr ejus diameter secunda.

Altera semi-diameter est valor ordinatæ s in ipso centro. Tunc autem est $z = eO = a - \frac{r}{4}$; quo valore posito in valore ipsius s, invenimus

$$s = \sqrt{4(a - \frac{r}{4})^2 - (8a - 2r)(a - \frac{r}{4}) + 4(a - \frac{r}{4})^2 + cc}$$

Est autem $(8a - 2r)(a - \frac{r}{4}) = 8(a - \frac{r}{4})(a - \frac{r}{4})$; ergo, ceteris terminis se destruentibus, erit $s = c$, cui æquales cape oS; os hinc inde a puncto o in recta oO, & per S & s puncta describe hyperbolas oppositas circa diametrum transversam Ss, & secundam Rr; habebis locum æquationis propositæ. Est autem 1, (denominator coefficientis zz sub signo)

ad 4 (numeratorem) sic $\frac{cc}{4}$ (quadratum unius semi-diametri) ad cc. Conversiunt ergo hæc cum No. 136.

Recta mM ponatur occurrere hyperbolæ in P, unde ages Pp ipsi EL parallelam, & occurrentem in p diametro sS. Erit ex hyperbolæ natura rectangulum sub sp; pS ad quadratum Pp ut quadratum So ad quadratum oR, ut 4 ad 5, quandoquidem est $LE = \sqrt{(LI + IE)^2 - 2LI \cdot IE} = \sqrt{(LI + 4LI)^2 - 4LI^2} = \sqrt{5LI^2} = LI\sqrt{5}$; & IL ad LE ut 1 ad $\sqrt{5}$. Sed IL ad LE ut OL ad Lo ut QL ad LR, ut OQ ad RO; igitur ut 1 ad 5 sic quadratum OQ, (aut quarta pars quadrati So quia recta So facta est dupla rectæ OQ) ad quadratum Ro; & tandem ut 4 ad 5 sic rectangulum sub sp; pS ad quadratum pP.

Pariter est ut IL ad LE (1 ad $\sqrt{5}$) sic OL₁ ($\frac{r}{2}$) ad Lo $\equiv \frac{r}{2}\sqrt{5}$; & IL ad EL (2 ad $\sqrt{5}$) ut NM ($s = 2z - 2a - \frac{r}{2}$) ad ML \equiv

$$(z - a - \frac{r}{4})\sqrt{5}; \text{ \& } Mo = (z - a + \frac{r}{4})\sqrt{5} = Pp, \text{ cujus quadratum est}$$

$$(zx - 2az + \frac{rz}{2} + aa - \frac{ar}{2} + \frac{rr}{16}) 5$$

Sed pS \equiv po - oS \equiv s - c \equiv u - 2z + 2a + $\frac{r}{2} - c$, ac pS \equiv po + oS \equiv u - 2z + 2a + $\frac{r}{2} + c$; quia erat u - s \equiv r, & s \equiv 2z - 2a - $\frac{r}{2}$; quare rectangulum sub ps; pS est

$$uu - 4uz + 4au + ur + 4xz - 8az - 2rx + 4aa + 2ar + \frac{rr}{4} - cc$$

quod cum sit ad

$$(zx - 2az - \frac{rz}{2} + aa + \frac{ar}{2} + \frac{rr}{16}) 5, \text{ ut 4 ad 5,}$$

tandem erit, multiplicando media & extrema, ac dividendo per 5, ac delendo æqualia

$$uu - 4uz + 4au + ru - 4xz + 4ar - cc \equiv 0$$

æquatio proposita.

Si per S agatur rectæ LR parallela ST ipsi QR occurrens in T & per o recta oX parallela rectæ AE, & rectæ QR occurrens in X erit TR \equiv So \equiv c \equiv RX quia RQ, cum sit dupla QL, est c - r, & cum QX aut Oo \equiv 2OL \equiv r, facit c. Quare producamus rectam TS donec rectæ oX occurrat in Z; erit XT ad ad TZ ut oS ad SZ; sed XT ostensa est dupla ipsius oS, est ergo TZ dupla ipsius ZS, quæ ideo est æqualis ipsi ST, id est semi-diametro secundæ, quare, acta Tø, erunt Tø, oZ asymptoti hujus hyperbolæ; quod recte congruit cum æquatione, in qua z est unius dimensionis, atque ideo debet esse vel asymptotus, vel asymptoto parallela.

Præterea, recta Tø occurrit rectæ QO in r, & rectæ eE in i; est TX (2oS \equiv 2c) ad Xo (QO $\equiv \frac{c}{2}$) ut 4 ad 1, ut oO (2OL \equiv r)

P R O B. X X I X.

Datum angulum per datum numerum multiplicare vel dividere.

In angulo quovis FAG inscribe lineas AB, BC, CD, DE, &c. ejusdem ^{TAB. III.} _{Fig. 10.} cujusvis longitudinis, & erunt triangula ABC, BCD, CDE, DEF, &c. isoscelia, adeoque per 32. I. Elem. erit ang. CBD = ang. A + ACB = 2 ang. A, & ang. DCE = ang. A + ADC = 3 ang. A, & ang. EDF = A + AED = 4 ang. A, & ang. FEG = 5 ang. A, & sic deinceps. Positis jam AB, BC, CD, &c. radiis æqualium circularum, perpendicularia BK, CL, DM, &c. demissa in AC, BD, CE, &c. erunt sinus istorum angulorum, & AK, BL, CM, DN, &c. sinus complementorum ad rectum. Vel posita AB diametro, illæ AK, BL, CM, &c. erunt chordæ. Sit ergo AB = 2r & AK = x, dein sic operare.

$$AB . AK :: AC . AL.$$

$$2r . x :: 2x . \frac{xx}{r}.$$

$$\left. \begin{array}{l} AL - AB \\ \text{Et } \frac{xx}{r} - 2r \end{array} \right\} = BL, \text{ Duplicatio.}$$

$$AB . AK :: AD (2AL - AB) . AM.$$

$$2r . x :: \frac{2xx}{r} - 2r . \frac{x^3}{rr} - x.$$

AM

ad Os = $\frac{r}{4}$; & si = eO + Os = a — $\frac{r}{4}$ + $\frac{r}{4}$ = a. Pariter rO ad Os, ut 4 ad 1, ut se ad si = 4a, a qua si demas partem ee æqualem ipsi Os = r, manebit zi = 4a — r, dimidiato coefficienti quem habet secundus terminus quantitatis sub signo; quare altera alymptotus determinata est ut jubebat N^{us}. 137.

Tandem descripta parabola $\frac{bb}{r} u = 2x,$

punctum K aut k in quo ea occurrit hyperbolæ, dat valorem incognitæ z; & si parabola occurrit hyperbolæ in duobus punctis, ut in figura; duo erunt in axe AE puncta F; f, & duæ rectæ CGFD; cGf problema solventes.

143. Addendo vel subducendo terminos æquationis localis assumtæ & æquationis localis inventæ per substitutionem assumti valoris in æquatione construenda, vel quales sunt, vel multiplicatos per aliquem coefficientem, possunt inveniri aliæ curvæ, e quibus commodissimam eliger analytâ.

Sic in nostro exemplo, si hinc demas $\frac{cbb}{r} u,$ & inde 5zz, habebis

$$uu - \frac{5bb}{r} u = 4uz - 5zz - 4au - ru + 4rz - 4ar + c6$$

æquationem ad ellipsim; nam altissimus terminus est uu — 4uz + 5zz, cujus factores sunt inæquales & imaginarii u — 2z + 2√-1; & u — 2z — 2√-1.

Gg 2

$$\left. \begin{array}{l} \text{AM} - \text{AC} \\ \text{Et } \frac{x^4}{rr} - 3x \end{array} \right\} = \text{CM, Triplicatio.}$$

$$\text{AB} . \text{AK} :: \text{AE} (2\text{AM} - \text{AC}) . \text{AN.}$$

$$2r . x :: \frac{2x^4}{rr} - 4x . \frac{x^4}{r^3} - \frac{2xx}{r}.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{AN} - \text{AD} \\ \text{Et } \frac{x^4}{r^3} - \frac{4xx}{r} + 2r \end{array} \right\} = \text{DN, Quadruplicatio.}$$

$$\text{AB} . \text{AK} :: \text{AF} (2\text{AN} - \text{AD}) . \text{AO.}$$

$$2r . x :: \frac{2x^4}{r^3} - \frac{6xx}{r^4} + 2r . \frac{x^4}{r^4} - \frac{3x^3}{rr} + x.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{AO} - \text{AE} \\ \text{Et } \frac{x^4}{r^4} - \frac{5x^3}{rr} + 5x \end{array} \right\} = \text{EO, Quintuplicatio.}$$

Et sic deinceps. Quod si velis angulum in aliquot partes dividere, pone q pro BL , CM , DN , &c. Et habebis $xx - 2rx = qr$ ad bisectionem, $x^3 - 3rrx = qrr$ ad trisectionem, $x^4 - 4rrxx + 2r^4 = qr^3$ ad ad quadri-sectionem, $x^5 - 5rrx^3 + 5r^4x = qr^4$ ad quinqusectionem &c.

PROB. XXX.

Cometæ in linea recta BD uniformiter progredientis positionem cursus ex tribus observationibus determinare.

TAB. III.
Fig. 11.

Sit A oculus spectatoris, B locus cometæ in prima observatione, C in secunda, ac D in tertia; quærenda erit inclinatio lineæ BD ad lineam AB . Ex observationibus itaque dantur anguli BAC , BAD ; adeoque si BH ducatur ad AB normalis & occurrens AC & BD in E & F , ex assumpto utcunque AB dabuntur BE & BF , tangentes nempe præfatorum angulorum respectu radii AB . Sit ergo $AB = a$, $BE = b$, & $BF = c$. Porro ex datis observationum intervallis dabitur ratio BC ad BD , quæ si ponatur b ad e , & agatur DG parallela AC , cum sit BE ad BG in eadem ratione, & BE dicta fuerit b , erit $BG = e$, adeoque $GF = e - c$. Ad hæc si demittatur DH normalis ad BG , propter triangu-la ABF & DHF similia & simili-

liter secta lineis AE ac DG, erit FE. AB :: FG. DH (c) hoc est $c - b$.

$a :: c - c \cdot \frac{ae - ac}{c - b} = HD$. Erit etiam FE. FB :: FG. FH, (d) hoc est

$c - b \cdot c :: c - c \cdot \frac{ce - ce}{c - b} = FH$; cui adde BF sive c & fit $BH = \frac{ce - cb}{c - b}$.

Quare est $\frac{ce - cb}{c - b}$ ad $\frac{ae - ac}{c - b}$, (sive $ce - cb$ ad $ae - ac$, vel $\frac{ce - cb}{c - c}$ ad a)

ut BH ad HD; hoc est ut tangens anguli HDB sive ABK ad radiam.

Quare cum a supponatur esse radius, erit $\frac{ce - cb}{e - c}$ tangens anguli ABK,

adeoque facta resolutione ut $e - c$ ad $e - b$ (sive GF ad GB) ita c (sive tangens anguli ABF) ad tangentem anguli ABK.

Dic itaque ut tempus inter primam & secundam observationem, ad tempus inter primam ac tertiam, ita tangens anguli BAE, ad quartam proportionalem. Dein ut differentia inter illam quartam proportionalem & tangentem anguli BAF, ad differentiam inter eandem quartam proportionalem & tangentem anguli BAE, ita tangens anguli BAF, ad tangentem anguli ABK.

PROB. XXXI.

Radii a puncto lucido ad sphericam superficiem refringentem divergentibus, invenire concursus singulorum refractorum cum axe sphaerae per punctum illud lucidum transeunte. (e)

Sit A punctum illud lucidum, & BV sphaera, (f) cujus axis AD, cen-^{TAB. III.} trum C, (g) & vertex V, utque AB radius incidens & BD refractus^{F. 5. 12.} ejus, ac demissis ad radios istos perpendicularibus CE & CF, ut & BG perpendiculari ad AD, actaque BC, dic AC = a, (b) VC vel BC = r, (i) CG.

(c) Est enim, ob similia triangula AFE; FGD, ut FE ad EA sic FG ad GD; & ob similia triangula AEB; DGH, ut EA ad AB, sic GD ad DH; unde ex aquo ordinate, FE ad AB ut FG ad HD.

(d) Pariter eadem triangula dant FE ad EA ut FG ad GD; & AE ad EB ut DG ad GH; quare iterum ex aquo ordinate, FE ad EB ut FG ad GH, & componendo, FE ad FB ut FG ad FH.

(e) Optime quidem Newtonus problema de sphaera proposuit; quia minus utiles, & magis difficiles sunt aliae curvae; sed tamen, quia paucissimis mutatis, potest Auctoris aequatio fieri ge-

neralissima, id exercitii causa faciam.

(f) Curva quævis superficies.

(g) Quia nempe in circulo omnes normales ad curvam per centrum transeunt, sed in nostra hypothesi ex B ducatur normalis ad curvam, quæ axi occurrat in C.

(b) In sphaera datur magnitudine recta AC; sed non in aliis curvis. Quare dic datam AV = a, VG = u; GC = s, & pro a, in Auctoris æquatione, ponere debebis a + u + s.

(i) Quia scilicet VC, & BC sunt radii sphaerae; at in nostra hypothesi VC = u + s; sed non aequat CB.

CG = x, (k) & CD = z, (l) eritque AG = a - x, BG = $\sqrt{rr - xx}$ (m)
 AB = $\sqrt{aa - 2ax + rr}$ (n) & propter similia triangula ABG & ACE, CE
 = $\frac{av\sqrt{rr - xx}}{\sqrt{aa - 2ax + rr}}$ (o). Item GD = z + x, (p) BD = $\sqrt{zz + 2zx + rr}$: & pro-

pter similia triangula DBG ac DCF; CF = $\frac{zv\sqrt{rr - xx}}{\sqrt{zz + 2zx + rr}}$, (q) Præterea cum
 ratio sinuum incidentiæ & refractionis, adeoque CE ad CF detur, pone il-
 lam ratione esse a ad f, (r) & erit $\frac{fa\sqrt{rr - xx}}{\sqrt{aa - 2ax + rr}} = \frac{azv\sqrt{rr - xx}}{\sqrt{zz + 2zx + rr}}$, (s)

ac multiplicando in crucem, dividendoque per a $\sqrt{rr - xx}$, erit
 $f\sqrt{zz + 2zx + rr} = zv(aa - 2ax + rr)$, & quadrando, ac redigendo termi-
 nos in ordinem, $zz = \frac{2ffxz + f\sqrt{rr}}{aa - 2ax + rr - ff}$. (r) Denique pro dato $\frac{f}{a}$ scribe

p, & q pro dato $q + \frac{rr}{a} = p$, & erit $zz = \frac{2pxz + prr}{q - 2x}$ ac

$z = \frac{px + \sqrt{ppxx - 2prrx + pqr}}{q - 2x}$. Inventum est itaque z; hoc est lon-
 gitude CD, adeoque punctum quæsitum D quo refractus BD concurrat
 cum axe Q. E. F.

Posui hic incidentes radios divergentes esse, & in medium densius inci-
 dere; sed mutatis mutandis problema perinde resolvitur ubi convergunt,
 vel incidunt e densiori medio in rarius. (v)

PROB.

(k) Apud nos $x = s$.

u; & m nobis indicabit sinum incidentiæ.

(l) Datum enim est in sphaera centrum C;
 sed nobis tantum punctum V datum est. Di-
 cemus ideo VD = β . Erit z (CD = DV -
 VG - GC) = $\beta - u - s$; qui valor in Aucto-
 ris æquatione ponendus erit.

$$(s) \text{ Nobis vero } \frac{ny(u + u + s)}{\sqrt{aa + 2au + uu + yy}} \\ = \frac{my(\beta - u - s)}{\sqrt{(\beta\beta - 2\beta u + uu + yy)}}$$

(m) Ex notissima circuli proprietate. Nos
 vero, qui æquationem generalissimam quæ-
 rimus, dicimus BG = y.

(r) Id est (dividendo per y, multiplicando
 in crucem, & quadrando,)

(n) Nobis autem $\sqrt{aa + 2au + uu + yy}$.

$$nn(aa + 2au + 2as + uu + 2us + ss)$$

$$(\beta\beta - 2\beta u + uu + yy) =$$

$$mm(\beta\beta - 2\beta u - 2\beta s + uu + 2us + ss)$$

$$(aa + 2au + uu + yy)$$

(o) Id est $\frac{(a + u + s)y}{\sqrt{(aa + 2au + uu + yy)}}$

(p) Substituendo $\beta - u = DG$, & BD =
 $\sqrt{\beta\beta - 2\beta u + uu + yy}$.

æquatio generalissima, quæ, licet nixa sit di-
 vergentiæ radiorum, facile tamen aptatur ad
 eorum parallelismum, & convergentiam.

(q) Et nostris symbolis CF =

$$\frac{(\beta - u - s)y}{\sqrt{\beta\beta - 2\beta u + uu + yy}}$$

(r) Sed quia in hypothesei nostra non datur
 a (a + u + s), hanc rationem ponemus m ad

(v) Namque si radii sunt axi paralleli u, & β
 in infinitum crescunt; & ideo delendi sunt
 omnes termini, in quibus eæ non sunt, aut
 non ad altissimum gradum elata, quia hi termi-
 ni finiti sunt, & pro nullis habentur ad infini-
 tos comparati; unde fit

po

posita α infinita, & dividendo per $\alpha\alpha$

$$nn (\beta\beta - 2\beta u + uu + yy) =$$

$$mm (\beta\beta - 2\beta u - 2\beta s + uu + 2us + ss)$$

& posita β infinita & dividendo per $\beta\beta$.

$$nn (\alpha\alpha + 2\alpha u + 2\alpha s + uu + 2us + ss) =$$

$$mm (\alpha\alpha + 2\alpha u + uu + yy)$$

Si radii convergunt, α , vel β negative sumantur, & ejus impares potestates contrariis, ac prius, signis sunt afficiendæ. Unde habebitur.

posita α negativa

$$nn (\alpha\alpha - 2\alpha u - 2\alpha s + uu + 2us + ss)$$

$$(\beta\beta - 2\beta u + uu + yy) =$$

$$mm (\beta\beta - 2\beta u - 2\beta s + uu + 2us + ss)$$

$$(\alpha\alpha - 2\alpha u + uu + yy)$$

& posita β negativa.

$$nn (\alpha\alpha + 2\alpha u + 2\alpha s + uu + 2us + ss)$$

$$(\beta\beta + 2\beta u + uu + yy) =$$

$$mm (\beta\beta + 2\beta u + 2\beta s + uu + 2us + ss)$$

$$(\alpha\alpha + 2\alpha u + uu + yy)$$

Si quis hoc ratiocinio contentus non est, is calculum rursus instituat in duabus his hypothësis, & superioribus vestigiis insistens ad allatas æquationes facile perveniet.

Obiter notandum: Quod si radii paralleli, aut convergentes, incidant in superficiem convexam, α fiet infinita, vel negativa; β vero, si in concavam.

Ex his tribus æquationibus generalibus facile peculiare omnes deducatur, & noscetur utrum, & quibus legibus, proposita curva habeat geometricum focus. Nam si radii sint divergentes, aut convergentes, pro α si incidunt in convexam; sin vero, pro β , ponetur ejus valor datus; & altera β , vel α determinabitur ab æquatione, quæ simplicior fiet ponendo pro s , aut y , ejus valorem, quem dat data curva. Erit autem curva inter punctum concursus, & punctum lucidum, cum valor quæsitæ β , vel α est positivus, ut nos posuimus; cum vero est negativus, erit punctum concursus ad eandem curvæ partes, ad quas est lucidum.

Habebit autem curva focus geometricum, quando y , & s , (ubi est variabilis) abeunt ab

æquatione. Si enim omnes radii refringuntur in idem punctum D, erit VD constans; sed BG, & GC sunt variables, ergo magnitudo ipsius VD ab iis non pendet; sed magnitudo VG, determinatur a BG, atque ideo VG est variabilis; ac VD æquat VG, GC, CD simul sumptas; igitur ipsa VD nequit esse constans, nisi ab ejus expressione, aut valore, abfuit VG, GC, aut eam determinans BG, variables. Secus autem curva habebit focus physicum.

Curva focus physicum habens geometrico donabitur, sublatis ex æquatione s , & y ; quod fieri nequit, nisi omnes termini, ubi sunt hæc quantitates, mutuo se destruant. Itaque, ut sciamus utrum curva focus geometricum habere possit, sumantur omnes termini homogenei, ubi reperitur s , aut y , & singula eorum aggregata ponantur æqualia nihilo.

Pauca, ut lucem generali huic doctrinæ dandam ex concisis afferemus.

Sit VB ellipsis, & radii paralleli ex aere incidant in vitrum convexum, & sit axis major $= 2a$, axis minor $= 2b$. Tunc VG $= u$, reliquis axis

$$= 2a - u; \text{ \& } \frac{2abn - bbnu}{aa} = yy, GC =$$

$$s = \frac{abb - bbu}{aa}; m = 3, n = 2.$$

Quia hic radii paralleli convexitatem feriunt, pone α infinitam, & substituendo, formulæ generalis evadet $4(\beta\beta - 2\beta u + uu + \frac{2abbu - bbuu}{aa})$

$$= 9(\beta\beta - 2\beta u - \frac{2ab\beta + 2bb\beta u + 2ab\beta u - 2bbuu}{aa}$$

$$+ uu + \frac{aab^4 - 2a^2u^4 + b^4uu}{a^4}), \text{ quæ per de-$$

$$\text{bitas reductiones, ac transpositiones fiet}$$

$$\beta\beta = \frac{\beta(10a^4u - 18a^2bbu - 18a^2bbu - 10a^4bbu)}{5a^4}$$

$$+ 18a^2u - 5a^4uu + 14a^2bbuu.$$

$$5a^4$$

$$- 6b^4uu - 9a^2u^4.$$

$$5a^4$$

Unde liquet, quod, extracta radice, semper u erit in valore ipsius $\beta\beta$ quare, cum u mutabitur etiam β , & ideo ellipsis focus geometricum non habet, quem tamen haberet, si a valore ipsius β abesset u . Ut ergo percipiam quando, & quibus legibus id accidat, facio $= 0$ omnes terminos homogeneos, in quibus occurrit u , qui sunt $10a^4u - 28a^2bbu$.

$$= 0.$$

PROB. XXXII.

Si Conus plano quolibet secetur, invenire figuram sectionis.

TAB. IV.
Fig. 1. 2.

Sit ABC conus circulari basi BC insitens; IEM ejus sectio quaesita; KILM alia qualibet sectio parallela basi, & occurrens priori sectioni in HI; & ABC tertia sectio perpendiculariter bisecans priores duas in EH & KL, & conum in triangulo ABC. Et producto EH donec occurrat ipsi AK in D, actisque EF ac DG parallelis KL & occurrentibus AB & AC in F ac G, dic EF = a, DG = b, ED = c, EH = x, & HI = y; & propter similia triangula EHL, EDG, erit ED. DG :: EH. HL = $\frac{bx}{c}$. Dein propter similia triangula DEF, DHK, erit DE. EF :: DH.

(c

= 0; & $10a^3u + 18al^4u = 0$; tum $-5a^4uu + 14aabbuu - 9b^4uu = 0$. Prima æquatio, transponendo ac dividendo, per $2auu$, dat $5aa = 9bb$, quod etiam colligitur e secunda: tertium divido per uu , quotum sic ordino $b^4 = \frac{14aabb - 5a^4}{9}$, cujus radicem extraho, ut in æquationibus biquadraticis, &

$$\text{invenio } bb = \frac{7aa}{9} \pm \sqrt{\frac{40a^4 - 5a^4}{81}}$$

$$= \frac{7aa}{9} \pm \sqrt{\frac{40a^4 - 45a^4}{81}} = \frac{7aa \pm 2aa}{9}$$

Sed $\frac{7aa + 2aa}{9}$ dat $lb = aa$, quod rejicio,

quia non congruit cum jam inventis; alii $\frac{7aa - 2aa}{9}$

dat $bb = \frac{5aa}{9}$, sive $5aa = 9bb$, ut supra. Aut

in $b^4 = \frac{14aabb - 5a^4}{9}$ pono pro l^4 , & bb ,

valores ex supra inventis erutos $\frac{25a^4}{81}$ & $\frac{5aa}{9}$,

& invenio $\frac{25a^4}{81} = \frac{7Ca^4}{81} - \frac{5a^4}{9} = \frac{7Ca^4 - 45a^4}{81}$

$= \frac{25a^4}{81}$, quod optime ad rem facit. Igitur

in radorum incidentium parallelismo ellipsis habet focum geometricum, cum $aa. lb :: 9. 5$, ut axis major ad parametrum. Sed distantia focorum est $2\sqrt{(aa - bb)} = (ob\ bb = \frac{5aa}{9})$

$2\sqrt{\frac{9aa - 5aa}{9}} = \frac{4a}{3}$; tunc autem est axis ad

focorum distantiam, ut sinus incidentiæ ad sinum refractionis. Quæramus nunc distantiam verticis a foco isto geometrico. In æquatione priore deletis terminis ubi est u , restat

$$\beta\beta = \frac{18a^3bb\beta - 9aabb^4}{5a^4} = \frac{18bb\beta}{5a} - \frac{9bb^4}{5aa}, \text{ \&}$$

$$\beta = \frac{9bb}{5a} + \sqrt{\frac{36bb^4}{25aa}} = \frac{9bb + 6bb^2}{5a}, \text{ \&}$$

$$\beta = \frac{3bb}{a} = (ob\ \frac{5aa}{9} = bb) \frac{5a}{3} = VD. \text{ Totus autem axis est } 2a, \text{ \& distantia inter focos ellipsois est } \frac{4a}{3}, \text{ quæ dimidiata cum dimidiata}$$

axe dat pariter $\frac{5a}{3}$ pro distantia verticis a

foco remotiore ellipsois; ergo focus geometricus in hac hypothese est remotior focus ellipsois.

Si VB ponatur hyperbola, & radii axi paralleli ex vitro incidentent in concavam aeris superficiem, superiora premens vestigia invenies hyperbolam focum geometricum non habere, nisi cum axis primarius est ad parametrum, ut sinus incidentiæ, ad sinum refractionis, & quod focus hic geometricus est focus oppositæ hyperbolæ. Facile quoque videbis, quod parabola nunquam focum dioptricum habere potest, ubi radii incidunt paralleli.

Si VB sit circulus, factis debitis substitutionibus incidet in ipsissimam æquationem Auctoris.

($c - x$ in Fig. 1, & $c + x$ in Fig. 2.) $HK = \frac{ac \mp ax}{c}$. Denique cum sectio KIL sit parallela basi, adeoque circularis, erit $HK \cdot HL = HI \cdot q$, hoc est $\frac{ab}{c}x \mp \frac{ab}{cc}xx = yy$, æquatio quæ exprimit relationem inter EH (x) & HI (y), hoc est inter axem & ordinatim applicatam sectionis EIM, quæ æquatio cum sit ad ellipsim in Fig. 1, & ad hyperbolam in Fig. 2. patet sectionem illam perinde ellipticam vel hyperbolicam esse.

Quod si ED nullibi occurrat AK, ipsi parallela existens, tunc erit $HK = EF$ (a), & inde $\frac{ab}{c}x$ ($HK \cdot HL$) = yy , æquatio ad parabolam.

P R O B. X X X I I I.

Si recta XY circa axem AB, ad distantiam CD, in data inclinatione ad planum DCB convolvatur, & solidum PQRUTS ista convolutione generatum secetur plano quolibet INQLK; invenire figuram sectionis. (x)

TAB. IV.
Fig. 3.

Esto BHQ vel GHO inclinatio axis AB ad planum sectionis; & L quilibet concursus rectæ XY cum plano illo. Age DF parallelam AB, & ad AB, DF, & HO demitte perpendiculares LG, LF, LM, & junge FG

(x) Operæ pretium facturus videor, si solidi PQRUTS generationem illustrem. Jam rectæ AB, CD sunt in eodem plano (Eucl. 2. XI). In eo ducatur DF ipsi BA parallela, vel normalis ad CD, & ex quolibet ipsius DF puncto F agatur FG perpendicularis ad AB, quæ erit parallela DC, & ad rectos angulos ad DF. Item ex F excita indefinitam FL rectam ad planum CDFG; recta XY esse debet in plano DFL, id est occurrere debet ipsi FL alicubi in L. (hoc enim indicant Auctoris verba, ad distantiam CD); & cum FD faceret quæcumque angulum datum FDL.

Juncta GL erit in eodem plano ac FL, FG, cum quibus triangulum constituit; & planum GFL erit rectum ad planum GFDC (Eucl. 18. XI). Rursus, quia DF, ex construct. est ad rectos angulos tum ipsi LF, tum FG, recta erit ad planum FGL (Eucl. 4. XI), æque ac ei parallela CG (Eucl. 8. XI). Est autem GFL triangulum rectangulum in F; quapropter hypotenusa GL major est latere GE, aut CD.

Tom. I.

Concipiatur GF producta donec æquet GL; erunt GF sic producta, & GL radii ejusdem circuli, ad quem perpendicularis erit AB; cum autem idem probari possit de omnibus punctis rectæ AB, patet solidum PQRUTS consistere circulis parallelis hinc inde a CD crescentibus, & quorum omnium centra sunt in recta AB, quæ vocatur *axis solidi*.

Si ergo solidum secetur plano SAPQBVT per axem, in duas partes æquales sectum erit; est enim PA, communis sectio planorum SKPI & SAPQBVT, normalis ad AB, ut omnes ipsi SA parallele; sunt igitur PS, & rectæ ei parallele, diametri circulorum, quibus componitur solidum; quare circuli omnes ab his rectis, & ideo solidum a plano bifecatur.

Si nunc solidum rursus secetur plano KLQNI ad axem AB inclinato, sed ad planum per axem recto, dico quod recta QO communis horum planorum sectio, bifecat rectam IQK communem sectionem plani KLQNI, & circuli SKPI, & omnes NML ei parallelas.

Hh

Nam

FG & MG. Diciturque $CD = a$, $CH = b$, $HM = x$, & $ML = y$; & propter datum angulum GHO , posito $MH.HG :: d.e : (y)$ erit $\frac{ex}{d} = GH$,

& $b + \frac{ex}{d} = GC$ vel FD . Adhæc propter angulum datum LDF (nempe inclinationem rectæ XY ad planum $GCDF$) posito $FD.FL :: g.b, (z)$ erit $\frac{bb}{g} + \frac{hex}{dg} = FL$, cujus quadrato adde FGq , (DCq seu aa) & emerget

$GLq = aa + \frac{bbbb}{gg} + \frac{2bbhex}{dgg} + \frac{hhexx}{ddg}$. Hinc aufer MGq (HMq — HGq seu $xx - \frac{ee}{dd}xx$) & restabit $\frac{aagg + bbbb}{gg} + \frac{2bbhe}{dgg}x + xx$ ($\frac{bhee - dgg + eegg}{ddgg}$) ($= MLq$) $= yy$: æquatio quæ exprimit relationem inter x & y , hoc est inter HM , axem sectionis, & ML , ordinatim applicatam. Et proinde cum in hac æquatione x & y ad duas tantum dimensiones ascendant, patet figuram $INQLK$ esse conicam sectionem. Ut pote si angulus MHG major sit angulo LDF , ellipsis erit hæc figura (a); si minor, hyperbola (b); si æqualis vel parabola (c), vel (coincidentibus insuper punctis C & H) parallelogrammum (d).

PROB.

Nam circulus $PKSI$ est rectus ad planum per axem $SAPQRBVT$, ut & planum $KLQNI$: Igitur IK est ad planum per axem normalis (Eucl. 19. XI.), ergo etiam ad rectam PAS ; sed IK est chorda circuli, cujus diameter est PAS , quare bisecta est in O ; quæ demonstratio cum etiam ipsi LMN (quæ normalis est ad OHQ) possit aptari, patet omnes NML bifectas esse ab OQ .

Denique erit pariter LM normalis ad GM , ut quæ ducta a centro circuli, cujus radius est GL & chorda LN , ipsam bifecet. Insuper, quia LN est parallela ipsi KI , est etiam MG parallela ad AO , ac normalis ad AB ; quod facile probatur per 10. XI.

etiam angulus $\beta\gamma$ major erit angulo $\lambda\delta$; quare etiam arcus $\alpha\beta$ major quam $\alpha\lambda$, & $\beta\gamma$ quam $\lambda\delta$; sed quadrata ex $\lambda\delta$, & simul æquant (quadratum ex $\alpha\lambda$, sive ex $\alpha\beta$, aut) quadrata ex $\beta\gamma$, $\alpha\gamma$ simul; igitur illinc demto minore quadrato ex $\lambda\delta$, hinc majore ex $\beta\gamma$, erit (quadratum ex $\lambda\delta$ majus quadrato ex $\alpha\gamma$, vel) $\delta\alpha$ major $\alpha\gamma$; quapropter $\delta\gamma$ abscindet ex $\lambda\alpha$ minorem $\alpha\mu$: est autem $\delta\alpha$ (g) ad $\delta\lambda$ (h) ut $\alpha\gamma$

(e) ad $\gamma\mu = \frac{he}{g}$; quapropter $\frac{bhee}{gg} + ee$

æquant quadratum ex $\mu\alpha$, & minora sunt quam quadratum ex $\alpha\lambda$ (dd), igitur $bhee + eegg$ minora sunt quam $ddgg$, quo circa terminus altissimus æquationis consistat duobus factoribus inæqualibus & imaginariis.

(b) Superior demonstratio facile applicatur huic hypothese; ex quo sequitur, factores termini altissimi esse inæquales & reales.

(c) Tunc $e = g$, & $\frac{bhee - dgg + eegg}{ddgg} = hb$

— $dd + ee = 0$; quam ob rem quadratum xx abisset ab æquatione, quæ fieret

$$\frac{aagg + bbbb}{gg} + \frac{2bbhx}{dg} = yy.$$

(d) Ubi puncta C, H coincidunt, fit $b = 0$; quare

Tab. O. Fig. 2. (y) Assume quamlibet ax , quam dices d , describe arcum $\alpha\lambda\beta$; fac angulum $\alpha\alpha\beta$ parem ipsi MHG ; ex β demitte perpendicularem $\beta\gamma$: erit triangulum $\beta\gamma\alpha$ simile GMH , & datum specie ac magnitudine; erit igitur $MH.HG :: \beta\alpha.\alpha\gamma :: d.e$, quare erit $\gamma\alpha$ quam Auctor dixit e .

(z) Pariter fac angulum $\alpha\alpha\lambda$ æqualem FDL , & ex λ age $\lambda\delta$ perpendicularem ad $\alpha\alpha$. Erit triangulum $\lambda\delta\alpha$ simile LFD , & $\delta\alpha = g$, si dicas $\lambda\delta = b$.

(a) Si angulus MHG major est angulo LDF

quare æquatio ad parabolam evadit $aa = yy$, aut $a = y$.

TAB. O.
Fig. 3.

Ceterum hoc problema (quamvis generalius, quam supra propositum de cono & ejus sectionibus) adhuc generalius fieri potest, fingendo XY esse curvam quamlibet, ita positam ut ejus axis sit non CD ad AB normalis, sed alia quævis obliqua eD; cujus solidi generationem sic illustrare conabimur.

In plano $a\beta\gamma\delta$ agatur quævis recta AB, & ab aliquo ejus puncto C excitetur recta CD ad planum $a\beta\gamma\delta$ normalis, ac in eodem plano ducatur recta μC faciens cum AB in C angulum quemcumque datum μCB , & per μ , C, D transeat planum, in quo descripta intelligatur quævis curva XDY, cujus axis sit DC, & curva XDY servans semper idem intervallum ab AB, gyret circa axem AB, oriatur solidum aliquod: concipiatur hoc sectum plano quovis; hujus sectionis natura quaerenda est. Huic investigationi præmitto sequentia.

Si per D agatur tangens ad curvam, hæc esse debet normalis ad axem & obliqua ad CD; sed CD normalis est ad $eC\mu$ (Euct. 4. XI.), ergo tangens & recta $e\mu$ alibi convenienti coeant in μ , hinc ducatur ad solidi axem CB normalis $\mu\sigma$. Dico triangulum $\mu C\sigma$ datum esse specie, & magnitudine.

Nam quia datur curvæ XDY natura, ac positio, & insuper punctum D, positione datur tangens D μ ; sed DC datur magnitudine, & positione, datur ideo angulus μDC , & angulus ad C est rectus, quare datur angulus D μC , & totum triangulum magnitudine ac specie datur.

Quapropter magnitudine datur recta μC ; sed ob duos angulos datos $\mu C\sigma$, $\mu\sigma C$, specie datur triangulum $\mu C\sigma$; datur etiam magnitudine: adeoque datur magnitudine rectæ $\mu\sigma$, σC .

Si nunc ex quovis curvæ puncto ψ demittatur ad axem AB normalis $\psi\zeta$, hæc erit radius circuli gyratione descripti, & paralleli circulo, cujus radius est CD; cum enim CD & $\psi\zeta$ situm quoad axem AB non mutant, circuli ab ipsis descripti erunt ad eundem axem recti. Igitur solidi bases erunt circulares, & concipere licet solidum ubivis finitum. Nunc indaganda est ratio habendi valorem cujusvis radii.

Ducatur $\zeta\zeta$ ipsi $\mu\sigma$ parallela. Sunt igitur igitur plana μCD , $\psi\zeta\zeta$ ad idem planum $a\beta\gamma\delta$

recta (Euct. 18. XI. & quia planum $\psi\zeta\zeta$ est idem ac planum circuli recti ad axem AB, id est ad planum per axem); sed horum planorum communis sectio est $\psi\zeta$, ergo ea est normalis ad subjectum planum, & ad rectam $\zeta\zeta$, est igitur quadratum ex $\psi\zeta$ æquale quadratis ex $\zeta\zeta$, $\zeta\psi$ simul; sed, ob triangula similia $C\zeta\zeta$, $C\mu\sigma$, haberi potest valor $\zeta\psi$, & ob datam curvæ X ψ YD naturam, valor ipsius $\zeta\psi$, hinc itaque excudetur radii valor.

142. His præmissis, sit PQRVTS solidum ita TAB. O. genitum, KQI planum fecans positione datum, Fig. 4.

communis autem sectio plani hujus, & SKPI (aliquis ex circulis rectis ad axem solidi) sit recta IK. Ex A hujus circuli centro demittatur in IK normalis AS eam bisecans in O; curva generans sit KDY, & ob datam curvæ DC; communis sectio planorum BA ζ & KDC, recta μC , circulo SKPI occurrens in ζ , & curvam in D tangat D μ occurrens rectæ $\zeta C\mu$ in μ , unde agatur in axem normalis $\mu\sigma$, cui parallela erit A ζ . Ex Q demittatur QE ad axem normalis; & sint, $CD = a$, $CH = b$, $C\sigma = g$, $\sigma\mu = h$, $QH = d$, $HE = e$, $EQ = f$, $OH = x$, $OK = y$. Jam (premiendo Newtoni vestigia) $OH(x)$. HA :: QH

$$(d) \cdot HE (e); \text{ quare } HA = \frac{ex}{d}, \text{ \& } CA = b + \frac{ex}{d}; \text{ sed } HO (x) \cdot OA :: HQ (d) \cdot QE (f);$$

$$\text{unde } OA = \frac{fx}{d}. \text{ At quia axis AB, rectus ad circulum SKPI, est normalis ad rectam AP, est } C\sigma (g) \cdot \sigma\mu (h) :: CA (b + \frac{ex}{d}) \cdot A\zeta =$$

$$\frac{bh + ehx}{dg}. \text{ Sit nunc } \zeta K = z; \text{ erit } AK^2$$

$$(K\zeta^2 + \zeta A^2) = \frac{bbddhh + 2bdehxx + eehxxx}{d^2gg}$$

$$+ zz, \text{ \& } KA^2 = AO^2 = zz + \frac{bbddhh + 2bdehxx + eehxxx - ffgxxx}{d^2gg}$$

$$= OK^2 = yy.$$

Supereff, ut in hac æquatione ponatur valor ipsius z expressus per cognititas & x, ac ex curvæ natura ductus; quod ita fieri potest. 143. Quia triangulum CA ζ rectangulum est in A,

$$\text{est } \zeta C^2 (CA^2 + A\zeta^2) = \frac{bbdd + 2bdex + eexx}{d^2}$$

$$+ \frac{bbddhh + 2bdehxx + eehxxx}{d^2gg} =$$

$$Hh 2 \quad bb$$

$$(bbdd + 2bdex + eexx) (gg + hb)$$

Pone $gg + hb = Cr + eu^2 = rr = \mu C$; & erit

$$\zeta^2 = \frac{bbddrr + 2bderrx + eerrxx}{d^2dg}$$

$$\text{tracta radice, } \zeta C = \frac{bx + dm}{d}$$

$$\text{faciendo brevitatis causa } g : r :: e : l = \frac{er}{g}$$

$$:: b : m = \frac{br}{g}$$

Datur igitur valor ipsius ζC per x & cognitias, sed quia omnes circuli figuræ sunt inter se paralleli, communes sectiones omnium horum circularum cum eodem plino $\mu \zeta KD$, id est, rectæ ζK , sunt parallelæ; sed CD est una ex his, & est normalis ad ζu ; quare omnes ζK sunt normales ad ζu ; igitur tota res reducitur ad sequens problema.

TAB. P. Fig. I. Curvæ KD natura, positione, & axe cD , & rectæ CD magnitudine, & positione datis, exponere ζK ipsi CD parallelas, & finitas hinc curvæ inde rectæ ζC normalis ad CD , per eandem incognitam x per quam exponitur ζC .

Sint, $CD = a$, $Cc = e$, $cD = s$. Ex K ducatur KL parallela ζC , & KN axi cD ordinatim, & productæ CD occurrens in M , & $\zeta C = KL = \frac{lx + dm}{d}$, ac $DN = n$. Triangula similia cDC , MDN , MKL , dant $cD (s)$. $DC (a) :: MD. DN (n)$, & $DC (a). Cc (e) :: DN (n). NM$. Item $CD (a). Dc (s) :: LK (\frac{lx + dm}{d}) . KM$, & demum $DC (a). Cc (e) :: LK (\frac{lx + dm}{d}) . LM$; quare $\frac{su}{a} = MD$,

$$NM = \frac{cn}{a}, KM = \frac{lx + dms}{ad}, \text{ \& } ML = \frac{clx + cdm}{ad}, \text{ ergo } KN = \frac{lsx + dms + edu}{ad};$$

sed, cum detur curvæ natura, datur relatio inter KN & ND , hinc igitur eruetur valor u per x & cognitias; at $K\zeta = CL = CD + DM + ML = a + \frac{su}{a} + \frac{clx + cdm}{ad}$, ergo (pro u posito ejus valore) erit ζK expressa per x , & cognitias. Q. E. F.

Si ex. gr. curvæ KD parabola, cujus parameter = p . Erit $KN: (\frac{llsxx + 2ldmsx + 2cdlsux + 4dmsm + 2cdmnu + ccdnu}{aad}) = pu$,

$$\text{\&, ordinando, } u = \frac{aadpu - 2cdmnu - 2cdlsux - 2dmsx - llssxx - dmsm}{ccad}$$

$$\text{circa } u = \frac{aad \cdot p - 2cdmnu - 2cdlsux + 2cdad}{2ccad}$$

$$\sqrt{\frac{aad^2 pp - 4aacd^2 rps - 4aacd^2 lpsx}{4c^4 d^4}}$$

Hic valor ponatur in expressione ipsius ζK supra inventa, & fiat ejus quadratum (in quo semper erit radicalis $\sqrt{\frac{a^2 d^4 pp}{4c^4 d^4}}$ &c.) hujus quadrati valor ponatur pro zz in æquatione ad sectionem, æquatio hinc oriens liberetur a radicali & habebitur æquatio ad sectionem.

Si vero curvæ axis esset ipsa CD , patet quod cD coincideret cum CD , id est, quod $s = a$, & $e = 0$, ergo $\zeta C = a + u$ (deletis terminis ubi est e) tunc etiam ordinata $KL = \zeta C = \frac{lx + dm}{d}$.

Sit, ex. gratia, curvæ KD parabola, erit $KL^2 = \frac{llxx + 2ldmsx + ddmn}{dd} = pu$, ac $u = \frac{llxx + 2ldmsx + ddmn}{adp}$, & $\zeta C = \frac{addp + llxx + 2ldmsx + ddmn}{adp}$, cujus quadrato posito pro zz in æquatione ad solidi sectionem, habebitur æquatio quatuor dimensionum exprimens naturam curvæ sectione genitæ.

144. Si præterea in solidi formatione rectæ ζu caderet super AB axem solidi, tunc $\mu C (r) = Cr (g)$; igitur æquatio ad sectionem (No. 142. hujus), deletis terminis in quibus est b , fit $zz = \frac{ffxx}{ed} = yy$; sed ζC tunc evaderet $AC = b + \frac{ex}{d}$, quam ob rem

$$\frac{bb}{p} + 2 \frac{bex}{dp} + \frac{eexx}{dpp} = u, \text{ \& } zz = (a + u)^2 = \frac{ffxx}{ad} = aa + 2 \frac{abb}{p} + 4 \frac{abex}{dp} + 2 \frac{aexx}{dip} + \frac{1e}{pp} + 4 \frac{b^2 ex}{dpp} + 6 \frac{bbexx}{dpp} + 4 \frac{b^2 ex^2}{d^2 p} + \frac{e^2 x^2}{d^2 p} = yy, \text{ æquatio quatuor dimensionum.}$$

Tab. P.
Fig. 2.

Insuper, si parabola generans haberet eundem axem ac solidum, & ei occurreret in C, tunc AC ($b + \frac{ex}{d}$) esset abscissa, & ζκ (z) vel KA ordinata, quam ob rem KA² (zz) = $bp + \frac{epx}{d}$, & $zz - \frac{fxx}{dd} = yy = bp + \frac{epx}{d} - \frac{fjxx}{dd}$ æquatio ad ellipsim. Si sectionis axis ωQ esset axi solidi AB parallelus, tunc fingi potest axem OQ gyrasse circa posum Q versus P, donec in Q^o pervenerit: sed quia punctum Q manet, ipsius ωQ valorem pro HO posuisse in superiore æquatione præstabit. Igitur, fiat QO = u = x + d, quapropter u - d = x, & $ux - \frac{fxx}{dd} = zd + dd = xx$, & $yy = bp + \frac{epx}{d} - \frac{fjxx}{dd} = bp - ep + \frac{eu}{d} - ff + \frac{fu}{d} - \frac{fju}{dl}$, in qua æquatione noto quod $bp - ep - ff = 0$, nam si solidum secetur per axem plano PAC recto ad planum IOQ, sectio PQC esset parabola, nempe ipsa genitrix, quæ tunc locum illum occuparet, quapropter QE² ($ff = p$. CE = p(b - e): Pieret igitur æquatio superior $yy = \frac{ep + 2fu}{d} - \frac{ffju}{dd} = \frac{bpu + fju}{d} - \frac{ffju}{dd}$ (ponendo pro ep valorem bp - ff).

Si nunc axis solidi parallelus esset axi sectionis, in infinitum excreverent EH (e), & HQ (d), quibus collata QE (f) pro nihilo habenda est; igitur $yy = \frac{bpu}{d} + \frac{fju}{d} - \frac{ffju}{dd}$ vertitur in $yy = \frac{bpu}{d}$; sed & CH (b) est infinita atque ideo æquat d, est itaque $yy = pu$, & sectio est parabola eandem habens parame-trum ac genitrix, quod etiam nullo calculo sic demonstratur.

Ob naturam curvæ SCQP, est rectangulum SωP æquale rectangulo ex ωQ in p: Sed ob circumlum SliPkK, rectangulum SωP æquat quadratum ex ωk, ergo &c.

Eodem pacto res absolvi potest, quævis alia ponatur curva generans XDY. Nos ad casum ab auctore propositum gradatim propere-rantes fingimus, quod.

Tab. O.
Fig. 4.

145. Ea sit recta μDK ducta in plano μDC faciente cum plano BCD angulum datum μCσ,

& in μ occurrens plano cui recta DC est normalis; tunc ζκ (z) obtinebitur per analogiam hanc, μC (r). CD (a) :: μζ ($\frac{er + bi + lgr}{dg}$).

$$\zeta\kappa = \frac{aex + ald + adg}{dg}; \text{ quare}$$

$$zz = \frac{aaexx + 2aal dex + 2aadegx + aabdd + 2aabddg + aadgg}{d^2gg}$$

Hic autem valor posuit in æquatione Ni. 142. dat æquationem ad sectiones conicas $yy = \frac{ebhxx + aaexx - ffgxx + 2aabdx + 2aadex + 2bdehxx + aabdd + 2aabde + aadgg + bddbh}{d^2gg}$

Sectio autem esset parabola, si, facta σθ = V(aa + bh), juncta Cθ esset parallela OQ axi sectionis; tunc enim Cσ (e) θ (V(aa + bh)):: HE (e). EQ (f = $\frac{e}{g}$ V(aa + bh)), & quadrando $ff = \frac{aaee + eebb}{gg}$; aut $aaee + eebb - ffg = 0$, quocirca quadratum x abscisset ab æquatione; sed si angulus QHE major esset quam σCσ, sectio esset ellipsis; si minor, hyperbola.

146. Quod si angulus μCσ evanesceret, aut si Cσ caderet super axem AB, tunc σμ = b = 0, unde, terminis in quibus est b ex æquatione superiore deletis, $yy = \frac{aaexx - ffgxx + 2aabdx + 2aadex + aabdd + 2aabdd + aadgg}{d^2gg}$, tunc autem, ut statim apparet, solidum esset conus rectus, & hoc problema caris problematis superioris.

147. Si vero, angulo μCσ existente, Kζ = CD = a, æquatio Ni. 142. evaderet $yy = \frac{ebhxx}{d^2gg} - \frac{ffgxx}{d^2gg} + \frac{2ebhxx}{d^2gg} + \frac{b^2bh + aagg}{d^2gg}$, æquatio Auctoris, si animadvertas quod QH² (dd) = HE² + EQ² (ee + ff), quare $ff = ee - dd$.

PROB. XXXIV.

Si ad AF erigatur perpendicularum AD datae longitudinis, & norma DEF crus unum ED continuo transeat per punctum D dum alterum crus EF aequale AD dilabatur super AF ; invenire curvam HIC quam crus EF medio ejus puncto C describit.

TAB. IV.
FIG. 4.

Sit EC vel $CF = a$, perpendicularum $CB = y$, $AB = x$, & propter similitudinem triangula FBC , FEG , (e) erit $BF = \sqrt{aa - yy}$. $BC + CF = (y + a) :: EF = (2a)$. $EG + GF = (AG + GF)$ seu AF . (f) Quare $\frac{2ay + 2aa}{\sqrt{aa - yy}} (= AF = AB + BF) = x + \sqrt{aa - yy}$. Jam multiplicando per $\sqrt{aa - yy}$ fit $2ay + 2aa = aa - yy + x\sqrt{aa - yy}$, seu $2ay + aa + yy = x\sqrt{aa - yy}$, & quadrando partes divisas per $\sqrt{aa - yy}$, (g) ac ordinando prodit $y^3 + 3ayy + 3aa^2 + a^3 - ax^2 - axx = 0$.

Idem

145. Demum si in hac ultima hypothefi $\mu\sigma = b = 0$ æquatio præcedens mutabitur in $yy = \frac{fxx}{dd}$, quæ semper est ad ellipsim; sed tunc liquet ex solidi genere quod solidum est cylindrus, ergo sectio obliqua cylindri est ellipsis.

Harum omnium hypothefium tanquam generale corollarium est inventio lineæ, qua solidum supra dictis modis genitum finitur; Hæc invenitur sectio solido per axem, id est, posito quod QO axis sectionis cadat super AB axem solidi. Tunc autem EQ (f) = e , & QH (d) = HE (e), quibus substitutionibus factis, æquatio Ni. 142 fit

$$2z + \frac{bbbh + 2bbbx + hhxx}{gg} = yy,$$

Sic æquatio Ni. 144 fit

$$aa + \frac{2abb}{p} + \frac{4abx}{p} + \frac{2axx}{p} + \frac{b^4}{pp} + \frac{ab^2x + 6bb^2xx + 4bx^3 + x^4}{pp} = yy, \text{ Ni. 145.}$$

$$\text{evadit } yy = \frac{bbxx + aaxx + 2aabx + 2bbbx}{gg} + \frac{2aaxx + aabb + 2aabg + aagg + 99g^2}{gg}$$

æquatio ad hyperbolam: ea Ni. 146, mutatur in

$$yy = \frac{aaxx + 2aabb + 2aagg + aab^2}{gg} + \frac{2aabg + aagg}{gg}$$

& extracta radice, $yy = \frac{ax + ab + ag}{g}$,

æquatio ad triangulum; Ni. 147 in $yy = \frac{bbxx + 2bbbx + bbb + aagg}{gg}$, æquatio rursus ad hyperbolam; & æquatio Ni. 148. fit $yy = aa$, & $y = a$, ad parallelogrammum.

149. (e) Rectangula nempe in E , & B , & habentia angulum EFG communem.

150. (f) Nam AG æquat GE , quia scilicet triangula DAG , FEG rectangula in A , & E habent angulos ad G verticales & pares, ac latus DA æquale ipsi EF ex hyp.

(g) Siquidem $aa + 2ay + yy (= (a + y)(a + y)) = (a + y)\sqrt{aa - yy} (= x\sqrt{aa - yy})$ idem est ac $(a + y)\sqrt{aa - yy} (= x\sqrt{aa - yy})$, unde quadrando exurgit $a^4 + 3aay + 3ayy + y^4 = a^4 - yxx$, &c.

(b)

Idem aliter.

In BC cape hinc inde BI, & CK æquales CF, & age KF, HI, HC, T. AB. IV. ac DF; quarum HC ac DF occurrant ipsis AF & IK in M & N, & in Fig. 5.

HC demitte normalem IL. (b) Eritque angulus $K = \frac{1}{2} BCF = \frac{1}{2} EGF = GFD = AMH = MHI = CIL$; adeoque triangula rectangula KBF, FBN, HLI & ILC similia. Dic ergo $FC = a$, $HI = x$, & $IC = y$; & erit $BN (2a - y) BK (y) :: LC. LH :: CIg (yy.) HIg (xx.)$ adeoque $2axx - yxx = y^3$. (i) Ex qua æquatione facile colligitur hanc curvam esse cissoidem Veterum, ad circulum cujus centrum fit A ac radius AH pertinentem.

PROB.

(b) Tota sequens angulorum collatio sic explicari, & demonstrari potest. Quia triangulum CKF est isosceles per constructionem, est angulus exterior BCF duplus interioris & oppositi CKF, aut KFC: sed ob triangula similia BCF, EGF, (149. hujus), angulus BCF æquat EGF, & hic duplus est anguli interioris & oppositi GFD, aut GDF (sunt enim æqualia triangula DAG, FEG (150. hujus,) & ideo triangulum DGF est isosceles), igitur pares sunt anguli FDG, GFD, KFC, CKF. Atqui anguli BCF, CFB simul unum rectum constituunt, ergo angulus NFK est rectus & circuli centro C radio CK descriptus transfire debet per F & N puncta; est igitur NC æqualis FC, aut DH; quo circa parallelae sunt rectæ HC, DF, & angulus GFD æquat oppositum ad easdem partes AMH, & hic alternum MHI, qui æqualis est CIL, quia triangula HIC, CLI rectangula in I, & L, & habentia angulum HCI communem, similia sunt.

est absurdum, nam quantitas finita nunquam fit æqualis nihilo, curva ideo nunquam occurrit rectæ VZ.

Asi y augetur dum x crescit, nam si y minueretur x crescente, quantitas $2a - y$ semper cresceret, quia ex eadem demeretur quantitas semper minor, sed $y. 2a - y :: xx. yy$, igitur xx quantitas semper crescens ad yy quantitatem semper decrecentem haberet eandem rationem ac y quantitas semper decrecens ad $2a - y$ quantitatem semper crescentem. Id est absurdum. Itaque curva semper propius accedit rectæ VZ, quæ ideo ejus asymptotus est.

Ex æquatione superiore deducitur analogia $x.y :: \frac{yy}{x} . 2a - y$; sed $x.y :: y. \frac{yy}{x}$, sunt igitur $x, y, \frac{yy}{x}, 2a - y$ in proportione continua. At acta ordinata quavis CI; & ex C, CQ parallela ST, & circulo occurrente in O, est HQ (IC = y). QO :: QO.Qd(2a - y); ideoque est OQ media inter y & $2a - y$, & $= \frac{yy}{x}$; quod etiam sic invenitur. Jam $OQ^2 = 2ay - yy$; sed quia $y^3 = 2axx - yxx$, est, ducendo cuncta in y, & dividendo per $xx, \frac{y^4}{xx} = 2ay - yy$, quare $\frac{y^4}{xx} = OQ^2$; & $\frac{yy}{x} = OQ$. Sunt ergo dQ, QO, QH, QC in proportione continua.

T. AB. P.
Fig. 3.

(i) Examinemus hanc æquationem, & aliquas hujus curvæ proprietates investigemus. Si hæc curva occurret rectæ XY, in occursum puncto fieret $y = a$, ponamus hunc valorem in æquatione, ea fiet $a^3 = 2axx - axx$, quare $aa = xx$, & $a = \pm x$; igitur centro A, radio AH describe circulum HPdp occurrentem rectæ XY in P, p, hæc erunt puncta, in quibus occurrit rectæ curva, quæ hinc inde extenditur, sed nunquam transit rectam TS, quia tunc haberetur $-y$, & cubus $-y^3$ est $-y^3$ & $x = \frac{-y \sqrt{2a - y}}{2a + y}$, quod est absurdum.

Age per d indefinitam VZ parallelam XY, & circuli tangentem; si curva occurreret ipsi VZ tunc fieret $y = 2a$, adeoque æq atio ad curvam fieret $8a^3 = 2axx - 2axx = 0$, quod

Nunc ex puncto C, ubi recta QC occurrit curvæ, duc ad punctum H rectam HC secantem circulum in R, & rectam VZ in N. Junge HO, Od; & ex R age RK parallelam ipsi VZ.

VZ. Jam CQ est ad QH ut RK ad KH; sed CQ ad QH est ut HQ ad QO, & RK ad KH ut Kd ad KR, igitur HQ ad QO ut dK ad KR, similia sunt itaque triangula dKR, HQO; quare angulus QHO æqualis angulo KdR, & arcus Od arcui RH, ac recta HO æqualis dR, id est, dK æquat HQ, & RN æquat CH.

Quæ cum sit descriptio curvæ, quam veteres dixerunt *Cissoidem*, patet nostram curvam esse quoque *Cissoidem*.

Veteres hujus curvæ ope duas medias inter duas datas rectas inveniunt ut tradit *Pappus Collect. Math. Lib. III. Prop. V.*

Tab. IV. Fig. 5. Sed hoc problemâ potest aliquanto reddi generalius. Quia normæ DEF crux unum DE semper transire debet per punctum D, & alterum EF semper labi super rectam AF, patet quod quando punctum F cadit in A, & tota FE super totam AD, punctum E commune ambobus normæ cratribus debet cadere super D, & punctum C super H; atque ideo AF, AD, AH, FC semper debent æquari. Potest igitur hypothesis mutari, ponendo EF divisam esse in C non bifariam, sed secundum quamvis rationem. Sit, ex. gr. DA = EF = a, & CF = AH = BI = $\frac{am}{n}$, erit BC = $y - \frac{am}{n}$,

& BF = $\sqrt{\left(\frac{2amy}{n} - yy\right)}$. Verum BF

($\sqrt{2\frac{amy}{n} - yy}$). FC ($\frac{am}{n}$) :: EF (a).

FG = $\frac{aam}{n\sqrt{2\frac{amy}{n} - yy}}$, & FB ($\sqrt{2\frac{amy}{n} - yy}$).

BC ($y - \frac{am}{n}$) :: AD (a). AG = $\frac{any - aam}{n\sqrt{2\frac{amy}{n} - yy}}$,

ergo $x + \sqrt{2\frac{amy}{n} - yy} = \frac{ay}{\sqrt{2\frac{amy}{n} - yy}}$,

& $x\sqrt{2\frac{amy}{n} - yy} = ay + yy - 2\frac{amy}{n}$, & quadrando, $2\frac{amyxx}{n} - xxyy = y^4 + 2ay^3 -$

$4\frac{amy^3}{n} + ayy - 4\frac{aamy}{n} + 4\frac{aamyy}{nn}$, in qua

si ponas $\frac{m}{n} = \frac{1}{2}$, habebis $ayxx - xxyy = y^4$, aut $axx - xxy = y^3$.

151. Quin, etiam si anguli DAF, DEF essent

obliqui & inæquales, problema resolvi posset Tab. I hoc modo. Ex dato puncto D duc DM fa- Fig. 4. cientem angulum DMF æqualem dato DEF, & DN ad rectos angulos ipsi AF. Ex C age CB facientem quoque angulum CBF æqualem DEF, & CL normalem. Dic MD = a, DN = b, NM = c, EF = f, FC = g, & variables MB = x, BC = y. Triangula similia MDN, BCL dant MD (a) . DN (b) ::

BC (y) . CL = $\frac{by}{a}$, est ideo LF = $\sqrt{gg - \frac{bby}{aa}}$. Item DM (a) . MN (c) :: CB (y) .

BL = $\frac{cy}{a}$, qua propter BF = $\frac{cy}{a} + \sqrt{gg - \frac{bby}{aa}}$.

Sed triangula GFE, CFB habentia communem angulum ad F, & angulum GEF æqualem CBF, similia sunt, ut & triangula FEG;

GDM, ergo BF ($\frac{cy}{a} + \sqrt{gg - \frac{bby}{aa}}$) . FC

(g) :: EF (f) . FG = $\frac{fg}{\frac{cy}{a} + \sqrt{gg - \frac{bby}{aa}}}$, &

FB ($\frac{cy}{a} + \sqrt{gg - \frac{bby}{aa}}$) . BC (y) :: DM (a) .

MG = $\frac{ay}{\frac{cy}{a} + \sqrt{gg - \frac{bby}{aa}}}$; unde MG + GF

= $\frac{ay + fg}{\frac{cy}{a} + \sqrt{gg - \frac{bby}{aa}}} = x + \frac{cy}{a} +$

$\sqrt{gg - \frac{bby}{aa}} = MB + BF$; & sublata fra-

ctione $ay + fg = \frac{cy^2}{a} + x\sqrt{gg - \frac{bby}{aa}} +$

$\frac{ccyy}{aa} + 2\frac{cy}{a}\sqrt{gg - \frac{bby}{aa}} + gg - \frac{bby}{aa}$,

& (cunctis ductis in aa, translatis terminis commensurabilibus, & asymmetris divis per quantitates racionales, per quas multiplicati sunt) $\frac{bby - ccyy + a^2y - a^2xy + aafg - aagg}{aax + 2acy}$

= $\sqrt{gg - \frac{bby}{aa}}$ & quadrando,

$4y^4 - 2bbccy^4 + 4y^4 + 2a^2bby^3 - 2abbccy^3 -$

$4^2xx + 4a^2cxy + 4a^2ccy -$
 $2a^2cyy + 2a^2cxy + 2aabbffyy -$
 $4^2xx + 4a^2cxy + 4a^2ccy$
 $2aabbggyy - 2aacccfy$
 $4^2xx + 4a^2cxy + 4a^2ccy$

& ex genefi patet, quod tunc curva occurreret rectæ DM in Q, ita ut QM = CF. Æquatio numeri 152 hanc indueret formam

$$y^4 + 2ay^3 + \frac{2ag}{aa}yy + \frac{2ag^2}{aa} = 0$$

& (fi curva occurrit rectæ DM) $y = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{aa-4ag+4g^2}{4}} = \frac{-a \pm a - 2g}{2}$, ubi ex genefi nofcimus, quod fumere debemus $y = \frac{-a + a - 2g}{2} = -g$, ut fupra.

Et fi præterea in hypothefibus N^o. 154. effict $2g = a$, æquatio prima fieret

$$y^4 + \frac{bb}{g}y^3 + \frac{cc}{g}yy + \frac{cx}{g} = 0$$

& fecunda, $y^4 + 4gy^3 + 3g^2yy + 4g^2y + g^4 = 0$, quæ divifa per $y + g$ dat æquationem, quam *Newtonus* invenit in prima hujus problematis refolutione, memento tantum nos vocaffe g lineam quam dixit a .

TAB. P.
Fig. 5.

Si vero anguli dati DEF crus unum EF caderet fuper alterum ED, tunc negligi poffet pars CE, & recta CG femper foret magnitudine data. Æquatio hujus curvæ poffet a fuperioribus deduci, fed præftat calculum inftituare. Igitur, factò angulo CBL æquale DAN, & ductis DN, CL normalibus; fint DA = a , AN = c , ND = b , AB = x , BC = y , CG = f ; & quia AD (a). DN (b) BC (y). CL = $\frac{by}{a}$, & AD (a). AN (c) :: CB (y). BL = $\frac{cy}{a}$, erit GL =

$\sqrt{(ff - \frac{bbyy}{aa})}$, & GB = $\sqrt{(ff - \frac{bbyy}{aa})} - \frac{cy}{a}$, ac NG = $x - c + \frac{cy}{a} - \sqrt{(ff - \frac{bbyy}{aa})}$; fed DN (b).

NG ($x - c + \frac{cy}{a} - \sqrt{(ff - \frac{bbyy}{aa})}$) :: CL ($\frac{by}{a}$). LG ($\sqrt{(ff - \frac{bbyy}{aa})}$), igitur $\frac{xy - cy}{a} +$

$\frac{ony}{aa} - \frac{y}{a} \sqrt{(ff - \frac{bbyy}{aa})} = \sqrt{(ff - \frac{bbyy}{aa})}$ & (cunctis ductis in aa , afymmetrisque in unam par-

tem conjectis) $axy - acy + cyy = (aa + ay) \sqrt{(ff - \frac{bbyy}{aa})} = (\frac{aa + ay}{a}) \sqrt{(aaff - bbyy)} =$

$(a + y) \sqrt{(aaff - bbyy)}$; igitur quadrando $aaxxyy - 2aacxyy + 2acxy^2 + aacccy - 2accy^2 + ccy^4 = a^4f - aabyy + 2a^2ffy - 2abby^2 + aaffyy - bby^4$, & (conjungendo terminos omnes ad eandem partem, ac dividendo per $bb + cc$, vel per æqualem aa)

$$y^4 + 2\frac{cx}{a}y^3 + \frac{cc}{aa}y^2 + \frac{bb}{aa}y + 2\frac{bb}{a} = 0$$

Si curva hæc alicubi occurreret rectæ AB, aliquantulum diftare a recta AB; fed quo magis ea recedit a normali DN, eo acutior fit angulus DGN, vel par CGL, adeoque normalis CL femper decrefcit, vel curva accedit ad rectam, quam tamen nunquam attingit, quæ duæ funt proprietates charaferifticæ afymptotorum.

Ubi

PROB. XXXV.

Si datae longitudinis recta ED angulum datum EAD subtendens ita moveatur ut termini ejus D & E anguli istius latera AD & AE perpetim contingant; proponatur curvam FCG determinare quam punctum quodvis C in recta ista ED datum describit. TAB. IV. Fig. 6.

A dato puncto C age CB parallelam EA; & dic AB = x, BC = y, CE = a & CD = b, & propter similia triangula DCB, DEA, erit EC. AB :: CD. BD; hoc est a . x :: b . BD = $\frac{bx}{a}$. Præterea demisso perpendiculari CH, propter datum angulum DAE vel DBC, adeoque datam rationem laterum trianguli rectanguli BCH, sit a . e . . :: BC . BH, & erit BH = $\frac{ey}{a}$. Aufer hanc de BD & restabit HD = $\frac{bx - ey}{a}$. Jam in trian-

gu- Ubi DC cadit in VD, est VN par GC, ut patet ex genesi. Et hæc quidem si una ex coordinatis ponatur parallela ipsi BC; sed melius fiet NL = x, LC = y, quo casu punctum A, unde incipiunt omnes x, cadit in N, e = 0, a = b, quibus substitutus in æquatione, ea convertitur in hanc simpliciorum Dg æqualis NV, & rursus D ad curvam. Quamdiu vero rectæ extremitas altera versabitur inter N & g, puta in y, erit yD minor quam Dg; quare altera hujus rectæ extremitas describit arcum DxV. Quum autem ea transgressa fuerit g, erit GD major quam gD, & punctum datum describet curvæ arcum DC. Eadem dicenda sunt cum recta ex N trahitur versus M.

$$y^4 + 2ay^3 + \frac{ax}{-ff} yy - 2affy - aaff = 0$$

TAB. P. Fig. 5. Si data GC sumpta fuisset infra rectam AB, y fieret negativa quantitas, & æquatio ad hanc curvam deduceretur ex superiore mutatis signis terminorum in quibus index ipsius y est impar; unde fieret

$$y^4 - 2ay^3 + \frac{ax}{-ff} yy + 2affy - aaff = 0$$

Hic revoca quæ supra notavimus, quibus adde, quod cum GC est minor, aut æqualis DN, curva CV semel occurrit rectæ DN inter D & N si GC est minor quam DN; in ipso puncto D si æqualis: sed cum CG, aut ei par NV, major est quam ND, curva occurret rectæ ND in duobus punctis V, & D.

TAB. Q. Fig. 1. Nam sige rectam, quæ semper transiens per D describit curvam, esse NV: jam erit V punctum ad curvam. Centro D radio NV describe arcum secantem rectam NG in g, erit

Hæ curvæ dicuntur *Conchoides Nicomedea a Nicomede inventore*, & punctum D vocatur *polus*, recta NG *Regula* vel *directrix*, & NV *intervallum*.

Hinc facile dato angulo C&L, & extra eum puncto D, agitur per D recta quæ ita fecerit anguli crura, ut interjecta pars CG æquet rectam datam. TAB. P. Fig. 5.

Nam ex D in alterum anguli dati crus Lb (productum quatenus opus est) demitte normalem DN, ex qua producta absconde NV datæ parem; ex polo D, regula NL, intervallo NV describe conchoidem. Et quia recta BC, quo magis producitur, eo magis recedit a NL cui semper conchoidis accedit, patet quod aliquando recta, & curva sibi occurrent. Occurrant in C, age CD, & erit CG cruribus anguli comprehensa æqualis datæ, ut liquet.

Hæc curva Nicomedes duas invenit medias continue proportionales inter duas datas, & angulum tripartitum divisit. Hujus usum videbimus in *appendice* de æquationum constructione lineari.

gulo BCH, propter angulum rectum BHC, est $BCq - BHq = CHq$, hoc est $yy - \frac{ceyy}{aa} = CHq$. Similiter in triangulo CDH propter angulum

CHD rectum, est $CDq - CHq = HDq$, hoc est $bb - yy + \frac{ceyy}{aa}$

($= HDq = \frac{bx - ey}{a}$ quadrato) $= \frac{bbxx - 2bexy + ceyy}{aa}$. Et per reductio-

nem $yy = \frac{2be}{aa} xy + \frac{aabb - bbxx}{aa}$, Ubi cum incognitæ quantitates sint

duarum tantum dimensionum, paret curvam esse conicam sectionem. Præ-
terea extracta radice, fit $y = \frac{bex \pm \sqrt{ceex - aaxx + a^4}}{aa}$. Ubi in termi-

no radicali coefficientis ipsius xx est $ce - aa$. Atqui erat $a.e :: BC.HB$; & BC necessario major est linea quam BH, nempe hypothenusa trianguli rectanguli major latere; ergo a major quam e , & $ce - aa$ negativa est quantitas, atque adeo curva erit ellipsis. (k)

PROB.

TAB. Q.
Fig. 2.

(k) Hujus ellipseos diametri sic inveniri possunt, sume $AL = \frac{aa}{b}$, per L age LM parallelam AE, & æqualem e . Duc indefinitam

AM. Jam pone $\frac{b}{aa} \sqrt{ceex - aaxx + a^4} = 0$,

erit $x = \pm \frac{aa}{\sqrt{aa - ce}}$. Sit $AQ = a$; Ex Q

age in AD normalem QN: erit $AN = \sqrt{aa - ce}$. Quare tertiam post AN & AQ, quæ sit AO.

$= Ao$. Age OV, ou parallelas AE. Diameter vero secunda invenitur ponendo $x = 0$, nam

A est centrum, ut apparet, tunc autem habetur $y = \pm b = AP = Ap$. Nam hoc centro, hisque diametris conjugatis describe ellipsim VPup; & ex quovis puncto C duc ordinatam CR occurrentem AD in B. Jam, quia

$AL (\frac{aa}{b})$. LM (a) :: AB (x). BR $= \frac{bex}{aa}$, erit

CR $= y - \frac{bex}{aa}$. Dic AM $= f$: & quia LA

($\frac{aa}{b}$). AM (f) :: BA (x). AR :: AO ($\sqrt{aa - ce}$).

AV; erunt, AR $= \frac{bfx}{aa}$, & AV $= \frac{bf}{\sqrt{aa - ce}}$

$= Am$; igitur VR $= \frac{bf}{\sqrt{aa - ce}} - \frac{bfx}{aa}$, & RV

$= \frac{bf}{\sqrt{aa - ce}} + \frac{bfx}{aa}$; quare RV rectangulum $= \frac{bbff}{aa - ce} - \frac{bbffxx}{a^4}$; sed RV. RC ::

AV. AP², ergo $\frac{bbff}{aa - ce} - \frac{bbffxx}{a^4} . yy -$

$\frac{2bexy}{aa} + \frac{bbexx}{a^4} :: \frac{bbff}{aa - ce} . bb$, & invicem

ducendo extremas, & dividendo per mediarum alteram $yy - 2 \frac{bexy}{aa} + \frac{bbexx}{a^4} = bb -$

$\frac{aabbxx + bbexx}{a^4}$, id est, $yy = 2 \frac{be}{aa} xy +$

$\frac{aabb - bbxx}{aa}$, æquatio construenda.

Si angulus EAD effect rectus, BH $= \frac{ey}{a} = c$,

adeoque æquatio fieret $yy = bb - \frac{bbxx}{aa}$,

& $y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{aa - xx}$. Si $\sqrt{aa - xx} = 0$,

esset $x = \pm a$, quæ foret una ex semi-diametris, & (ponendo $x = 0$) $y = \pm b$, quæ esset altera.

PROB. XXXVI.

Si norma EBD ita moveatur ut ejus crus unum EB continuo subtendat angulum rectum EAB, dum terminus alterius cruris BD describat curvam aliquam lineam FDG; invenire lineam istam FDG quam punctum D describit.

TAB. IV.
Fig. 7.

A puncto D ad latus AC demitte perpendicularum DC; & distis AC = x, & DC = y, atque EB = a & BD = b; in triangulo BDC propter angulum rectum ad C, est BCq = BDq — DCq = bb — yy. Ergo BC = √(bb — yy) & AB = x — √(bb — yy). Præterea propter similia triangula BEA, DBC, est BD.DC :: EB.AB. hoc est b.y :: a.x — √(bb — yy). Quare bx — b√(bb — yy) = ay, five bx — ay = b√(bb — yy). Et partibus quadratis ac debite reductis yy = $\frac{2abxy + b^2 - bbxx}{aa + bb}$. Et extracta radice y = $\frac{abx + bb\sqrt{aa + bb - xx}}{aa + bb}$.

Unde patet iterum curvam esse ellipsim. (1)

Hæc ita se habent ubi anguli EBD & EAB recti sunt. Sed si anguli isti sunt alterius cujusvis magnitudinis, dummodo sint æquales, sic pro-

TAB. Q.
Fig. 2.

(1) Cape AL = $a + \frac{bb}{a}$. Per L age LM parallelam AP, & æqualem b. Duc indefinitam AM. Nunc ponendo, $\frac{bb}{aa + bb} \sqrt{aa + bb - xx} = 0$; est x = $\frac{bb}{a} \sqrt{aa + bb}$ = AO = Ao; per O, & o duc OV, ou parallelas AP. Erit uV altera diametrorum. Quia A est centrum, pone x = 0; unde y = $\frac{bb}{aa + bb}$ $\sqrt{aa + bb} = \frac{bb}{\sqrt{aa + bb}}$, cui pares absceinde AP, Ap: erit Pp diameter conjugata.

Nam AL ($a + \frac{bb}{a}$). LM (b) :: AB (x). BR ::

AO (√(aa + bb)). OV; quare BR = $\frac{abx}{aa + bb}$,

& OV = $\frac{a\sqrt{aa + bb}}{aa + bb} = \frac{ab}{\sqrt{aa + bb}}$. Dic

AM = f: quia AL ($a + \frac{bb}{a}$). AM (f) :: AB (x). AR :: AO (√(aa + bb)). AV, est AR

= $\frac{afx}{aa + bb}$, & AV = $\frac{a\sqrt{aa + bb}}{aa + bb}$

= $\frac{af}{\sqrt{aa + bb}} = Au$; ergo uR = $\frac{af}{\sqrt{aa + bb}}$

+ $\frac{afx}{aa + bb}$, RV = $\frac{af}{\sqrt{aa - bb}} - \frac{afx}{aa + bb}$;

& rectangulum VRu = $\frac{aaff}{aa + bb} - \frac{aaffxx}{(aa + uu)^2}$,

RC = y — $\frac{abx}{aa + bb}$, & RC² = yy —

$2 \frac{abxy}{a + bb} + \frac{aabbxx}{(aa + bb)^2}$; fed uRV . RC² ::

AV² . AP², aut $\frac{aaff}{aa + bb} - \frac{aaffxx}{(aa + bb)^2}$ ad

yy — $2 \frac{abxy}{(aa + bb)} + \frac{aabbxx}{(aa + bb)^2}$ ut $\frac{aaff}{aa + bb}$

ad $\frac{aabbxx}{(aa + bb)^2}$; quare yy — $2 \frac{abxy}{aa + bb}$

+ $\frac{aabbxx}{(aa + bb)^2} = \frac{l4}{aa + bb} - \frac{abxy}{(aa + bb)^2}$,

vel $\frac{aa + bb}{aa + bb} = yy - 2 \frac{abxy}{aa + bb}$

+ $\frac{aabbxx + l4xx}{(aa + uu)^2} = yy - \frac{2abxy + bbxx}{aa + bb}$,

æquatio proposita.

TAB. IV.
Fig. 8. cedendum erit. Demittatur DC perpendicularis ad AC ut ante, & agatur DH constituens angulum DHA æqualem angulo HAE, puta obtusum, dictisque $EB = a$, $BD = b$, $AH = x$, & $HD = y$, propter similia trian- gula EAB, BHD, erit $BD \cdot DH :: EB \cdot AB$. hoc est $b \cdot y :: a \cdot AB = \frac{ay}{b}$.

Aufer hanc de AH, & restabit $BH = x - \frac{ay}{b}$. Præterea in triangulo DHC propter omnes angulos datos, adeoque datam rationem laterum, as- sume DH ad HC in ratione quavis data puta b ad e , & cum DH sit y , erit $HC = \frac{ey}{b}$, & $BH \cdot HC = \frac{exy}{b} - \frac{acyy}{bb}$. Denique per 12. II. Elem. in triangulo BHD est $BD^2 = BH^2 + DH^2 + 2BH \cdot HC$, hoc est $bb = xx - \frac{2axy}{b} + \frac{aayy}{bb} + yy + \frac{2exy}{b} - \frac{2acyy}{bb}$. Et extracta radice $x = \frac{ay - ey \pm \sqrt{eeyy - bbyy + bbbb}}{b}$. Ubi cum b sit major e , hoc est $ee - bb$ negativa quantitas, patet iterum curvam esse ellipsim (m)

PROB. XXXVII.

TAB. IV.
Fig. 9.

In dato angulo PAB actis utcumque rectis BD; PD in data ratione hac semper lege, ut BD sit parallela AP, & PD terminetur ad punctum P in recta AP datum; invenire locum puncti D.

Age CD parallelam AB & DE perpendicularem AP; ac dic $AP = a$, $CP = x$, & $CD = y$, sitque BD ad PD in ratione d ad e , & erit AC

TAB. Q.
Fig. 3.

(m) Fac angulum LAP æqualem angulo EAp. Posito quod a sit minor quam e , cape $AL = b$. Duc LM parallelam AH, & æqualem $a - e$, quæ cadet versus p, ob $a - e$ negativam, age indefinitam MA. Sit nunc $\sqrt{\frac{eeyy - bbyy + 14}{b}} = 0$: erit $y = \pm \frac{bb}{\sqrt{bb - ee}}$ $= AO = Ao$. Duc OV, ov parallelas AH: erit Vv una ex diametris, pone nunc $y = 0$, quia A est centrum, & invenies $x = \pm b = AP = Ap$. Circa has diametros describe ellipsim, & erit quaesita.

Nam ex quolibet ellipseo puncto D age DH ipsi AL parallelam, & DF parallelam PA. Erit $HD = AR = y$, & $AH = RD = x$: quia AL (b). LM ($e - a$) :: AR (y). RF = $\frac{ey - ay}{b}$, erit $FD = x + \frac{ey - ay}{b}$, & $FD^2 = xx + \frac{2exy - 2axy}{b} + \frac{eeyy - 2aeyy + aayy}{bb}$ Dic $AM = f$: quia AL (b). AR (y) :: AM (f).

$AF :: AO \left(\frac{bb}{\sqrt{bb - ee}} \right) \cdot AV$, erit $AF = \frac{fy}{b}$, & $AV = \frac{bf}{\sqrt{bb - ee}} = Av$; quapropter $vF = \frac{bf}{\sqrt{bb - ee}} + \frac{fy}{b}$, & $FV = \frac{bf}{\sqrt{bb - ee}} - \frac{fy}{b}$, ac rectangulum $vFV = \frac{bbff}{bb - ee} - \frac{ffy}{bb}$. At $vFV \cdot FD^2 :: AV^2 \cdot AP^2$, vel $\frac{bbff}{bb - ee} - \frac{ffy}{bb} \cdot xx + \frac{2exy - 2axy}{b} + \frac{eeyy - 2aeyy + aayy}{bb} :: \frac{bbff}{bb - ee} \cdot bb$, vel $xx + \frac{2exy - 2axy}{b} + \frac{eeyy - 2aeyy + aayy}{bb} = bb - y^2 + \frac{eeyy}{bb}$, quæ (deletis delendis) est æ- quatio superior.

AC vel BD = $a - x$, & PD = $\frac{ea - ex}{d}$. Sit insuper, propter datum
 angulum DCE, ratio CD ad CE, d ad f , & erit CE = $\frac{fy}{d}$, & EP =
 $x - \frac{fy}{d}$. Atqui, propter angulos ad E rectos, est CDq — CEq (= EDq)
 = PDq — EPq, hoc est $yy - \frac{ffy}{dd} = \frac{eaa - 2eex + eexx}{dd} - xx$
 + $\frac{2fxy}{d} - \frac{ffy}{dd}$. Ac deletis utrobique $\frac{ffy}{dd}$, terminisque rite disposi-
 tis, $yy = \frac{2fxy}{d} + \frac{eaa - 2eex + eexx - ddx}{dd}$. Et extracta radice
 $y = \frac{fx}{d} + \frac{V(eaaa - 2eex + eexx - ddx)}{d}$. Ubi cum x & y in æquatione pe-

ultima non nisi ad duas dimensiones ascendant, locus puncti D erit co-
 nica sectio, eaque hyperbola, parabola, vel ellipsis, prout $ee - dd + ff$,
 (coefficientis ipsius xx in æquatione posteriore,) sit majus, æquale, vel mi-
 nus nihilo. (n)

PROB.

TAB. Q.
Fig. 4-5.6.

(n) Quia d est quantitas arbitraria pone eam æqualem a , erit ideo

$$y = \frac{fx}{a} \pm \frac{V(aace - 2aeex + eexx + ffx - aaxx)}{a}$$

Fac AF = f , & age indefinitam PF. Est igitur AP ad AF ut CD ad CE: sed anguli PAF, DCE sunt æquales, ergo triangulum PAF simile est triangulo DCE, & angulus F æqualis recto E.

TAB. Q.
Fig. 7.

Nunc super as ipsi AP parem, fac angulum $\beta\gamma\delta$ æqualem angulo PAF, & descripto super diametrum as semicirculo rectæ $\alpha\gamma$ occurrente in γ , perficiatur triangulum rectangulum $\alpha\gamma\delta$: erit, ut patet, hoc triangulum æquale & simile triangulo AFP (figg. 4. 5. 6) & $\alpha\gamma$ æqualis AF. Aut igitur as ad $\beta\gamma$ eandem habet rationem, ac a ad e , aut minorem, aut majorem.

Si primum, erit $\beta\gamma = PF = e$, & $as = be + ff$, quo circa $y = \frac{fx \pm V(aace - 2aeex)}{a}$, æquatio ad parabolam. Pone $\frac{V(aace - 2aeex)}{a} = 0$,

& inuenies $x = \frac{a}{2} = PO$. Duc OV paral-

TAB. O.
Fig. 4.

lelam AF: erit V vertex curvæ, VP = $\frac{e}{2}$,

& VH axis. In $\frac{V(aace - 2aeex)}{a}$ fac $x = 0$; cadet ordinata in P, & æquabit e , est igitur P focus, & PQ semiparameter.

Si secundum; erit $\beta\gamma$ major quam e . Finge $\epsilon = \gamma\delta$, cadet punctum δ inter α & β , quo circa as majus erit quam $ff + ee$, & æquatio superior ad ellipsum spectabit. Pone

TAB. Q.
Fig. 7.

$$\frac{V(aace - 2aeex + eexx + ffx - aaxx)}{a} = 0, \&$$

$$\text{erit } xx = \frac{-2aeex + aace}{aa - ff - ee}, \text{ vel}$$

$$x = \frac{-ae \pm V(a^2ee - aaeff)}{aa - ff - ee}$$

$$= \frac{-ae \pm ae V(aa - ff)}{aa - ff - ee}$$

Sume Pk = $\frac{ae}{aa - ff - ee}$, & hinc inde kO =

TAB. Q.
Fig. 5.

PROB. XXXVIII.

Rectis duabus VE & VC positione datis, & ab alia recta PE circa polum positione datum P vertente, sectis utcumque in C & E; si recta intercepta CE dividatur in partes CD, DE rationem datam habentes, proponatur invenire locum puncti D.

TAB. V.
Fig. 1.

Age VP, eique parallelas DA, EB occurrentes VC in A & B. Dic VP = a, VA = x, & AD = y, & cum detur ratio CD ad DE, vel converse ratio CD ad CE, hoc est ratio DA ad EB, sit ista ratio d ad e, & erit EB = $\frac{ey}{d}$. Præterea, cum detur angulus EVB, adeoque ratio

EB ad VB, sit ista ratio e ad f, & erit VB = $\frac{fy}{d}$. Denique propter similia triangula CEB, CDA, CPV, est EB . CB :: DA . CA :: VP . VC, & componendo EB + VP . CB + VC :: DA + VP . CA + VC. Hoc est

ko = $\frac{aeVaa-ff}{aa-ff-ee}$. Age kK, OV, ov parallelas AF: erunt puncta K centrum, V & v vertices. Rursus in radicali pone x = o, & ordinata transiens per P = e.

Jam quia AP (a) . PF (V(aa-ff)) :: Pk $\frac{aee}{aa-ff-ee}$. PK = $\frac{eeV(aa-ff)}{aa-ff-ee}$: KV = $\frac{aae-ff}{aa-ff-ee}$, erit VP = $\frac{aae-ef-eeV(aa-ff)}{aa-ff-ee}$, & Pv = $\frac{aae-ef+eeV(aa-ff)}{aa-ff-ee}$, ac VP . Pv = $\frac{a^2ee-2aaeff-aae^2+eef^2+4ff}{(aa-ff-ee)^2}$ = $\frac{aaee-eeff}{aa-ff-ee}$; sed VP . Pv . PQ² :: 2KV . π; igitur π = 2e, atque adeo est P focus, & PQ semiparameter.

TAB. Q.
Fig. 7.

Si tertium, erit βγ minor quam e; sit γλ = e: cadet punctum λ extra aβ; quare aa minor erit ff + ee, & superior æquatio ad hyperbolam pertinebit. Pone

$$V(aace-2aex+eex+ffx-axx) = 0,$$

$$\text{erit } xx = \frac{2aex - aace}{ee + ff - aa}, \text{ \& } x =$$

$$\frac{aee + V(a^2ee - aaceff)}{ee + ff - aa} =$$

$$\frac{aee + aeV(aa-ff)}{ee + ff - aa}.$$

Cape Pk = $\frac{aee}{ee + ff - aa}$, & hinc inde TAB. Q. Fig. 6.

ko = ko = $\frac{aeV(aa-ff)}{ee + ff - aa}$, & age kK, OV, ov, parallelas AF, erunt, K centrum, V, v vertices. In radicali finge x = o, & ordinata in P = e, & superioribus vestigiis infiltens invenies π = 2e.

Nota quod in secunda hypothesi V(aa-ff) = γλ est major quam e = γδ; itaque $\frac{aeV(aa-ff)}{aa-ff-ee}$ superat $\frac{aee}{aa-ff-ee}$, vel KV major est quam KP; sed in hac tertia est V(aa-ff) = γλ minor quam γλ = e, quo circa $\frac{aeV(aa-ff)}{ee + ff - aa}$ superatur ab $\frac{aee}{ee + ff - aa}$, vel KV minor est quam KP. Quod optime convenit cum curvarum natura.

$\frac{ey}{d} + a \cdot \frac{fy}{d} :: y + a \cdot x$. Ductisque extremis & mediis in se, $eyx + dax = fyy + fay$. Ubi cum indefinitæ quantitates x & y non nisi ad duas dimensiones ascendant, sequitur curvam VD, in qua punctum D perpetim reperitur, esse conicam sectionem, eamque hyperbolam; quia una ex indefinitis quantitatibus, nempe x , est unius tantum dimensionis, & in termino exy multiplicatur per alteram indefinitam quantitatem y (θ).

PROB.

TAB. Q. (d) Cum d sit arbitrariæ magnitudinis, pone eam $= VP = a$; & quia DC. CE :: $a \cdot e$, & DC minor ponitur quam CE, erit a minor quam e ; sit VF $= e$. Duc FG parallelam VE. Erit VG $= f$, quia EB. BV :: FV. VG :: $e \cdot f$. Æquatio autem fiet $exy + aax = fyy + afy$, aut, dividendo per $ey + aa$, $x = \frac{fyy + afy}{ey + aa}$

si eam negative sumas, est enim $\frac{aaf - aef}{ee}$ quantitas negativa, ob a minorem quam e . Describere igitur inter asymptotos QMR hyperbolam transeuntem per V. Dico eam esse locum æquationis propositæ.

(divisione reipsa facta)

$$\frac{efy + aef - aaf}{ee} + \frac{a^2f - a^1ef}{e^1y + a^2ee}$$

Dic

$$u = \frac{efy + aef - aaf}{ee}$$

&

$$\frac{a^2f - a^1ef}{e^1y + a^2ee} = z. \text{ Sit } u = 0; \text{ erit } -y = \frac{ae - aa}{e}; \text{ quare igitur quartam post FV,}$$

VP, PF; ea erit $= y$. Hæc sit VH. Jam pone $y = 0$, fiet $u = \frac{aef - aaf}{ee}$; fac igitur FV

(e). VG (f) :: HV ($\frac{ae - aa}{e}$). VK $= \frac{aef - aaf}{ee}$, & per K, H age indefinitam MQ, ea erit una ex asymptotis.

Nunc, quia diximus $z = \frac{a^2f - a^1ef}{e^1y + a^2ee}$, erit $e^1y + a^2ee = \frac{a^2f - a^1ef}{z}$; pone z infinitam, erit $-y = \frac{aa}{e} = VL$: per L duc LM parallelam VB & occurrentem QM in M; hæc erit altera asymptotus, & M centrum. Pone $y = 0$, & restat $z = \frac{aaf - aef}{ee}$ æqualis VK

Duc enim quamlibet NA parallelam VF, & occurrentem curvæ in D, asymptoto in T, & rectæ VB in A; & per D age DQ parallelam asymptoto MR: dic AV $= x$, AD $= y$, FG $= m$. Jam GV (f). VF (e) :: AV (x). AN $= \frac{ex}{f}$:: QD. DT; sed TD ($=$

$$AD + TN - AN) = y + \frac{ae - aa}{e} - \frac{ex}{f},$$

ergo QD $= \frac{fy}{e} + \frac{aef - aaf}{ee} - x$. Item

$$VG (f). GF (m) :: AV (x). VN = \frac{mx}{f} =$$

$$TH :: DQ \left(\frac{fy}{e} + \frac{aef - aaf}{ee} - x \right). QT =$$

$$\frac{my}{e} + \frac{aem - aam}{ee} - \frac{mx}{f} :: VK \left(\frac{aef - aaf}{ee} \right).$$

$$KH = \frac{aem - aam}{ee}. \text{ Rursus HL} = LV -$$

$$VH = \frac{2aa - ae}{e}, \text{ \& VF (e). FG (m) :: LH}$$

$$\left(\frac{2aa - ae}{e} \right) \cdot HM = \frac{2aam - aam}{ee}; \text{ est igitur}$$

$$MQ = MH + HT + TQ = \frac{aam}{ee} + \frac{my}{e}, \text{ \&}$$

$$MK = MH + HK = \frac{aam}{ee}; \text{ sed MQ} \cdot QD =$$

MK. KV, ergo (restitutis symbolis, deletis delendis, cunctisque divis per m , & multiplicatis per ee) $fyy + afy = exy + aax$, quæ est æquatio nostra, & quæ donat æquationem Auctoris, reposita d pro a in aax .

Quod si a major esse: quam e , id est, si omnes

PROB. XXXIX.

Si rectæ AC, BC a duobus positione datis punctis A & B in data quavis ratione ad tertium quodvis punctum C ducantur; invenire locum puncti concursus C.

TAB. V.
Fig. 2.

Junge AB; & ad hanc demitte normalem CD: dictisque $AB = a$, $AD = x$, $DC = y$: Erit $AC = \sqrt{xx + yy}$. $BD = a - x$ & $BC (= \sqrt{BD^2 + DC^2}) = \sqrt{xx - 2ax + aa + yy}$. Jam cum detur ratio AC ad BC, sit ista d ad e ; & extremis & mediis in se ductis, erit $e\sqrt{xx + yy} = d\sqrt{xx - 2ax + aa + yy}$. Et per reductionem $\sqrt{\frac{ddaa - 2ddax}{ee - dd} - xx} = y$. Ubi cum xx sit negativum, & sola unitate affectum, atque etiam angulus ADC rectus, patet curvam in qua punctum C locatur, esse circulum. Nempe in recta AB cape puncta E & F ita ut sint $d.e :: AE.BE :: AF.BF$, & erit EF circuli hujus diameter. (p)

Et

TAB. R.
Fig. 1.

rectæ PE producendæ essent in D' ut PE ad PD haberet datam rationem, tunc $\frac{ae - aa}{e}$

esset quantitas negativa; at $\frac{ae - aa}{e} = -y$,

ergo, transferendo terminos omnes, $y = \frac{aa - ae}{e}$,

igitur VH capi deberet in PV producta. Sed invenieramus $u = \frac{ae - aa}{e}$ quæ est quanti-

tas negativa, sumere ergo debemus VK versus S, & per K, H agere indefinitam MQ; cetera vero ut supra: observa solum quod in prima hypothefi VL minor est quam VP, quia est e major ad a (VP) minorem ut a ad VL; nunc autem est VL major quam VP, quia e minor est quam a . Debet autem hæc hyperbola contineri angulo SVN, & ei ad verticem, & superior angulo NVA, & ei ad verticem, ut positio asymptotorum & puncti in hyperbola satis ostendunt.

Si vero in æquatione ad curvam ponamus $x = 0$, sit $y = -a$, at in priori hypothefi non potest hyperbola ingredi angulum SVN, nec ei ad verticem; igitur hyperbola opposita transit per P. Sed in secunda hypothefi per P transit ipsa hyperbola quam descripsimus.

Si $a = e$, patet locum esse rectam VE; quod etiam ex æquatione deducitur; tunc enim est

$$x = \frac{fy + afy}{ay + aa} = \frac{fy(y+a)}{a(y+a)} = \frac{fy}{a}$$

Ceterum etiam sic solvi potuisset problema. TAB. R. Reliquis positis, ut in Auctore, a puncto D Fig. 2

agatur ipsi BU parallela DA rectæ UE occurrens in A; & a puncto P eidem BU parallela ducatur PF rectæ EU productæ occurrens in F. Dicator $FP = a$; $PU = b$; $UA = y$; $AD = x$; & sit CD ad DE ut FP (a) ad PG (d), & sit $FG = a + d = e$.

Est CD ad DE (ut a ad d), ut UA (y) ad AE $= \frac{dy}{a}$. Quare EU $= \frac{ay + dy}{a} = \frac{ey}{a}$,

atque FE $= \frac{ab + cy}{a}$. Sed PF (a) ad FE

$(\frac{ab + cy}{a})$, ut DA (x) ad AE $(\frac{dy}{a})$: ergo factum

est ex extremis $dy = \frac{abx + cxy}{a}$, quod

est factum ex mediis; & rursus habetur æquatio ad hyperbolam facile construenda.

(p) Ponamus d , quantitatem arbitriam, æqualem a , & primo sit e major quam a .

Fac $y = 0 = \sqrt{\frac{a^4 - 2a^2x}{ee - aa} - xx}$, erit

$$xx = \frac{-2a^2x + a^4}{ee - aa}, \text{ ac } x = \frac{-a^4}{ee - aa} \pm$$

$$\sqrt{\left(\frac{a^6}{(ee - aa)^2} + \frac{a^4}{ee - aa}\right)} = \frac{-a^4 \pm \sqrt{a^4 ee}}{ee - aa}$$

=

Et hinc e converso patet hoc theorema, quod in circuli cujusvis diametro EF infinite producta datis utcumque duobus punctis A & B hac lege ut sit AE.AF::BE.BF, & a punctis hisce actis duabus rectis AC, BC concurrentibus ad circulum in puncto quovis C; erit AC ad BC in data ratione AE ad BE. (q)

PROB.

TAB. R.
Fig. 3.

$\frac{-a^3 \pm aae}{e^2 - aa} = (\text{si utaris } \frac{-a^3 + aae}{e^2 - aa}) \frac{aa}{e + a}$;
aut (si præferas $\frac{-a^3 - aae}{e^2 - aa}$) $\frac{-aa}{e - a}$. Sed
 $e + a . a :: a . \frac{aa}{e + a}$, & est $e + a$ major
quam a , igitur etiam a major quam $\frac{aa}{e + a} = AE$.
Abscinde nunc AF $= \frac{aa}{e - a}$ & diametro EF
describere circulum.

Patet quod in hac hypothesi, punctum A
est inter E & F; est autem BE = BA - AE =
 $a - \frac{aa}{e + a} = \frac{ae}{e + a}$, & BF = BA + AF =
 $a + \frac{aa}{e - a} = \frac{ae}{e - a}$, & AE $(\frac{aa}{e + a})$. EB
 $(\frac{ae}{e + a}) :: a . e$ (multiplicando terminos hos
per $e + a$, & dividendo per a) :: AF $(\frac{aa}{e - a})$
, FB $(\frac{ae}{e - a})$, multiplicando per $e - a$, & di-
videndo per a , quod analogiam non turbat.

TAB. R.
Fig. 4.

Si vero sit e minor quam a , erit $ee - aa$
quantitas negativa, ut $-a^3 + aae$, igitur
 $\frac{-a^3 + aae}{e^2 - aa}$ reflabit positiva $= \frac{aa}{e + a}$, ut
antea, (dividendo scilicet per $e - a$). Ea sit AE.
Item quantitas positiva fiet $\frac{-a^3 - aae}{e^2 - aa} = \frac{aa}{a - e}$
(divisa nempe per negativam $-a - e$); sed
 $a - e . a :: a . \frac{aa}{a - e}$, & est $a - e$ minor quam
 a , ergo a etiam minor quam $\frac{aa}{a - e}$, huic pa-
rem abscinde AF, & punctum F cadet inter
A & B: rursus diametro EF describere circulum.
Dico hunc esse locum æquationis inventæ.

Inspecte quamlibet ACB, & ex C demitte
CD ad rectos angulos super AB. Erit AD =
 x in prima hypothesi, id est $+x$ ubi D

cadit inter puncta A & B, & $-x$ ubi cadit
inter A & F, aut in secunda hypothesi semper
AD = $+x$, DC = y in utraque hypothesi,

Item in prima hypothesi, DF æqualis FB—TAB. R.
BA + AD, cum D est inter A & B, aut Fig. 3.
FB—BA—AD, cum D est inter A & F,
semper $= \frac{ae}{e - a} - a + x = \frac{aa}{e - a} + x$,
& ED æqualis EA—AD, aut EA + AD,
semper $= \frac{aa}{e + a} - x$. Sed ex proprietate
circuli, rectangulum FDE æquat quadratum
ex CD, ergo $\frac{a^4}{ee - aa} + \frac{a^2 x}{e + a} = \frac{a^2 x}{e - a}$
 $- xx = yy = \frac{a^4 - 2a^2 x}{e^2 - aa} - xx$.

At in secunda hypothesi, DF æqualis AD + TAB. R.
FB—BA = $x - \frac{ae}{a - e} - a = x - \frac{aa}{a - e}$, Fig. 4.

& ED = EA—AD = $\frac{aa}{a + e} - x$; unde,
& ex natura circuli $-\frac{a^4}{aa - ee} + \frac{a^2 x}{a + e} +$
 $\frac{a^2 x}{a - e} - xx = \frac{-a^4 + 2a^2 x}{aa - ee} - xx = yy$.

(q) Cum sit AE ad EB ut AC ad CB, ut
AF ad FB, patet quod junctæ CF, CE bi- TAB. R.
secant angulos ACG in prima hypothesi, BCG Fig. 3-4
in secunda, & ACB in utraque.

Igitur arcus CE æquat arcum EH, & est
EF diameter, ergo CH ad rectos angulos est
super EF.

Ceterum hoc theorema deducitur ex prop.
2. lib. 2. Loeor. plan. Apollonii restitutorum
a Roberto Simion, quam lege. Idem etiam sic
demonstrari potest.

Sit circulus, cujus diameter EF, & a quovis TAB. R.
peripheria puncto H ad diametrum agatur per- Fig. 3.
pendicularis HD rursus occurrens peripheria in C,
& per C ducatur quavis recta occurrens diametro
in B & rursus peripheria in c, ac junctæ CH
diametrum conveniat in A: dico, ut AE ad

PROB. XL.

Si punctum lucidum A radii versus refringentem superficiem planam CD ejiciat; invenire radium AC, cujus refractus CB impinget in datum punctum B.

TAB. V.
Fig. 3.

A puncto isto lucido ad refringens planum demitte perpendiculum AD, & cum eo utrinque producto concurrat refractus radius BC in E, & perpendiculum a puncto B demissum in F, & agatur BD; dictisque $AD = a$, $BD = b$, $BF = c$, $DC = x$, statue rationem sinuum incidentiæ & refractio-

EB ita esse AC ad CB, & AF ad FB, & si AE sit ad EB ut AF ad FB erit CH vel ch perpendicularis diametro.

Jungantur CE, CF, CAh & ch diametro occurrens in d. Quia CH ad angulos rectos insitit diametro, erit arcus CE æqualis arcui EH, & arcus CcF æqualis FbH, quare trianguli ACH angulus CAH bifecatur recta BF: sed æquales sunt anguli ad verticem CAH: cAb, & CAD: bAd, ut & HAD: cAd; quare trianguli cAb angulus cAb bifectus est eadem recta BF; rectæ cA; Ab æque distant a centro; ideo sunt æquales, ut & anguli Ach; cbA. Ergo recti sunt anguli circa punctum d; recta ch parallela recta CH; & arcus cC æqualis arcui bH; atque arcus cCE arcui EHb & reliquis cF reliquo Fb. Jam ergo æquales sunt anguli cCF; Fcb insistentes æqualibus arcibus; id est trianguli ACB angulus exterior ACc bifectus est recta CF & est AF ad FB ut AC ad CB. Sed anguli cCA; ACB simul æquant duos rectos, id est bis angulum FCE, vel bis angulum FCA & bis angulum ACE; ergo demtis æqualibus angulis cCA & bis FCA, manet angulus ACB æqualis bis angulo ACE, & ejusdem trianguli ACB angulus interior ACB bifectus est recta CE; quare AC ad CB ut AE ad EB. Unde patet propositum. *Q. E. primum.*

TAB. R.
Fig. 4.

Dico nunc quod si sit AE ad EB, ut AF ad FB, & per B agatur quævis chorda Cbb, & juncta AC rursus occurrat peripheriæ in e, juncta ch fecat diametrum ad rectos angulos. Non enim; sed si fieri potest, sit cM normalis diametro; hic CM diametro occurrens in L, erit FL major, aut minor quam FB. Sit major: ergo EL minor quam EB; sed AE ad EL ut AF ad FL, & alternando AE ad AF, ut EL ad LF, ut EB ad BF, & rursus alternando EL minor ad EB majorem ut FL

major ad FB minorem, quod est absurdum. Eodem pacto devenies ab absurdum si FL minorem ponas quam ipsa FB. *Q. E. alterum.*

Si in circuli diametro EF indefinite producta sistantur duo quævis puncta A, B, ita ut AE ad EB sit ut AF ad FB, & insciantur quævis ACB, erit semper AC ad CB ut AF ad FB.

Occurrant AC, BC productæ iterum peripheriæ in e & b, agatur ecb per data puncta e, b, erit recta cb normalis ad diametrum, ergo patet propositum.

Si a duobus datis punctis insciantur AC, CB, ita ut quævis potestas ipsius AC sit ad æque altam potestatem CB in data ratione, locus erit circulus sic describendus.

Esse debeat $AC^m \cdot CB^m :: d \cdot e$, quare inter d & e, medias continue proportionales numero m — 1, quarum prima sit e, tunc $d^m \cdot e^m :: d \cdot e$; quare debet esse $AC \cdot BC :: d \cdot e$: Seca itaque AB data puncta jungentem in F, ita ut AF:FB :: d:e, eamque producat, ut AE:EB :: AF:FB, & diametro FE describe circulum. Hic erit locus quæsitus, ut patet.

Datam autem rectam AB sectam in F, produces in E, ut AF ad FB sit ut AE ad EB, TAB. R.
Fig. 4 sumendo FN ipsi EB parem, & quærendo quartam BE post datas AN, NF, AB; nam quia AN ad NF est ut AB ad BE; etiam componendo AF ad (NF vel) FB ut AE ad EB.

Patet autem quod si imperata ratio esset æqualitatis, locus esset normalis bifecans rectam AB.

tionis, hoc est sinuum angulorum CAD, CED (*r*) esse *d* ad *e*, & cum EC & AC (ut notum est) (*s*) sint in eadem ratione, & AC sit $\sqrt{aa+xx}$

erit $EC = \frac{d}{e} \sqrt{aa+xx}$. Præterea est $ED (= \sqrt{ECq - CDq}) =$

$\sqrt{\frac{ddaa+ddxx}{ee} - xx}$, & $DF = \sqrt{bb-cc}$, atque $EF = \sqrt{bb-cc} +$

$\sqrt{\frac{ddaa+ddxx}{ee} - xx}$. Denique propter similia triangula ECD, EBF, est ED.DC::EF.FB, &c, ductis extremorum & mediorum valoribus in

se, $e \sqrt{\frac{ddaa+ddxx}{ee} - xx} = x \sqrt{bb-cc} + x \sqrt{\frac{ddaa+ddxx}{ee} - xx}$,

sive $(e-x) \sqrt{\frac{ddaa+ddxx}{ee} - xx} = x \sqrt{bb-cc}$. Et partibus æqua-

tionis quadratis & rite dispositis, $x^4 - 2ex^3 - \frac{+ddcc + ddaaxx - zddaacx + ddaacc(t) - eebb}{dd-ee} = 0$.

P R O B . X L I .

Invenire locum verticis trianguli *D*, cujus basis *AB* datur, & anguli ad basem *DAB*, *DBA* datam habent differentiam.

TAB. V.
Fig. 4.

Ubi angulus ad verticem, sive (quod perinde est) ubi summa angulorum ad basem datur, docuit Euclides locum verticis esse circum-

TAB. R.
Fig. 5.
(*r*) Nam, si per C agatur recta GH parallela rectæ EF, erit angulus GCA, angulus incidentiæ, est autem æqualis alterno CAD. Pariter angulus BCH est angulus refractionis & est æqualis opposito CED. Quare &c.

(*s*) Quia in triangulo ECA, latera EC, CA sunt ut sinus angulorum oppositorum CAE, vel CAD, & CEA.

(*t*) Pone quantitatem arbitrariam $d = b$, æquatio fiet

$$x^4 - 2cx^3 + \frac{bbccxx + aabbxx - eebbxx}{bb-ee} - \frac{2aabbex + aabbee}{bb-ee} = 0$$

aut, ponendo $cc + ax = ff$, & $bb - ee = gg$

$$x^4 - 2cx^3 + \frac{bbffxx - eebbxx - 2aabbex + aabbee}{gg} = 0$$

Fac $gy = xx$, quæ est æquatio ad parabolam, & ponendo ggy pro x^4 ; gxy pro x^3 , & gy pro xx , in æquatione postrema, habebis, dividendo per gg ,

$$yy - \frac{2cxy}{g} + \frac{bbffyy - bbeyy}{g^2} - \frac{2aabbecy + aabbee}{g^2} = 0$$

æquationem ad hyperbolam, cum divisoribus termini altissimi $yy - \frac{2cxy}{g}$, sint y & $y - \frac{2cx}{g}$, inæquales & reales; quam facile describes e superioribus.

K k 3

ferentiam circuli; proposuimus igitur inventionem loci ubi differentia angulorum ad basem datur. Sit angulus DBA major angulo DAB, sitque ABF eorum data differentia, recta BF occurrente AD in F. Insuper ad BF demittatur normalis DE, ut & ad AB normalis DC occurrens BF in G. Diciturque $AB = a$, $AC = x$, & $CD = y$, erit $BC = a - x$. Jam in triangulo BCG cum dentur omnes anguli, dabitur ratio laterum BC & GC; sit ista d ad a , & erit $GC = \frac{aa - ax}{d}$. Aufer hanc de DC

sive y , & restabit $DG = \frac{dy - aa + ax}{d}$. Præterea, propter similia trian-

gula BGC, DGE, est $BG : BC :: DG : DE$. Est autem in triangulo BGC, $a : d :: CG : BC$; adeoque $aa : dd :: CGq : BCq$, & componendo $aa + dd : dd :: BGq : BCq$. Et extractis radicibus $\sqrt{(aa + dd) \cdot d} (:: BG \cdot BC) ::$

$DG \cdot DE$. Ergo $DE = \frac{dy - aa + ax}{\sqrt{(aa + dd) \cdot d}}$. Adhæc cum angulus ABF sit

differentia angulorum BAD & ABD, adeoque anguli BAD & FBD æquentur, similia erunt triangula rectangula CAD & EBD, & proinde latera proportionalia $DA : DC :: BD : DE$. Sed est $DC = y$. $DA (= \sqrt{ACq + DCq}) = \sqrt{xx + yy}$. $DB (= \sqrt{BCq + DCq}) = \sqrt{(aa - 2ax + xx + yy)}$,

& supra erat $DE = \frac{dy - aa + ax}{\sqrt{(aa + dd) \cdot d}}$. Quare est $\sqrt{(xx + yy)} \cdot y ::$

$\sqrt{(aa - 2ax + xx + yy)} \cdot \frac{dy - aa + ax}{\sqrt{(aa + dd) \cdot d}}$. Et extremorum & mediorum

quadratis in se ductis $aayy - 2axy + xxxy + y^4 = \frac{ddxxyy + ddy^4}{aa + dd}$

$$\frac{-2aadxx - 2aady^3 + 2adyx^3 + 2adxy^3 + a^4xx + a^4yy - 2a^3x^4}{aa + dd}$$

$$\frac{-2a^3xyy + aax^4 + aaxxyy}{aa + dd}$$

Duc omnes terminos in $aa + dd$, & prodeuntes redige in debitum or-

$$\text{dinem, \& oriatur } x^4 + \frac{2d}{a}y x^3 - \frac{2dy}{aa}xx + \frac{2d}{a}y^3 x - \frac{ddy}{a} = 0.$$

Divide hanc æquationem per $xx - ax + \frac{dy}{y}$, & oriatur

$$xx - \frac{a}{2d}x - \frac{yy}{a} = 0. \text{ Duæ itaque prodierunt æquationes in solutione hu-}$$

jus problematis. Prior $xx - ax + \frac{dy}{yy} = 0$ est ad circulum, locum nempe puncti D ubi angulus FBD sumitur ad alias partes rectæ BF quam in figura describitur, existente angulo ABF summa angulorum DAB, DBA ad basem, adeoque angulo ADB ad verticem dato. Posterior

$xx + \frac{2d}{a}x - dy = 0$ est ad hyperbolam, locum puncti D ubi angulus FBD

fitum obtinet a recta BF quem in figura descripsimus, hoc est ita ut angulus ABF sit differentia angulorum DAB, DBA ad basem. Hyperbolæ autem hæc est determinatio. Bifeca AB in P. Age PQ constituentem angulum BPQ æqualem dimidio anguli ABF. Huic erige normalem PR, & erunt PQ, PR asymptoti hujus hyperbolæ, & B punctum per quod hyperbola transibit. (u)

Et

Tab. R. Fig. 6. (u) Si propositum fuisset problema. Invenire locum verticis D trianguli, cujus basis AB datur, & anguli ad basem DAB, DBA datam consuevit summam, posses illud solvere ratiocinio prorsus eodem, nisi quod hic e GC demere deberes CD; sed nihilominus ad eandem æquationem devenires, ut facile videbis; debet igitur hæc æquatio ambabus hypothesibus inservire.

Pofuimus autem angulum ABF, vel æqualem BDF, esse recto minorem, alioquin rectæ BF, CD coire requirent in G, ut statuimus, est ergo angulus BDA obtusus, quapropter circuli centrum debet esse infra rectam BA.

Si nunc circulum, cujus segmentum terminatum recta BA debet esse capax anguli BDA, describas Euclide more, erit BG hujus circuli tangens, BM diameter, & L centrum, quod invenies bifeca chorda AB in H, & ex H educta normali ipsi BA.

Junge AM, erit angulus ad A rectus, & AMB æqualis CBG; sunt igitur similia triangula rectangula CBG, AMB; & est AM ad AB, ut BC ad CG :: d. a, sed AB = a, ergo AM = d: quare HL aut CP = $\frac{d}{2}$, igitur DP = $y + \frac{d}{2}$. Pariter BL, vel LO, aut LO = $\sqrt{\left(\frac{aa+dd}{4}\right) + (BH)^2}$, quo circa OP (= LO + LQ - QP) = $\sqrt{\left(\frac{aa+dd}{4}\right) +$

$\frac{a}{2} - x$, & Po (= oL - LQ + QP) = $\sqrt{\left(\frac{aa+dd}{4}\right) - \frac{a}{2} + x}$. Sed ex proprietate circuli OP . Po = PD², ergo $ax - xx = xx + dy$, aut $xx - ax + \frac{dy}{yy} = 0$.

Atqui æquatio ab Auctore inventa debet etiam hanc continere, & quidem per multiplicationem, ergo dividendo restat

$xx + \frac{2dy}{a}x - \frac{yy}{dd} = 0$, pro solutione problematis quod propositum fuerat.

Hyperbola facile determinatur & superioribus.

Est enim $y = \frac{dx}{a} - \frac{d}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{aa+dd}{aa}xx - \frac{x(aa+dd)}{a} + \frac{dd}{4}\right)}$; & factis $u = \frac{dx}{a} - \frac{d}{2}$, ac $z = \sqrt{\left(\frac{aa+dd}{aa}xx - \frac{x(aa+dd)}{a} + \frac{dd}{4}\right)}$; ubi $u = 0$, est $x =$

$\frac{a}{2} = AP$, & cum $x = 0$, $u = -\frac{d}{2} =$ Tab. R. Fig. 7.

AL. Proinde per P & L age indefinitam PL in ea erit vera diameter ordinarum AL, cujus positio determinata est secundum Num.

Et hinc prodit tale theorema. Hyperbolæ rectangulæ diametro quavis AB ducta, & terminis ejus ad hyperbolæ puncta duo quævis D & H ductis rectis AD, DB, AH, BH; hæ rectæ angulos DAH, DBH ad terminos diametri constituent æquales.

Idem brevius.

Ad PROB. XXIV. *Regulam* de commoda terminorum ad incundum calculum electione tradidi; ubi obvenerit ambiguitas in electione. Hic differentia angulorum ad basem eodem modo se habet ad utrumque angulum; & in constructione schematis æque potuit addi ad angulum minorem DAB, ducendo ab A rectam ipsi BF parallelam, ac subtrahi ab angulo majori DBA ducendo rectam BF. Quamobrem nec addo nec subtraho, sed dimidium ejus uni angulorum addo, alteri subtraho. Deinde cum etiam ambiguum sit utrum AC vel BC pro termino indefinito cui ordinatim applicata DC inficit, adhibeatur, neutrum adhibeo; sed bifeco AB in P, & ad-

130. Sed est $LA \left(\frac{d}{2}\right) \cdot AP \left(\frac{a}{2}\right) :: d \cdot a ::$
BC . CG, & sunt anguli ad A & C æquales, igitur similia sunt triangula PAL, GCB, & angulus ALP æquat angulum CBG.

Pone nunc $o = z = \sqrt{\frac{(aa + dd)xx}{aa}}$
 $x \left(\frac{aa + dd}{a} + \frac{dd}{4}\right)$ erit $xx = ax - \frac{aadd}{4aa + 4dd}$
& $x = \frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^4}{4aa + 4dd}} = \frac{a}{2} \pm$
 $\frac{aa}{2\sqrt{aa + dd}}$, & jam $AP = \frac{a}{2}$, ut in No.
104; quare ergo tertiam post LP $\frac{\sqrt{(aa + dd)}}{4}$,

& PA $\left(\frac{a}{2}\right)$; hæc fit PN = Pn, & age NO, ne parallelas AL; erunt O, o vertices hyperbolarum oppositarum, ut ex No. 135.

Atqui triangula similia LAP, ONP dant LP . PA :: OP . PN, & fecimus LP . PA :: PA . PN, ergo PA . PN :: PO . PN, quare est OP = PA = $\frac{a}{2}$, igitur OP, PA sunt diametri æquidistantes ab axe, nam hyperbole transit per B & per A, quia si in æquatione ponas $y = 0$, est $xx - ax = 0$, id est $x = 0$, vel $x = a$.

Sed $LP^2 - PO^2 \left(\frac{dd}{4}\right) \cdot LA^2 \left(\frac{d^2}{4}\right) :: OP^2$,

ee , est igitur $e = \frac{a}{2}$, & hyperbola est æquilatera, quapropter asymptoti sunt invicem ad rectos angulos; sed axis bifecat angulum asymptotum, debent ergo asymptoti facere cum diametris OP, PA angulos æquales; verum anguli APL; PLA simul faciunt unum rectum, igitur fac angulum QPB æqualem dimidio dato CBG, & recta QB erit asymptotorum una, altera vero erit RP priori normalis.

Nam age quamlibet MC parallelam AL, & curvæ occurrentem in V: erit $AC = x$, $CP = x - \frac{a}{2}$, & $CV = y$; sed quia AP $\left(\frac{a}{2}\right) \cdot AL \left(\frac{d}{2}\right) :: PC \left(x - \frac{a}{2}\right) \cdot CM = \frac{dx}{a} - \frac{d}{2}$; est $MV = \frac{dx}{a} - \frac{d}{2} - y$, & cum AP $\left(\frac{a}{2}\right) \cdot PL \left(\frac{1}{2}\sqrt{aa + dd}\right) :: CP \left(x - \frac{a}{2}\right) \cdot PM = \frac{x}{a}\sqrt{aa + dd} - \frac{1}{2}\sqrt{aa + dd}$, reperitur $PM^2 = xx + \frac{ddxx}{aa} - ax - \frac{ddx}{a} + \frac{aa + dd}{4}$; sed $PM^2 - PO^2 = MV^2$ ergo $xx - ax = yy + dy - 2\frac{dxy}{a}$, quæ est æquatio construenda.

adhibeo PC: vel potius acta MPQ constituyente hinc inde angulos APQ, TAB. V. Fig. 5.
 BPM æquales dimidio differentiæ angulorum ad basem, ita ut ea cum
 rectis AD, BD, constituat angulos DQP, DMP æquales; ad MQ demitto
 normales AR, BN, DO, & adhibeo DO pro ordinatim applicata ac PO
 pro indefinita linea cui insistit. Voco itaque $PO = x$, $DO = y$, AR,
 vel $BN = b$, & PR vel $PN = c$. Et propter similia triangula BNM, DOM,
 erit $BN \cdot DO :: MN \cdot MO$: & dividendo, $DO - BN (y - b) \cdot DO$

$$(y) :: MO - MN (ON, sive $c - x$) \cdot MO. \text{ Quare } MO = \frac{cy - xy}{y - b}.$$

Similiter ex altera parte propter similia triangula ARQ, DOQ, erit AR.
 $DO :: RQ \cdot QO$: & componendo $DO + AR (y + b) \cdot DO (y) ::$

$$QO + RQ (OR, sive $c + x$) \cdot QO. \text{ Quare } QO = \frac{cy + xy}{y + b}.$$

Denique propter æquales angulos DMQ, DQM, æquantur MO & QO, hoc est
 $\frac{cy - xy}{y - b} = \frac{cy + xy}{y + b}$. Divide omnia per y , & multiplica per denominato-
 res, & oriatur $cy + bc - xy - bx = cy - bc + xy - bx$, sive $cb = xy$,
 notissima æquatio ad hyperbolam. (v)

Quin etiam locus puncti D sine calculo algebraico prodire potuit. Est
 enim ex superioribus $DO - BN \cdot ON :: DO \cdot MO (QO) :: DO + AR \cdot$
 OR . Hoc est $DO - BN \cdot DO + BN :: ON \cdot OR$, & mixtim (\ast)

$$DO \cdot BN :: \frac{ON + OR}{2} (NP) \cdot \frac{OR - ON}{2} (OP). \text{ Adeoque } DO \text{ in } OP \\ = BN \text{ in } NP.$$

PROB.

(v) Hujus hyperbolæ constructionem ut
 inis facilem, omitto.

(x) Est enim $DO - BN$ ad $DO + BN$ ut
 ON ad OR ; ergo $DO - BN + DO + BN$
 $(2DO)$ ad $DO + BN$ ut $NO + OR$ ad OR ;
 ergo etiam $DO + BN$ ad $DO + BN - DO +$
 $BN (2BN)$ ut OR ad $OR - ON$; quare ex
 æquo ordinate, $2DO$ ad $2BN$ ut $RO + ON$ ad
 $RO - ON$, & dividendo per 2. &c.

Sed idem problema facilius solvit *Robertus*
Simon in appendice ad suas sectiones conicas,
 editi 2a; hoc pacto.

TAB. R. Fig. 8. Esto triangulum ABC, cujus datur basis AB
 & excessus anguli ABC supra angulum BAC.
 Ipsi angulo BAC æqualis ponatur angulus BCD.

Cum sit angulus ABC æqualis utrique BDC
 & DCB, vel BAC, simul; erit angulus BDC
 excessus anguli ABC supra angulum BAC; at-
 que ideo dabitur angulus BDC per hypot.

Nunc triangula ADC; BDC, quæ habent
 communem angulum ad D & æquales angulos
 DAC; DCB, sunt æquiangula; ergo AD ad DC
 ut CD ad DB, & rectangulum sub AD; DB
 est æquale quadrato ex DC, & datus est an-
 gulus ADC; quare punctum C tangit hyper-
 bolam æquilateram, quæ describetur bisecta
 AB in E, & ducta EF æquali ipsi AE vel EB,
 & constituente angulum AEF æqualem dato
 angulorum conjugitæ. Erunt AE; EL, semi-
 diametri conjugatæ, quarum transversa & in-
 tegra erit AB.

PROB. XLII.

Locum verticis trianguli invenire cujus basis datur & angulorum ad basem unus dato angulo differt a duplo alterius.

TAB. V.
Fig. 5.

In schemate novissimo superioris problematis sit ABD triangulum illud, AB basis bisecta in P, APQ vel BPM triens anguli dati, quo angulus DBA excedit duplum anguli DAB; & angulus DMQ erit duplus anguli DQM. (y) Ad MQ demitte perpendicularia AR, BN, DO; & angulum DMQ biseca recta MS occurrente DO in S; & erunt triangula DOQ, SOM similia; adeoque OQ. OM :: OD. OS, & dividendo OQ — OM . OM :: SD . OS :: (per 3. VI. Elem.) DM . OM Quare (per 9. V. Elem.) OQ — OM = DM. Dictis jam PO = x, OD = y, AR vel BN = b, & PR vel PN = c, erit, ut in superiore problemate, OM = $\frac{cy - xy}{y - b}$, & OQ = $\frac{cy + xy}{y + b}$, adeoque OQ — OM = $\frac{-2bcy + 2xyy}{yy - bb}$.

Pone jam DOq + OMq = DMq, hoc est $yy + \left(\frac{cc - 2cx + xx}{yy - 2by + bb}\right)yy = \left(\frac{4bbcc - 8bcxy + 4xxyy}{y^4 - 2bby + b^4}\right)yy$. Et per debitam reductionem (z) orietur

$$\begin{matrix} + cc & + 2bxx & + b^4 \\ \text{tandem } y^4 * & - 2bb & - 2cx yy + 4bcxy & - 3bbcc = 0. \\ & - 3xx & + 2bcc & + bbxx \end{matrix}$$

Divide omnia per $y - b$, & evadet $y^3 + byy - bb - cc + 3bcc - 2cx y + 2bcx - 3xx - bxx = 0$.

Quare punctum D est ad curvam trium dimensionum; quæ tamen evadit hyperbola ubi angulus BPM statuitur nullus, sive angulorum ad basem unus DBA duplus alterius DAB. Tunc enim BN, sive b evanescente, æquatio fiet $yy = 3xx + 2cx - cc$ (a).

Ex

(y) Cum angulus BPM sit triens anguli, quo angulus DBP superat duplum anguli DAP, & cum angulus DBP æquet angulos DMP, BPM simul; erit angulus DMP æqualis duplo angulorum DAP, APQ simul; at angulus DQM æquatur angulis DAP & APQ, ergo angulus DMP par est duplo angulo DQM.

(yy + 2by + bb) & deletis descendis, ac transponendo &c.

(a) Cum $y = \pm \sqrt{3xx + 2cx - cc}$ TAB. S. fit = 0, est $xx = \frac{-2cx + cc}{3}$, & $x = \frac{-c \pm \sqrt{acc}}{3}$, Fig. 1.

quare $x = \frac{c}{3}$, aut $x = -c$. Abscinde

(z) Reductio fiet ducendo yy in $y^4 - 2bby + b^4$, & (cc — 2cx + xx) yy in $yy + 2by + bb$, (est enim $y^4 - 2bby + b^4 = (y - by + bb)$

PV = $\frac{c}{3}$, quo circa erunt V, & R vertices

by-

Ex hujus autem æquationis constructione tale elicitur theorema. Si cen-^{Tab. V.}tro C, asymptotis CS, CT, angulum SCT 120 graduum contentibus ^{Fig. 6.} describatur hyperbola quævis DV, cujus semiaxis sint CV, CA: produc CV ad B, ut sit VB = VC, & ab A & B actis utcumque rectis AD, BD concurrentibus ad hyperbolam, erit angulus BAD dimidium anguli ABD, triens vero anguli ADE quem recta AD comprehendit cum BD producta. Hoc intelligendum est de hyperbola quæ transit per punctum V. Quod si ab iisdem punctis A & B actæ rectæ Ad, Bd convenient ad conjugatam hyperbolam quæ transit per A: tunc exteriorum angulorum trianguli ad basem, ille ad B erit duplus alterius ad A.

PROB.

hyperbolarum oppositarum, & tota diameter VR = $\frac{4c}{3}$, atque ideo dimidia VC = $\frac{2c}{3} = VN$. Erit igitur quævis abscissa PQ = x, & RQ x + x; sed QV = $x - \frac{c}{3}$, & RQ · QV = $\frac{3xx + 2cx - cc}{3}$, quæ quantitas esse debet ad ordinatæ quadratum (yy = 3xx + 2cx - cc) :: VC ($\frac{4cc}{9}$) · σσ = $\frac{4cc}{3}$: sume hinc inde

CL = Cl, = $\frac{2c}{\sqrt{3}}$ & circa has diametros describe hyperbolam, quæ, ut constat, erit locus æquationis.

Nunc dico quod angulus, quem faciunt asymptoti est 120. graduum.

Nam per V acta KV ad rectos angulos, & quæ asymptoto occurrat in K, & juncta NK, quia NV æquat VC, erit NK æqualis KC: sed sed quadratum ex KV, (CL) æquat ter quadratum ex CV, igitur quadratum ex CK æquat (quater quadratum ex CV vel) quadratum ex CN: est igitur æquilaterum triangulum NCK, quapropter angulus NCK est 60. grad. Q.E.D.

Hinc facilior hyperbolæ determinatio. Trifeca rectam RN; super duos ejus trientes NC describe triangulum æquilaterum NKC, age TC facientem cum NC angulum TCN æqualem NCK; erunt TC, CK asymptoti, & hyperbola transire debet per V.

Idem, analysi geometrica.

Sit triangulum ABC habens angulum ACB duplum anguli BAC. Ex B demitte perpendicularem BD, & abscinde DE ipsi DC parem. Erit igitur juncta EB æqualis BC, & angulus BEC angulo BCE: sed angulus BEC

angulo EBA una cum BAE æquatur, ergo (angulus BEC, aut) bis angulus EAB æqualis est angulus EAB, ABE; atque ideo triangulum AEB est isosceles. Idem ostenditur in fig. 3. fumendo angulum BEF pro angulo BEC. Sed excessus quadrati ex BE super quadratum ex ED est quadratum ex DB, & (sumpta EF ipsi ED æquali) excessus quadrati ex AE super quadratum ex EF est rectangulum DAF; & æqualia sunt quadrata ex AE, EB, atque ex EF, DE, igitur rectangulum DAF æquat quadratum ex DB.

Sit CG triens datæ CA, & quia CD triens est ipsius CF, erit residuum (fig. 2.), aut summa (fig. 3.) AF triplex reliqui aut summæ GD, quare ter rectangulum ADG æquabit (rectangulum DAF vel) quadratum ex DB; est igitur rectangulum ex data AG una cum variabili GD in variabilem GD ad quadratum ex variabili DB ut unitas ad tres, quare punctum B est ad hyperbolam.

Componetur sic. Ex data AC abscinde trientem CG, ex axe AG; parametro tripla ipsius AG, describe hyperbolam, erit angulus ACB duplex anguli CAB.

Nam ducta normali BD, est rectangulum ADG ad quadratum ex DB ut unitas ad tres, quo circa ter rectangulum ADG æquale est quadrato ex DB, hoc est excessui quadrati ex CB super quadratum ex CD, aut (capta ED ipsi DC æquali) quadrati ex EB super quadratum ex ED. Pone nunc EF ipsi ED parem, & quia tota AC est ad trientem CG ut residuum vel summa antecedentium AF ad residuum vel summam consequentium GD: igitur AF est tripla ipsius GD, quare rectangulum DAF æquat ter rectangulum ADG, id est, excessum quadrati ex BE super quadratum ex ED; sed rectangulum DAF, est excessus quadrati ex AE super quadratum ex EF; igitur quadratum ex AE æquat quadratum ex EB,

L 1 2

EB,

Tab. S.
Fig. 2.

PROB. XLIII.

Circulum per data duo puncta describere qui rectam positione datam continget (c).

TAB. V.
Fig. 7. **S**unt A & B puncta data, & EF recta positione data, & requiratur circulum ABE per ista puncta describere, qui contingat rectam istam FE Junge AB, & eam biseca in D. Ad D erige normalem DF occurrentem rectæ FE in F, & circuli centrum incidet in hanc novissime ductam DF, puta in C. Junge ergo CB; & ad FE demitte CE normalem, eritque E punctum contactus, ac CB, CE æquales inter se, utpote radii circuli quæsi. Jam cum puncta A, B, D, & F dentur, esto DB = a , ac DF = b ; & ad determinandum centrum circuli quærat DC, quam ideo dic x . Jam in triangulo CDB propter angulum ad D rectum, est $\sqrt{(DBq + DCq)}$, hoc est $\sqrt{(aa + xx)} = CB$. Est & DF — DC sive $b - x = CF$. Et in triangulo rectangulo CFE cum dentur anguli, dabitur ratio laterum CF & CE; sit ista d ad e ; & erit CE = $\frac{e}{d}$ in CF hoc est = $\frac{eb - ex}{d}$. Pone jam CB & CE, (radios nempe circuli quæsi- ti,) æquales inter se, & habebitur æquatio $\sqrt{(aa + xx)} = \frac{eb - ex}{d}$. Cujus partibus quadratis & multiplicatis per dd , oritur $aadd + ddx = eebb - 2eebx + eexx$. Sive $xx = \frac{+ eebb - 2eebx - aadd}{dd - ee}$. Et extracta radice, $x = \frac{- eeb + d\sqrt{(eebb + ecaa - ddaa)}}{dd - ee}$. Inventa est ergo longitudo DC adeo-

EB, quare triangulum AEB est isosceles, & angulus (BEC, fig. 2. vel BEF, fig. 3. vel æqualis) BCA duplex anguli CAB. \square E. D.

Si angulus ACB esset rectus, puncta C, D, E, F coinciderent, & analysis ac demonstratio eadem esset, sed aliquanto brevior.

TAB. S.
Fig. 4. Hinc angulum datum MPQ trifariam cum Vetteribus dividemus. Nam quemvis circulum ACB secabimus in duo segmenta, quorum unum ATC capax sit anguli dati, tum tripartita chorda AC, super AG dupla ipsius CG describemus hyperbolam, cujus parameter triplex sit ipsius AG, connexis punctis A, B, C, erit angulus HBC æqualis angulo dato, & triplex anguli BAC.

(c) Apollonius ille qui scripserat conicarum libros octo, (septem tantum nobis reliquit tempus edax), plura volumina de rebus geometricis (ut discimus ex Pappo in præf. ad septimum collectionum Mathem. librum) confecerat, & inter alia duo *tactionum* quæ perdidimus temporum injuria.

Horum problematum in his libris contentorum unum solum profat *Eucl. lib. IV. 5.* secundi casus, videlicet ubi tres rectæ datæ constituunt triangulum *ibid. prop. 4.*; septem autem solvit Newtonus hoc problemate & quatuor sequentibus, omnia soluta habeo, & me editurum spero propediem, cum Porismatis Euclidis restitutus.

adeoque centrum C, quo circulus per puncta A & B describendus est ut contingat rectam FE (d).

PROB. XLIV.

Circulum per datum punctum describere qui rectas duas positione datas contingat.

Esto datum punctum A, & sint EF, FG rectæ duæ positione datæ, TAB. V. & AEG circulus quæsitus easdem contingens, ac transiens per punctum Fig. 3.

TAB. S. Fig. 5. (d) Æquatio superior datæ
 $xx + 2ebx \equiv ebb - aadd$; sed producta DB
 $\frac{dd-ee}{dd-ee}$
 donec ipsi FE occurrat in G & dicta FG $\equiv d$,
 est GD $\equiv e$, quia FC ad CE, ut FG ad GD; &
 $dd-ee (FG^2 - GD^2) \equiv (DF^2) \equiv bb$, ergo $xx +$
 $2\frac{ee}{b} \equiv ee - \frac{aadd}{bb}$. Per A duc AL facientem angulum DAL æqualem angulo DFG, & occurrentem FC productæ in L: erit DF (b) . FG (d) :: AD (a) . AL $\equiv \frac{ad}{b}$, quam dic $\equiv g$; ergo
 $xx + 2\frac{ee}{b} \equiv ee - gg$. Per G age GM parallelam CE, & occurrentem FL in M; hinc FD (b) . DG (e) :: DG (e) . DM $\equiv \frac{ee}{b}$. Restat igitur per Num 35. Sect. IV. faciendum GD \rightarrow AL (e + g) . x + 2DM :: x . DG - AL (e - g).

Determinatio.

Posuimus quod $ee - gg$ sit quantitas positiva, quod accidit cum $eebb$ major est quam $aadd$, aut eb major quam ad , vel cum e ad a majorem habet rationem quam d ad b ; sed (ex D acta super FG ad rectos angulos DO) est FG (d) ad FD (b) ut GD (e) ad DO, tunc ergo DG (e) ad DB (a) majorem habebit rationem quam ad DO, igitur DG superat DB.

TAB. S. Fig. 6. Sed si $eb \equiv ad$, tunc DO æquaret DB, & æquatio superior fieret $xx + 2\frac{ee}{b} \equiv 0$, unde colligitur aut $x \equiv 0$, & circuli centrum esset D, aut $x \equiv -2\frac{ee}{b}$, & (sumpta CD æquali 2MD) esset C centrum circuli.

TAB. S. Fig. 7. Si demum esset eb minor quam ad , tunc etiam OD minor esset quam DB, & nostra

æquatio hæc erit $-xx - 2\frac{ee}{b} \equiv 33 - ee$, & x sumi deberet ex D versus M, & CF exprimentenda fuisset per $b \rightarrow x$.

Duos habet valores æquatio nostra, & videndum est quando unum, quando nullum habeat circulum, quod concernius fiet extracta æquationis radice, nam illa duos valores melius explicat; sumamus ergo $x \equiv$
 $\frac{-eeb \pm \sqrt{eebb^2 + aace - aadd}}{dd-ee} \equiv$ (si, ut fo-

lemus, determinetur $d) - \frac{ee}{b} \pm \frac{d}{b} \sqrt{(ee-aa)}$, statim apparet unum futurum valorem x , cum $e \equiv a$, vel cum punctorum unum est in rectæ positione data; nullum ubi e minor est quam a , aut recta positione data est inter duo puncta.

Igitur, proposito problemate, si recta non separet data puncta, statim discernendum est utrum alterum punctorum B sit in ipsa recta, tunc junge data puncta AB, age indefinitam FD, TAB. S. Fig. 8. quæ bifecet AB ad rectos angulos; ex B erige BM datæ rectæ perpendicularem & FD occurrentem in M, quo centro, radio MB describe circulum qui, ut liquet, problemati satisfaciet.

Sed facilius ita. Juncta AB & acta BM normali fac angulum BAM æqualem ABM, erit M centrum circuli.

Si vero neutrum ex punctis sit in data recta junge AB quam bifeca in D: ex D age DO TAB. S. Fig. 5-6. ad rectos angulos datæ rectæ; si DO, DB sint æquales erit ipsum D centrum unius circuli, aliud invenies ut supra; si DB sit minor aut major DO construes æquationem ut supra, sed valor x qui est positivus cum DB minor est quam DO, sit negativus cum DB major est quam DO, & contra.

Et cum istud A. Recta CF bifecetur angulus EFG & centrum circuli in ipsa reperietur. Sit istud C; & ad EF & FG demissis perpendicularis CE, CG, erunt E ac G puncta contactus. Jam in triangulis CEF, CGF, cum anguli ad E & G, sint recti, & anguli ad F semisses sint anguli EFG, dantur omnes anguli, adeoque ratio laterum CF & CE vel CG. Sit ista *d* ad *e*, & si ad determinandum centrum circuli quaesiti C, assuma-

Resolvi-
tur ut
Prob. 43.
Nam da-
to puncto
A, datur
& aliud
punctum
B.

tur CF = *x*, erit CE vel CG = $\frac{ex}{d}$. Præterea ad FC demitte norma-

lem AH (*e*), & cum punctum A detur, dabuntur etiam rectæ AH & FH. Dicantur istæ *a* & *b*, & ab FH, sive *b*, ablato FC, sive *x*, restabit CH = *b* - *x*. Cujus quadrato, $bb - 2bx + xx$, adde quadratum ipsius AH, sive aa & summa $aa + bb - 2bx + xx$, erit ACq per 47. I. Elem.; siquidem angulus AHC ex hypothesi sit rectus. Pone jam radios circuli AC & CG inter se æquales; hoc est pone æqualitatem inter eorum valores,

vel inter quadrata eorum, & habebitur æquatio $aa + bb - 2bx + xx = \frac{eex}{dd}$.

Aufer utrobique *xx*, & mutatis omnibus signis erit $-aa - bb + 2bx = xx - \frac{eex}{dd}$. Duc omnia in *dd*, ac divide per $dd - ee$, & evadet

$\frac{-aadd - bdd + 2bdx}{dd - ee} = xx$ (*f*). Cujus æquationis extracta radix

est $x = \frac{bdd - d\sqrt{(eebb + ecaa - ddaa)}}{dd - ee}$. Inventa est itaque longitudo

FC, adeoque punctum C, quod centrum est circuli quaesiti.

Si inventus valor *x*, sive FC, auferatur de *b*, sive HF, restabit HC = $\frac{-eeb + d\sqrt{(eebb + ecaa - ddaa)}}{dd - ee}$; eadem æquatio quæ in priori pro-

blemate prodiit, ad determinandum longitudinem DC.

P R O B . X L V .

Vide
Prop. 21.

*Circulum per data duo puncta describere, qui alium circulum
positione datum continget (g).*

TAB. VI. **S**int A, B puncta data, EK circulus positione & magnitudine datus, F centrum ejus, ABE circulus quaesitus per puncta A & B transiens, ac tangens alterum circulum in E, & C centrum ejus. Ad AB produ-

(e) Eam produc donec rectæ FE occurrat in L, & dic FL = *d*, erit LH = *e*.

(f) Sed quia $dd - ee$ (FL² - LH²) = FH² = *bb*,

erit $2 \frac{ddx}{b} - xx = dd + \frac{aadd}{bb}$, quam facile construes.

(g) Jam vidimus quod problema XXI. hujus idem est ac istud XLV.

Etam demitte perpendiculara CD, & FG; & age CF, fecantem circulos in puncto contactus E, ac age etiam FH parallelam DG, & occurrentem CD in H. His constructis dic AD vel DB = a, DG vel HF = b, GF = c, & EF (radius nempe circuli dati) = d, atque DC = x: & erit CH (= CD - FG) = x - c, & CFg (= CHg + HFg) = xx - 2cx + cc + bb, atque CBg (= CDg + DBg) = xx + aa, adeoque CB vel CE = √(xx + aa). Huic adde EF, & habebitur CF = d + √(xx + aa), ejus quadratum dd + aa + xx + 2d√(xx + aa), æquatur valori ejusdem CFg prius invento, nempe xx - 2cx + cc + bb. Aufer utrobique xx, & restabit dd + aa + 2d√(xx + aa) = cc + bb - 2cx. Aufer insuper dd + aa, & habebitur 2d√(xx + aa) = cc + bb - dd - aa - 2cx. Jam, abbreviandi causa, pro cc + bb - dd - aa, (b) scribe 2gg, & habebitur 2d√(xx + aa) = 2gg - 2cx, sive d√(xx + aa) = gg - cx. Et partibus æquationis quadratis, erit ddx + ddaa = g² - 2ggcx + ccxx. Utrinque aufer ddaa & ccxx, & restabit ddx - ccxx = g² - ddaa - 2ggcx. Et partibus æquationis divisus per dd - cc, habebitur xx = $\frac{g^2 - ddaa - 2ggcx}{dd - cc}$. At-

que per extractionem radicis affectæ x = $\frac{-ggc + \sqrt{(g^2dd - d'aa + ddaacc)}}{dd - cc}$. (i)

(b) Junge FK, & KG = √(dd - cc) quam dic = h; restat igitur bb - hh - aa: sed LD h + b & DK = b - h; quare LDK vel (ducta tangente DN) DN² = bb - hh, cui parem sume DO, & quia AB secata est in æqualia in D, & ei addita BO, erit AOB cum quadrato ex BD æquale quadrato ex DO, vel AOB æquale bb - hh - aa: dic AOB = 2gg.

(i) Quia KG = √(dd - cc) = h, erit x = $\frac{-cgg \pm d\sqrt{g^2 - aabb}}{hb}$: fac g.a :: b. ad quartam = g, & gg = ab, aut gggg = aabb; quapropter x = $\frac{-cgg \pm dg\sqrt{gg - gg}}{hb}$; quare cc = gg - gg, & fiet x = $\frac{-cgg \pm dgo}{hb}$: fac demum hb. - cg ± do :: g. ad quartam x.

Sed quia duo reperiuntur valores x, qui ad unum redigerentur si $\frac{gg}{b} = a$, & impossibiles fierent si $\frac{gg}{b}$ esset minor quam a, videndum est quando $\frac{gg}{b}$ major, æqualis, aut minor sit quam a. Biseca AO in P. Quia diximus AOB = 2gg, erit POB = gg: idcirco fac ut GK ad PO ita OB ad quartam; si hæc

In-æquat DB problema erit possibile & unam habebit solutionem, eritque x = $\frac{ac}{b}$; si major, duas, quas construes ut supra, & centrum unius circuli cadet supra AB, alterius vero infra; si minor, problema est impossibile.

Si recta AB tangeret in G circulum-KNL esset c = d, & æquatio ddx - ccxx = g² - aadd - 2ggcx fieret x = $\frac{gg}{2d} - \frac{aad}{2cg}$; sed tum 2gg = bb - aa = AGB, & gg = DGB; quare fac AGB ad quadratum ex DB ut FK ad quartam, & excessus hujus supra illam erit x.

Si AB neque tangeret, neque secaret circulum KNL, esset c major quam d & æquatio fieret xx = $\frac{2ggcx + aadd - g^2}{cc - dd}$.

Si punctum B caderet in peripheria circuli KNL, & punctum A extra, esset b = a + c; quare 2gg, in prima & tertia hypothesis, = 2cc + 2ac - dd; in secunda, = cc + 2ac. Facile persequeris reliquos casus, nempe, quando unum ex punctis est in peripheria, dum alterum intra circulum existit; ambo intra circulum; circulus inter utrumque medius. Ambo autem puncta nequeant esse in peripheria dati circuli.

Inventa igitur x , sive longitudine DC, biseca AB in D, & ad D erige perpendiculum DC = $\frac{ggc + d\sqrt{(g^2 - aadd + aacc)}}{ad - cc}$. Dein centro C per punctum A vel B describe circulum ABE; nam hic continget alterum circulum EK, & transibit per utrumque punctum A, B. Q. E. F.

PROB. XLVI.

Circulum per datum punctum describere qui datum circulum, & rectam lineam positione datam continget.

TAB. VI.
Fig. 2.

Sit circulus iste describendus BD, ejus centrum C, punctum per quod describi debet B, recta quam continget AD, punctum contactus D, circulus quem continget GEM, ejus centrum F, & punctum contactus E. Junge CB, CD, CF; & CD erit perpendicularis ad AD, atque CF fecabit circulos in puncto contactus E. Produca CD ad Q ut sit DQ = EF & per Q age QN parallelam AD. Denique a B & F ad AD & QN demitte perpendiculara BA, FN, & a C ad AB & FN perpendiculara CK, CL. Et cum sit BC = CD vel AK, erit BK (= AB - AK) = AB - BC, adeoque BKq = ABq - 2AB . BC + BCq. Aufer hoc de BCq, & restabit 2AB . BC - ABq, pro quadrato de CK. Est itaque AB(2BC - AB) = CKq; & eodem argumento erit FN(2CF - FN) = CLq, atque adeo $\frac{CKq}{AB} + AB = 2BC$, & $\frac{CLq}{FN} + FN = 2CF$. Quamobrem, si pro AB, CK, FN, KL, & CL, scribas a, y, b, c , & $c - y$, erit $\frac{yy}{2a} + \frac{1}{2}a = BC$, & $\frac{cc - 2cy + yy}{2b} + \frac{1}{2}b = FC$. De FC aufer BC, & restabit BF = $\frac{cc - 2cy + yy}{2b} + \frac{1}{2}b - \frac{yy}{2a} - \frac{1}{2}a$. Jam si puncta ubi FN producta fecat rectam AD, & circulum GEM notentur literis H, G, & M & in HG producta capiatur HR = AB, cum sit HN (= DQ = EF) = GF, addendo FH utrinque, erit FN = GH, adeoque AB - FN (= HR - GH) = GR, & AB - FN + 2EF, hoc est $a - b + 2EF = RM$, & $\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b + EF = \frac{1}{2}RM$. Quare, cum supra fuerit EF = $\frac{cc - 2cy + yy}{2b} + \frac{1}{2}b - \frac{yy}{2a} - \frac{1}{2}a$, si hoc scribatur pro EF habebitur $\frac{1}{2}RM = \frac{cc - 2cy + yy}{2b} - \frac{yy}{2a}$. Dic ergo RM d , & erit $d = \frac{cc - 2cy + yy}{b} - \frac{yy}{a}$. Duc omnes terminos in a & b , & orietur $abd = acc - 2acy + ayy - byy$. Aufer utrinque

que $acc - 2acy$, & restabit $abd - acc + 2acy = ayy - byy$. Divide per $a - b$, & oriatur $\frac{abd - acc + 2acy}{a - b} = yy$. Et extracta radice $y = \frac{ac}{a - b} \pm \sqrt{\frac{aabd - abbd + abcc}{aa - 2ab + bb}}$. Quæ conclusiones sic abbreviari possunt. Pone $c. b :: d. e$, dein $a - b. a :: e. f$; & erit $fe - fe + 2fy = yy$, five $y = f \pm \sqrt{ff + fe - fe}$. Invento y , five KC vel AD, cape AD = $f \pm \sqrt{ff + fe - fe}$, ad D erige perpendiculum DC (= BC) = $\frac{KCq}{2AB} + \frac{1}{2} AB$, & centro C, intervallo CB vel CD describe circulum BDE, nam hic transiens per datum punctum B, tanget rectam AD in D, & circulum GEM in E. Q. E. F.

Hinc circulus etiam describi potest qui duos datos circulos, & rectam ^{TAB. VI.} positione datam continget. Sint enim circuli dati RT, SV, eorum centra ^{Fig. 3.} B, F, & recta positione data PQ. Centro F, radio FS — BR describe circulum EM. A puncto B, ad rectam PQ demitte perpendiculum BP, & producto eo ad A ut sit PA = BR per A age AH parallelam PQ, & circulus describatur qui transeat per punctum B, tangatque rectam AH, & circulum EM. Sit ejus centrum C; junge BC secantem circulum RT in R, & eodem centro C, radio vero CR descriptus circulus RS tanget circulos RT, SV, & rectam PQ, ut ex constructione manifestum est.

PROB. XLVII.

Circulum describere qui per datum punctum transibit, & alios duos positione, & magnitudine datos circulos continget.

Esto punctum datum A, sintque circuli positione, & magnitudine dati ^{TAB. VI.} TIV, HRS, centra eorum C & B, circulus describendus AIH ^{Fig. 4.} centrum ejus D, & puncta contactus I & H. Junge AB, AC, AD, DB, secetque AB producta circulum RHS in punctis R & S, & AC, producta circulum TIV in T & V. Et a punctis D & C demissis perpendiculis DE ad AB, & DF ad AC occurrente AB in G, atque CK ad AB, in triangulo ADB erit $ADq - DBq + ABq = 2AE \cdot AB$, per 13. II. Elem. Sed $DB = AD + BR$, adeoque $DBq = ADq + 2AD \cdot BR + BRq$. Aufer hoc de $ADq + ABq$, & restabit $ABq - 2AD \cdot BR - BRq = 2AE \cdot AB$. Est & $ABq - BRq = (AB - BR)(AB + BR) = AR \cdot AS$. Quare $AR \cdot AS - 2AD \cdot BR = 2AE \cdot AB$. Et $\frac{AR \cdot AS - AB \cdot AE}{BR} = 2AD$.

Et simili ratiocinio in triangulo ADC emerget iterum $2AD = \frac{TAV - 2CAF}{CT}$. Quare $\frac{RAS - 2BAE}{BR} = \frac{TAV - 2CAF}{CT}$. Et $\frac{TAV}{CT} = \frac{RAS}{RAS}$

$$\frac{RAS}{BR} + \frac{2BAE}{BR} = \frac{2CAF}{CT}. \text{ Et } \left(\frac{TAV}{CT} - \frac{RAS}{BR} + \frac{2BAE}{BR} \right) \frac{CT}{2AC} = AF.$$

Unde cum sit $AK \cdot AC :: AF \cdot AG$, erit $AG = \left(\frac{TAV}{CT} - \frac{RAS}{BR} + \frac{2BAE}{BR} \right)$

$$\frac{CT}{2AK}. \text{ Aufer hoc de AE sive } \frac{2KAE}{CT} \text{ in } \frac{CT}{2AK}, \text{ \& restabit } GE = \left(\frac{RAS}{BR} - \frac{TAV}{CT} - \frac{2BAE}{BR} + \frac{2KAE}{CT} \right) \frac{CT}{2AK}.$$

Unde cum sit $KC \cdot AK :: GE \cdot DE$; erit $DE = \left(\frac{RAS}{BR} - \frac{TAV}{CT} - \frac{2BAE}{BR} + \frac{2KAE}{CT} \right) \frac{CT}{2KC}$. In

AB cape AP quæ sit ad AB ut CT ad BR , & erit $\frac{2PAE}{CT} = \frac{2BAE}{BR}$, adeo-

que $\frac{2PK \cdot AE}{CT} = \frac{2BAE}{BR} - \frac{2KAE}{CT}$, adeoque $DE = \left(\frac{RAS}{BR} - \frac{TAV}{CT} - \frac{2PK \cdot AE}{CT} \right)$

$\frac{CT}{2KC}$. Ad AB erige ergo perpendicularum $AQ = \left(\frac{RAS}{BR} - \frac{TAV}{CT} \right) \frac{CT}{2CK}$,

& in eo cape $QO = \frac{PK \cdot AE}{KC}$, & erit $AO = DE$.

Junge DO , DQ , CP , & triangula DOQ , CKP erunt similia, quippe quorum anguli ad O & K sunt recti, & latera ($KC \cdot PK :: AE$, vel $DO \cdot QO$) proportionalia. Anguli ergo QQD , KPC æquales sunt, & proinde QD perpendicularis est ad CP . Quamobrem si agatur AN parallela CP , & occurrens QD in N , angulus ANQ erit rectus, & triangula AQN , PCK similia; adeoque $PC \cdot KC :: AQ \cdot AN$. Unde cum AQ sit $\left(\frac{RAS}{BR} - \frac{TAV}{CT} \right) \frac{CT}{2KC}$, AN erit $\left(\frac{RAS}{BR} - \frac{TAV}{CT} \right) \frac{CT}{2PC}$. Produc

AN ad M ut sit $NM = AN$, & erit $AD = DM$, adeoque circulus quæritus transibit per punctum M . Cum ergo punctum M datum sit, ex his, sine ulteriore analysi, talis emergit problematis resolutio.

In AB cape AP , quæ sit ad AB ut CT ad BR ; jungo CP eique parallelam age AM , quæ sit ad $\frac{RAS}{BR} - \frac{TAV}{CT}$, ut CT ad PC : & ope *Prob.*

45. per puncta A & M describe circulum $AIHM$ qui tangat alterutrum circulum TIV , RHS , & idem circulus tanget utrumque. $Q. E. F.$

Et hinc circulus etiam describi potest qui tres circulos positione & magnitudine datos continget. Sunt tria datorum circulorum radii A, B, C , & centra D, E, F , radii $B \pm A, C \pm A$ describantur duo circuli, & tertius circulus qui hosce tangat, transeatque per punctum D . Sit hujus radius G , & centrum H , & eodem centro H radio $G \pm A$ descriptus circulus continget tres primos circulos, ut fieri oportuit.

P R O B. X L V I I I.

Si ad extremitates fili DAE circa paxillum A labentis appendantur pondera duo D & E, quorum pondus E labitur per lineam obliquam BG: invenire locum ponderis E, ubi pondera hæc in æquilibrio consistunt. TAB. VI.
Fig. 5.

Puta factum, & ipsi AD age parallelam EF quæ sit ad AE, ut pondus E ad pondus D. Et a punctis A & F ad lineam BG demitte perpendiculara AB, FG. Jam cum pondera, ex hypothesi, sint ut lineæ AE, EF, exponantur pondera per lineas istas, pondus D per lineam AE, & pondus E per lineam EF. Ergo corpus E proprii ponderis vi directæ EF tendit versus F, & vi obliqua EG tendit versus G. Et idem corpus E, ponderis D vi directæ AE, trahitur versus A, vi obliqua BE trahitur versus B. Cum itaque pondera se mutuo sustineant in æquilibrio, vis qua pondus E trahitur versus B æqualis esse debet vi contrariæ qua tendit versus G, hoc est BE æqualis esse debet ipsi EG. Jam vero datur ratio AE ad EF, ex hypothesi, & propter datum angulum FEG datur etiam ratio FE ad EG cui BE æqualis est. Ergo datur ratio AE ad BE. Datur etiam AB longitudine. Et inde triangulum ABE, & punctum E facile dabitur. Nempe dic $AB = a$, $BE = x$, & erit $AE = \sqrt{aa + xx}$: sit insuper AE ad BE in data ratione d ad e , & erit $e \sqrt{aa + xx} = dx$. Et partibus æquationis quadratis & reductis, $ecaa = ddx - eexx$, sive $\frac{ea}{\sqrt{dd - ee}} = x$. Inventa

est igitur longitudo BE quæ determinat locum ponderis E. Q. E. F.

Quod si pondus utrumque per lineam obliquam descendat, computum TAB. VI.
Fig. 6. sic institui potest. Sint CD, BE obliquæ lineæ positione datæ per quas pondera ista D & E descendunt. A paxillo A ad has lineas demitte perpendiculara AC, AB, iisque productis occurrant in punctis G & H lineæ EG, DH, a ponderibus perpendiculariter ad horizontem erectæ, & vis qua pondus E conatur descendere juxta lineam perpendicularem, hoc est tota gravitas ipsius E, erit ad vim qua pondus idem conatur descendere juxta lineam obliquam BE, ut GE ad BE; atque vis qua conatur juxta lineam istam obliquam BE descendere erit ad vim qua conatur juxta lineam AE descendere, hoc est ad vim qua filum AE distenditur, ut BE ad AE. Adeoque gravitas ipsius E, erit ad tensionem fili AE ut GE ad AE. Et eadem ratione gravitas ipsius D erit ad tensionem fili AD ut HD ad AD. Sit itaque fili totius DA + AE longitudo c , sitque pars ejus AE = x , & erit altera pars AD = $c - x$. Et quoniam est AEq — ABq = BEq, & ADq — ACq = CDq, sit insuper AB = a , & AC = b , & erit BE = $\sqrt{xx - aa}$ & CD = $\sqrt{xx - 2cx + cc - bb}$. Adhæc cum triangula BEG, CDH, dentur specie, sit BE . EG :: f . E, & CD . DH :: f . g, & erit EG =

M m 2

$$\frac{E}{f} \sqrt{xx}$$

$\frac{E}{f} \sqrt{xx - aa}$, & $DH = \frac{g}{f} \sqrt{xx - 2cx + cc - bb}$. Quamobrem cum sit GE ad AE ut pondus D ad tensionem AE; & HD ad AD ut pondus D ad tensionem AD, & tensiones istæ æquantur inter se, erit $\frac{E}{f} \sqrt{xx - aa} =$ ten-

sioni AE = tensioni AD = $\frac{Dc - Dx}{\frac{g}{f} \sqrt{xx - 2cx + cc - bb}}$. Cujus æquatio-

nis reductione provenit $gx \sqrt{xx - 2cx + cc - bb} = (Dc - Dx) \sqrt{xx - aa}$
five

$$-DDx^4 + 2DDcx^3 - DDccx^2 - 2DDacx + DDccaa = 0.$$

Si casum desideras quo hoc problema per regulam & circinum construi-
queat, pone pondus D ad pondus E ut ratio $\frac{BE}{EG}$ ad rationem $\frac{CD}{DH}$, &
evadet $g = D$, (k) adeoque vice præcedentis æquationis habebitur hæc

$$- \frac{aa}{bb} xx - 2aacx + aacc = 0; \text{ five } x = \frac{ac}{a+b} (l).$$

PROB.

(k) Nam $\frac{BE}{EG} = \frac{f}{E}$, & $\frac{CD}{DH} = \frac{f}{g}$; cum $(\sqrt{xx - aa}) = \frac{acf}{(a+b)\sqrt{\frac{aac}{aa+2a+bb} - aa}}$
ergo nunc sit $\frac{BE}{EG} \left(\frac{f}{E}\right) \cdot \frac{CD}{DH} \left(\frac{f}{g}\right) :: D \cdot E$, erit,
sive ducis extremis & mediis, $\frac{Df}{g} = f$,
& $D = g$.
 $(\sqrt{xx - 2cx + cc - bb}) = \frac{bcf}{(a+b)\sqrt{\frac{aacc}{a+b^2}}}$

(l) Aut enim b æquat a , aut minor est, aut
major. Si primum, $aaax - bbxx = 0$, &
æquatio restat $x = \frac{c}{2} = \frac{2ac}{2a} = \frac{ac}{a+b}$. Hoc
autem accidit quando BA, AC sunt æquales.

Si secundum, æquatio fit $xx = \frac{2acx - aacc}{aa - bb}$,
& $= x \frac{aac \pm \sqrt{aabbcc}}{aa - bb} = \frac{aac \pm abc}{aa - bb}$
 $= \frac{ac(a \pm b)}{(a+b)(a-b)} = \frac{ac}{a \pm b}$; & tunc duo viden-
tur esse puncta æquilibrium dantia. Sed si po-
namus $x = \frac{ac}{a+b}$, erit tensio filii AE

$\frac{cf}{\sqrt{cc - aa - 2ab - bb}}$.
quæ tensiones sunt æquales, & pondera in
æquilibrio.

Si vero ponamus $x = \frac{ac}{a-b}$, tensio filii AE
fiet $= \frac{cf}{\sqrt{cc - aa + 2ab - bb}}$; & tensio filii
AD $= \frac{-cf}{\sqrt{cc - aa + 2ab - bb}}$ quæ quantitas
est quidem alteri æqualis, sed negativa, & de-
bet esse positiva, quia tensiones ambæ tendunt
ad eandem plagas; fieret tantem positiva si pro
tensione ipsius AD haberetur non

P R O B. X L I X.

Si ad filum DACBF circa paxillos duos A, B, labile appendantur tria pondera D, E, F; D & F ad extremitates fili, & E ad medium ejus punctum C, inter paxillos positum: ex datis ponderibus & situ paxillorum invenire situm puncti C, ad quod medium pondus appenditur ubi pondera consistunt in æquilibrio.

Cum tensio fili AC æquetur tensioni fili AD, & tensio fili BC tensioni fili BF, (m) tensiones filorum AC, BC, EC erunt ut pondera D, F, E. In eadem ponderum ratione cape partes filorum CG, CH, CI. Completur triangulum GHI. Produc IC donec ea occurrat GH in K, & erit

GK = KH, & CK = $\frac{1}{2}$ CI, adeoque C centrum gravitatis trianguli

GHI. (n) Nam per C agatur ipsi CE perpendicularare PQ, & huic a punctis G, & H, perpendiculararia GP, HQ. Et si vis qua filum AC vi ponderis D trahit punctum C versus A, exponatur per lineam GC, vis qua filum istud trahet idem punctum versus P exponetur per lineam CP, & vis qua trahit illud versus K exponetur per lineam KP. Et similiter vires quibus filum BC vi ponderis F, trahit idem punctum C versus B, Q & K, exponentur per lineas CH, CQ, HQ; & vis qua filum CE vi ponderis E, trahit punctum illud C versus E, exponetur per lineam CI. Jam cum punctum C viribus æquipollentibus sustineatur in æqui-

$\frac{fc-fx}{\sqrt{(xx-2cx+cc-bb)}}$ sed $\frac{fx-fc}{\sqrt{xx-2cx+cc-bb}}$, quod indicat hunc ignotæ valorem satisfacere problemati, si pro summa filorum DA, AE data fuisset eorum differentia.

Denique si b major est quam a, æquatio evadit $xx = -\frac{2aax + aacc}{bb-aa}$; aut $x = \frac{-aac \pm \sqrt{abc}}{bb-aa}$; quarum altera ($\frac{-aac - \sqrt{abc}}{bb-aa}$)

est falsa, quam non quærimus, & quæ satisfaceret problemati si fuisset quærendum punctum æquilibrii pondere labente per GD, & illud retrahente potentia quadam æquale ponderi E juxta directionem IF ipsi BE parallelam filo circa A recurvato in F ita ut FA AE sint in directum. Altera vero ($\frac{-aac + \sqrt{abc}}{bb-aa}$) dat

$$\frac{ac}{a+hb}$$

(m). Quoniam pondera D, E, F, sunt in æquilibrio, vis qua pondera D & F deorsum trahuntur, æquat vim qua pondus E deprimitur. Pondus autem E simul tendit fila AC, CB; ac tensioni filii AC contraria est tensio filii AD, tensioni vero filii CB contraria est tensio filii BF; ergo hæ tensiones contrariæ debent esse æquales; alioquin enim tensio major minorem vinceret, & pondus non esset in æquilibrio.

Tensio fili AD est effectus ponderis D perpendiculariter trahentis, & idcirco totam suam vim exercentis; ergo est ei proportionalis. Sed tensio fili AC æquat tensionem filii AD, igitur tensio fili AC est ut pondus D. Idem dicendum de tensione filii BC. Tensionem CE esse ut pondus E statim patet.

(n) Quod GH bisecetur in K, & quod KC sit dimidiata CI ab Auctore dilucide ostenditur, & notum est esse C centrum gravitatis trianguli GIK.

æquilibrio, summa virium quibus fila AC & BC, simul trahunt punctum C versus K, æqualis erit vi contrariæ qua filum EC, trahit punctum illud versus E, hoc est summa GP + HQ, æqualis erit ipsi CI; & vis qua filum AC trahit punctum C versus P, æqualis erit vi contrariæ qua filum BC trahit idem punctum C versus Q, hoc est linea PC æqualis lineæ CQ. Quare cum PG, CK, & QH parallelæ sint, erit etiam GK = KH, & CK ($= \frac{GP + HQ}{2}$) = $\frac{1}{2}$ CI. Quod erat ostendendum. Restat itaque

triangulum GCH determinandum, cujus latera GC & HC, dantur, una cum linea CK, quæ a vertice C ad medium basis ducitur. Demittatur itaque a vertice C ad basem GH perpendicularum CL, & erit $\frac{GCq - CHq}{2GH} = KL = \frac{GCq - KCq - GKq}{2GK}$. Pro 2GK scribe GH, &

rejecto communi divisore GH, & ordinatis terminis, erit $GCq - 2KCq + CHq = 2GKq$, sive $\sqrt{\frac{1}{2} GCq - KCq + \frac{1}{2} CHq} = GK$. Invento

GK vel KH, dantur simul anguli GCK, KCH, sive DAC, FBC. Quare a punctis A & B in datis istis angulis DAC, FBC duc lineas AC, BC concurrentes in puncto C, & istud C erit punctum quod quæritur.

Ceterum quæstiones omnes quæ sunt ejusdem generis non semper opus est per algebraem sigillatim solvere, sed ex solutione unius plerumque confectatur solutio alterius. Ut si jam proponeretur hæc quæstio.

TAB. VI.
Fig. 8.

Filo ACDB in datas partes AC, CD, DB diviso & extremitatibus ejus ad paxillos duos A, B positione datos ligatis, si ad puncta divisionum C ac D appendantur pondera duo E & F; ex dato pondere F, & situ punctorum C ac D, cognoscere pondus E.

Ex præcedentis problematis solutione satis facile colligetur hæc solutio hujus. Produca lineas AC, BD, donec occurrant lineis DF, CE in G & H; & erit pondus E ad pondus F ut DG ad CH.

Et hinc obiter patet ratio componendi flateram ex solis filis, quæ pondus corporis cujusvis E, ex unico dato pondere F cognosci potest.

P R O B. L.

Lapide in puteum decidente, ex sono lapidis fundum percutientis, altitudinem putei cognoscere.

Sit altitudo putei x , & si lapis motu uniformiter accelerato descendat per spatium quodlibet datum a in tempore dato b , & sonus motu unifor-

formi transeat per idem spatium datum a in tempore dato d , lapis descendet per spatium x , in tempore $b\sqrt{\frac{x}{a}}$, sonus autem qui fit a lapide in fundum putei impingente ascendet per idem spatium x , in tempore $\frac{dx}{a}$. Ut enim sunt spatia gravibus decidentibus descripta, ita sunt quadrata temporum descensus; vel ut radices spatiorum, hoc est ut \sqrt{x} & \sqrt{a} , ita sunt ipsa tempora. Et ut spatia x & a , per quae sonus transit, ita sunt tempora transitus. Ex horum temporum $b\sqrt{\frac{x}{a}}$ & $\frac{dx}{a}$ summa conflatur tempus a lapide demisso ad sonus reditum. Hoc tempus ex observatione cognosci potest. Sit ipsum t , & erit $b\sqrt{\frac{x}{a}} + \frac{dx}{a} = t$. Ac $b\sqrt{\frac{x}{a}} = t - \frac{dx}{a}$. Et partibus quadratis $\frac{bbx}{a} = tt - \frac{2tdx}{a} + \frac{d^2xx}{a^2}$. Et per reductionem

$$xx = \frac{2adt + abb}{dd} x - \frac{aatt}{dd}. \text{ Et extracta radice } x = \frac{adt + \frac{1}{2}abb}{dd} - \frac{ab}{2dd}$$

$\sqrt{(bb + 4dt) (o)}$.

P R O B. L I.

Dato globo A , positione parietis DE , & centri globi B a pariete distantia BD ; invenire molem globi B ea lege ut in spatii liberis, & vi gravitatis destitutis, si globus A , cujus centrum in linea BD , qua ad parietem perpendicularis est, ultra B producta consistit, uniformi tum motu versus D feratur donec is impingat in alterum quiescentem globum B ; globus iste B postquam reflectitur a pariete, denuo occurrat globo A in dato puncto C . TAB. VII. FIG. 1.

Sit globi A celeritas ante reflexionem a & erit per Prob. XII. Quæst. Arith. celeritas globi A post reflexionem $= \frac{aA - aB}{A + B}$, & celeritas globi B post

(o) Hic sumitur minor æquationis radix, quia t (tempus quod labitur, dum lapis descendit & sonus ascendit) debet esse majus quam $\frac{dx}{a}$ (tempus, per quod sonus ascendit); ergo $\frac{at}{d}$ majus quam x , quod sic optime efficitur. Est enim $\sqrt{(bb + 4dt)}$ major quam b , pone eam $= b + e$; ergo

$$x = \frac{adt + \frac{1}{2}abb}{dd} - \frac{\frac{1}{2}abb - \frac{1}{2}abc}{dd} = \frac{adt - \frac{1}{2}abc}{dd} : \text{ est autem } \frac{adt - \frac{1}{2}abc}{dd} \text{ minor quam } \frac{adt}{dd}; \text{ ergo } x \text{ minor quam } \frac{adt}{dd} = \frac{at}{d}.$$

post reflexionem $= \frac{2A}{A+B}$. Ergo celeritas globi A ad celeritatem globi B est ut A — B ad 2A. In GD cape $gD = GH$ diametro nempe globi B, & celeritates istæ erunt ut GC ad $Gg + gC$. Nam ubi Globus A impigit in globum B, punctum G quod in superficie globi B existens movetur in linea AD, perget per spatium Gg antequam globus ille B impingeret in parietem, & per spatium gC postquam a pariete reflectitur; hoc est per totum spatium $Gg + gC$, in eodem tempore quo globi A punctum F perget per spatium GC, eo ut globus uterque rursus conveniant & in se mutuo impingant in puncto dato C. Quamobrem cum dentur intervalla BC & CD, dic $BC = m$, $BD + CD = n$, & $BG = x$, & erit $GC = m + x$, & $Gg + gC = GD + DC = 2gD = GB + BD + DC = 2GH = x + n - 4x$, seu $= n - 3x$. Supra erat A — B ad 2A ut celeritas globi B ut GC ad $Gg + gC$, adeoque A — B ad 2A ut GC ad $Gg + gC$, ergo cum sit $GC = m + x$, & $Gg + gC = n - 3x$, erit A — B ad 2A sicut $m + x$ ad $n - 3x$. Porro globus A est ad globum B ut cubus radii ejus AF ad cubum radii alterius GB, hoc est si ponas radium AF esse s , ut s^3 ad x^3 . Ergo $s^3 - x^3$, $2s^3$ ($:: A - B . 2A$) $:: s^3n - 3s^3x - nx^3 + 3x^4 = 2ms^3 + 2xs^3$. Et per reductionem

$$3x^4 - nx^3 - s^3x + 2s^3m = 0.$$

Si datus esset globus B & quæreretur globus A ea lege ut globi duo post reflexionem convenirent in C, quæstio foret facilior. Nempe in inventa æquatione novissima supponendum esset x dari & s quæri. Qua ratione per debitam reductionem illius æquationis, translatis terminis — $s^3x + s^3n - 2s^3m$ ad æquationis partem contrariam ac divisa utraque parte per $sx - n + m$, emergeret $\frac{3n^4 - nx^3}{sx - n + 2m} = s^3$. Ubi per solam extractionem radicis cubicæ obtinebitur s .

Quod si dato globo utroque quæreretur punctum C in quo post reflexionem ambo in se mutuo impingerent: cum supra fuerit A — B ad 2A ut GC ad $Gg + gC$ ergo invertendo & componendo $3A - B$ erit ad A — B ut $2Gg$ ad distantiam quæsitam GC.

PROB. LII.

Si globi duo *A* & *B* tenui jungantur filo *PQ*, & pendente globo *B* a globo *A*, si demittatur globus *A*, ita ut globus uterque simul sola gravitatis vi in eadem linea perpendiculari *PQ* cadere incipiat; dein globus inferior *B*, postquam a fundo seu plano horizontali *FG* sursum reflectitur, superiori decidenti globo *A* occurrat in puncto quodam *D*: ex data fili longitudine *PQ*, & puncti illius *D* a fundo distantia *DF*, invenire altitudinem *PF*, a qua globus superior *A* ad hunc effectum demitti debet.

TAB. VII.
Fig. 2.

Sit fili *PQ* longitudo *a*. In perpendiculo *PQRF* ab *F* sursum cape *FE* æqualem globi inferioris diametro *QR*, ita ut cum globi illius punctum infimum *R* incidit in fundum ad *F*, punctum ejus supremum *Q* occupet locum *E*; sitque *ED* distantia per quam globus ille, postquam a fundo reflectitur, ascendendo transit antequam globo superiori decidenti occurrat in puncto *D*. Igitur, ob datam puncti *D* a fundo distantiam *DF* globique inferioris diametrum *EF*, dabitur eorum differentia *DE*. Sit ea = *b*. Sitque altitudo quam globus ille inferior, antequam impingit in fundum, cadendo describit, *RF* vel *QE* = *x*, siquidem ea ignoretur. Et invento *x* si eidem addatur *EF* & *PQ* habebitur altitudo *PF*, a qua globus superior ad effectum desideratum demitti debet.

Cum igitur sit *PQ* = *a*, & *QE* = *x*, erit *PE* = *a* + *x*. Aufer *DE* seu *b*, & restabit *PD* = *a* + *x* - *b*. Est autem tempus descensus globi *A* ut radix spatii cadendo descripti seu $\sqrt{a + x - b}$, & tempus descensus globi alterius *B* ut radix spatii cadendo descripti, seu \sqrt{x} , & tempus ascensus ejusdem ut differentia radicis illius & radicis spatii quod cadendo tantum a *Q* ad *D* describeretur (*p*). Nam hæc differentia est ut tempus descensus a *D* ad *E*, quod æquale est tempori ascensus ab *E* ad *D*. Est autem differentia illa $\sqrt{x} - \sqrt{x - b}$. Unde tempus descensus & ascensus conjunctim erit ut $2\sqrt{x} - \sqrt{x - b}$. Quamobrem cum hoc tempus æquetur tempori descensus globi superioris erit $\sqrt{a + x - b} = 2\sqrt{x} - \sqrt{x - b}$ (*q*). Cujus æquationis partibus quadratis habebitur

$$a + x$$

(*p*) Hæc explicantur infra sub signo *q*.

(*q*) Cum vis gravitatis eadem sit in globo ascendente aut descendente, cumque ea deorsum tendat, illa uniformiter retardabit globum ascendentem, ut uniformiter cadentem acceleraverat. Ita ut si globus *B* in *QR* quiescens vi gravitatis cadere concipiatur in *EF*, & inde versus *RQ* repelli eadem profus velocitate quam acquiverat, eodem tempore ascen-

det in primum locum *RQ* ac ex eo descenderat in *EF*, & ipso momento, quo venerit in *RQ*, nullum profus motum habebit; sed tempus descensus puncti *Q* ex *Q* in *E* est ut \sqrt{x} ; ergo tempus ascensus ejusdem erit ut \sqrt{x} ; quare hæc duo tempora simul sumpta ut $2\sqrt{x}$; sed cum punctum *Q* debeat solum venisse in *D*, quando globus *A* item est in *D*, ergo ex tempore ascensus globi *B* demendum est tempus ascensus ex *D* in *Q*, quod est ut $\sqrt{x - b}$;

$a + x - b = 5x - b - 4\sqrt{xx - bx}$, seu $a = 4x - 4\sqrt{xx - bx}$, & ordinata æquatione $4x - a = 4\sqrt{xx - bx}$. Cujus partes iterum quadrando oritur $16xx - 8ax + aa = 16xx - 16bx$, seu $aa = 8ax - 16bx$.

Et divisis omnibus per $8a - 16b$, fiet $\frac{aa}{8a - 16b} = x$. Fac igitur ut $8a - 16b$ ad a ita a ad x , habebitur x seu QE. Q. E. I.

Quod si ex dato QE quæreretur fili longitudo PQ seu a ; eadem æquatio $aa = 8ax - 16bx$ extrahendo affectam radicem quadraticam daret $a = 4x - \sqrt{16xx - 16bx}$ (r). Id est si sumas QY mediam proportionalem inter QD & QE, erit PQ = 4EY. Nam media illa proportionalis erit $\sqrt{x \cdot (x - b)}$, seu $\sqrt{xx - bx}$ quod subductum de x seu QE, relinquit EY, cujus quadruplum est $4x - 4\sqrt{xx - bx}$.

Sin vero ex datis tum QE, seu x , tum fili longitudine PQ, seu a , quæreretur punctum D in quo globus superior in inferiore incidit; puncti illius a dato puncto E distantia DE seu b , e præcedente æquatione $aa = 8ax - 16bx$, eruetur transferendo aa & $16bx$ ad æquationis partes contrarias cum signis mutatis, & omnia dividendo per $16x$. Orietur enim $\frac{8ax - aa}{16x} = b$. Fac igitur ut $16x$, ad $8x - a$ ut a ad b , & habebitur b seu DE.

Hactenus suppositi globos tenui filo connexos simul demitti. Quod si nullo connexi filo diversis temporibus demittantur, ita ut globus superior A verbi gratia prius demissus, descenderit per spatium PT antequam globus alter incipiat cadere, & ex datis distantiis PT, PQ ac DE quærat altitude PF a qua globus superior demitti debet ea lege ut inferiore incidat ad punctum D; sit PQ = a , DE = b , PT = c , & QE = x , & erit PD = $a + x - b$, ut supra. Et tempora quibus globus superior cadendo describat spatia PT ac TD, & globus inferior prius cadendo dein reascendendo describat summam spatiorum QE + ED, erunt ut \sqrt{PT} , $\sqrt{PD} - \sqrt{PT}$, & $2\sqrt{QE} - \sqrt{QD}$ hoc est ut \sqrt{c} , $\sqrt{a + x - b} - \sqrt{c}$, & $2\sqrt{x - b}$. At ultima duo tempora, propterea quod spatia TD, & QE + ED simul describuntur, æqualia sunt. Ergo $\sqrt{a + x - b} - \sqrt{c}$

est igitur tempus descensus ex Q in E, & ascensus ex E in D, ut $2\sqrt{x} - \sqrt{x - b}$; sed globus B debet descendere & ascendere quo tempore globus A venit ex P in D, ergo $\sqrt{x + a - b} = 2\sqrt{x} - \sqrt{x - b}$.

(r) Hic quoque radix habetur ambigua, nam $a = 4x \pm \sqrt{16xx - 16bx}$; quæ ambo sunt positivæ: cur ergo minor eligenda? Responsum nascitur ex re ipsa. Siquidem esse debet $\sqrt{a + x - b} = 2\sqrt{x} - \sqrt{x - b} = \sqrt{5x - b} \pm \sqrt{16xx - 16bx}$: extra hanc radicem, & fac $A = 5x - b$ (Sect. I. Cap. VIII. Art. VL), $B = \sqrt{16xx - 16bx}$; erit

$\frac{A + \sqrt{A^2 - B^2}}{2} = 4x$, quadratum majoris partis radicis, & $\frac{A - \sqrt{A^2 - B^2}}{2} = x - b$ quadratum minoris partis; ergo radices sunt $2\sqrt{x}$ & $\sqrt{x - b}$, hæc signis, quæ prius habebant, iungendæ sunt; ergo sumi debet $a = 4x - \sqrt{16xx - 16bx}$, alioquin haberetur $2\sqrt{x} - \sqrt{x - b} = 2\sqrt{x} + \sqrt{x - b}$, quod est absurdum, nisi cum $x = b$, id est, cum globus B debet ad primum firmum ascendisse, cum inlidit globo A, cadenti, tunc enim $\sqrt{x - b} = 0$, & $2\sqrt{x - 0} = 2\sqrt{x + 0}$: sed tunc statim apparet $a = 4x = 4b$.

$\sqrt{c} = 2\sqrt{x} - \sqrt{x - b}$. Et partibus quadratis $a + c = 2\sqrt{ca - cb + cx}$
 $= 4x - 4\sqrt{xx - bx}$. Pone $a + c = e$, & $a - b = f$, & erit per
 debitam reductionem $4x - e + 2\sqrt{cf + cx} = 4\sqrt{xx - bx}$, & parti-
 bus quadratis $ee - 8ex + 16xx + 4cf + 4cx + (16x - 4c)\sqrt{cf + cx}$
 $= 16xx - 16bx$. Ac deletis utrobique $16xx$ & pro $ee + 4cf$ scripto m
 nec non pro $8e - 16b - 4c$ scripto n , habebitur per debitam reductio-
 nem $(16x - 4c)\sqrt{cf + cx} = nx - m$. Et partibus quadratis $256cfxx$
 $+ 256cx^3 - 128cef x - 128cexx + 16ceef + 16ceex = mxx - 2mxx$
 $+ 2.6cf - 128cef + 16ceef$
 $+ mm$. Et ordinata æquatione $256cx^3 - 128cexx + 16ceex - mm$
 $= 0$. Cujus æquationis constructione dabitur x seu QE , cui si addas da-
 tas distantias PQ , & EF habebitur altitudo PF quam oportuit invenire.

P R O B. L I I I.

*Si globi duo quiescentes superior A, & inferior B diversis tempori-
 bus demittantur; & globus inferior eo temporis momento cadere
 incipiat ubi superior cadendo jam descripsit spatium PT;
 invenire loca α , β quæ globi illi cadentes occupabunt
 ubi eorum intervallum πx dato æquale est.*

TAB. VII.
Fig. 3.

Cum dentur distantie PT , PQ , & πx , dic primam a , secundam b , ter-
 tiam c , & pro $P\pi$ seu spatio quod globus superior, antequam perve-
 nit ad locum quæsitum α , cadendo describit, ponatur x . Jam tempora qui-
 bus globus superior describit spatia PT , $P\pi$, $T\pi$, & inferior spatium Qx ,
 sunt ut \sqrt{PT} , $\sqrt{P\pi}$, $\sqrt{P\pi} - \sqrt{PT}$, & \sqrt{Qx} : quorum temporum po-
 steriora duo, eo quod globi cadendo simul describant spatia $T\pi$ & Qx ,
 sunt æqualia. Unde & $\sqrt{P\pi} - \sqrt{PT}$ æquale erit \sqrt{Qx} . Erat $P\pi = x$,
 & $PT = a$, & ad $P\pi$ addendo πx seu c & a summa auferendo PQ seu b
 habebitur $Qx = x + c - b$. Quamobrem his substitutis fiet $\sqrt{x} - \sqrt{a} =$
 $\sqrt{x + c - b}$. Et æquationis partibus quadratis, oriatur $x + a =$
 $2\sqrt{ax} = x + c - b$. Ac deleto utrobique x , & ordinata æquatione habe-
 bitur $a + b - c = 2\sqrt{ax}$. Et partibus quadratis erit quadratum de $a + b - c$
 æquale $4ax$, & quadratum illud divisum per $4a$ æquale x , seu $4a$ ad
 $a + b - c$ sicut $a + b - c$ ad x . Ex invento autem x seu $P\pi$ datur
 globi superioris decidentis locus quæsitus α . Et per locorum distantiam
 simul datur etiam locus inferioris β .

Et hinc si punctum quæratur ubi globus superior cadendo impinget in
 inferiorem; ponendo distantiam πx nullam esse seu delendo c , dic $4a$ ad
 $a + b$ ut $a + b$ ad x , seu $P\pi$, & punctum π erit quod quæris.

Et vicissim si detur punctum illud π vel x in quo globus superior incidit
 in inferiorem, & quæratur locus T , quem superioris globi decidentis pun-
 ctum imum P tunc occupabat cum globus inferior incipiebat cadere; quom-

niam est $4a$ ad $a + b$ ut $a + b$ ad x , seu ductis extremis & mediis in se $4ax = aa + 2ab + bb$, & per æquationis debitam ordinationem $aa = 4ax - 2ab - bb$; extrahe radicem quadraticam & proveniet $a = 2x - b - 2\sqrt{xx - bx}$ (s). Cape ergo V mediam proportionalem inter $P\pi$ & $Q\pi$, & versus V cape $VT = VQ$, & erit T punctum quod æquis. Nam $V\pi$ erit $= \sqrt{P\pi}$. $Q\pi$ hoc est $= \sqrt{x(x - b)}$ seu $= \sqrt{xx - bx}$, cujus duplum subductum de $2x - b$, seu de $2P\pi - PQ$, hoc est de $PQ + 2Q\pi$, relinquit $PQ - 2VQ$ seu $PV - VQ$, hoc est PT .

Si denique globorum, postquam superior incidit in inferiorem, & impetu in se invicem facto inferior acceleratur, superior retardatur, desiderantur loci ubi inter cadendum distantiam datæ rectæ æqualem acquirent: quærendus erit primo locus ubi superior impingit in inferiorem; dein ex cognitis tum magnitudinibus globorum tum eorum, ubi in se impingunt, celeritatibus, inveniendæ sunt celeritates quas proxime post reflexionem habebunt, idque per modum PROB. XII. Quæst. Arith. Postea quærenda sunt loca summa ad quæ globi celeritatibus hisce si sursum ferantur ascenderent, & inde cognoscentur spatia quæ globi datis temporibus post reflexionem cadendo describent, ut & differentia spatiorum: & vicissim ex assumpta illa differentia, per analysin regredietur ad ipsa spatia cadendo descripta.

TAB. VII.
Fig. 4.

Ut si globus superior incidit in inferiorem ad punctum π , & post reflexionem celeritas superioris deorsum tanta sit, ut si sursum esset, ascendere faceret globum illum per spatium πN , & inferioris celeritas deorsum tanta esset, ut, si sursum esset, ascendere faceret globum illum inferiorem per spatium πM ; tum tempora quibus globus superior vicissim descenderet per spatia $N\pi, NG$, & inferior per spatia $M\pi, MH$, forent ut $\sqrt{N\pi}, \sqrt{NG}, \sqrt{M\pi}, \sqrt{MH}$, adeoque tempora quibus globus superior conficeret spatium πG , & inferior spatium πH , forent ut $\sqrt{NG} - \sqrt{N\pi}$, ad $\sqrt{MH} - \sqrt{M\pi}$. Pone hæc tempora æqualia esse, & erit $\sqrt{NG} - \sqrt{N\pi} = \sqrt{MH} - \sqrt{M\pi}$. Et insuper cum detur distantia GH pone $\pi G + GH = \pi H$. Et harum duarum æquationum reductione solvetur problema. Ut si sit $M\pi = a$, $N\pi = b$, $GH = c$, $\pi G = x$; erit juxta posteriorem æquationem $x + c = \pi H$. Adde $M\pi$ fiet $MH = a + c + x$. Ad πG adde $N\pi$, & fiet $NG = b + x$. Quibus inventis, juxta priorem æquationem erit $\sqrt{b + x} - \sqrt{b} = \sqrt{a + c + x} - \sqrt{a}$. Scribatur e pro $a + c$, & f pro $a - \sqrt{b}$: & æquatio fiet $\sqrt{b + x} = \sqrt{e + x} - \sqrt{f}$. Et partibus quadratis $b + x = e + x + f -$

(s) En rursus radicem ambiguam, in quobis Mercurius noster erit, (ut semper,) consideratio rei ipsius.

Quia hic $e = 0$, debet esse $\sqrt{x} - \sqrt{a} = \sqrt{x - b}$: sed $a = 2x - b = \sqrt{4xx - 4bx}$; ergo quæramus radicem ipsius $2x - b = \sqrt{4xx - 4bx}$, ut videamus quinam sit valor ipsius a . Sit igitur $2x - b = A$ (Sect. I. C. VIII. Art. VI.), $\sqrt{4xx - 4bx} = B$, tunc $\frac{A + \sqrt{A^2 - B^2}}{2}$

$= x$, & $\frac{A - \sqrt{A^2 - B^2}}{2} = x - b$; ergo $\sqrt{a} = \sqrt{x} \pm \sqrt{x - b}$; sed $\sqrt{x} - \sqrt{a} = \sqrt{x - b}$ $\sqrt{x - b} = \sqrt{x} - \sqrt{x} \mp \sqrt{x - b} = 0$ $\mp \sqrt{x - b} = + \sqrt{x - b}$, ergo in excessu \sqrt{x} supra \sqrt{a} sumi debet $+\sqrt{x - b}$; quare $\sqrt{a} = \sqrt{x} - \sqrt{x - b}$ & $a = 2x - b - 2\sqrt{xx - bx}$.

$2\sqrt{(ef+fx)}$, seu $e+f-b=2\sqrt{(ef+fx)}$. Pro $e+f-b$ scribe g , & fiet $g=2\sqrt{(ef+fx)}$, & partibus quadratis $gg=4ef+4fx$, & per reductionem.

$$\frac{gg}{4f}-e=x.$$

PROB. LIV.

Si duo sint globi *A*, *B*, quorum superior *A* ab altitudine *G* decidens, in alterum inferiorem *B* a fundo *H* versus superiora resiliens incidat, & hi globi ita per reflexionem ab invicem denuo recedant, ut globus *A* vi reflexionis illius ad altitudinem priorem *G* redeat, idque eodem tempore quo globus inferior *B* ad fundum *H* revertitur; dein globus *A* rursus decidat, & in globum *B* a fundo resiliens denuo incidat, idque in eodem loco *AB* ubi prius in ipsum incidebat; & sic perpetuo globi ab invicem resiliant rursusque ad eundem locum redeant: ex datis globorum magnitudinibus, positione fundi, & loco *G* a quo globus superior decidit, invenire locum ubi globi in se mutuo impingent. TAB. VII. Fig. 5.

Sit *e* centrum globi *A*, & *f* centrum globi *B*, *d* centrum loci *G* in quo globus superior in maxima est altitudine, *g* centrum loci globi inferioris ubi in fundum impingit, *a* semidiameter globi *A*, *b* semidiameter globi *B*, *c* punctum contactus globorum in se mutuo impingentium, & *H* punctum contactus globi inferioris & fundi. Et celeritas globi *A*, ubi in globum *B* impingit, ea erit quæ generatur casu globi ab altitudine *de*, adeoque est ut *Vde* (*i*). Hac eadem celeritate reflecti debet globus *A* versus superiora, ut ad locum priorem *G* redeat: at globus *B* eadem celeritate deorsum reflecti debet qua ascenderat ut eodem tempore redeat ad fundum quo inde recesserat. Ut autem hæc duo eveniant, globorum motus inter reflectendum æquales esse debent. Motus autem ex globorum celeritatibus & magnitudinibus componuntur, adeoque quod fit ex globi unius mole & celeritate æquale erit ei quod fit ex globi alterius mole & celeritate (*v*). Unde si factum ex unius globi mole & celeritate divi-

(*i*) Nam celeritates acquisite, in motibus uniformiter acceleratis, sunt ut tempora; tempora autem in subduplicata spatiorum peractorum ratione.

(*v*) Etenim (Probl. Arithm. XII. Cas. II.) invenimus velocitatem Corporis *A* post reflexionem = $\frac{aA-aB-2bB}{A+B}$. Hæc debet

esse negativa quidem, sed æqualis velocitati, quam *A* habebat ante reflexionem, nempe æqualis velocitati $-a$; ergo $aA-aB-2bB = -aA-aB$; & (deletis deletis, ac transponendo) $2aA = 2bB$, vel $aA = bB$. Sunt autem $-aA$, bB motus corporum *A* & *B*; ergo &c. Idem invenissemus, si adhibuissemus velocitatem ipsius *B* post reflexionem.

dividatur per molem alterius globi, habebitur celeritas alterius globi proxime ante & post reflexionem, seu sub fine ascensus & initio descensus.

Erit igitur hæc celeritas ut $\frac{AVde}{B}$, seu, cum globi sint ut cubi radiorum,

ut $\frac{a^3Vde}{b^3}$. Ut autem hujus celeritatis quadratum ad quadratum celeritatis

globi A proxime ante reflexionem, ita altitudo ad quam globus B hac celeritate, si occurfu globi A in eum decidentis non impediretur, ascen-

deret, ad altitudinem ed a qua globus A descendit. Hoc est ut $\frac{Aq}{Bj}$ de ad

de seu ut Aq ad Bq vel a^6 ad b^6 ita altitudo illa prior ad x , si modo pro altitudine posteriore ed ponatur x . Ergo hæc altitudo, ad quam nimirum

B, si non impediretur, ascenderet, est $\frac{a^6}{b^6}x$. Sit ea fK . Ad fK adde fg ,

seu $dH—de—ef—gH$, hoc est $p—x$ si modo pro dato $dH—ef—$

gH scribas p , & x pro incognito de & habebitur $Kg = \frac{a^6}{b^6}x + p — x$.

Unde celeritas globi B ubi decidit a K ad fundum, hoc est ubi decidit per spatium Kg , quod centrum ejus inter decidendum describeret, erit ut

$V(\frac{a^6}{b^6}x + p — x)$. At globus ille decidit a loco Bef ad fundum eodem tem-

pore quo globus superior A ascendit a loco Ace ad summam altitudinem d ,

aut vicissim descendit a d ad locum Ace , & proinde cum gravium cadentium celeritates æqualibus temporibus æqualiter augeantur, celeritas globi

B descendendo ad fundum tantum augebitur quanta est celeritas tota quam globus A eodem tempore cadendo a d ad e acquirat vel ascendendo ab e

ad d amittat. Ad celeritatem itaque quam globus B habet in loco Bef , adde celeritatem quam globus A habet in loco Ace , & summa, quæ est ut $Vde +$

$\frac{a^3Vde}{b^3}$, seu $Vx + \frac{a^3}{b^3}Vx$ æquabitur $V(\frac{a^6}{b^6}x + p — x)$. Pro $\frac{a^3 + b^3}{b^3}$ scri-

be $\frac{r}{s}$ & pro $\frac{a^6 — b^6}{b^6}$, $\frac{rr}{ss}$ & æquatio illa fiet $\frac{r}{s}Vx = V(\frac{rr}{ss}x + p)$, &

partibus quadratis $\frac{rr}{ss}x = \frac{rr}{ss}x + p$. Aufer utrobique $\frac{rr}{ss}x$, duc omnia in

ss ac divide per $rr — rs$, & orietur $x = \frac{sp}{rr — rs}$. Quæ quidem æqua-

tio prodiisset simplicior si modo assumpissem $\frac{p}{s}$ pro $\frac{a^3 + b^3}{b^3}$, prodiisset e-

nim $\frac{ss}{p — t} = x$. Unde faciendo ut sit $p — t$ ad s ut s ad x habebitur x

seu ed ; cui si addas ec habebitur dc , & punctum c in quo globi in se mutuo impingent. Q. E. F.

PROB.

P R O B . L V .

Erectis alicubi terrarum tribus baculis ad horizontale planum in ^{TAB. VII.} punctis *A*, *B*, & *C* perpendicularibus, quorum is qui in *A* sit sex ^{FIG. 6.} pedum, qui in *B* octodecim pedum, & qui in *C* octo pedum, existente linea *AB* triginta trium pedum; contingit quodam die extremitatem umbrae baculi *A*, transire per puncta *B* & *C*, baculi autem *B* per *A* & *C*, ac baculi *C* per punctum *A*. Queritur declinatio solis & elevatio poli, siue dies locusque ubi hæc evenerint (*x*)?

Quoniam umbra baculi cujusque descripsit conicam sectionem, sectionem nempe conii radiosi cujus vertex est baculi summitas; fingam *BCDEF*, esse hujusmodi curvam (sive ea sit hyperbola, parabola vel ellipsis) quam umbra baculi *A* eo die descripsit, ponendo *AD*, *AE*, *AF* ejus umbras fuisse cum *BC*, *BA*, *CA* respective fuerunt umbræ baculorum *B* & *C*. Et præterea fingam *PAQ* esse lineam meridionalem sive axem hujus curvæ ad quem demissæ perpendiculares *BM*, *CH*, *DK*, *EN*, & *FL*, sunt ordinatim applicatæ. Has vero ordinatim applicatas indefinite designabo littera *y*, & axis partes interceptas *AM*, *AH*, *AK*, *AN*, & *AL* littera *x*. Fingam denique æquationem $aa \pm bx \pm cxx = yy$, ipsarum *x*, & *y* relationem (i. e. naturam curvæ) designare, assumendo *aa*, *b* & *c* tanquam cognitatas ut ex analysi tandem inveniantur. Ubi incognitas quantitates *x* & *y*, duarum tantum dimensionum posui quia æquatio est ad conicam sectionem; & ipsius *y* dimensiones impares omisi quia ipsa est ordinatim applicata ad axem. Signa autem ipsorum *b* & *c*, quia indeterminata sunt, designavi notula \pm quam indifferenter pro $+$ aut $-$ usurpo, & ejus oppositum \mp pro signo contrario. At signum quadrati *aa* affirmativum posui, quia baculum *A* umbras in adversas plagas (*C* & *F*, *B* & *E*) projicientem concava pars curvæ necessario complectitur, & proinde si ad punctum *A* erigatur perpendiculum *AB*; hoc alicubi occurret curvæ puta in *B*, hoc est, ordinatim applicatum *y*, ubi *x* nullum est, erit reale. Nam inde sequitur quadratum ejus, quod in eo casu est *aa*, affirmativum esse.

Constat itaque quod æquatio hæc fictitia $aa \pm bx \pm cxx = yy$, sicut terminis superfluis non referta sic neque restrictor est quam ut ad omnes hujus problematis condiciones se extendat, hyperbòlam, ellipsin vel parabolam

(*) Hoc problema totidem verbis propositum, & diversimode solutum legitur apud SCHOOTENIUM in additamento ad suos commentarios in CARTESII Geometriam, quem lege.

majorem Astronomiæ cognitionem flagitet, quam qua Tirones plerumque præditi sint; nos autem Tironibus scribamus, nec fieri possit ut omnia scitu necessaria satis breviter & perspicue tradantur, consultus duximus illa non explicata relinquere.

(†) Cum hoc problema, æque ac sequens

lam quamlibet designatura prout ipforum aa , b , c , valores determinabuntur, aut nulli forte reperientur. Quid autem valent, quibusque signis b & c debent affici, & inde quænam sit hæc curva ex sequenti analyti constabit.

Analyseos pars prior.

Cum umbræ sint ut altitudines baculorum erit $BC \cdot AD :: AB \cdot AE$ ($:: 18 \cdot 6.$) $:: 3 \cdot 1$. Item $CA \cdot AF$ ($:: 8 \cdot 6.$) $:: 4 \cdot 3$. Quare nominatis $AM = r$, $MB = s$, $AH = t$, & $HC = v$. Ex similitudine triangulorum AMB , ANE , & AHC , ALF erunt $AN = -\frac{r}{3}$. $NE = -\frac{s}{3}$. $AL = -\frac{3t}{4}$. Et $LF = \frac{3v}{4}$: quarum signa signis ipfarum AM , MB , AH , HC contraria posui quia tendunt ad contrarias plagas respectu puncti A , a quo ducuntur, axisve PQ cui insistant. His autem pro x & y in æquatione fictitia $aa \dot{-} bx \dot{-} cxx = yy$, respectively scriptis,

$$\begin{aligned} r \text{ \& } s \text{ dabunt } aa \dot{-} br \dot{-} crr &= ss. \\ -r \text{ \& } -\frac{s}{3} \text{ dabunt } aa \dot{-} \frac{br}{3} \dot{-} \frac{1}{9}crr &= \frac{1}{9}ss. \\ t \text{ \& } v \text{ dabunt } aa \dot{-} bt \dot{-} ctt &= vv. \\ -\frac{3}{4}t \text{ \& } -\frac{3}{4}v \text{ dabunt } aa \dot{-} \frac{3}{4}bt \dot{-} \frac{9}{16}ctt &= \frac{9}{16}vv. \end{aligned}$$

Jam e prima & secunda harum exterminando ss ut obtineatur r , prodit $\frac{2aa}{\dot{-}b} = r$. Unde patet $\dot{-}b$ esse affirmativum. Item e tertia & quarta exterminando vv ut obtineatur t , prodit $\frac{aa}{3b} = t$. Et scriptis insuper $\frac{2aa}{b}$ pro r in prima, & $\frac{aa}{3b}$ pro t in tertia, oriuntur $3aa \dot{-} \frac{4a^2c}{bb} = ss$, & $\frac{4}{3}aa \dot{-} \frac{a^2c}{9bb} = vv$.

Porro demissa Bl perpendiculari in CH , erit $BC \cdot AD$ ($:: 3 \cdot 1.$) $:: Bl \cdot AK :: Cd \cdot DK$. Quare cum sit Bl ($= AM - AH = r - t$) $= \frac{5aa}{3b}$, erit $AK = \frac{5aa}{9b}$, vel potius $= -\frac{5aa}{9b}$. Item cum sit Cl ($= CH - BM = v - s$) $= v(\frac{4aa}{3} \dot{-} \frac{a^2c}{9bb}) \dot{-} v(3aa \dot{-} \frac{4a^2c}{bb})$, erit DK ($= \frac{1}{3}Cl$) $= v(\frac{4aa}{27} \dot{-} \frac{a^2c}{81bb}) \dot{-} v(\frac{1}{3}aa \dot{-} \frac{4a^2c}{9bb})$. Quibus in æquatione

$aa + bx - cxx = yy$, pro AK, ac DK, five x , & y , respective scriptis, prodit $\frac{4aa}{9} - \frac{2fa^2c}{81bb} = \frac{13}{27} aa - \frac{37aac}{81bb} + 2(\sqrt{\frac{4aa}{27} - \frac{a^2c}{81bb}})(\sqrt{\frac{aa}{3} - \frac{4a^2c}{9bb}})$

Et per reductionem $-bb - 4aac = \pm 2\sqrt{(36b^4 - 51aabb^2c + 4a^2cc^2)}$; & partibus quadratis iterumque reductis, exit $0 = 143b^4 - 196aabb^2c$, five $\frac{-143bb}{196aa} = \pm c$. Unde constat $\pm c$ negativam esse, adeoque æquationem fictitiam $aa + bx - cxx = yy$, hujus esse formæ $aa + bx - cxx = yy$, & ideo curvam, quam designat, ellipsin esse. Ejus vero centrum & axes duo sic eruuntur.

Ponendo $y = 0$, sicut in figuræ verticibus P & Q contingit, habebitur $aa + bx = cxx$, & extracta radice, $x = \frac{b}{2c} \pm \sqrt{\left(\frac{bb}{4cc} + \frac{aa}{c}\right)} = AQ$ vel AP .

Adeoque sumpto $AV = \frac{b}{2c}$, erit V centrum ellipsis, & VQ vel VP $(\sqrt{\frac{bb}{4cc} + \frac{aa}{c}})$ femiaxis maximus. Si porro ipsius AV valor $\frac{b}{2c}$ pro x in æquatione $aa + bx - cxx = yy$ scribatur, fiet $aa + \frac{bb}{4c} = yy$. Quare est $aa + \frac{bb}{4c} = VZq$, hoc est quadrato femiaxis minimi. Denique in valoribus ipsarum AV, VQ, VZ jam inventis, scripto $\frac{143bb}{196aa}$ pro c , exeunt

$\frac{98aa}{143b} = AV$, $\frac{112aa\sqrt{3}}{143b} = VQ$, & $\frac{8a\sqrt{3}}{\sqrt{143}} = VZ$.

Analyseos pars altera.

Supponatur jam baculus puncto A insitens esse AR, & erit RPQ planum meridionale, ac RPZQ conus radiosus cujus vertex est R. Sit insu-
TAB. VII.
Fig. 7.

per TXZ planum secans horizontem in VZ, ut & meridionale planum in TVX, quæ sectio sit ad axem mundi, conive, perpendicularis, & ipsum planum TXZ erit ad eundem axem perpendicularare, & conum secabit in peripheria circuli TZX, quæ ab ejus vertice pari ubique intervallo RX, RZ, RT distabit. Quamobrem si PS ipsi TX parallela ducatur, fiet RS = RP propter æquales RX, RT; nec non SX = XQ propter æquales PV, VQ. Unde est RX vel RZ $(= \frac{RS + RQ}{2}) = \frac{RP + RQ}{2}$. Denique ducatur RV; & cum VZ perpendiculariter insitit plano RPQ, (sectio utique existens planorum eidem perpendiculariter insistentium fiet triangulum RVZ rectangulum ad V.

Dictis jam $RA = d$, $AV = e$, PV vel $VQ = f$, & $VZ = g$, erit
 $AP = f - e$, & $RP = \sqrt{ff - 2ef + ee + dd}$. Item $AQ = f + e$,
 & $RQ = \sqrt{ff + 2ef + ee + dd}$: adeoque RZ ($= \frac{RP + RQ}{2}$)
 $= \frac{\sqrt{ff - 2ef + ee + dd} + \sqrt{ff + 2ef + ee + dd}}{2}$. Cujus quadratum

$\frac{dd + ee + ff}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{f^2 - 2eff + e^2 + 2ddff + 2ddee + d^2}$, est æquale

$(RVq + VZq = RAq + AVq + VZq =) dd + ee + gg$. Jam reductione
 facta est $\sqrt{f^2 - 2eff + e^2 + 2ddff + 2ddee + d^2} = dd + ee - ff + 2gg$,
 & partibus quadratis ac in ordinem redactis, $ddff = ddgg + eegg - ff$
 $+ g^2$, sive $\frac{ddff}{gg} = dd + ee - ff + gg$. Denique 6, $\frac{98aa}{143b}$, $\frac{112aa\sqrt{3}}{143b}$, &

$\frac{8a\sqrt{3}}{143}$ (valoribus ipsorum AR , AV , VQ , & VZ), pro d, e, f , ac g resti-

tutis, oritur $36 - \frac{196a^4}{143bb} + \frac{192aa}{143} = \frac{36 \cdot 14 \cdot 14aa}{143bb}$, & inde per reducti-

onem $\frac{49a^4 + 36 \cdot 49aa}{48aa + 1287} = bb$.

In Fig. 6. est $AMq + MBq = ABq$, hoc est $rr + ss = 33 \cdot 33$. Erat
 autem $r = \frac{2aa}{b}$, & $ss = 3aa - \frac{4a^2c}{bb}$, unde $rr = \frac{4a^2}{bb}$, & (substituto

$\frac{143bb}{196aa}$ pro c) $ss = \frac{4aa}{49}$. Quare $\frac{4a^2}{bb} + \frac{4aa}{49} = 33 \cdot 33$, & inde per reductio-

nem iterum resultat $\frac{4 \cdot 49a^4}{53361 - 4aa} = bb$. Ponendo igitur æqualitatem in-

ter duo bb , & dividendo utramque æquationis per 49, fit

$\frac{a^4 + 36aa}{48aa + 1287} = \frac{4a^4}{53361 - 4aa}$. Cujus partibus in crucem multiplicatis,

ordinatis, ac divisus per 49, exit $4a^4 = 981aa + 39204$ cujus radix aa est

$\frac{981 + \sqrt{1589625}}{8} = 280[2254144$.

Supra inventum fuit $\frac{4 \cdot 49a^4}{53361 - 4aa} = bb$, sive $\frac{14aa}{\sqrt{53361 - 4aa}} = b$. Un-

de AV ($\frac{98aa}{143b}$) est $\frac{7\sqrt{53361 - 4aa}}{143}$, & VP vel VQ ($\frac{112aa\sqrt{3}}{143b}$) est

$\frac{8}{143} \sqrt{160083 - 12aa}$. Hoc est substituendo $280[2254144$ pro aa , ac

terminos in decimales numeros reducendo, $AV = 11[188297$, & VP vel

$VQ = 22[147085$. Adeoque AP ($PV - AV$) $= 10[958788$, & AQ
 $(AV + VQ) 33[335382$.

Deni-

Denique si $\frac{1}{6}$ AR five 1 ponatur radius, erit $\frac{1}{6}$ AQ five 51555897 tangens anguli ARQ 79 gr. 47'. 48", & $\frac{1}{6}$ AP five 11826465 tangens anguli ARP 61 gr. 17'. 57". Quorum angulorum semisumma 70 gr. 32'. 52", est complementum declinationis solis; & semidifferentia 9 gr. 14'. 56", complementum latitudinis loci. Proinde declinatio solis erat 19 gr. 27'. 8", & latitudo loci 80 gr. 45'. 4". Quæ erant inveniendæ.

P R O B. L V I.

E cometæ motu uniformi retilineo per cælum trajicientis locis quatuor observatis, distantiam a terra, motusque determinationem, in hypothese copernicæa colligere.

SI e centro cometæ in locis quatuor observatis, ad planum eclipticæ TAB. VII.
demittantur totidem perpendiculara; sintque A, B, C, D, puncta in Fig. 8.
plano illo in quæ perpendiculara incidunt; per puncta illa agatur recta AD, & hæc secabitur a perpendicularis in eadem ratione cum linea quam cometa motu suo describit, hoc est, ita ut sit AB ad AC ut tempus inter primam & secundam observationem ad tempus inter primam ac tertiam, & AB ad AD ut tempus illud inter primam & secundam observationem ad tempus inter primam & quartam. Ex observationibus itaque dantur rationes linearum AB, AC, AD, ad invicem.

Insuper in eodem eclipticæ plano sit S sol, EH arcus linearum eclipticæ in qua terra movetur, E, F, G, H loca quatuor terræ temporibus observationum, E locus primus, F secundus, G tertius, H quartus. Jungantur AE, BF, CG, DH, & producantur donec tres posteriores priorem fecent in I, K, & L, BF in I, CG in K, DH in L. Et erunt anguli AIB, AKC, ALD differentiæ longitudinum observatarum cometæ; AIB differentia longitudinum loci primi cometæ & secundi; AKC differentia longitudinum loci primi ac tertii; & ALD differentia longitudinum loci primi & quarti. Dantur itaque ex observationibus anguli AIB, AKC, ALD.

Junge SE, SF, EF; & ob data puncta S, E, F, datumque angulum ESF, dabitur angulus SEF. Datur etiam angulus SEA, utpote differentia longitudinis cometæ & solis tempore observationis primæ. Quare si complementum ejus ad duos rectos, nempe angulum SEI, addas angulo SEF, dabitur angulus IEF. Trianguli igitur IEF dantur anguli una cum latere EF, adeoque datur etiam latus IE. Et simili argumento dantur KE & LE. Dantur igitur positione linearum quatuor AI, BI, CK, DL, adeoque problema huc redit, ut lineis quatuor positione datis, quintam inveniamus quæ ab his in data ratione secabitur.

Demissis ad AI perpendicularis BM, CN, DO, ob datum angulum AIB datur ratio BM ad MI. Est & BM ad CN in data ratione BA ad CA, & ob datum angulum CKN datur ratio CN ad KN. Quare datur etiam ratio BM ad KN; & inde ratio quoque BM ad MI — KN, hoc est ad MN + IK. Cape P ad IK ut est AB ad BC, & cum sit MA ad MN in eadem ratione, erit etiam P + MA ad IK + MN in eadem ratione; hoc est in ratione data. Quare datur ratio BM ad P + MA. Et simili argumento si capiatur Q ad IL in ratione AB ad BD, dabitur ratio BM ad Q + MA. Et proinde ratio BM ad ipsorum P + MA & Q + MA differentiam, quoque dabitur. At differentia illa, nempe P — Q vel Q — P, datur. Et proinde dabitur BM. Dato autem BM, simul dantur P + MA, & MI, & inde MA, ME, AE, & angulus EAB.

His inventis, erige ad A lineam plano eclipticæ perpendicularem, quæ sit ad lineam EA ut tangens latitudinis cometæ in observatione prima ad radium, & istius perpendicularis terminus erit locus centri cometæ in observatione prima. Unde datur distantia cometæ a terra tempore illius observationis. Et eodem modo si e puncto B erigatur perpendicularis quæ sit ad lineam BF ut tangens latitudinis cometæ in observatione secunda ad radium, habebitur locus centri cometæ in illa secunda. Et acta linea a loco ad primo ad secundum, ea est in qua cometa per cælum trajicit.

P R G B. L V I I.

Si angulus datus CAD circa punctum angulare A, positione datum, & angulus datus CBD circa punctum angulare B, positione datum, ea lege circumvolvantur ut crura AD, BD ad rectam positione datam EF sese semper interfecent: invenire lineam illam curvam quam reliquorum crurum AC, BC intersectio C describit.

T A B.
V I I I.
Fig. I.

Produc CA ad d ut sit $Ad = AD$, & CB ad δ ut sit $B\delta = BD$. Fac. angulum Ade æqualem angulo ADE, & angulum $B\delta f$ æqualem angulo BDF, & produc AB utrinque donec ea occurrat de & δf in e & f . Produc etiam ed ad G. ut sit $dG = \delta f$, & a puncto C ad lineam AB ipsi ed parallelam age CHI, & ipsi $f\delta$ parallelam CK. Et concipiendo lineas eG , $f\delta$ immobiles manere dum anguli CAD, CBD lege præscripta circa polos A & B volvuntur, semper erit Gd æqualis ipsi $f\delta$, & triangulum CHK dabitur specie (a). Dic itaque $Ae = a$, $eG = b$, $Bf = c$, $AB = m$, $BK = x$, &

(a) Ad pleniorum hujus problematis explanationem, anguli dati certum aliquem situm occupare fingantur, ita ut puncta e , L æque dentur ac puncta A, B: tunc dabuntur eA , AL; LB; Br, ut & anguli ALE, BLF.

& frant anguli $Ale = ALE$, & $Baf = BLF$; & ex e ducantur ch , ck , ipsi el , $f\delta$, parallelæ; eæ dabuntur: sit ergo $ke = \delta$, $ch = e$, $hk = f$.

Sumantur ergo $IA = AL$, ac $\lambda B = BL$;

Jam vero anguli gyrent circa polos A & B, ceteris stantibus; & venerint quocumque eA in.

& CK = y. Et erit BK ad CK ut Bfad fβ. Ergo fβ = $\frac{cy}{x}$ = Gd. Aufer hoc de Gc, & restabit ed = b — $\frac{cy}{x}$. Cum detur specie triangulum CKH, pone CK ad CH ut d ad e; & CH ad HK ut e ad f, & erit CH = $\frac{ey}{d}$, & HK = $\frac{fy}{d}$.

Ade.

in AC, Al in Ad, AL in AD, BL in BD, T. Si primum, rursus aut versus E, aut versus F.

Semper triangulum dAl est æquale ac simile triangulo ADL, ut DBL triangulo DBA.

Cum enim anguli gyrantes dati sint, & semper sibiinet æquales, semper quoque sibiinet æquales erunt anguli quibus si a duobus rectis deficient; ergo angulus dAD = dAL; igitur, demto communi dAD, erit dAl = DAL: sed angulus Al d factus est æqualis angulo ALD: ergo triangula dAl, DAL sunt æqui-angula; atqui latus LA æquat homologam Al, ex constructione: igitur triangula dAl, DAL sunt etiam æqualia. Quare dl = DL.

Sed eodem pacto demonstratur triangulum $\lambda\beta\delta$ æquale triangulo LBD. Proinde $\lambda\delta$ = LD = dl.

Si ergo sumatur IG = fa datae; semper erit dG vel (dl + IG) = fδ vel (fλ + λδ).

Quod si ex C ducantur CH & CK ipsis ch, ck parallelæ; erunt triangula hck, HCK similia.

Hæc sufficiunt quidem ad Auctorem intelligendum: sed viam ad inferius dicenda straturus, denuo rem, nonnullis mutatis, aggredior.

Tab. T. fig. 1. Aut anguli dati sunt æquales aut inæquales. Si primum, licet quemlibet assumere: si secundum, bene sumetur minimus, quem esse pono ad A.

Super AB fiat angulus BAL æqualis dato illi, qui circa A movetur; seu (quod idem est) ponatur alterum ex ejus curribus cadere in AB; alterum crus anguli gyrantis circa B cadet in LB per hypothesim. Jam, bisecta AB in V, demittatur ei ad rectos angulos TV secans EF in T: eidem EF occurret AL, aut extra punctum T, aut in ipso puncto

Jungantur AT, TB: erunt anguli TAB; TBA æquales. Nunc si punctum L est versus E, cadet recta BL intra angulum TBA; erit ergo angulus LBA minor angulo TBA vel TAB; sed hic minor est angulo BAL, per hypothesim, igitur illo minor est angulus LBA. Sed angulus gyrans circa B positus est non minor angulo LAB; quare alterum illius crus cadere debet supra lineam AC: cadat in BM.

Si vero punctum L est versus F, eodem pacto probabitur angulus LBA major angulo LAB; ideo fieri poterit ut alterum anguli circa B gyrantis crus cadat vel supra lineam AB, vel in ipsa, vel intra eam: si cadit supra, res in casum superiorem recidet, & eadem utemur figura: si in ipsa recta AB, quid accidat dispiciemus suo loco: si vero infra, utemur ejus productione BM eademque figura.

Si autem punctum L cadit in T, anguli mobiles aut æquales sunt, aut inæquales. Si primum, alterum crus anguli B cadet in ipsa BA, & de hoc casu postea loquemur. Si inæquales, crus illud cadere debet supra AB, per hypothesim.

Animadvertendum est, quod in his omnibus, nulla positionis rectæ EF ratio habita est; unde fit hæc stare in illius positione quacunque.

Jam super BA ultra A sumatur Ae æqualis datæ AL, & fiat angulus AeN æqualis dato ALE, ponaturque eA = AL = a.

Item super MB ultra B producta capiatur Bg æqualis datæ BL, & fiat angulus Bgf æqualis angulo dato BLF, & exponatur gf per b, ac fB per e; & sumatur eG = gf = b.

Adcoque $AH = m - x - \frac{fy}{d}$. Est autem AH ad HC ut Ae ad ed , hoc est

$m - x - \frac{fy}{d} : y :: a : b - \frac{cy}{x}$. Ergo ducendo media & extrema in se,

fiet $mb - \frac{mcy}{x} = bx + cy - \frac{bf}{d}y + \frac{cfy}{dx} = \frac{aey}{d}$. Duc omnes terminos in dx , eosque in ordinem redige; & fiet $fey - aexy - dcmx - bdx + bdmx = 0$.

Ubi cum incognitæ quantitates x & y , ad duas tantum dimensiones ascendunt, patet curvam lineam quam punctum C describit, esse conicam sectionem.

Pone $\frac{ae + fb - dc}{c} = 2p$, & fiet $yy = \frac{2p}{f}xy + \frac{dm}{f}y + \frac{bd}{fc}xx - \frac{bdm}{fc}x$. Et ex-

tracta radice $y = \frac{p}{f}x + \frac{dm}{2f} \pm \sqrt{\left(\frac{pp}{ff}xx + \frac{bd}{fc}xx + \frac{pdm}{ff}x - \frac{bdm}{fc}x + \frac{ddmm}{4ff}\right)}$.

Unde colligitur curvam hyperbolam esse, si fit $\frac{bd}{fc}$ affirmativum, vel negati-

vum & minus quam $\frac{pp}{ff}$; parabolam, si fit $\frac{bd}{fc}$ negativum & æquale $\frac{pp}{ff}$; ellip-

sin vel circulum, si fit $\frac{bd}{fc}$ & negativum & majus quam $\frac{pp}{ff}$. Q. E. I. (b)

PROB.

Gyrent nunc anguli dati, & eorum latera se interfecerint in recta EF alicubi in D ab L versus F; latus anguli LAB erit in AP, ita ut angulus DAP æquet angulum LAB; quocirca, demto communi DAB, erit LAD æqualis BAP vel eAd, si latus PA producatu doncc occurrat Ne in d. Quod etiam patet, quia angulus LAe æquat DAd; & communi LAd ablato, DAL æqualis est ipsi dAe. Sed anguli LAD, ADL simul sumti sunt æquales externo ALE, & hic, per constructionem, æquat angulum AeN, id est, angulos internos & oppositos eAd, Ade simul; ergo, sublatis æqualibus, DAL, dAe, restat angulus ADL æqualis angulo Ade; &, ob latus eA æquale lateri AL, est latus dA æquale lateri AD, ac ed æquale LD.

Haud aliter latus BM tunc erit in BQ, ita ut angulus LBM æquet angulum DBQ; &, demto communi LBQ, erit angulus LBD æqualis angulo MBQ vel gBd, producta recta QB: quare angulus BDF, qui æquat interiores oppositos DBL, BLD simul, æquabit ipsos gBg, Bgd, vel his parem Bdf; æquales enim

fecimus angulos BLF, Bgf.

Atqui triangula æquiangula BLD, Bgd habent latera LB, Bg æqualia; sunt igitur æqualia, & DB æquat Bd, ac DL ipsam dg: sed recta DL ostensa est æqualis rectæ ed, & facta fuerat eG æqualis fg; superest igitur dG æqualis ipsi fd.

Nunc ex R, ubi FE occurrit eG (productæ, quatenus opus est), duc Rk ipsi fg parallelam, & dic kR = d, Re = e, ek = f.

In ceteris Auctorem sequere.

(b) Si crura AP, BQ datorum angulorum fieri possunt parallela, tunc ordinata in infinitum crevit, id est curva in seipsum non redit; sed in infinitum extenditur; secus vero, si crura illa semper in aliquo puncto concurrant.

Si primum, curva erit hyperbola aut parabola; si secundum, ellipsis aut circulus.

Crura PA, QB parallela erunt, si anguli PAB;

TAB. T.
Fig. 2.

PAB; ABQ simul æquales sint duobus angulis rectis: sed anguli BAD; ADB; DBA simul æquales sunt duobus rectis; ergo est ADB complementum angularum datorum PAD; DBQ simul ad quatuor rectos.

Ut ergo appareat utrum PA, QB esse possint parallela, super AB describatur versus EF arcus capax hujus complementi.

Hic aut fecabit rectam EF, aut eam tanget, aut intactam & intactam infra se relinquet.

Si primum, duo erunt puncta in recta EF, nempe E; F, ubi eam fecat circulus; quæ suppediabant latera parallela. Jam sint anguli in EAP, EBQ; latera vero AP, BQ parallela. Si tantisper moveatur intersectio E, & veniat in e, circulus alicubi fecabit ipsam Be in G. Junge AG, angulus AGB æquabit angulum AEB; est autem exterior AGB major interiore & opposito AεG; ergo angulus AεG minor est angulo AEB: atque ideo anguli eAB, eBA simul sumti majores sunt angulis EAB, EBA simul. Sunt autem anguli eAp, eBq, simul, æquales angulis EAP, EBQ, simul; igitur, demtis hinc minoribus EAB, EBA, inde majoribus eAB, eBA, restant anguli eAB, ABq, simul, minores angulis PAB, ABQ; & hi æquales erant duobus rectis, ergo anguli pAB, ABq minores sunt duobus rectis, quapropter rectæ Ap, Bq alicubi convenient supra rectam AB: conveniant in e.

Jam quia angulus eAB major est angulo EAB, debet reliquus BAρ minor esse reliquo BAP, & recta Ap occurrere rectæ BQ, & ultra eam ferri versus R. Quoniam vero eBA minor est EBA, est reliquus ABq major reliquo ABQ, & recta BQ cadit ultra BQ versus R.

Eodem pacto probabitur quod si intersectio super recta fiat in f, concursus laterum reliquorum fiet ultra lineam AO versus S.

Rursum veniat eadem intersectio in e inter puncta E & F, & circulus occurret ipsi Be, productæ, alicubi in G; & junctis AG, demonstrabitur eodem pacto angulos BAρ, ABq simul majores esse duobus rectis, & latera illa producta occurrere infra rectam AB ultra rectam PAL versus F, & ideo AL totam esse extra curvam.

Item demonstratur de recta MN. Unde conficitur duas rectas sibi non parallelas huic curvæ non occurrere, nisi, singulas in singulis punctis. Notum autem est ex conicis id uni hy-

perbolæ contingere, & quidem quando rectæ illæ sunt asymptotis parallele. Tunc igitur curva est hyperbola.

Isdem vestigiis insitens facile dispicies, quando arcus, ut supra, descriptus, tangit rectam EF, unum esse punctum præbens latera parallela: hæc duo latera curvæ non occurrere, nisi singula in singulis punctis, & rectas omnes alias bis curvam secare: constat ex conicis id uni parabolæ accidere, & quidem quando rectæ illæ sunt diametri. Tunc ergo curva est parabola.

Sed quando arcus rectæ EF non occurrat, nullum est punctum præbens latera parallela; neque curva in infinitum extenditur. Est ergo circulus aut ellipsis.

Ut nunc perspiciam num sectio sit circulus aut ellipsis, noto quod in circulo transeunte per A, B, angulus describens, C, e, debet semper esse idem; quare semper eadem est summa angularum CAB, CBA, & eAB, eBA; ergo & PAB, ABQ, & pAB, ABq; quapropter etiam angulus concursus (si quis sit) est semper idem: sed locus tunc est circuli arcus. Ergo ut describatur circulus, aut PA, BQ debent esse parallele, aut percurrere circuli arcum; ergo in hypothesei nostra sectio semper est ellipsis.

Hinc sequitur quod cum recta EF ipsam AB secat inter A & B, sectio semper est hyperbola.

Si, ceteris stantibus, anguli dati ita mutantur, ut eadem semper sit eorum summa, curvæ species non mutatur; nam semper idem erit angulus ADB: quare arcus illius capax sibi conitabit, & si primo casu rectam EF tetigerit, semper eam tanget, &c.

Cum latus QB cadit super BA, intersectio curvam describens fit in A.

Tunc enim AP sectionem tangit in A; Feratur enim punctum D in d, tunc certe recta PA (producta pro necessitate) cadere debet in pA inter PA & punctum B vel supra vel infra rectam AB, & recta BQ tunc lata in Bq ei occurret inter PA & punctum B; quare curva totam rectam extra se relinquet versus Q.

Data quavis recta QB transeunte per alterum utrum polorum B facile invenitur punctum ubi ea sectioni occurrat. Fiat angulus QBD æqualis dato gyranti in B. Jungatur DA & fiat

Tab. T. Fig. 3.

Tab. T. Fig. 5.

Tab. T. Fig. 4.

Tab. T. Fig. 6.

Tab. U. Fig. 1.

PROB. LVIII.

Parabolam describere quæ per data quatuor puncta transibit.

TAB. VIII.
Fig. 2.

Sint puncta illa data A, B, C, D. Junge AB & eam biseca in E. Et per E age rectam aliquam VE, quam concipe diametrum esse parabolæ, puncto V existente vertice ejus. Junge AC ipsique AB parallelam age DG occurrentem AC in G. Dic $AB = a$, $AC = b$, $AG = c$, $GD = d$. In AC cape AP cujusvis longitudinis & a Page PQ parallelam AB, & concipiendo Q punctum esse parabolæ; dic $AP = x$, $PQ = y$, & æquationem quamvis ad parabolam assûme quæ relationem inter AP & PQ exprimat. Ut quod sit $y = e + fx \pm \sqrt{gg} + bx$.

Jam si ponatur AP sive $x = 0$, puncto P incidente in ipsum A, fiet PQ sive $y = 0$, ut $e = -AB$. Scribendo autem in æquatione assumpta 0 pro x, fiet $y = e \pm \sqrt{gg}$, hoc est $= e \pm g$. Quorum valorum ipsius y major $e + g$ est = 0, minor $e - g = -AB$ sive $-a$ (c). Ergo $e = -g$ & $e - g$, hoc est $-2g = -a$, sive $g = \frac{1}{2}a$. Atque adeo vice æquationis assumptæ habebitur hæc $y = -\frac{1}{2}a + fx \pm \sqrt{\frac{1}{4}aa + bx}$.

Adhæc

fiat angulus DAP æqualis alteri ex datis. Rectæ AP alicubi occurrit rectæ BQ in P, quod erit punctum quæsitum.

Ex his facillime describuntur sectiones hoc problemate quæsitæ.

TAB. U.
Fig. 2.

Sit enim AP sectionis tangens in A, cui parallela sit BQ. Inveniatur punctum Q, ubi hæc sectioni occurrerit. Recta BQ bisecetur in G. Erit AG diameter; id sufficit pro parabola.

Sed pro aliis sectionibus, quære in AG punctum H, ubi AG curvæ occurrit & describe sectionem.

Nota quod in ellipsi erit AH major quam AG; secus vero in hyperbola.

TAB. U.
Fig. 3.

Cum recta EF transit per alterutrum polorum B, recta describitur.

Siquidem, quia dato:um angulorum crura concurrere debent in recta EF, punctum aliquod ex crure anguli QBE semper esse debet in recta FE; sed alterum ex his punctis (nempe punctum B) est in eadem recta; ergo totum crus illius anguli cum recta FE coincidit: quare alterum BQ jacet immobile; igitur in-

tersectio Q anguli mobilis EAQ semper fit in recta QB, quæ hoc motu describitur.

Veniamus tandem ad alteram hypothefim.

Nunc igitur ambo anguli simul cadere ponuntur in AB: sint ii BAL, LBA.

TAB. U.
Fig. 4.

Quia hic ambo crura super eandem rectam cadunt; sumatur $eA = AL = a$, & $fB = BL = c$, & fiant anguli $NcA = ALE$, ac $MfB = BLF$; & quia punctum g cadit inf, erit b (distantia horum punctorum) = 0.

Igitur ex superiore æquatione delcantur termini, ubi est b ; & erit

$fey - \frac{dc}{ae} xy - dem = 0$, & cunctis divisivis per y, $fey - \frac{dc}{ae} x - dem = 0$, æquatio ad rectam,

(c) Quando $x = 0$, habet y ex æquatione duos valores $e + g$, $e - g$, & ex consideratione figuræ duos alios 0 & $-a$; hi duo valores debent esse æquales singuli singulis, igitur, pone, ut libet, vel $e + g = 0$ vel $e - g = 0$. Si primum, quid inde fiat videt apud Auctorem. Si secundum, erit ergo $e + g = -a$; sed quoniam

Adhæc si ponatur AP five $x = AC$ ita ut punctum P incidat in C, fiet iterum $PQ = 0$. Pro x igitur in æquatione novissima scribe AC five b , & pro y , 0, & fiet $0 = -\frac{1}{2}a + fb + \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa + bb\right)}$ (d), five $\frac{1}{2}a - fb =$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}aa + bb\right)}; \text{ \& partibus quadratis, } -afb + ffb = bb. \text{ Sive } ffb - fa = b.$$

Atque ita vice assumptæ æquationis habebitur isthæc $y = -\frac{1}{2}a + fx \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa + ffbx - fax\right)}$.

Insuper si ponatur AP five $x = AG$ five e , fiet PQ five $y = -GD$ five $-d$ (e). Quare pro x & y in æquatione novissima scribe e & $-d$, & fiet $-d = -\frac{1}{2}a + fe - \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa + ffb e - fae\right)}$. Sive $\frac{1}{2}a - d - fe =$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}aa + ffb e - fae\right)}. \text{ Et partibus quadratis, } -ad - fae + dd + 2dfe$$

$$+ ecf = ffb e - fae. \text{ Et æquatione ordinata \& reducta, } ff = \frac{2d}{b-e}f + \frac{dd - ad}{bc - ce}.$$

Pro $b - c$ hoc est pro GC scribe k , & æquatio illa fiet $ff = \frac{2d}{k}f$

$$+ \frac{dd - ad}{kc}. \text{ Et extracta radice } f = \frac{d}{k} + \sqrt{\left(\frac{ddc + ddk - adk}{kkc}\right)}. \text{ (f) In-}$$

vento

niam $e - g = 0$, est $e = g$, ergo $2g = e + g = -a$, & $g = \frac{1}{2}a = e$, unde oritur eadem æquationis assumptæ mutatio.

(d) Ponit Newtonus signum positivum quantitati radicali, quia jam finxerat radicem majorem æqualem nihilo, & in eadem hypothefi semper est manendum. Siquis autem finxisset minorem radicem, in superiori collatione, æqualem nihilo, affigere nunc deberet quantitati radicali signum negativum & idem inveniret.

(e) Est quidem etiam $y = +Gg$: sed quoniam hoc non conducit ad definiendum valorem ipsius f , ideo negligitur.

(f) Duc AF ipsi BD parallelam & æqualem, & CH parallelam FA; & habebis AG (e). GF ($GD - DF = GD - BA = d - a$)

$$:: CG (k). GH = \frac{dk - ak}{c}, \text{ \& proinde}$$

$$HD = \frac{cd + dk - ak}{c}, \text{ igitur si fiat } GD (d).$$

Tom. I.

$$DK :: DK.DH, \text{ erit } DK = \sqrt{\left(\frac{cdd + ddk - adk}{c}\right)};$$

est autem $fk = d \pm \sqrt{\left(\frac{cdd + ddk - adk}{c}\right)}$, atque ideo æquat aut GD + DK (id est, 2GD + GK) aut DG - DK (hoc est, -GK). Pone $GK = n$; & erit fk , vel æqualis $2d + n$, vel $-n$: unde æquatio ad parabolam evadet,

$$\text{vel } y = -\frac{a}{2} + \frac{2dx + nx}{k} \pm$$

$$\sqrt{\left(\frac{aa}{4} + \frac{4b dx + 4bdnx + bnnx}{kk} - \frac{2adx - anx}{k}\right)}$$

$$\text{vel } y = -\frac{a}{2} - \frac{nx}{k} \pm \sqrt{\left(\frac{aa}{4} + \frac{bnnx}{kk} + \frac{anx}{k}\right)};$$

quæ cum diversæ sint, indicant parabolas duas problemati satisfacere.

Primam ut construas, pone MD æqualem DG. Ex K age KL parallelam & æqualem datæ CG. Junge ML, cui parallelam duc EI occurrentem MK productæ in I. Cetera, ut in Auctore. Secundæ autem constructionem dat Auctor ipse. TAB. U.
Fig. 41

Pp

vento autem f , æquatio ad parabolam, id est $y = -\frac{1}{2}a + fx + \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa + ffbx - fax\right)}$, plene determinatur: cujus itaque constructione parabola etiam determinabitur. Constructio autem ejus hujusmodi est. Ipsi BD parallelam age CH occurrentem DG in H. Inter DG ac DH cape mediam proportionalem DK, & ipsi CK parallelam age EI bisequantem AB in E, & occurrentem DG in I. Dein produc IE ad V, ut sit EV. EI :: EBq. DIq — EBq, & erit V vertex (g), VE diameter, & $\frac{BEq}{VE}$ latus rectum parabolæ quæsitæ. (*b*)

PROB.

(*g*) Est enim VI ad VE ut quadratum DI ad quadratum BE, & dividendo, &c.

TAB. U. Fig. 5. 6. Verticem autem sic expedite invenies. Super DI diametro describe semicirculum ILD, cui inscribe chordam DN æqualem BE, junge IN, & ex N demitte NR ad rectos angulos supra DI. Junge RE, & age parallelam DV. Dico factum.

Est enim VI ad VE ut DI ad DR ut quadratum ID ad quadratum DN vel EB.

(*b*) Quia nempe rectangulum lateris recti in abscissam æquat quadratum ordinatæ.

Una autem erit parabola quæsito respondens, cum unus erit valor ipsius f ; nempe cum aut nulla erit horum valorum differentia

$$2\sqrt{\frac{edd + ddk - adk}{ckk}}, \text{ aut cum } f \text{ evanescit.}$$

Si primum; fiet $ed + dk = ak$, vel $c + k$ ($AG + GC = b$). $k(GC = b - c) :: a(AB, d(GD), \text{ aut } CA. AB :: CG. GD, \text{ quod, quoniam anguli } CAB, CGD \text{ sunt æquales})$ fieri nequit, nisi quando puncta B, D, C sunt in eadem recta; tunc autem res erit semper impossibilis, quia parabola rectæ occurrere nequit in tribus punctis. Oportet ergo ut valor ipsius f sit nullus, id est, ut $\frac{d}{k} = \frac{a}{c}$

$$\sqrt{\frac{edd + ddk - adk}{ckk}}, \text{ aut } \frac{dd}{kk} = \frac{edd + ddk - adk}{ckk},$$

& denique $a = d$, sive rectæ AC, BD parallelæ.

Hæc eleganter quidem Newtonus: sed facile poterat hoc per præcedens problema solvi.

TAB. U. Fig. 7. Jungantur tria quævis puncta B, A, C; e quarto D fiant anguli DBM = CBA, &

DAP = CAB. Super chorda AB describatur arcus capax complementi datorum angulorum ad quatuor rectos, ad quem ex P ducantur tangentes EP, PF. Jam demonstratum est angulos hos descripturos parabolam, quæ transibit per D, B, A tria ex datis punctis, ut & per quartum C, cum latera AB, BD venient ambo in ABK.

Eodem pacto invenietur ellipsis & hyperbola transiens per data quatuor puncta.

Ellipsis, quidem, ducta ex P aliqua Pe extra circumulum.

Hyperbola vero, ducta aliqua Pe secante circumulum. Et quia infinitæ Pe, Pe duci possunt, liquet quod infinitæ ellipses aut hyperbolæ problemati satisfaciunt.

Idem Analysis Geometrica.

Putata factum, & data quatuor puncta C, A, TAB. X. B, D. Sit parabola per illa transiens AOV D: Fig. 1. ita junge bina puncta ut rectæ jungentes AD, CB alicubi se intersectent in G; & sint VI diameter pertinens ad ordinatam AD & LM diameter pertinens ad ordinatam BC. Hæc duæ diametri sunt parallelæ. Per L agatur recta LE parabolam tangens; hæc erit parallela ipsi BC, & occurret IV productæ alicubi in E. Ex L demitte LK parallelam ipsi AD. Pariter per V age VF tangentem parabolæ & occurrentem ML productæ in F; & per V duc VN parallelam BC. Hæc duæ tangentens alicubi, in H, se decussabunt. Quia E LNV, VFLK sunt parallelogramma, æquales sunt EV, LN, & VK, FL; sed KV æquat BV, ergo etiam FL & LN; & FH æquat HV, ac EH, HL. Est autem quadratum LK vel VF æquale rectangulo ex VK in ejus latus rectum π , & quadratum VN vel EL rectangulo

gulo ex LN in ejus latus rectum π ; ergo hæc duo quadrata, vel quadrata VH, HE, sunt ut π & π . Jam ex G age GO diametrum five parallelam VI, & OP ordinatam; erit quadratum OP par rectangulo PV in π , & quadratum AI par rectangulo IV in π , ac excessus hujus quadrati supra illud, nempe rectangulum AGD, æquale excessui rectangulorum, id est, rectangulo ex PI, seu OG, in π . Eadem ratione, acta per O parallela ipsi CB, demonstrabitur rectangulum BGC æquale rectangulo OG in π . Igitur hæc duo rectangula sunt ut π & π , seu, ut quadrata VH, HE; vel, acta AQ diametro, ut quadratum AG ad GQ quadratum. Dantur autem rectangula AGD, BGC; datur itaque eorum ratio (Dat. 1.) id est, quadratorum AG, GQ. Ad datur recta AG, ergo etiam GO (Dat. 2.), & datum est punctum G in recta BC positione data; datur ideo etiam punctum Q, & recta AQ datur positione ut omnes ei parallelae: quapropter duc BR ipsi AQ parallelam & datam positione ac magnitudine: biseca datam AD in I; magnitudine quoque dabuntur AR, RD, AI. Est autem, ex demonstratis, rectangulum ARD ad quadratum AI ut BR ad VI; igitur datur VI magnitudine. Quære tertiam post VI, IA, quæ erit latus rectum π . & per V verticem, latere recto π , diametrum VI describe parabolam, quæ transibit per quatuor assignata puncta.

Demonstrationem facile invenies, analyseos vestigia retro legens.

Notandum quod punctum Q sumi potest versus B, & tunc fuisent duæ parabolæ proposito servientes.

Determinatio.

Sed si alterutrum ex punctis Q, puta Q¹, caderet in C, una esset parabola solvens problema; illa nempe, cujus diameter est AQ¹; nam illa, cujus diameter est AQ¹; evanescit, quia tunc diameter occurrere debet parabolæ in duobus punctis A, C, quod est absurdum. Tunc autem iterum parallelæ essent AC, BD. Igitur si & alterum punctum Q caderet in alterum ex datis punctis, problema eûet impossibile.

Alter.

Factum sit, & jungantur data quatuor puncta C, A, B, D, duabus rectis alicubi convenientibus in G, aut extra, aut intra parabolam. Per A ducatur AH parallela ipsi BD,

ac per puncta A, C, H, diametri AE, CF, HK.

Patet quod si daretur punctum F, problema esset solutum; tunc enim daretur positione & magnitudine recta CF; quare & diametri parabolæ darentur positione; & quia recta BD datur magnitudine, datur etiam punctum I eam bisecans, quapropter positione datur diameter IV, sed etiam magnitudine; quoniam rectangulum (quod tunc datum esset) DFB ad quadratum datum DI, ut data recta FC ad IV. Daretur ergo parabolæ vertex & diameter, sed & latus rectum; est enim tertia post duas datas VI, ID. Superest igitur investigandum punctum F.

Jam rectangulum BED' est ad rectangulum BED ut CF ad AE, vel ut FG ad GE. Sed rectangulum BFD una cum quadrato IF æquat quadratum ID, nempe rectangulum BKD una cum quadrato KI; & quadratum KI par est rectangulo EFK & quadrato IF simul; igitur, demto hinc inde communium, rectangulum BFD æquat rectangula EFK & BKD, vel BED (sunt enim æquales BI, ID, & EI, IK.) Igitur rectangula BED & EFK, simul, ad rectangulum BED ut FG ad GE, & BED ac EFK simul ad EFK ut GF ad FE ut GFK ad EFK; sunt igitur æqualia rectangula BED ac EFK simul, seu BFD, & GFK; quare GF ad FB ut DF ad FK, atque FG ad GB ut FD ad DK vel BE: igitur (addendo antecedentes antecedentibus, & consequentes consequentibus) DG ad GE ut FG ad GB, & rectangulum DGB æquat rectangulum EGF. Datur autem rectangulum DGB; quo circa & rectangulum EGF datur magnitudine: sed EG ad GF eandem habet rationem ac data AG ad datam GC; ideoque rectangulum EGF specie datur, & latera EG, GF: dantur magnitudine (dat. 55.); quare, cum datur punctum G & recta GD positione, dantur puncta E & F. Quod inveniendum supererat.

Compositio fiet describendo rectangulum æquale dato BGD & simile dato AGC per 25. VI. Elem. & sumendo GE, GF æqualia lateribus rectanguli sic descripti.

Quia vero e G versus D & versus partes contra-
 trias sumi possunt GE & GF; duæ sunt parabolæ
 proposito satisfaciens; nisi cum alterum punctum
 F cadit in D; quod si accideret, esset rectangulum
 DGB æquale rectangulo DGE, ergo GE
 = GB: factum autem est rectangulum FGE, id
 est, nunc DGB, simile rectangulo, CAG; igitur DG
 P p 2

TAB. X.
Fig. 2.

TAB. X.
Fig. 3. 4.

TAB. X.
Fig. 5.

TAB. X.
Fig. 6. 7.

PROB. LIX.

Conicam sectionem per data quinque puncta describere.

TAB. VII
Fig. 3.

Sint puncta ista A, B, C, D, E. Junge AC, BE se mutuo secantes in H. Age DI parallelam BE, & occurrentem AC in I. Item EK parallelam AC, & occurrentem DI productæ in K. Produc ID ad F, & EK ad G; ut sit AHC ad BHE :: AIC ad FID :: EKG ad FKD, & erunt puncta F ac G in conica sectione, ut notum est (i). Hoc tamen observare debebis, quod si punctum H cadit inter puncta omnia A, C & B, E, vel extra ea omnia, punctum I cadere debebit vel inter puncta omnia A, C & F, D, vel extra ea omnia; & punctum K inter omnia D, F & E, G, vel extra ea omnia. At si punctum H cadit inter duo puncta A, C, & extra alia duo B, E, vel inter illa duo B, E, & extra altera duo A, C, debebit punctum I cadere inter duo punctorum A, C & F, D, & extra alia duo eorum; & similiter punctum K debebit cadere inter duo punctorum D, F & E, G, & extra alia duo eorum; id quod fiet capiendo IF, KG, ad hanc vel illam partem punctorum I, K, pro exigentia problematis. Inventis punctis F ac G, biseca AC, EG in N & O; item BE, FD in L & M. Junge NO, LM se mutuo secantes in R; & erunt LM & NO diametri conicæ sectionis, R centrum ejus, & BL, FM ordinatim applicatæ ad diametrum DM (k). Produc LM hinc inde si opus est ad P & Q ita ut sit BLq. FMq :: PLQ. PMQ, & erunt P & Q vertices conicæ sectionis & PQ latus transversum. Fac PLQ. LBq :: PQ. T. Et erit T latus rectum. Quibus cognitis cognoscitur figura.

Restat tantum ut doceamus quomodo LM hinc inde producenda sit ad P & Q ita ut fiat BLq. FMq :: PLQ. PMQ. Nempe PLQ sive PL. LQ est (PR — LR) (PR + LR), nam PL est PR — LR, & LQ est RQ + LR seu PR + LR. Porro (PR — LR) (PR + LR) multiplicando fit PRq.

ad IC ut EG ad GA; & CD, AB rursus sunt parallelæ, & parabola satisfaciens problemati ea esset, cujus diameter bisecaret ordinatas AB, CD, &c.

(j) Puncta F ac G sic inveniri possunt.

Per tria data puncta A, B, C, transeat circulus ABCR. Est AH.HC = BH.HR; quare AH.HC ad BH.HE :: RH ad HE, quod debet esse :: AL.IC ad DI. IF :: $\frac{AL.IC}{DI}$ ad IF; ergo

inveni IS = $\frac{AI.IC}{DI}$ (junctis DC, & ducta AS ipsi DC parallela) & junge RI, RS, atque huic parallelam duc VF; & erit punctum F quaesitum, quia RH ad HE :: RI ad IV :: SI ad IF, restat faciendum :: KG ad $\frac{FK.KD}{EK}$; quod

eadem pacto facile fiet.

Auctoris vero monitum pendet a proposito solutio innititur.

(k) Nam EB & FD ut & EG; AI; sunt ordinatæ parallelæ, quæ a diametris bisecari debent. Omnes autem diametri aut sunt parallelæ aut per centrum transeunt. Unde intersectio duarum diametrorum licet non conjugatarum exhibet centrum. Si ML, ON parallelæ sint, sectio erit parabola cujus vertex V, & parameter invenietur ut in Probl. superiori.

Si hæ diametri se decussant, sectio erit hyperbola aut ellipsis.

TAB. X
Fig. 8.

$PRq - LRq$. Et ad eundem modum PMQ est $(PR + RM)(PR - RM)$, seu $PRq - RMq$. Ergo $BLq \cdot FMq :: PRq - LRq \cdot PRq - RMq$, & dividendo $BLq - FMq \cdot FMq :: RMq - LRq \cdot PRq - RMq$. Quamobrem cum dentur $BLq - FMq$, FMq , & $RMq - LRq$ dabitur $PRq - RMq$. Adde datum RMq , & dabitur summa PRq , adeoque & latus ejus PR (l), cui QR æqualis est.

(l) Recta autem PR invenitur more solito per circulos & rectas.

TAB. Y.
Fig. 1.

Ex. gr. diametro BL describatur semicirculus BLM , sit chorda $Lm = FM$. Erit $Bm^2 = BL^2 - FM^2$; fiat $Lm = mQ$. Sit $BT = RM$; describatur alter semicirculus BTX ; & sit chorda $TX = LR$; & erit $XB^2 = RM^2 - LR^2$. Jungatur mX ; cui parallelam ducatur QZ ; & habebitur $Bm (\sqrt{BL^2 - FM^2}) \cdot mQ (FM) :: BX (\sqrt{RM^2 - LR^2}) \cdot XZ$, quæ proinde æquabit $\sqrt{PR^2 - RM^2}$. Sume $XY = RM$, & erit $ZY = PR$. Eodem pacto invenitur altera sectionis diameter.

Cum duæ diametri datæ sint magnitudine & positione, patet quod una tantum sectio problemati satisfaciatur.

Poterant aliter inveniri puncta P & Q . Sed opus est his duobus lemmatibus.

TAB. Y.
Fig. 2.

Si inter duas parallelas AB , CD incidat quomodocumque recta OF , a cujus punctis duobus quibusvis agantur alie rectæ EH , LI , parallelis occurrentes in P & K , erit rectangulum ENL ad rectangulum LME ut HNK rectangulum ad rectangulum PMI .

Nam ratio rectanguli ENL ad rectangulum EML componitur ex ratione NE ad EM & EL ad LM . Sed ratio NE ad EM eadem est ac ratio NH ad MP ; ratio autem NL ad LM eadem est ac ratio NK ad MI ; & ex rationibus NH ad NK , ac PM ad MI componitur ratio rectangulorum HNK , GML &c.

TAB. Y.
Fig. 3.

Si datum sit rectangulum utrumque ACB , ADB , & data puncta C , D , invenire puncta A , B .

Rectangulo ACB æquale fiat rectangulum DCE ; quod quoniam datum est magnitudine & datum est latus DC , dabitur latus CE & punctum E . Erit autem BC ad CD ut EC ad CA : sed BC major est CD , ex hypoth. ergo CE major est CA ; quare dividendo CB ad BD ut CE ad EA .

Item rectangulo ADB fiat æquale CDF , &

datum erit punctum F . Sed est CD ad DB ut AD ad DF ; ergo etiam CB ad BD ut AF ad FD . Atqui demonstratum est, ut CB ad BD ita etiam CE ad EA : igitur AF ad FD ut CE ad EA , & rectangulum FAE æquat rectangulum ex FD in CE ; sed hoc datur, & illud applicatum est rectæ datæ FE , ita ut deficiat quadrato; datur ergo recta EA & punctum A . Jam dabitur rectangulum ACB & datur latus unum AC , ergo & alterum CB .

Compositio manifesta est.

Nunc ex A duc AS parallelam diametro TAB. Y. jam descriptæ PQ ; & in ea determina pun- Fig. 4. ctum S ad sectionem. Junge FC occurrentem AS in T , & PQ in M , ac CS occurrentem PQ in K ; & per data puncta F , K , age rectam FA occurrentem PQ in V . Et quoniam inter duas parallelas AS , PQ incidit recta FC , a qua ductæ duæ parallelis occurrentes FV , CS ; erunt rectangula FMC , FTC ut rectangula KMV , STA . Sed quia puncta A , F , S , Q , C , P , sunt ad sectionem conicam, & AS , PQ parallelæ, rectangula eadem FMC , FTC sunt ut rectangula QMP , STA . Igitur æqualia sunt KMV , QMP ; hoc autem datum est, ergo & illud magnitudine datur.

Eodem modo per A & E age rectam AE occurrentem PQ in β , & per B & S rectam BS occurrentem PQ in γ , & demonstrabis rectangulum QLP æquale $\beta L \gamma$, & hoc datum est, ergo & illud; dantur autem duo puncta M & L ; ergo, per lemma II, dantur etiam puncta Q & P . Qued E. I.

Item poterat hoc problema solvi per TAB. Y. Probl. LVII. Junctis enim tribus quibusvis Fig. 5. punctis A , E , C ut & A , B , E , ac A , D , E ; fac angulum $BAF = DAG =$ dato CAE ; item angulum $BEF = DEH =$ dato CEA . Produce HE in G , donec ipsi AG occurrat: duc rectam GF occurrentem ipsi AE in M ; anguli dati MAC , MEC gyrantes circa polos A , E & per rectam GM circumducti describunt conicam sectionem per data quinque puncta transeuntem, ut liquet.

PROB. LX.

*Conicam sectionem describere quæ transibit per quatuor data puncta,
& in uno istorum punctorum continget rectam positione datam.*

TAB. VIII. Fig. 4. Sint puncta quatuor data A, B, C, D, & recta positione data AE, quam conica sectio contingat in puncto A. Junge duo quævis puncta D, C, & DC, producta si opus est, occurrat tangenti in E. Per quartum punctum B ipsi DC age parallelam BF, quæ occurrat eidem tangenti in F. Item tangenti parallelam age DI, quæ occurrat ipsi BF in I. In FB, DI, si opus est productis, cape FG, HI ejus longitudinis ut sit AEq. CED :: AFq. BFG :: DIH. BIG. Et erunt puncta G & H in conica sectione, ut notum est: si modo capias FG, IH ad legitimas partes punctorum F & I, juxta regulam in superiore problemate traditam. Bifeca BG, DC, DH in K, L & M. Junge KL, AM se mutuo secantes in O, & erit O centrum, A vertex, & HM ordinatim applicata ad semidiametrum AO. Quibus cognitis cognoscitur figura (m).

PROB. LXI.

*Conicam sectionem describere quæ transibit per tria data puncta,
& in duobus istorum punctorum continget rectas positione datas.*

TAB. VIII. Fig. 5. Sint puncta illa data A, B, C, tangentes AD, BD ad puncta A & B, D communis intersectio tangentium. Bifeca AB in E. Age DE, & produc eam donec in F occurrat CF aëtax parallela AB: & erit DF diameter, & AE, CF ordinatim applicatae ad diametrum. Produc DF ad O, & in DO cape OV mediam proportionalem inter DO & EO ea lege ut sit etiam AEq. CFq :: VE (VO + OE) . VF (VO + OF); & erit V vertex, & O centrum figuræ. Quibus cognitis figura simul cognoscitur. Est autem VE = VO — OE, adeoque VE (VO + OE) = (VO — OE) (VO + OE) = VOq — OEq. Præterea, quia VO media proportionalis est inter DO & EO, erit VOq = DOE, adeoque VOq — OEq = DOE — OEq = DEO. Et simili argumento erit VF (VO + OF) = VOq — OFq = DOE — OFq :: DEO . DOE — OFq. Est OFq = EOq — 2FEO + FEq (n). Adeoque DOE — OFq = DOE

TAB. Y. Fig. 6. (m) Nulla hic est difficultas; sed interim per Probl. LVII. hoc solvam. Junge DC, CB, donec rectæ DC, CB occurrant datis FA, AG in F & G; per quæ puncta duc rectam indefinitam FG, quacum perpetuo concurrant recta GB & crus anguli GAB; sic describitur sectio conica transiens per puncta B, A, D, C & rectam AE tangens in A.

(n) Est enim EO divisa in F; ergo EO

quadratum æquale quadratis EF, FO una cum bis rectangulo EFO; igitur OF quadratum æquat excessum quadrati EO supra quadratum EF cum bis rectangulo EFO; sed bis rectangulum EFO una cum bis quadrato EF æquat bis rectangulum OEF; igitur quadratum OF æquat excessum quadratorum OE, EF supra bis rectangulum OEF, aut OFq = OEq + EFq — 2OEF.

$$DOE - OEq + 2FEO - FEq = DEO + 2FEO - FEq. \text{ Et } AEq. \\ CFq :: DEO . DEO + 2FEO - FEq :: DE . DE + 2FE - \frac{FEq}{EO}$$

Datur ergo $DE + 2FE - \frac{FEq}{EO}$. Aufer hoc de dato $DE + 2FE$, & resta-

bit $\frac{FEq}{EO}$ datum. Sit illud N ; & erit $\frac{FEq}{N} = EO$, adeoque dabitur EO .

Dato autem EO simul datur VO medium proportionale inter DO & EO .

Hoc modo per theorematum quædam Apollonii (o) satis expedite resolvuntur hæc problemata: quæ tamen sine istis theorematibus per Algebram solam resolvî possent. Ut si proponatur primum trium novissimorum problematum; sint puncta quinque data A, B, C, D, E , per quæ conica sectio transire debet. Junge duo quævis AC , & alia duo BE rectis se secantibus in H . Ipsi BE parallèlam age DI occurrentem AC in I ; & aliam quamvis rectam KL occurrentem AC in K , & conicæ sectioni in L . Et finge conicam sectionem datam esse, ita ut cognito puncto K simul cognoscatur punctum L . Et posito $AC = x$, & $KL = y$, ad exprimendam relationem inter x & y , assume quamvis æquationem quæ conicis

TAB. VIII. Fig. 6.

(o) Quoniam Apollonii theorematibus uti vult Auctor, multo facilius poterat centrum inveniri. Per datum punctum C duc ipsi AD parallelam CG , quæ occurrat DB in G , & sectioni in I ; erit igitur per demonstrata in conicis, rectangulum CGI ad quadratum GB ut quadratum AD ad quadratum DB ; dantur autem tria hæc quadrata, & insuper recta CG ; datur ergo recta GI , & punctum I . Quapropter ordinata est IC ; eam biseca, & per puncta contactus & bisectionis age rectam, quæ aut suo cum DF concursu dabit centrum; aut ei parallela erit.

propositum, quia difficilius est, & solum exhibet solutionem alterius.

Ceterum punctum I facile determinatur. Occurrat enim recta CG rectæ AB in K ; & erit AD ad DB ut KG ad GB ; seu quadrata AD , DB ut quadrata KG , GB ; ostensum autem est in conicis ut quadrata AD , DB ita esse rectangulum CGI ad quadratum GB ; ergo quadratum datum KG æquat rectangulum CGI ; igitur CG ad GK ut KG ad GI : datur autem CG ; GK ; quare datur etiam GI .

Poterat etiam per C agi hi parallela alteri tangenti, & sic defini punctum; quantum ad sectionem, quæ descripta circa hæc quinque puncta, tanget rectas AD , DB .

Sed & hoc per Probl. LVII. solvi potest.

Si primum sectio erit ellipsis, si centrum cadit intra angulum ADB , hyperbola vero, si cadit extra; & tunc semper, dato EO , ut ait Newtonus, simul datur VO medium proportionale inter DO & EO .

Jungantur puncta $B; A; C$; fiat angulus $TAB. Y.$ CAG æqualis KAB ; & per CB agatur recta $Fig. 7.$ CB ipsi AG occurrens in G , fiat nunc angulus BAF æqualis BAK ; producatur FA , donec ipsi DB occurrat in L ; per data puncta G, L agatur recta indefinita GL ; recta GB ; & angulus GAC circa puncta $A; G$; gyrantes, concursu suo peragrantes rectam GL describat sectionem conicam requisitam.

Si secundum, sectio erit parabola, & bisecta ED dat V verticem. Hoc enim problema diversimode proponi potest. Siquidem fieri potest, ut sciamus AD , DB esse tangentes nunc parabole, nunc hyperbolæ, nunc ellipsoos per C transeuntis, & describenda sit certa curva; & fieri potest ut datis tangentibus & punctis, proponatur invenire quænam sectio problemati satisfaciat, & eam describere. Nos solvimus problema secundo modo

nicas sectiones generaliter exprimit, puta hanc $a + bx + cxx + dy + exy + yy = 0$, ubi a, b, c, d, e denotant quantitates determinatas cum signis suis, x vero & y quantitates indeterminatas. Si jam quantitates determinatas a, b, c, d, e invenire possumus, habebimus conicam sectionem. Fingamus ergo punctum L successive incidere in puncta A, C, B, E, D , & videamus qui inde sequetur. Si ergo punctum L incidit in punctum A , erit in eo casu AK & KL , hoc est x & y , nihil. Proinde æquationis omnes termini præter a evanescent, & restabit $a = 0$. Quare delendum est a in æquatione illa, & ceteri termini.

$$bx + cxx + dy + exy + yy \text{ erunt } = 0.$$

Porro si L incidit in C , erit AK seu $x = AC$, & LK seu $y = 0$. Pone ergo $AC = f$, & substituendo f pro x , & 0 pro y ; æquatio ad curvam

$$bx + cxx + dy + exy + yy = 0,$$

evadet

$$bf + cff = 0, \text{ seu } b = -cf.$$

Et in æquatione illa scripto $-cf$ pro b evadet

$$-cfx + cxx + dy + exy + yy = 0.$$

Adhæc si punctum L incidit in punctum B , erit AK seu $x = AH$, & CL seu $y = BH$. Pone ergo $AH = g$ & $BH = h$, & perinde scribe g pro x & h pro y , & æquatio

$$-cfx + cxx, \text{ \&c.}$$

evadet

$$-cfg + cgg + db + egh + hh = 0.$$

Quod si punctum L incidit in E , erit $AK = AH$ seu $x = g$, & KL seu $y = HE$. Pro HE . ergo scribe $-k$ cum signo negativo quia HE jacet ad contrarias partes lineæ AC , & substituendo g pro x & $-k$ pro y , æquatio

$$-cfx + cxx, \text{ \&c.}$$

evadet

$$-cfg + cgg - dk - egh + kh = 0.$$

Aufer hoc de superiori æquatione

$$-cfg + cgg + db + egh + hh,$$

&

& restabit

$$db + egh + bb + dk + egk - kk = 0.$$

Divide hoc per $b + k$, & fiet $d + eg + b - k = 0$.

Hoc ductum in b aufer de

$$-efg + efg + db + egh + bb = 0,$$

& restabit

$$-efg + efg + bk = 0, \text{ seu } \frac{bk}{gg + fg} = c.$$

Denique si punctum L incidit in punctum D , erit AK seu $x = AI$, & KL seu $y = ID$. Quare pro AI scribe m & pro ID n , & perinde pro x & y substitue m & n , & æquatio

$$-cfx + cxx, \text{ \&c.}$$

evadet

$$-cfm + cmm + dn + emn + nn = 0.$$

Hoc divide per n & fiet

$$\frac{-cfm + cmm}{n} + d + em + n = 0.$$

$$\text{Aufer } d + eg + b - k = 0,$$

& restabit

$$\frac{-cfm + cmm}{n} + em - eg + n - b + k = 0.$$

Sive

$$\frac{cmm - cfm}{n} + n - b + k = eg - em.$$

Jam vero ob data puncta A, B, C, D, E dantur AC, AH, AI, BH, EH, DI , hoc est f, g, m, b, k, n . Atque adeo per æquationem $\frac{bk}{fg - gg} = c$ datur c . Dato autem c , per æquationem

$$\frac{emm - cfm}{n} + n - b + k = eg - em$$

datur $eg - em$. Divide hoc datum per datum $g - m$, & emerget datum e . Quibus inventis, æquatio $d + eg + b - k = 0$, seu $d = k - b - eg$ dabit d . Et his cognitis, simul determinatur æquatio ad quæsitam conicam sectionem

$$cfx = cxx + dy + exy + yy.$$

Et ex ea æquatione per methodum Cartesii determinabitur conica sectio.

Quod si quatuor puncta A, B, C, E, & positio rectæ AF quæ tangit conicam sectionem ad unum istorum punctorum A, daretur, posset conica sectio sic facilius determinari. Inventis ut supra æquationibus

$$cfx = cxx + dy + exy + yy,$$

$$d = k - b - eg,$$

$$e = \frac{bk}{fg - gg},$$

concipe tangentem AF occurrere rectæ EH in F, dein punctum L moveri per perimetrum figuræ CDE donec incidat in punctum A: & ultima ratio ipsius LK ad AK erit ratio FH ad AH, ut contemplanti figuram constare potest (p). Dic vero $FH = p$, & in hoc casu ubi LK est ad AK in ultima ratione, erit $p . g :: y, x$, sive $\frac{gy}{p} = x$. Quare pro x in æquatione

$$cfx = cxx + dy + exy + yy,$$

scribe $\frac{gy}{p}$, & orietur

$$\frac{cgy}{p} = \frac{cgyy}{pp} + dy + \frac{egyy}{p} + yy.$$

Divide omnia per y , & emerget

(p) Ubiunque cadat recta LK, si producatur in I, similia semper erunt triangula IAK, FAH, unde semper IK . KA :: FH . HA; quæ ratio, cum semper eadem sit, manebit

etiam, ubi IK tam prope AL erit, ut fere cum ea coincidat, sive, ut triangulum IKA evanescat; tunc vero coincident puncta K, L, A, quæ ratio dicitur ultima.

$$\frac{cfz}{p} = \frac{cglg}{fp} + d + \frac{cgy}{p} + y.$$

Jam, quia supponitur punctum L incidere in punctum A, adeoque KL, seu y, infinite parvum vel nihil esse, dele terminos qui per y multiplicantur, & restabit $\frac{cfz}{p} = d$. Quare fac $\frac{bk}{fg - glg} = c$ dein $\frac{cfz}{p} = d$, denique $\frac{k - b - d}{g} = e$, & inventis c, d & e, æquatio

$$cfx = cxx + dy + exy + yy$$

determinabit conicam sectionem.

Si denique tria tantum puncta A, B, B dentur, una cum positione duarum rectarum AT, CT, quæ tangunt conicam sectionem in duobus istorum punctorum A & C, obtinebitur ut supra ad conicam sectionem æquatio hæc

$$cfx = cxx + dy + exy + yy.$$

Deinde si supponatur ordinatam KL parallelam esse tangenti AT, & concipiatur eam produci donec rursus occurrat conicæ sectioni in M, & lineam illam LM accedere ad tangentem AT donec cum ea conveniat ad A; ultima ratio linearum KL & KM ad invicem erit ratio æqualitatis, ut contemplanti figuram constare potest. Quamobrem in illo casu existentibus KL & KM, sibi invicem æqualibus, hoc est duobus valoribus ip- y (affirmativo scilicet KL, & negativo KM) æqualibus, debent æquationis

$$cfx = cxx + dy + exy + yy$$

termini illi in quibus y est imparis dimensionis, hoc est termini dy + exy respectu termini yy in quo y est paris dimensionis, evanescere (q). Aliter enim duo valores ipsius y, affirmativus & negativus, æquales esse non possunt. Et in illo quidem casu AK infinite minor erit quam LK, hoc est x quam y, proinde terminus exy quam terminus yy. Atque adeo infinite mi-

(q) Ex æquationum natura patebit in omni æquatione secundum terminum evanescere, ubi aggregatum ex radicibus affirmativis æquat aggregatum ex radicibus negativis. Nobis autem sufficit id demonstrare in æquationibus quadraticis; in quibus duæ sunt omnino radices, & ideo debent esse æquales, ut aggregatum ex positivis æquet aggregatum ex nega-

tivis. Sit igitur $x = a$, & $x = -a$; aut $x - a = 0$ & $x + a = 0$, Factum ex duabus hisce quantitativis est $xx - aa$, ubi secundus terminus ax non apparet; & quoniam hæc æquatio exponit omnes quadraticas habentes duas radices æquales, sed alteram negativam, alteram positivam, patet propositum.

minor existens, pro nihilo habendus erit. At terminus dy respectu termini yy , non evanescet ut oportet, sed eo major erit nisi d supponatur esse nihil (r). Delendus est itaque terminus dy , & sic restabit

$$efx = cxv + exy + yy,$$

æquatio ad conicam sectionem. Concipiuntur jam tangentes AT, CT sibi mutuo occurrere in T, & punctum L accedere ad punctum C donec in illud incidat. Et ultima ratio ipsius KL ad KC erit AT ad AC. KL erat y ; AK, x ; & AC, f ; atque adeo KC, $f - x$. Sic AT = g , & ultima ratio y ad $f - x$, erit ea quæ est g ad f . Æquatio

$$efx = cxv + exy + yy,$$

subducto utrobique cxv , fit

$$efx - cxv = exy + yy,$$

hoc est, $f - x$ in $cx = y$ in $cx + y$. Ergo est $y \cdot f - x :: cx \cdot cx + y$, adeoque $g \cdot f :: cx \cdot cx + y$. At puncto L incidente in C, fit y nihil (s). Er-

(r) Mens Auctoris non bene explicari posse videtur nisi e Fluxionum natura, quæ consideratio loci hujus non est. Sed, opinor, res ipsa potest aliter explanari. Secundus terminus $dy + exy$ debet evanescere. Igitur $d + ex = 0$: sed quia ex hypothesi $x = 0$, erit $d + 0 = 0$ aut $d = 0$.

(s) Licet hæc satis perspicua videantur, tamen sic quodammodo explicari possunt. Quia $f - x$ & y in nihilum evanescunt, eis præfigatur 0, ut simul pateat illas quantitates in nihilum redactas esse, & nosci possit, unde quis terminus ortus sit; tunc ergo y evadet cy , & $f - x$ fiet $cf - cx$; (non enim x evanescit, quinimo evadit quam maximus potest, sed tota quantitas complexa $f - x$) est autem $cy \cdot cf - cx :: g \cdot f$, igitur $cy = \frac{g \cdot f}{f}$,

quapropter

$$efx - cxv = (f - x) cx$$

fit

$$(cf - cx) cx,$$

&c

$$exy = ex \cdot y = ex \cdot cy = ex \left(\frac{g \cdot f}{f} \right),$$

ac

$$yy = cy \cdot cy = \frac{2 \cdot g \cdot c \cdot x}{f} + \frac{g \cdot c \cdot x \cdot x}{f \cdot f};$$

unde habetur

$$(cf - cx) cx = cx \left(\frac{g \cdot f}{f} \right)$$

$$+ \frac{2 \cdot g \cdot c \cdot x}{f} + \frac{g \cdot c \cdot x \cdot x}{f \cdot f}$$

& cunctis divisivis per 0,

$$(f - x) cx = cx \left(g - \frac{f \cdot x}{f} \right) + \frac{2 \cdot g \cdot c \cdot x}{f}$$

$$+ \frac{g \cdot c \cdot x \cdot x}{f};$$

æqui ultimi tres termini ducti in nihilum evanescant, dum alteri manent finiti, ergo

$$(f - x) cx = cx \left(g - \frac{f \cdot x}{f} \right);$$

&c

Ergo $g . f :: ex . ex$. Divide posteriorem rationem per x , & evadet
 $g . f :: e . e$, & $\frac{ef}{g} = e$. Quare si in æquatione

$$efx = exx + cxy + yy,$$

scribas $\frac{ef}{g}$ pro e , fiet

$$efx = exx + \frac{ef}{g} xy + yy,$$

æquatio ad conicam sectionem. Denique ipsi KL seu AT a dato puncto
 B, per quod conica sectio transire debet, age parallelam BH occurrentem
 AC in H. & concipiendo LK accedere ad BH donec cum ea coincidat,
 in eo casu erit AH = x , & BH = y . Dic ergo datam AH = m , &
 datam BH = n , & perinde pro x & y in æquatione

$$efx = exx + \frac{ef}{g} xy + yy,$$

scribe m & n , orietur

$$efm = emm + \frac{ef}{g} mn + nn.$$

Aufer utrobique $emm + \frac{ef}{g} mn$, & fiet

$$efm - emm - \frac{ef}{g} mn = nn.$$

Pone $f - m - \frac{fn}{g} = s$, & erit $esm = nn$. Divide utramque partem
 æquationis per sm , & orietur $e = \frac{nn}{sm}$. Invento autem e , determinata ha-
 betur æquatio ad conicam sectionem

$$efx = exx + \frac{ef}{g} xy + yy.$$

Et

& cunctis divisus per x , multiplicatisque per f ,
 $(f-x) ef = e (gf - gx) = e . g (f-x)$;

quare $ef = ge$, & $\frac{ef}{g} = e$.

Et inde per methodum Cartesii conica sectio datur & describi potest.

Atque hætenus varia evolvi problemata. In scientiis enim addiscendis profunt exempla magis quam præcepta. Qua de causa in his fusius expatiatus sum. Sed & aliqua quæ inter scribendum occurrebant, immiscui sine Algebra soluta, ut insinuarem in problematibus, quæ prima fronte difficilia videntur, non semper ad Algebram recurrendum esse. Sed tempus est jam æquationum resolutionem docere. Nam postquam problema ad æquationem deductum est, radices illius æquationis, quæ quantitates sunt problemati satisfaciennes, extrahere oportebit.

FINIS TOMI I.



ERRATA.









TOMI I.

CORRIGE

Pag. 4. not. 11. lin. positivæ & affirmativæ
 pag. 14. not. 55. lig. 3. col. 2. $11 - 4 = 8$
 pag. 38. Ex. (f) (275
 pag. 52. lin. 7. a fine 2536
 pag. 55. ($aa + 3ab - 2bb^2$
 pag. 62. not. lin. pen. $(m+1)(n+1)(m+1)$
 pag. 110. not. 29. $x \cdot y :: y \cdot x$
 pag. 112. not. 43. *cum cognita*
 pag. 125. $pA + qB = rC$
 pag. 160. not. lig. 13. a fin. col. 2. CB
 pag. 163. not. lig. 13. col. 2. $AG = H - a$

positivæ & negativæ
 $12 - 4 = 8$
 (2,75
 15360
 ($aa + 3ab - 2bb$
 $(m+1)n+1(m+1)$
 $x \cdot y :: y \cdot z.$
cum incognita.
 $pA + qB + rC$
 DB
 $AG = AH - a.$

TAB. A.



TAB. B.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.



Fig. 8.




Fig. 9.
















Fig. 10.




TAB. C.










TAB. D.





TAB. E.



TAB. F.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.






Fig. 11.


TAB. G.



TAB. I.



TAB. K.



TAB. M.





Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 7.











Fig. 6.








TAB. N.




TAB. O.




TAB. P.




TAB. Q.




TAB. R.









TAB. S.












TAB. T.











TAB. U.




TAB. X.










4158



CE



a39003 013161590b



GretagMachbeth™ ColorChecker Color Rendition Chart

